

រៀបរៀងដោយ លីម ផល្គុន

Tel: 017 768 246

www.mathtoday.wordpress.com

គណិតវិទ្យា

សម្រាប់ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម

រួមមាន ៖

- ◇ មេរៀនសង្ខេប
- ◇ លំហាត់គំរូ
- ◇ លំហាត់អនុវត្តន៍

© ក្សេមសិទ្ធិ

អនុគមន៍មានមួយអង្វែរ

1-និយមន័យ :

☞ ទំនាក់ទំនងទ្វេធាតុ f ពីសំណុំ E ទៅសំណុំ F ជាអនុគមន៍កាលណាគ្រប់ធាតុ x នៃសំណុំ E មានរូបភាព y យ៉ាងច្រើននៃសំណុំ F ។

គេកំនត់សរសេរ : $f : E \mapsto F$
 $f : x \mapsto y = f(x)$

☞ ដែនកំនត់នៃអនុគមន៍ f គឺជាសំណុំនៃធាតុដើម ដែលមានរូបភាពតាមអនុគមន៍ f

គេកំនត់សរសេរ : $D = \{ \forall x \in E, \exists y \in F / y = f(x) \}$ ។

ឧទាហរណ៍ : ចូរកំនត់ដែនកំនត់នៃអនុគមន៍ $y = f(x) = (2x + 3)e^{\frac{x^2}{2}} \ln x$

អនុគមន៍នេះអាចកំនត់បានលុះត្រាតែ $x > 0$ ។ ដូចនេះ $D =]0, +\infty[$ ។

២-លើកលែងអនុគមន៍ :

ក. និយមន័យ : ឧបមាថាមានអនុគមន៍ f កំនត់លើចន្លោះ I ហើយ x_0 ជាចំនួនពិតនៅក្នុងចន្លោះ I និង h ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យដែល $x_0 + h$ នៅក្នុងចន្លោះ I ។

ចំនួនដេរីវេនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ចំនុច x_0 (បើមាន) ជាលីមីតនៃផលធៀបរវាងអត្រាកំណើន $\Delta y = f(x_0 + h) - f(x_0)$ ជាមួយនឹង $\Delta x = (x_0 + h) - x_0 = h$ កាលណា Δx

ខិតទៅរកសូន្យ ។ គេកំនត់សរសេរ $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{U(x)}{V(x)}$ ។

ប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថា $y'_0 = f'(x_0) = \frac{U'(x_0)V(x_0) - V'(x_0)U(x_0)}{V^2(x_0)}$ ។

គេបាន $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

$$\begin{aligned}
& \frac{U(x_0 + h) - U(x_0)}{V(x_0 + h) - V(x_0)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x_0 + h) - U(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{\frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h}} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x_0 + h)V(x_0) - U(x_0)V(x_0 + h)}{h V(x_0 + h)V(x_0)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[U(x_0 + h)V(x_0) - U(x_0)V(x_0)] - [U(x_0)V(x_0 + h) - U(x_0)V(x_0)]}{h V(x_0 + h)V(x_0)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\left(\frac{U(x_0 + h) - U(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{V(x_0 + h)} \right) - \left(\frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h} \cdot \frac{U(x_0)}{V(x_0 + h)V(x_0)} \right) \right] \\
&= U'(x_0) \cdot \frac{1}{V(x_0)} - V'(x_0) \cdot \frac{U(x_0)}{V^2(x_0)} = \frac{U'(x_0)V(x_0) - V'(x_0)U(x_0)}{V^2(x_0)} \\
&\text{ដូចនេះ: } \boxed{y'_0 = f'(x_0) = \frac{U'(x_0)V(x_0) - V'(x_0)U(x_0)}{V^2(x_0)}} \quad \forall
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = a^x$ ដែល $a > 0, a \neq 1$ $\forall$

ដោយប្រើនិយមន័យចូរមេត្តា $y'_0 = f'(x_0) = a^{x_0} \cdot \ln a$

$$\begin{aligned}
\text{គេបាន } f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x_0 + h} - a^{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a^{x_0} \frac{a^h - 1}{h} = a^{x_0} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^{x_0} \cdot \ln a
\end{aligned}$$

$$\left(\text{ពីព្រោះ } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a \right) \quad \forall$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{y'_0 = f'(x_0) = a^{x_0} \cdot \ln a} \quad \forall$$

ខ. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍សំខាន់ៗ និង រូបមន្តត្រី:

$$1. y = ax^n \Rightarrow y' = n a x^{n-1} \quad \text{ដែល } a \in \mathbb{R}$$

$$2. y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$3. y = \frac{a}{x} \Rightarrow y' = -\frac{a}{x^2} \quad \text{ដែល } a \in \mathbb{R}$$

$$4. y = e^x \Rightarrow y' = e^x \quad \left(e = 2.7182818... \text{ ជាគោលលោការីតនេព័រ } \right)$$

$$5. y = e^{ax} \Rightarrow y' = a e^{ax} \quad \text{ដែល } a \in \mathbb{R}$$

$$6. y = a^x \Rightarrow y' = a^x \cdot \ln a \quad \text{ដែល } a > 0 \quad \forall$$

$$7. y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$8. y = \ln(ax + b) \Rightarrow y' = \frac{a}{ax + b}$$

$$9. y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x \cdot \ln a} \quad \text{ដែល } a > 0, a \neq 1 \quad \forall$$

$$10. y = u + v - w \Rightarrow y' = u' + v' - w'$$

$$11. y = u^n \Rightarrow y' = n u' u^{n-1}$$

$$12. y = \sqrt{u} \Rightarrow y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$13. y = u \cdot v \Rightarrow y' = u'v + v'u$$

$$14. y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$15. y = \frac{1}{v} \Rightarrow y' = -\frac{v'}{v^2}$$

$$16. y = e^u \Rightarrow y' = u' e^u$$

$$17. y = a^u \Rightarrow y' = u' a^u \ln a$$

$$18. y = u^v \Rightarrow y' = u'v u^{v-1} + v' u \ln u$$

ឧទាហរណ៍ : ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = e^{\frac{1+\ln x}{x}}$ ដែល $x > 0$ ។

តាមរូបមន្ត $(e^u)' = U' \cdot e^u$ គេបាន :

$$y' = \left(\frac{1+\ln x}{x} \right)' e^{\frac{1+\ln x}{x}} = \frac{(1+\ln x)'x - (x)'(1+\ln x)}{x^2} \cdot e^{\frac{1+\ln x}{x}} = \frac{1-1-\ln x}{x^2} \cdot e^{\frac{1+\ln x}{x}}$$

ដូចនេះ $y' = -\frac{\ln x}{x^2} \cdot e^{\frac{1+\ln x}{x}}$ ។

ឧទាហរណ៍ : ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{x^2-4x}$

គេបាន $\ln y = \ln \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{x^2-4x}$ (រូបមន្ត $\ln U^V = V \ln U$, $\ln \frac{U}{V} = \ln U - \ln V$)

$$\ln y = (x^2 - 4x)[\ln(\ln x) - \ln x]$$

ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរនៃសមភាពនេះគេបាន :

$$\frac{y'}{y} = (2x - 4)(\ln \ln x - \ln x) - \left(\frac{1}{x \ln x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$y' = \left[(2x - 4)(\ln \ln x - \ln x) - \left(\frac{1}{x \ln x} - \frac{1}{x} \right) \right] \cdot y$$

ដូចនេះ $y' = f'(x) = \left[2(x - 2)(\ln \ln x - \ln x) - \frac{1 - \ln x}{x \ln x} \right] \cdot \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{x^2 - 4x}$

គ. ដេរីវេបន្តបន្ទាប់

ឧបមាថា f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេទី n លើចន្លោះ I ។

ដែលហៅថាអនុគមន៍ដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ គឺជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ :

$$y^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n} = f^{(n)}(x) \quad \text{ដែល } n \in \mathbb{N}^* \quad \text{។}$$

ឃ. រូបមន្តដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍ផលគុណ :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $y = u \cdot v$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍ពីរ ។

$$\text{គេមាន } y' = u'v + v'u \quad (1 - 1)$$

$$y'' = u''v + 2u'v' + uv'' \quad (1 - 2 - 1)$$

$$y''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv''' \quad (1 - 3 - 3 - 1)$$

$$y^{(4)} = u^{(4)}v + 4u^{(3)}v' + 6u''v'' + 4u'v^{(3)} + uv^{(4)} \quad (1 - 4 - 6 - 4 - 1)$$

ដូចនេះគេបានរូបមន្តទូទៅ :

$$y^{(n)} = (u \cdot v)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + C_n^2 u^{(n-2)} v'' + \dots + C_n^{n-1} u' v^{(n-1)} + C_n^n u v^{(n)}$$

៣-អនុគមន៍ដេរីវេនៃអនុគមន៍ :**ក. អនុគមន៍ចំណាយម៉ាជីណល (Marginal Cost Function)**

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុប (Total Cost Function) មួយកំនត់ដោយ :

$TC = TC(x)$ ដែល x តាងឱ្យបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិត ។

ដែលហៅថា Marginal Cost Function គឺជាអនុគមន៍ដេរីវេនៃ Total Cost Function

គេកំនត់តាងដោយ $MC = MC(x) = \frac{dTC(x)}{dx} = TC'(x)$ ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបមួយកំនត់ដោយ :

$TC(x) = 4x^3 - 12x^2 + 15x + 100$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិត ។

ក. ចូរកំនត់រក Marginal cost function

ខ. ចូរកំនត់រក Marginal cost ត្រង់ចំណុច $x = 20$ units ។

ដំណោះស្រាយ :

ក. រក Marginal cost function

គេមាន $TC(x) = 4x^3 - 12x^2 + 15x + 100$

គេបាន $MC(x) = TC'(x) = (4x^3 - 12x^2 + 15x + 100)' = 12x^2 - 24x + 15$

ដូចនេះ $MC(x) = 3(4x^2 - 8x + 5)$ ។

ខ. កំនត់រក Marginal cost ត្រង់ចំណុច $x = 20$ units

គេបាន $MC(20) = 12 \cdot 20^2 - 24 \cdot 20 + 15 = 4335$ ។

មានន័យថា បើគេផលិតបន្ថែម 1 ឯកតាទី 21 នោះគេត្រូវចំណាយបន្ថែម 4335 ឯកតារូបិយវត្ថុ ។

ខ. អនុគមន៍ចំណូលម៉ាជីណល (Marginal Revenue Function)

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ចំណូលសរុប (Total Revenue Function) មួយកំនត់ដោយ :

$TR = TR(x)$ ដែល x តាងឱ្យបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ ។

ដែលហៅថា Marginal Revenue Function គឺជាអនុគមន៍ដេរីវេនៃ

Total Revenue Function តែកំនត់តាំងដោយ $MR = MR(x) = \frac{dTR(x)}{dx} = TR'(x)$ ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំនូលសរុបមួយកំនត់ដោយ :

$TR(x) = 40x - 0.02x^2$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ ។

ក. ចូរគណនា $TR(1000)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ ?

ខ. ចូរកំនត់រក Marginal Revenue Function

គ. ចូរកំនត់រក Marginal Revenue Function ត្រង់ $x = 100$ units ។

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនា $TR(1000)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ

គេមាន $TR(x) = 40x - 0.02x^2$

គេបាន $TR(1000) = 40 \cdot 1000 - 0.02 \times 1000^2 = 40000 - 20000 = 20000$

ដូចនេះ $TR(1000) = 20000$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។ លទ្ធផលនេះមានន័យថាការលក់

ផលិតផលចំនួន 1000 units នោះគេនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនូលសរុប 20000 (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

ខ. កំនត់រក Marginal Revenue Function

គេមាន $TR(x) = 40x - 0.02x^2$

គេបាន $MR(x) = TR'(x) = (40x - 0.02x^2)' = 40 - 0.04x$

ដូចនេះ $MR(x) = 40 - 0.04x$

គ. កំនត់រក Marginal Revenue Function ត្រង់ $x = 100$ units

គេបាន $MR(100) = 40 - 0.04(100) = 40 - 4 = 36$ ។

មានន័យថាបើគេលក់បន្ថែម 1 ឯកតាទៀត (ឯកតាទី 101) នោះប្រាក់ចំនូលនឹងកើនឡើង

ចំនួន 36 ឯកតារូបិយវត្ថុ ។

គ. អនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញម៉ាជីណល (Marginal Profit Function)

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុប (Total Profit Function) មួយកំនត់ដោយ៖

$TP = TP(x)$ ដែល x តាងឱ្យបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ ។

ដែលហៅថា Marginal Profit Function គឺជាអនុគមន៍ដេរីវេនៃ

Total Profit Function គេកំនត់តាងដោយ $MP = MP(x) = \frac{dTP(x)}{dx} = TP'(x)$ ។

ឧទាហរណ៍៖ ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុបមួយកំនត់ដោយ ៖

$TP(x) = 50\sqrt{x^2 + 225} - \frac{x}{2} - 750$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលត្រូវលក់ ។

ក. ចូររក $TP(8)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ ។

ខ. ចូររក Marginal Profit Function.

គ. ចូររក Marginal Profit Function ត្រង់ចំណុច $x = 20$ units ។

ដំណោះស្រាយ

ក. រក $TP(8)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ

គេបាន $TP(8) = 50\sqrt{8^2 + 225} - \frac{8}{2} - 750 = 96$

ដូចនេះ $TP(8) = 96$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។ លទ្ធផលនេះមានន័យថាកាលណាគេលក់ផលិតផល

ចំនួន 8 ឯកតាគេនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 96 (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

ខ. រក Marginal Profit Function.

គេមាន $TP(x) = 50\sqrt{x^2 + 225} - \frac{x}{2} - 750$

គេបាន $MP(x) = TP'(x) = 50 \frac{(x^2 + 225)'}{2\sqrt{x^2 + 225}} - \frac{1}{2} = \frac{50}{\sqrt{x^2 + 225}} - \frac{1}{2}$

ដូចនេះ $MP(x) = \frac{50}{\sqrt{x^2 + 225}} - \frac{1}{2}$ ។

គ. រក Marginal Profit Function ត្រង់ចំណុច $x = 20$ units

គេបាន $MP(20) = \frac{50}{\sqrt{20^2 + 225}} - \frac{1}{2} = \frac{50}{\sqrt{625}} - \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1.50$ ។

មានន័យថាបើគេលក់បន្ថែម 1 ឯកតា ទី 21 នោះគេបានប្រាក់ចំណេញ 1.50 (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

៤-បរមាភូមិអនុគមន៍ (Optimization)

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម គេច្រើនជួបនូវបញ្ហានៅចំពោះមុខដែលត្រូវដោះស្រាយ ហើយរាល់ដំណោះស្រាយទាំងនោះគេតែងចង់បានជានិច្ចនូវដំណោះស្រាយដែលប្រសើរបំផុត (Optimal solution) ដូចជា :

- ការកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណូលសរុប (Total Revenue) ឬ ប្រាក់ចំណេញសរុប (Total Profit) អតិបរមា ។
- កំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិតដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណាយមធ្យមក្នុង១ឯកតាអប្បបរមា បញ្ហាទាំងអស់នេះគេអាចបកស្រាយបានតាមគណិតវិទ្យាដោយប្រើបរមាភូមិអនុគមន៍ ។

☞ វិធីកំណត់រកបរមាភូមិអនុគមន៍មានមួយអថេរ :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $y = f(x)$ ។

ដើម្បីកំណត់រកបរមាភូមិអនុគមន៍នេះគេត្រូវ :

1-គណនាដេរីវេទីមួយ $y' = f'(x)$

2-រកឫសរបស់សមីការ $f'(x) = 0$ ឧបមាថាវាមានឫស $x = x_0$

3-គណនាដេរីវេទីពីរ $y'' = f''(x)$ រួចរកតម្លៃលេខនៃ $y''_0 = f''(x_0)$

សន្និដ្ឋាន :

-បើ $f''(x_0) < 0$ នោះអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = x_0$ ។

-បើ $f''(x_0) = 0$ (មិនអាចសន្និដ្ឋានបាន) ។

-បើ $f''(x_0) > 0$ នោះអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = x_0$ ។

❁ រំលឹកសមីការដឺក្រេទីពីរ : $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$

ដើម្បីរកចម្លើយសមីការនេះគេត្រូវ :

-គណនាបរិមាណ $\Delta = b^2 - 4ac$

-បើ $\Delta > 0$ សមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នាគឺ

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

-បើ $\Delta = 0$ សមីការមានឫសឌុបគឺ $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ ។

-បើ $\Delta < 0$ សមីការគ្មានឫសក្នុងសំណុំចំនួនពិត ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំនូលសរុប $TR(x) = 13500x - 60x^2 - x^3$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលគេត្រូវលក់ ។

តើគេត្រូវលក់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យបានចំនូលសរុបអតិបរមា ?

ចូរកំណត់ប្រាក់ចំនូលអតិបរមានោះ ?

ដំណោះស្រាយ

-គណនាដេរីវេទីមួយ $TR'(x) = 13500 - 120x - 3x^2$

-ដោះស្រាយសមីការ $TR'(x) = 0$ នាំឱ្យ $-3x^2 - 120x + 13500 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-60)^2 - (-3)(13500) = 44100 = 210^2$

គេទាញឫស $x_1 = \frac{60 - 210}{-3} = 50$, $x_2 = \frac{60 + 210}{-3} = -90 < 0$ (មិនយក)

-គណនាដេរីវេទីពីរ $TR''(x) = -120 - 6x$

ដោយ $TR''(50) = -120 - 6(50) = -420 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់

$x = 50$ មានន័យថាដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំនូលសរុបអតិបរមាគេត្រូវលក់ផលិតផលចំនួន 50 units

ហើយប្រាក់ចំនូលសរុបអតិបរមានោះគឺ $TR(50) = 400,000$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

ឧទាហរណ៍: ឧបមាថាមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុប $TR(x) = 12600x$ និងអនុគមន៍

ប្រាក់ចំណាយសរុប $TC(x) = 6000 + 15x^2 + x^3$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផល ។

ចូរកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ដើម្បីឱ្យបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា ?

ចូរកំណត់រកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\text{Total Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Cost}$

គេបាន $TP(x) = 12600x - (6000 + 15x^2 + x^3) = -x^3 - 15x^2 + 12600x - 6000$

-គណនាដេរីវេទីមួយ $TP'(x) = -3x^2 - 30x + 12600$

-ដោះស្រាយសមីការ $TP'(x) = 0$ នាំឱ្យ $-3x^2 - 30x + 12600 = 0$

គណនា $\Delta' = (-15)^2 - (-3)(12600) = 225 + 37800 = 38025 = 195^2$

គេទាញយក $x_1 = \frac{15 - 195}{-3} = 60$, $x_2 = \frac{15 + 195}{-3} = -70 < 0$ (មិនយក)

-គណនាដេរីវេទីពីរ $TP''(x) = -6x - 30$ ។

ដោយ $TP''(60) = -6(60) - 30 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = 60$ ។

ដូចនេះដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណេញអតិបរមាលុះត្រាតែគេលក់ផលិតផលចំនួន 60 units ។

ប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះគឺ $TP(60) = 480,000$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបក្នុងការផលិតមួយកំណត់ដោយ :

$TC(x) = \frac{x^2}{9} + 2x + 2500$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលបានផលិត ។

តើគេត្រូវផលិតផលនេះប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមអប្បបរមា ?

ចូររកប្រាក់ចំណាយអប្បបរមានោះ ?

SOLUTION: -គេត្រូវផលិតចំនួន 150 units

-ចំណាយមធ្យមអប្បបរមាក្នុងឯកតាគឺ 35.33 (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

៥-អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (Indefinite integrals)

ក-និយមន័យ : អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ គឺជាសំណុំនៃព្រីមីទីវទាំងអស់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដែលគេកំណត់សរសេរ : $\int f(x).dx = F(x) + c$ ។

ដែល c ជាចំនួនថេរ ហើយ $F'(x) = f(x)$ ។

ខ-រូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំណត់សំខាន់ៗ :

$$1. \int x^n .dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c \quad \text{ដែល } n \neq -1, c \in \mathbb{R}$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$3. \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + c$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + c$$

$$5. \int e^x .dx = e^x + c$$

$$6. \int e^{ax} .dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c \quad \text{ដែល } a \neq 0$$
 ។

$$7. \int a^x .dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad \text{ដែល } a > 0, a \neq 1$$
 ។

គ-លក្ខណៈនៃអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ :

$$1. \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$2. \int [f(x) + g(x) - h(x)].dx = \int f(x).dx + \int g(x).dx - \int h(x).dx$$

ឃ-រូបមន្តអាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ :

$$1. \text{ ឧបមាថា } I = \int f(x).dx \text{ បើគេតាង } x = \varphi(t) \Rightarrow dx = \varphi'(t).dt$$

$$\text{គេបានរូបមន្ត } I = \int f(x).dx = \int f[\varphi(t)].\varphi'(t).dt$$
 ។

$$2. \text{ ឧបមាថា } I = \int f[\phi(x)].\phi'(x).dx \text{ បើគេតាង } u = \phi(x) \Rightarrow du = \phi'(x).dx$$

$$\text{គេបានរូបមន្ត } I = \int f[\phi(x)] \cdot \phi'(x) \cdot dx = \int f(u) \cdot du \quad \text{។}$$

ង-រូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក :

$$\text{គេមាន } d(u \cdot v) = v \, du + u \, dv$$

$$\text{គេទាញ } u \, dv = d(u \cdot v) - v \, du$$

$$\int u \, dv = \int d(u \cdot v) - \int v \, du = uv - \int v \, du$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{\int u \, dv = uv - \int v \, du} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int \frac{4x^5 - 2x^4 + 3x^2 + x - 1}{x^2} \cdot dx$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } I &= \int \left(4x^3 - 2x^2 + 3 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) \cdot dx \\ &= 4 \int x^3 dx - 2 \int x^2 dx + \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} \\ &= 4 \left(\frac{x^4}{4} \right) - 2 \left(\frac{x^3}{3} \right) + \ln |x| + \frac{1}{x} + c \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{I = x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \ln |x| + \frac{1}{x} + c} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍: គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int \frac{4x^7 \cdot dx}{x^4 + 1}$

តាង $t = x^4 + 1 \Rightarrow dt = 4x^3 \cdot dx$ និង $x^4 = t - 1$

$$\text{គេបាន } I = \int \frac{x^4 \cdot (4x^3 dx)}{x^4 + 1} = \int \frac{(t-1)dt}{t} = \int \left(1 - \frac{1}{t} \right) \cdot dt = \int dt - \int \frac{dt}{t} = t - \ln |t| + c$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{I = x^4 + 1 - \ln(x^4 + 1) + c} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int \frac{dx}{x \ln x}$

$$\text{គេមាន } I = \int \frac{\frac{dx}{x}}{\ln x} = \int \frac{\frac{dx}{x}}{\ln x} \quad \text{តាង } u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$$

$$\text{គេបាន } I = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + c = \ln |\ln x| + c$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{I = \ln |\ln x| + c} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍: គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int (4x + 1)e^{2x}.dx$

$$\text{តាង } \begin{cases} u = 4x + 1 \\ dv = e^{2x}.dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 4dx \\ v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } I &= \frac{1}{2}(4x + 1)e^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x}.4dx = \frac{1}{2}(4x + 1)e^{2x} - \int 2e^{2x}.dx \\ &= \frac{1}{2}(4x + 1)e^{2x} - e^{2x} + c = \frac{1}{2}(4x - 1)e^{2x} + c \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $I = \frac{1}{2}(4x - 1)e^{2x} + c$ ។

ឧទាហរណ៍ : $I = \int x^2 e^x .dx$

$$\text{តាង } \begin{cases} u = x^2 \\ dv = e^x .dx \end{cases} \begin{matrix} \text{នាំអោយ} \\ \begin{cases} du = 2x.dx \\ v = e^x \end{cases} \end{matrix}$$

$$= x^2 e^x - \int 2xe^x .dx$$

$$\begin{aligned} \text{តាង } \begin{cases} u = 2x \\ dv = e^x .dx \end{cases} \begin{matrix} \text{នាំអោយ} \\ \begin{cases} du = 2.dx \\ v = e^x \end{cases} \end{matrix} \\ &= x^2 e^x - \left[2xe^x - \int 2e^x .dx \right] \\ &= x^2 e^x - 2xe^x - 2e^x + c \\ &= (x^2 - 2x - 2)e^x + c \end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍ : គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int x^3 \ln x .dx$

$$\text{តាង } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x^3 .dx \end{cases} \begin{matrix} \text{នាំអោយ} \\ \begin{cases} du = \frac{1}{x}.dx \\ v = \frac{1}{4}x^4 \end{cases} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}x^4 \ln x - \int \frac{1}{4}x^4 \cdot \frac{1}{x}.dx \\ &= \frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 .dx \\ &= \frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{1}{16}x^4 + c \end{aligned}$$

៦-អនុវត្តន៍រវាងចេត្រាលមិតកំណត់ :

ក. កំណត់រកអនុគមន៍ Total Cost ដោយស្គាល់អនុគមន៍ Marginal Cost :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ Marginal Cost កំណត់ដោយ $MC = MC(x)$ ។

អនុគមន៍ Total Cost កំណត់ដោយ $TC(x) = \int MC(x).dx$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ Marginal Cost កំណត់ដោយ $MC(x) = \frac{x}{2} + 4$ គិតក្នុង១ខែ

សម្រាប់ការផលិត ហើយចំណាយថេរស្មើនឹង 100 ឯកតារូបិយវត្ថុ ។

ចូររកអនុគមន៍ Total Cost សម្រាប់ខែនីមួយៗ ?

-តាង $TC(x)$ ជា អនុគមន៍ Total Cost

$$\text{គេបាន } TC(x) = \int MC(x).dx = \int \left(\frac{x}{2} + 4\right).dx = \frac{x^2}{4} + 4x + k$$

-ដោយចំណាយថេរស្មើ 100 មានន័យថា $TC(0) = 100$ នាំឱ្យ $k = 100$ ។

ដូចនេះ $TC(x) = \frac{x^2}{4} + 4x + 100$ ។

ខ. កំណត់អនុគមន៍ Total Profit ដោយស្គាល់អនុគមន៍ Marginal Profit :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ Marginal Profit កំណត់ដោយ $MP = MP(x)$ ។

អនុគមន៍ Total Profit កំណត់ដោយ $TP(x) = \int MP(x).dx$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ Marginal Profit កំណត់ដោយ $MP(x) = 30 - 2x$ ។

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលបានលក់ ។ គេដឹងថាបើគេលក់ទំនិញ 15 ឯកតានោះ

គេនឹងបានប្រាក់ចំណេញ 25 ឯកតារូបិយវត្ថុ ។

ចូរកំណត់រកអនុគមន៍ Total Profit ?

$$\text{គេបាន } TP(x) = \int MP(x).dx = \int (30 - 2x).dx = 30x - x^2 + k$$

ដោយ $TP(15) = 25$ នាំឱ្យ $k = 200$ ។ ដូចនេះ $TP(x) = -x^2 + 30x + 200$ ។

គ.កំណត់រកអនុគមន៍ Total Revenue ដោយស្គាល់អនុគមន៍ Marginal Revenue :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ Marginal Revenue កំណត់ដោយ $MR = MR(x)$ ។

អនុគមន៍ Total Revenue កំណត់ដោយ $TR(x) = \int MR(x) \cdot dx$

ឧទាហរណ៍: គេមានអនុគមន៍ Marginal Revenue មួយកំណត់ដោយ :

$MR(x) = 8000 - 80x - 3x^2$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលបានលក់ ។

ចូរកំណត់រកអនុគមន៍ Total Revenue បើគេដឹងថា កាលណាគេលក់ផលិតផល 40 ឯកតា

គេទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុប 192 000 រៀល ។

SOLUTION: $TR(x) = 8000x - 40x^2 - x^3$ ។

គ.កំណត់រកអនុគមន៍ ផលិតផលសរុបដែលបានផលិតក្នុងរយៈពេល t ដោយស្គាល់អនុគមន៍

ទិន្នផលពលកម្មនៅខណៈ t :

បើគេស្គាល់ទិន្នផលពលកម្មមានអនុគមន៍ $W = W(t)$ នៅខណៈ t នោះអនុគមន៍

ផលិតផលសរុបដែលបានផលិតបានក្នុងរយៈពេល t កំណត់ដោយ :

$$TP(t) = \int W(t) \cdot dt$$

៧-អាំងតេក្រាលកំណត់ (Definite integrals)

ក-និយមន័យ : អាំងតេក្រាលកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ កំណត់ដោយ :

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n [f(\xi_k) \cdot \Delta x_k]$$

ដែល $x_k = a + \frac{b-a}{n} k$, $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$, $\xi_k \in [x_k, x_{k-1}]$ ។

ខ-ទ្រឹស្តីបទ Newton – Leibniz

បើ $f(x)$ ជាប់ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ និងមានព្រីមីទីវ $F(x)$ ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ នោះ

អាំងតេក្រាលកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ កំណត់ដោយ :

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{ដែល } F'(x) = f(x))$$

គ-លក្ខណៈនៃអាំងតេក្រាលកំនត់ :

$$1. \int_a^a f(x) = 0$$

$$2. \int_a^b k f(x).dx = k \int_a^b f(x).dx$$

$$3. \int_a^b [f(x) + g(x) - h(x)].dx = \int_a^b f(x).dx + \int_a^b g(x).dx - \int_a^b h(x).dx$$

$$4. \int_a^c f(x).dx + \int_c^b f(x).dx = \int_a^b f(x).dx$$

$$5. \int_a^b f(x).dx = -\int_b^a f(x).dx$$

ឃ-រូបមន្តអាំងតេក្រាលកំនត់ប្តូរអថេរ :

$$1. \text{បើគេមាន } I = \int_a^b f(x).dx \text{ បើគេតាង } x = \varphi(t) \Rightarrow dx = \varphi'(t).dt$$

ចំពោះ $x \in [a, b]$ ត្រូវនឹង $t \in [t_1, t_2]$ គេបានរូបមន្ត :

$$I = \int_a^b f(x).dx = \int_{t_1}^{t_2} f[\varphi(t)]\varphi'(t).dt$$

$$2. \text{បើគេមាន } I = \int_a^b f[\phi(x)]\phi'(x).dx \text{ បើគេតាង } u = \phi(x) \Rightarrow du = \phi'(x).dx$$

ចំពោះ $x \in [a, b]$ ត្រូវនឹង $u \in [\alpha, \beta]$ គេបានរូបមន្ត :

$$I = \int_a^b f[\phi(x)]\phi'(x).dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(u).du$$

ង-រូបមន្តគណនាអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក :


$$\int_a^b u dv = [u v]_a^b - \int_a^b v du$$

៧-អនុវត្តន៍អាំងតេក្រាលកំនត់**ក-តម្លៃមធ្យម : (Average Value)**

តម្លៃមធ្យមនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ កំនត់ដោយ :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x).dx \quad \text{។}$$


ខ-អត្ថន័យធរណីមាត្រ :



ក្រឡាផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $y = f(x)$ និងអក្សរអាប់ស៊ីស $(x'ox)$

ក្នុងចន្លោះ $[a, b]$ កំណត់ដោយ : $S = \int_a^b f(x).dx \quad \text{។}$

គ-ក្រឡាផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងពីរក្នុងចន្លោះមួយ :



រូបមន្តសម្រាប់គណនា

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)].dx \quad \text{។}$$

ឃ-ចំណាយក្នុងការថែទាំគ្រឿងយន្ត :


បើគេប្រើថយន្តកាន់តែយូរទៅនោះចំណាយក្នុងការថែទាំកាន់តែធំដែរ ។

ឧបមាថា $r(t)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយគ្រឿងយន្តមួយ នៅឆ្នាំទី t ដោយគិតធៀបពីពេលដែល

គេទើបប្រើប្រាស់ (t គិតជាឆ្នាំ) ។

ចំណាយក្នុងការថែទាំក្នុងចន្លោះរយៈពេលពី t_1 ទៅ t_2 កំណត់ដោយ :

$$E = \int_{t_1}^{t_2} r(t).dt = [R(t)]_{t_1}^{t_2} = R(t_2) - R(t_1) \quad \text{ដែល } R'(t) = r(t) \quad \text{។}$$

ង-ភាពលើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ :

សន្មតថា $D = f(q)$ ជាអនុគមន៍រំលូត ហើយ $E(q_0, p_0)$ ជាចំណុចសមតា ។

ចំនួនសរុបត្រង់ចំណុចសមតា $TR_0 = p_0 \times q_0$ ដែល p_0 ជាថ្លៃសមតា ។


ភាពលើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ដោយ :

$$\text{CONSUMER'S SURPLUS} = \int_0^{q_0} f(q).dq - q_0 \times p_0 \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាអនុគមន៍តម្រូវការ $f(q) = \frac{400}{(q+2)^2}$ និងថ្លៃសមតា \$25 ។

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ?

ច-ភាពលើសរបស់អ្នកផលិត :



សន្មតថា $S = g(q)$ ជាអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ ហើយ $E(q_0, p_0)$ ជាចំណុចសមគ្នា ។

ចំនួនសរុបត្រង់ចំណុចសមគ្នា $TR_0 = p_0 \times q_0$ ដែល p_0 ជាថ្លៃសមគ្នា ។

ភាពលើសរបស់អ្នកផលិតកំណត់ដោយ :

$$\text{PRODUCER'S SURPLUS} = q_0 \times p_0 - \int_0^{q_0} f(q).dq \quad ។$$

ឧទាហរណ៍១ : អនុគមន៍តម្រូវការរបស់ផលិតកម្មមួយគឺ $f(q) = \frac{200}{q+2}$ និងអនុគមន៍

ផ្គត់ផ្គង់ $g(q) = q + 12$ ។ ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិត ?

ឧទាហរណ៍២: អនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលមួយគឺ $g(q) = 100 + 400 \ln(q + 4)$ ។

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិតត្រង់ $q = 6$ units ?

លំហាត់មានជំនោះស្រាយ

លំហាត់ទី១

ឧបមាថាមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបមួយកំណត់ដោយ : $TC(x) = \frac{x^2}{3} - 4x + 2700$

តើគេត្រូវផលិតប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុង ១ឯកតា អប្បបរមា ?

ដំណោះស្រាយ

តាង $\overline{TC}(x)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយមធ្យម ។

$$\text{គេបាន } \overline{TC}(x) = \frac{TC(x)}{x} = \frac{x}{3} - 4 + \frac{2700}{x}$$

$$\text{-គណនាដេរីវេទីមួយ } \overline{TC}'(x) = \frac{1}{3} - \frac{2700}{x^2}$$

$$\text{-បើ } \overline{TC}' = 0 \text{ នាំអោយ } \frac{1}{3} - \frac{2700}{x^2} = 0 \text{ នាំអោយ } x = \sqrt{3 \times 2700} = 90$$

$$\text{-គណនាដេរីវេទីពីរ } \overline{TC}''(x) = \frac{5400}{x^3}$$

$$\text{ដោយគេមាន } \overline{TC}''(90) = \frac{5400}{90^3} > 0 \text{ នាំឱ្យអនុគមន៍ } TC(x) \text{ មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ } x = 90$$

ដូចនេះដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុងមួយឯកតាអប្បបរមាគេត្រូវផលិតចំនួន 90 Units ។

លំហាត់ទី២

$$\text{គេឱ្យ Total Revenue Function កំណត់ដោយ } TR(x) = \frac{880x - x^2}{x + 2}$$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលគេត្រូវលក់ ។

តើគេត្រូវលក់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យចំនូលសរុបអតិបរមា ?

ចូរកំណត់រកចំនួនអតិបរមានោះ ?

ដំណោះស្រាយ

គណនាដេរីវេ:

$$TR'(x) = \frac{(880 - 2x)(x + 2) - (880x - x^2)}{(x + 2)^2} = \frac{1760 - 4x - x^2}{(x + 2)^2}$$

បើ $TR'(x) = 0$ នាំឱ្យ $1760 - 4x - x^2 = 0$

$$\Delta' = 4 + 1760 = 1764 = 42^2$$

គេទាញបាន $x_1 = \frac{2 - 42}{-1} = 40$, $x_2 = \frac{2 + 42}{-1} = -44 < 0$ (មិនយក)

កន្សោម $TR'(x)$ មានសញ្ញាដូច $1760 - 4x - x^2$ ព្រោះ $(x + 2)^2 > 0$, $\forall x > 0$ ។

x	-44	40
TR'(x)		

ដោយត្រង់ចំនុច $x = 40$ អនុគមន៍ $TR'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ (-) នាំឱ្យអនុគមន៍

$TR(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ចំនុច $x = 40$ ។

ដូចនេះគេត្រូវលក់ផលិតផល 40units ទើបទទួលបានប្រាក់ចំនូលអតិបរមា ។

ប្រាក់ចំនូលអតិបរមានោះគឺ $TR(40) = \frac{880(40) - (40)^2}{40 + 2} = 800$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

លំហាត់ទី៣

គេឱ្យអនុគមន៍ Marginal Revenue : $MR(x) = 2000 - 40x - 3x^2$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផល ។

ចូរកំណត់អនុគមន៍ Total Revenue បើគេដឹងថាបើគេលក់ផលិតផល 100units

គេទទួលបានប្រាក់ចំនូលសរុប 17 000 (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

ដំណោះស្រាយ

តាង $TR(x)$ ជាអនុគមន៍ Total Revenue ។

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } TR(x) &= \int MR(x).dx = \int (2000 - 40x - 3x^2).dx \\ &= 2000x - 20x^2 - x^3 + k \end{aligned}$$

ដោយ $TR(10) = 2000(10) - 20(10)^2 - (10)^3 + k = 17000$ នាំឱ្យ $k = 0$

ដូចនេះ $TR(x) = 200x - 20x^2 - x^3$ ។

លំហាត់ទី៤

គេឱ្យអនុគមន៍ចំណាយក្នុងការថែទាំគ្រឿងយន្តមួយកំណត់ដោយ :

$r(t) = 400 - 10t + 3t^2$ ដែល t ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំ និង 400ជាចំណាយថេរ ។

ចូររកចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី 4 ទៅឆ្នាំទី6 ។

ដំណោះស្រាយ

តាង E ជាចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី 4 ទៅឆ្នាំទី6

គេបាន $E = \int_4^6 (400 - 10t + 3t^2).dt = [400t - 5t^2 + t^3]_4^6 = 852$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

លំហាត់ទី៥

អនុគមន៍តម្រូវការរបស់អ្នកផលិតមួយគឺ $f(q) = \frac{1000}{q+5}$ និងថ្លៃសមតាស្មើនឹង \$100 ។

ចូររកភាពលើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ?

ដំណោះស្រាយ

ដោយ $p = \$100$ គេបាន $\frac{1000}{q+5} = 100 \Rightarrow q = 5 \text{ units}$

ដូចនេះ ($p = \$100$, $q = 5 \text{ units}$) ជាចំនុចសមតា ហើយចំនួនត្រង់ចំនុចសមតាគឺ :

$$TR_0 = 100 \times 5 = \$500 \quad \text{។}$$

$$\text{គេបាន } C.S = \int_0^5 \frac{1000}{q+5}.dq - 500 = [1000 \ln |q+5|]_0^5 - 500 = 1000 \ln 2 - 500$$

ដូចនេះភាពលើសនៃអ្នកប្រើប្រាស់គឺ $C.S = \$193$ ។

លំហាត់ទី៦

អនុគមន៍តម្រូវការរបស់ផលិតកម្មមួយគឺ $f(q) = \sqrt{100 - q^2}$ និងអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់

$$g(q) = q + 2 \quad \text{។}$$

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិត ?

ដំណោះស្រាយ

-រកចំនុចសមគ្នា :

$$\sqrt{100 - q^2} = q + 2$$

$$100 - q^2 = q^2 + 4q + 4$$

$$2q^2 + 4q - 96 = 0$$

$$q^2 + 2q - 48 = 0 \quad , \quad \Delta' = 1 + 48 = 49 = 7^2$$

គេទាញបាន $q_1 = -1 + 7 = 6$, $q_2 = -1 - 7 = -8 < 0$ (មិនយក)

គេបាន $q = 6$ units នាំឱ្យ $p = 6 + 2 = \$8$

$$\begin{aligned} \text{ភាពលើសនៃអ្នកផលិតគឺ } P.S &= 6 \times 8 - \int_0^6 (q + 2).dq \\ &= 48 - \left[\frac{q^2}{2} + 2q \right]_0^6 = 48 - (18 + 12 - 0) = \$18 \quad \text{។} \end{aligned}$$

លំហាត់ទី៧

គេឱ្យ Marginal Profit Function មួយកំនត់ដោយ $MP(x) = \frac{10}{\sqrt{x+1}} - 2$

ចូររក Total Profit Function បើគេដឹងថា បើគេលក់ 15 ឯកតាគេបានប្រាក់ចំណេញ \$50 ?

ដំណោះស្រាយ

$$\text{គេបាន } TP(x) = \int \left(\frac{10}{\sqrt{x+1}} - 2 \right) dx = 20\sqrt{x+1} - 2x + k$$

$$\text{ដោយ } TP(15) = 20\sqrt{15+1} - 2(15) + k = 50 \Rightarrow k = 0$$

ដូចនេះ Total Profit Function គឺ $TP(x) = 20\sqrt{x+1} - 2x$ ។

លំហាត់ទី៨

គណនាតម្លៃមធ្យមរបស់អនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{2x+1}$ ក្នុងចន្លោះ $[0, 4]$ ។

$$\text{គេបាន } \mu = \frac{1}{4-0} \cdot \int_0^4 \sqrt{2x+1} \cdot dx = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{13}{6} = 2.166 \quad \text{។}$$



លំហាត់អនុវត្ត

1- ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបមួយកំណត់ដោយ :

$TC(x) = 2x^3 - 12x^2 + 27x + 250$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិត ។

ក. ចូរកំណត់រក Marginal cost function

ខ. ចូរកំណត់រក Marginal cost ត្រង់ចំណុច $x = 10$ units ។

2- ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុបមួយកំណត់ដោយ :

$TR(x) = 60x - 0.05x^2$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ ។

ក. ចូរគណនា $TR(600)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ ?

ខ. ចូរកំណត់រក Marginal Revenue Function

គ. ចូរកំណត់រក Marginal Revenue Function ត្រង់ $x = 100$ units ។

3- ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុបមួយកំណត់ដោយ :

$TP(x) = 50\sqrt{x^2 + 49} - \frac{x}{2} - 350$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលត្រូវលក់ ។

ក. ចូររក $TP(24)$ រួចពន្យល់ពីលទ្ធផលនេះ ។

ខ. ចូររក Marginal Profit Function.

គ. ចូររក Marginal Profit Function ត្រង់ចំណុច $x = 24$ units ។

4- ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុប $TR(x) = 9000x + 5x^2 - \frac{1}{3}x^3$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលគេត្រូវលក់ ។

តើគេត្រូវលក់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យបានចំណូលសរុបអតិបរមា ?

ចូរកំណត់ប្រាក់ចំណូលអតិបរមានោះ ?

5- ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុប $TR(x) = 12000x$ និងអនុគមន៍

ប្រាក់ចំណាយសរុប $TC(x) = 6000 - 600x + 15x^2 + x^3$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផល ។

ចូរកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ដើម្បីឱ្យបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា ?

ចូរកំណត់រកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

6-អនុគមន៍ចំណាយសរុបក្នុងការផលិតមួយគឺ : $TC(x) = \frac{x^2}{4} - 2x + 400$ ។

តើគេត្រូវផលិតប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុងឯកតាអប្បបរមា ?

ចូរចំណាយអប្បបរមានោះ ?

7-គេមាន Total Revenue Function កំណត់ដោយ $TR(x) = \frac{-x^2 + 884x - 1764}{0.2x}$

ក. ចូររក Marginal Revenue Function

ខ. តើគេត្រូវលក់ផលិតផលប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលអតិបរមា ?

ចូររកប្រាក់ចំណូលអតិបរមានោះ ?

8-គេឱ្យអនុគមន៍ Marginal Revenue: $MR(x) = 2000 - 40x - 3x^2$ ។

ចូររក Total Revenue Function ?

9-គេឱ្យអនុគមន៍ Marginal Cost សម្រាប់ផលិតកម្មមួយកំណត់ដោយ :

$MC(x) = 2 + 3x \ln(x + 4)$ និងចំណាយថេរស្មើនឹង 8 000 000 រៀល ។

ចូរកំណត់រក Total cost function ?

10-គេឱ្យអនុគមន៍ Marginal Revenue: $MR(x) = 8000 - 80x - 3x^2$

និងអនុគមន៍ Marginal Cost : $MC(x) = 2 + (x + 1) \ln(x + 1)$ ហើយចំណាយថេរស្មើ

នឹង 500 000 រៀល ។

ចូររក Total profit function ?

11-អនុគមន៍ Marginal Cost សម្រាប់ផលិតកម្មមួយគឺ $MC(x) = 10 + 4(x - 1) \ln x$

ហើយចំណាយថេរគឺ \$1500 ។

ចូររក Total cost function ?

12-គេមានអនុគមន៍តម្រូវការ $f(q) = \frac{10q + 150}{q + 5}$ និងថ្លៃសមតាស្មើនឹង \$15 ។

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ?

13-អនុគមន៍តម្រូវការ $f(q) = \frac{750}{(q + 3)^3}$ និងថ្លៃសមតាស្មើនឹង \$6 ។

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ?

14-ឧបមាថាអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល $g(q) = 40 + 25 \ln(q + 1)$ ។

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិតត្រង់ $q = 99$ units ។

15-គេមានអនុគមន៍តម្រូវការផលិតកម្ម $f(q) = \sqrt{56 - 4q}$ និងអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់

$g(q) = 1 + q$ ។ ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិត ?

16-ឧបមាថាអនុគមន៍ចំណាយក្នុងការថែទាំគ្រឿងយន្តមួយកំនត់ដោយ :

$$r(t) = 100 + 2t + 6t^2 \text{ ដែល } 100 \text{ ជាចំណាយថេរ និង } t \text{ ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំ ។}$$

ចូររកចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី2 ដល់ឆ្នាំទី4 ?

17- គេមានអនុគមន៍ចំណាយក្នុងការថែទាំគ្រឿងយន្តមួយកំនត់ដោយ :

$$r(t) = 150 + 2t + 0.3t^2 + 0.4t^3 \text{ ។}$$

ដែល 150 ជាចំណាយថេរ និង t ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំ ។

ចូររកចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី3 ដល់ឆ្នាំទី5 ?

18-គេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបលើការផលិត q ឯកតានៃផលិតផលមួយប្រភេទ ដែល

$$\text{កំនត់ដោយ } TC(q) = \frac{q^2}{2} + 3q + 800 \text{ ។}$$

ក-រកចំណាយមធ្យមក្នុងមួយឯកតា បើផលិតផល 100 units ។

ខ-រកចំណាយមធ្យមនៃ $TC(q)$ ក្នុងចន្លោះពី 0 ដល់ 100 ។

គ-កំនត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិតដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុងមួយឯកតាអប្បបរមា



អនុគមន៍មានពីរអថេរ

1-សញ្ញាណនៃអនុគមន៍ត្រីមេឌ័រ :

ក. អនុគមន៍មានពីរអថេរ :

ប្រសិនបើចំពោះគ្រប់ $(x, y) \in D$ មានរូបភាពមួយតាម f នោះ Z ហៅថាអនុគមន៍ស៊េរី x, y ដែលគេកំណត់សរសេរ $Z = f(x, y)$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យ $Z = f(x, y) = 2x^2 - 7xy + 3y^2$ ជាអនុគមន៍មានពីរអថេរ ។

ឧទាហរណ៍ : កោនបរិវត្តន៍មួយដែលមានកម្ពស់ h និងកាំថាសបាត R មានមាឌ

$$V = f(h, R) = \frac{\pi}{3} R^2 h \text{ ជាអនុគមន៍មានពីរអថេរ ។}$$

ឧទាហរណ៍ : អនុគមន៍មានពីរអថេរ $Z = f(x, y) = \frac{2006}{\sqrt[4]{a^2 - x^2 - y^2}}$, $a \neq 0$, a ថេរ

អនុគមន៍នេះអាចកំណត់បានកាលណា $a^2 - x^2 - y^2 > 0$ or $x^2 + y^2 < a^2$

តាមធរណីមាត្រ ដែនកំណត់ D នៃអនុគមន៍គឺជាផ្ទៃក្រឡារង្វង់ផ្ចិត O កាំ a ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាអនុគមន៍ចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយគឺ :

$$TC(x, y) = 2x + 3y + 4 \quad \text{។}$$

ដែល x ជាថ្លៃវត្ថុធាតុដើម 1kg និង y ជាថ្លៃឈ្នួលពលកម្មក្នុង 1 ម៉ោង គិតជាដុល្លារ ។

រកចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការផលិត 1 unit បើវត្ថុធាតុដើមថ្លៃ $0.25\$/\text{kg}$ និងថ្លៃឈ្នួលពលកម្ម

មាន $\$2.5/h$ ។

$$\text{យើងបាន } TC(0.25; 2.50) = 2(0.25) + 3(2.50) + 4 = \$12 \quad \text{។}$$

ក. អនុគមន៍មានពីរអថេរ :

ប្រសិនបើចំពោះគ្រប់ $(x, y, z) \in D$ មានរូបភាពមួយតាម f នោះ Z ហៅថាអនុគមន៍ស៊េរី

x, y, z ដែលគេកំណត់សរសេរ $Z = f(x, y, z)$ ។

ឧទាហរណ៍ : $Z = f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$ ជាអនុគមន៍មានបីអថេរ ។

អនុគមន៍នេះមានន័យបើ $1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0$ or $x^2 + y^2 + z^2 < 1$

តាមន័យធរណីមាត្រ ដែនកំណត់ D គឺជាមាឌស្វ័យដែលមានផ្ចិត O កាំ $R = 1$ ។

ឧទាហរណ៍ : អង្កត់ទ្រូងរបស់ប្រឡេពីប៉ែតកែងមួយដែលមានវិមាត្រ x, y, z ជាអនុគមន៍

មានបីអថេរដែលកំណត់ដោយ $d = f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

ប្រសិនបើវិមាត្រ $x = 10\text{cm}$, $y = 15\text{cm}$, $z = 30\text{cm}$ គេបាន :

$$d = f(10, 15, 30) = \sqrt{10^2 + 15^2 + 30^2} = 35\text{cm} \quad \text{។}$$

2 - មើលរង្វង់កែងនៃអនុគមន៍ត្រីមេរ័ត្យ :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍មានពីរអថេរមួយកំណត់ជាប់ក្នុងដែន D ដោយ $Z = f(x, y, z)$

-បើ y មិនប្រែប្រួលនោះ Z ក្លាយជាអនុគមន៍មានមួយអថេរ x ។

-បើ x មិនប្រែប្រួលនោះ Z ក្លាយជាអនុគមន៍មានមួយអថេរ y ។

ក. និយមន័យ :

ចំពោះ y មិនប្រែប្រួលនោះ Z ក្លាយជាអនុគមន៍មានមួយអថេរ x ហើយបើ Z មាន

ដេរីវេធៀបនឹង x នោះដេរីវេនេះគេហៅថាដេរីវេដោយផ្នែករបស់អនុគមន៍ $Z = f(x, y)$

ធៀបនឹង x ដែលគេកំណត់សរសេរ :

$$Z'_x = f'_x(x, y) = \frac{\partial Z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេមាន : } Z'_y = f'_y(x, y) = \frac{\partial Z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ $Z = f(x, y) = 2x^2 - 7xy + 3y^2$ ។

ចូរគណនាដេរីវេដោយផ្នែកនៃអនុគមន៍នេះ ?

គេបាន $Z'_x = 4x - 7y$ និង $Z'_y = -7x + 6y$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ $z = f(x, y) = x^y + y^x$, $x > 0, y > 0$

គេបាន $Z'_x = yx^{y-1} + y^x \ln y$ និង $Z'_y = x^y \ln x + xy^{x-1}$ ។

ឧទាហរណ៍: គណនាដេរីវេដោយផ្នែកនៃអនុគមន៍ : $Z = f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

គេបាន : $Z'_x = 3x^2 - 3yz$, $Z'_y = 3y^2 - 3xz$, $Z'_z = 3z^2 - 3xyz$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

ចូរគណនាដេរីវេដោយផ្នែកនៃអនុគមន៍នេះ ?

គេបាន $Z'_x = \frac{(x^2 + y^2)'}{x^2 + y^2} = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $Z'_y = \frac{(x^2 + y^2)'}{x^2 + y^2} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាដេរីវេដោយផ្នែកនៃអនុគមន៍ $Z = f(x, y) = e^{x^3+y^3}$

គេបាន $Z'_x = (x^3 + y^3)'e^{x^3+y^3} = 3x^2e^{x^3+y^3}$, $Z'_y = (x^3 + y^3)'e^{x^3+y^3} = 3y^2e^{x^3+y^3}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាដេរីវេតាមផ្នែកនៃអនុគមន៍ :

$Z = f(x, y, z) = x^y + y^z + z^x + x^x y^y z^z$, $x > 0, y > 0, z > 0$ ។

គេបាន $Z'_x = yx^{y-1} + z^x \ln z + x^x y^y z^z (1 + \ln x)$

$Z'_y = x^y \ln x + zy^{z-1} + x^x y^y z^z (1 + \ln y)$

$Z'_z = y^z \ln y + xz^{x-1} + x^x y^y z^z (1 + \ln z)$

ឧទាហរណ៍ : គណនាដេរីវេដោយផ្នែកនៃអនុគមន៍ :

$Z = f(x, y, z) = \ln(2x^3 + y^3 - 5z^3 + 4x^2 y^2 z^2)$

គេបាន $Z'_x = \frac{6x^2 + 8xy^2 z^2}{2x^3 + y^3 - 5z^3 + 4x^2 y^2 z^2}$

$Z'_y = \frac{3y^2 + 8x^2 yz^2}{2x^3 + y^3 - 5z^3 + 4x^2 y^2 z^2}$

$Z'_z = \frac{-15z^2 + 8x^2 y^2 z}{2x^3 + y^3 - 5z^3 + 4x^2 y^2 z^2}$

៣-ភាពយឺត (ELASTICITY) :**ក. ចំពោះអនុគមន៍មានមួយអថេរ :**-កំណើន $\Delta x = x - x_0$ ហៅថាកំណើនដាច់ខាត ។-ផលធៀប $\frac{\Delta x}{x_0}$ ហៅថាកំណើនធៀប ធៀបនឹង x ។-ដើម្បីប្រៀបធៀបកំណើនធៀប ធៀបនឹង y គឺ $\frac{\Delta y}{y_0}$ ជាមួយនឹងកំណើនធៀប ធៀបនឹង x

$$\text{គឺ } \frac{\Delta x}{x_0} \text{ យើងបង្កើតផលធៀប } E = \frac{\frac{\Delta y}{y_0}}{\frac{\Delta x}{x_0}} = \frac{x_0}{y_0} \times \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{។}$$

ផលធៀបនេះមានន័យថា បើ x កើន 1% នោះ y កើនឬថយ $\left(\frac{x_0}{y_0} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x} \right) \%$ ។-មេគុណភាពយឺតនៃអនុគមន៍នៅត្រង់ ចំនុច x_0 គឺ $E = \frac{x_0}{y_0} \cdot f'(x_0) = \frac{x_0}{y_0} \cdot \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0}$ ។**ឧទាហរណ៍ :** បើគេបង្កើនកម្មករ ពី 100នាក់ ទៅ 110នាក់ នោះផលិតផលនឹងកើនឡើង ពី 2000ឯកតា ទៅ 2200 ឯកតា ។គេបាន $E = \frac{100}{2000} \cdot \frac{2200 - 2000}{110 - 100} = 1\%$ មានន័យថា បើគេបង្កើនចំនួនកម្មករ 1% នោះ

ផលិតផលនឹងកើនឡើង 1% ដែរ ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍តម្រូវការ $f(q) = \sqrt{100 - q^2}$ ។ចូររកភាពយឺតនៅត្រង់ចំនុច $q = 8$ units ។

$$\text{គេមាន } f(q) = \sqrt{100 - q^2} \text{ នាំឱ្យ } \frac{df(q)}{dq} = -\frac{q}{\sqrt{100 - q^2}}$$

$$\text{បើ } q = 8 \Rightarrow p = f(8) = \sqrt{100 - 64} = 6$$

$$\text{ដូចនេះ ភាពយឺតនៅត្រង់ចំនុច } q = 8 \text{ units គឺ } E = \frac{6}{8} \left(-\frac{8}{\sqrt{100 - 8^2}} \right) = -1\% \quad \text{។}$$

ខ. ភាពយឺតដោយផ្នែក :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ពីរអថេរ $Z = f(x, y)$ ។ ភាពយឺតនៃអនុគមន៍នេះ ដូចគ្នាទៅនឹង ភាពយឺតនៃអនុគមន៍មានមួយអថេរដែរ ។

-ភាពយឺត ធៀបនឹង x គឺ
$$EZ_x = \frac{x}{f(x, y)} \times \frac{\partial Z}{\partial x} \quad ។$$

-ភាពយឺត ធៀបនឹង y គឺ
$$EZ_y = \frac{y}{f(x, y)} \times \frac{\partial Z}{\partial y} \quad ។$$

៤-ចំណាយសរុប និង ចំណាយម៉ាឌីណាល :

ឧបមាថាក្រុមហ៊ុនមួយផលិតទំនិញ ពីរ ប្រភេទដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នា តែមាន សមាមាត្រខុសគ្នា ។

ដូចនេះអនុគមន៍ចំណាយសរុបគឺ : $TC(x, y) = Q(x, y)$

ដែល x និង y ជាបរិមាណផលិតផលនីមួយៗ ។

-Marginal Cost ធៀបនឹង x គឺ : $\frac{\partial TC}{\partial x} = Q'_x(x, y) \quad ។$

-Marginal Cost ធៀបនឹង y គឺ : $\frac{\partial TC}{\partial y} = Q'_y(x, y) \quad ។$

ឧទាហរណ៍ : អនុគមន៍ចំណាយផលិតផលពីរប្រភេទគឺ :

$$TC(x, y) = 100 + \ln(x^2 + xy + y^2 + 1) \quad ។$$

ចូររក Marginal Cost ធៀបនឹង x និង Marginal Cost ធៀបនឹង y ។

-Marginal Cost ធៀបនឹង x គឺ
$$\frac{\partial TC}{\partial x} = \frac{2x + y}{x^2 + xy + y^2 + 1}$$

-Marginal Cost ធៀបនឹង y គឺ
$$\frac{\partial TC}{\partial y} = \frac{x + 2y}{x^2 + xy + y^2 + 1} \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលពីរកាលកំណើតផលិតពីរប្រភេទ :

$$TR(x) = 100 \ln(2x^2 + 5y^2 + 1) \quad ។$$

ចូររក Marginal Revenue ធៀបនឹង x រួច ធៀបនឹង y ។

៥-ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសរុប :

ក. ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y)$, $\forall x, y \in D$ មានដេរីវេទីមួយ ។

ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសរុបត្រង់ចំណុច (x, y) កំណត់ដោយ :
$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial Z}{\partial y} \cdot dy$$
 ។

ឧទាហរណ៍ : រកឌីផេរ៉ង់ស្យែលសរុបនៃអនុគមន៍ $z = x^2 + 4xy + 3y^2$

គេបាន $dZ = (2x + 4y) \cdot dx + (4x + 6y) \cdot dy$ ។

ខ. ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y, z)$, $\forall x, y, z \in D$ មានដេរីវេទីមួយ ។

ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសរុបត្រង់ចំណុច (x, y, z) កំណត់ដោយ :
$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial Z}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial Z}{\partial z} \cdot dz$$

ឧទាហរណ៍ : រកឌីផេរ៉ង់ស្យែលសរុបនៃអនុគមន៍ $Z = f(x, y, z) = \ln(2x^2 + 5y^2 + 4z^2)$

គេបាន $dZ = \frac{4x}{2x^2 + 5y^2 + 4z^2} \cdot dx + \frac{10y}{2x^2 + 5y^2 + 4z^2} \cdot dy + \frac{8z}{2x^2 + 5y^2 + 4z^2} \cdot dz$ ។

៦-ដេរីវេដោយផ្នែកលំដាប់ទីពីរ :

ដេរីវេដោយផ្នែកលំដាប់ទីពីររបស់អនុគមន៍ $Z = f(x, y)$ គឺជាដេរីវេដោយផ្នែករបស់ដេរីវេដោយផ្នែកលំដាប់ទីមួយ ។ គេតាងដេរីវេលំដាប់ទីពីរដោយ :

$$1. f''_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2}$$

$$2. f''_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2}$$

$$3. f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 Z}{\partial y \cdot \partial x}$$

$$4. f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 Z}{\partial x \cdot \partial y}$$

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ $Z = f(x, y) = x^3 + y^3 - 2x^2y + 5xy^2 + 3$

ចូរគណនា f''_{xx} , f''_{yy} , f''_{xy} និង f''_{yx} ?

៧-បរមាណៃអនុគមន៍ច្រើនអថេរ :**ក. និយមន័យ :**

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y)$

- គេថាអនុគមន៍មានអតិបរិមាត្រង់ចំនុច $M(x_0, y_0)$ លុះត្រាតែគ្រប់ចំនុច $M(x, y)$

ក្នុងវិស័យស៊ីណៃនៃចំនុច M_0 គេបាន : $f(x_0, y_0) > f(x, y)$ ។

- គេថាអនុគមន៍មានអតិបរិមាត្រង់ចំនុច $M(x_0, y_0)$ លុះត្រាតែគ្រប់ចំនុច $M(x, y)$

ក្នុងវិស័យស៊ីណៃនៃចំនុច M_0 គេបាន : $f(x_0, y_0) < f(x, y)$ ។

ខ. របៀបកំណត់បរមាណៃអនុគមន៍មានពីរអថេរ :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y)$ ដែលមានដេរីវេ ។

ដើម្បីកំណត់រកបរិមាណៃអនុគមន៍គេត្រូវ:

១- គណនាដេរីវេដោយផ្នែកគឺ: $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$

២- ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ:
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

ឧបមាថាប្រព័ន្ធមានគូចឆ្លើយ (x_0, y_0)

៣- គណនាបរិមាណ $a = f''_{xx}(x, y)$, $b = f''_{xy}(x, y)$, $c = f''_{yy}(x, y)$ ត្រង់ (x_0, y_0)

៤- គណនាបរិមាណ $\Delta = ac - b^2$

☞ បើ $\Delta > 0$, $a > 0$ នោះអនុគមន៍ $Z = f(x_0, y_0)$ មានអប្បបរមា ។

☞ បើ $\Delta > 0$, $a < 0$ នោះអនុគមន៍ $Z = f(x_0, y_0)$ មានអតិបរមា ។

☞ បើ $\Delta < 0$ នោះអនុគមន៍ $Z = f(x_0, y_0)$ គ្មានបរមា ។

☞ បើ $\Delta = 0$ មិនអាចសន្និដ្ឋានបាន ។

ឧទាហរណ៍: គេអោយអនុគមន៍ $Z = f(x, y) = 2x^2 + 5y^2 - 2xy - 6x - 6y + 34$

រកបរិមាណនៃអនុគមន៍នេះ ។

-គណនាដេរីវេ $Z'_x = 4x - 2y - 6$ and $Z'_y = 10y - 2x - 6$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 4x - 2y - 6 = 0 \\ 10y - 2x - 6 = 0 \end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយប្រព័ន្ធមានតួចឆ្លើយ $x = 2$, $y = 1$

-គណនាបរិមាណ $\Delta = ac - b^2$

ដោយគេមាន $a = Z''_{xx} = 4$, $b = Z''_{xy} = -2$, $c = Z''_{yy} = 10$

គេបាន $\Delta = 40 - 4 = 36 > 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានអប្បបរមាត្រង់ $M_0(2, 1)$

តម្លៃអប្បបរមានោះគឺ $Z_{\min} = f(2, 1) = 25$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុបពីការលក់ផលិតផលពីរប្រភេទកំណត់ដោយ :

$$TP(x, y) = 1980 - 17x^2 - 10y^2 + 26xy - 10x + 10y$$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទទីមួយ និង y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទទីពីរ ។

តើគេត្រូវលក់ផលិតផលនីមួយៗប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា ?

-គណនាដេរីវេ $TP'_x = -34x + 26y - 10$ and $TP'_y = -20y + 26x + 10$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} -34x + 26y - 10 = 0 \\ -20y + 26x + 10 = 0 \end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបានចម្លើយ $x = 15$, $y = 20$

-គណនា $\Delta = ac - b^2$ ដោយ $a = TP''_{xx} = -34$, $b = TP''_{xy} = 26$, $c = TP''_{yy} = -20$

គេបាន $\Delta = (-34)(-20) - (26)^2 = 4 > 0$ ។

ដោយ $a = -34 < 0$ នាំឱ្យ $TP(x, y)$ មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = 15$, $y = 20$

ដូចនេះដើម្បីឱ្យគេចំណេញអតិបរមាគេត្រូវលក់ផលិតផលទីមួយចំនួន 15 units និងត្រូវលក់

ផលិតផលទីពីរចំនួន 20 units ហើយប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះគឺ $TP(15, 20) = \$2005$ ។

គ-របៀបកំណត់រកបរមានៃអនុគមន៍មានបីអថេរ :

ឧបមាថាមានអនុគមន៍ $Z = f(x, y, z)$ ដែលមានដេរីវេ ។

ដើម្បីកំណត់រកបរមានៃអនុគមន៍នេះគេត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម :

១. គណនាដេរីវេ : $f'_x(x, y, z), f'_y(x, y, z), f'_z(x, y, z)$

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ
$$\begin{cases} f'_x(x, y, z) = 0 \\ f'_y(x, y, z) = 0 \\ f'_z(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

៣. គណនាដេរីវេមីណង់ HESSE ត្រង់ចំណុចដែលជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធខាងលើគឺ :

$$D_1 = f''_{xx}(x, y, z) = f''_{xx} \quad , \quad D_2 = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}$$

$$\text{និង } D_3 = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{yz} \\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz} \\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz} \end{vmatrix} \quad ។$$

សន្និដ្ឋាន - បើ $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍ $Z = f(x, y, z)$ មានតម្លៃអប្បបរមា ។

- បើ $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍ $Z = f(x, y, z)$ មានតម្លៃអតិបរមា ។

ឧទាហរណ៍ : រកតម្លៃបរមានៃអនុគមន៍ $Z = x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 12z + 490$

- គណនាដេរីវេ $Z'_x = 2x - 4, Z'_y = 2y - 6, Z'_z = 2z - 12$

- ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ
$$\begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 2y - 6 = 0 \\ 2z - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 6 \end{cases}$$

- គណនា $D_1 = Z''_{xx} = 2, D_2 = \begin{vmatrix} Z''_{xx} & Z''_{xy} \\ Z''_{yx} & Z''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4$

$$\text{និង } D_3 = \begin{vmatrix} Z''_{xx} & Z''_{xy} & Z''_{xz} \\ Z''_{yx} & Z''_{yy} & Z''_{yz} \\ Z''_{zx} & Z''_{zy} & Z''_{zz} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

ដោយ $D_1 = 2 > 0, D_2 = 4 > 0, D_3 = 8 > 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់

ចំនុច $x = 2$, $y = 3$, $z = 6$ ហើយតម្លៃអប្បបរមានោះគឺ $Z(2, 3, 6) = 441$ ។

អនុវត្តន៍ : ចូររកតម្លៃបរមានៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

$$1. Z = f(x, y, z) = 13x^2 + 2y^2 + 4z^2 - 4xy - 12xz - 8y + 25$$

$$2. Z = f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + z^2 - 4xy - 4y - 6z + 2005$$

$$3. Z = f(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz - 2yz - 2x - 2y + 2004$$

ឧទាហរណ៍: គេឱ្យអនុគមន៍ចំណាយសរុបក្នុងការផលិតទំនិញបីប្រភេទកំណត់ដោយ :

$$TC = f(x, y, z) = 4x^2 + 18y^2 + z^2 - 320x - 360y - 6yz + 50000$$

ដែល x , y , z ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

តើគេត្រូវផលិតទំនិញប្រភេទនីមួយៗប៉ុន្មានដើម្បីឱ្យចំណាយអស់តិចបំផុត ?

ចូររកចំណាយអប្បបរមានោះ ?

-គណនាដេរីវេ $Z'_x = 8x - 320$, $Z'_y = 36y - 360 - 6z$, $Z'_z = 2z - 6y$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ
$$\begin{cases} 8x - 320 = 0 \\ 36y - 6z - 360 = 0 \\ 2z - 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 40 \\ y = 20 \\ z = 60 \end{cases}$$

-គណនា $D_1 = Z''_{xx} = 8$, $D_2 = \begin{vmatrix} Z''_{xx} & Z''_{xy} \\ Z''_{yx} & Z''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 36 \end{vmatrix} = 288$

និង $D_3 = \begin{vmatrix} Z''_{xx} & Z''_{xy} & Z''_{xz} \\ Z''_{yx} & Z''_{yy} & Z''_{yz} \\ Z''_{zx} & Z''_{zy} & Z''_{zz} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 36 & -6 \\ 0 & -6 & 2 \end{vmatrix} = 576$

ដោយ $D_1 = 8 > 0$, $D_2 = 288 > 0$, $D_3 = 576 > 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមា

ត្រង់ $x = 40$, $y = 20$, $z = 60$ ហើយប្រាក់ចំណាយអប្បបរមាក្នុងការផលិតនោះគឺ :

$$\begin{aligned} TC_{\min} &= 4(40)^2 + 18(20)^2 + (60)^2 - 320(40) - 360(20) - 6(20)(60) + 50000 \\ &= 6400 + 7200 + 3600 - 12800 - 7200 - 7200 + 50000 = \$40000 \end{aligned}$$

ឃ-របៀបកំណត់កម្រិតនៃអនុគមន៍មានលក្ខខណ្ឌ :

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ ដែល x and y ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $g(x, y) = c$ ។

ដើម្បីរកកម្រិតនៃអនុគមន៍នេះគេអាចដោះស្រាយបានតាមពីរបៀប :

1. របៀបទីមួយ :

គេត្រូវទាញ y ពីសមីការ $g(x, y) = c$ ឧបមាថា $y = \varphi(x, c)$ រួចយកទៅជួសក្នុងអនុគមន៍
គេបាន $Z = f[x, \varphi(x, c)]$ ជាអនុគមន៍មានមួយអថេរដែលគេអាចរកបានតាមរបៀបដែល
យើងបានសិក្សារួចមកហើយ ។

2. របៀបទីពីរ :

ដោយប្រើមេគុណរបស់ **ឡាហ្វ្រង់** (Lagrange Multipliers) ដៃអនុវត្តន៍ដូចតទៅ :

-បង្កើតអនុគមន៍ $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda [c - g(x, y)]$

-គណនាដេរីវេ $F'_x(x, y, \lambda)$, $F'_y(x, y, \lambda)$, $F'_\lambda(x, y, \lambda)$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ
$$\begin{cases} F'_x(x, y, \lambda) = 0 \\ F'_y(x, y, \lambda) = 0 \\ F'_\lambda(x, y, \lambda) = 0 \end{cases}$$

-គណនាដេរីវេទីពីរ HESSE:
$$D = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & F''_{xx} & F''_{xy} \\ g'_y & F''_{yx} & F''_{yy} \end{vmatrix}$$

សន្និដ្ឋាន : -បើ $D > 0$ នោះអនុគមន៍មានអតិបរមា ។

-បើ $D < 0$ នោះអនុគមន៍មានអប្បបរមា ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ចំនួនសរុបពីការលក់ផលិតផលពីរប្រភេទកំណត់ដោយ :

$TR(x, y) = 8000x - x^2y$ ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ

ហើយគេដឹងថា $x - y + 40 = 0$ តើគេលក់ផលិតផលប្រភេទនីមួយៗប៉ុន្មានដើម្បីឱ្យគេបាន

ប្រាក់ចំនូលអតិបរមា ? រកប្រាក់ចំនូលនោះ ?

តែមាន $TR(x, y) = 8000x - x^2y$ ដោយ $x - y + 40 = 0$ នោះ $y = 40 + x$

តែបាន $TR(x) = 8000x - x^2(40 + x) = 8000x - 40x^2 - x^3$

-រកដេរីវេទីមួយ $TR'(x) = 8000 - 80x - 3x^2$

-ដោះស្រាយសមីការ $TR'(x) = 8000 - 80x - 3x^2 = 0$ $\Delta' = 1600 + 2400 = 160^2$

គេទាញបាន $x_1 = \frac{40 - 160}{-3} = 40$, $x_2 = \frac{40 + 160}{-3} = -\frac{200}{3} < 0$ (មិនយក)

-គណនាដេរីវេទីពីរ $TR''(x) = -80 - 6x$ នាំឱ្យ $TR''(40) = -80 - 6(40) = -320 < 0$

មានន័យថាអនុគមន៍នេះមានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 40$ ។

ដូចនេះដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំនូលអតិបរមាគេត្រូវលក់ផលិតផលប្រភេទទីមួយ

ចំនួន 40 units និង ផលិតផលប្រភេទទីពីរចំនួន 80 units ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុបពីការលក់ផលិតផលពីរប្រភេទកំណត់ដោយ :

$TP = f(x, y) = -200 + xy$ ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទទីមួយៗ

ហើយគេដឹងថា $x + y = 30$ តើគេលក់ផលិតផលប្រភេទទីមួយប៉ុន្មានដើម្បីឱ្យគេបាន

ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា ? រកប្រាក់ចំណេញនោះ ?

-បង្កើតអនុគមន៍ $F(x, y, \lambda) = (-200 + xy) + \lambda(30 - x - y)$

-គណនាដេរីវេ $F'_x = y - \lambda$, $F'_y = x - \lambda$, $F'_\lambda = 30 - x - y$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ
$$\begin{cases} y - \lambda = 0 \\ x - \lambda = 0 \\ 30 - x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = \lambda = 15$$

-គណនាដេរីវេទីពីរ HESSE: $D = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & F''_{xx} & F''_{xy} \\ g'_y & F''_{yx} & F''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0$

មានន័យថាដើម្បីឱ្យគេបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា គេត្រូវលក់ផលិតផលទីមួយចំនួន 15 units

និងផលិតផលទីពីរចំនួន 15 units ហើយប្រាក់ចំណេញនោះគឺ $TP_{\max} = \$25$ ។

លំហាត់មានជំនោះស្រាយ

លំហាត់ទី១

គេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបនៃការផលិត ផលិតផលពីរប្រភេទ A និង B កំណត់ដោយ :

$$TC = f(x, y) = 17x^2 + 10y^2 - 26xy + 10x - 10y + 65$$

ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

ក-គណនាចំណាយម៉ាជីណាលឡើងនឹង x ។

ខ-គណនាចំណាយម៉ាជីណាលឡើងនឹង y ។

គ-តើគេត្រូវផលិតនូវផលិតផលនីមួយៗប៉ុន្មានដើម្បីឱ្យចំណាយអស់តិចបំផុត ?

ចំណោះស្រាយ

ក-គណនាចំណាយម៉ាជីណាលឡើងនឹង x

$$\text{គេបាន } TC'_x = \frac{\partial TC}{\partial x} = 34x - 26y + 10$$

ខ-គណនាចំណាយម៉ាជីណាលឡើងនឹង y

$$\text{គេបាន } TC'_y = \frac{\partial TC}{\partial y} = 20y - 26x - 10$$

គ-រកបរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិតដើម្បីឱ្យចំណាយអស់តិចបំផុត :

$$\text{គេមាន } TC'_x = 34x - 26y + 10, \quad TC'_y = 20y - 26x - 10$$

$$\text{-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ } \begin{cases} 34x - 26y + 10 = 0 \\ 20y - 26x - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 15, y = 20$$

$$\text{-គណនា } \Delta = ac - b^2 \text{ ដោយ } a = TC''_{xx} = 34, b = TC''_{xy} = -26, TC''_{yy} = 20$$

$$\text{គេបាន } \Delta = 680 - 676 = 4 > 0, a = 34 > 0 \text{ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមា ។}$$

ដូចនេះដើម្បីឱ្យចំណាយអស់តិចបំផុតគេត្រូវផលិត ផលិតផលប្រភេទទីមួយចំនួន 15

និងផលិតផលទីពីរចំនួន 20 ។

លំហាត់ទី២

ឧបមាថា $TC(x, y)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយសរុបនៃការផលិតនូវផលិតផលពីរប្រភេទ ។

គេដឹងថា Marginal cost ធៀបនឹង x គឺ $\frac{\partial TC}{\partial x} = 2x + 8y$ និង Marginal cost ធៀបនឹង y គឺ $\frac{\partial TC}{\partial y} = 8x + 2y$ ហើយចំណាយថេរស្មើនឹង \$50 ។

ចូរកំណត់រកអនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = TC(x, y)$?

ចំណោះស្រាយ

រកអនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = TC(x, y)$

$$\text{គេមាន } \frac{\partial TC}{\partial x} = 2x + 8y$$

$$\text{គេបាន } TC = \int (2x + 8y).dx = x^2 + 8xy + K(y) \text{ នាំឱ្យ } TC'_y = 8x + k'(y)$$

$$\text{ដោយ } \frac{\partial TC}{\partial y} = TC'_y = 8x + 2y \text{ គេទាញបាន } 8x + k'(y) = 8x + 2y$$

$$\text{នាំឱ្យ } k'(y) = 2y \text{ នាំឱ្យ } k(y) = \int 2y.dy = y^2 + c$$

$$\text{គេបាន } TC = TC(x, y) = x^2 + 8xy + y^2 + c \text{ ចំណាយថេរស្មើនឹង } \$50 \text{ នោះ } c = \$50$$

$$\text{ដូចនេះ } TC(x, y) = x^2 + 8xy + y^2 + 50 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣

ឧបមាថា $TC = TC(x, y)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយសរុបនៃការផលិតនូវផលិតផលពីរប្រភេទ ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

គេដឹងថាឱ្យផ្ទេររង់ស្បែកនៃអនុគមន៍ចំណាយសរុបនេះកំណត់ដោយ :

$$dTC = (4x - 4y - 6).dx + (-4x + 8y - 6) \text{ ហើយចំណាយថេរស្មើនឹង } \$100 \quad \text{។}$$

ក-ចូររក Marginal cost ធៀបនឹង x និង Marginal cost ធៀបនឹង y ។

ខ-ចូរកំណត់ រកអនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = TC(x, y)$ ។

ចំណេះស្រាយ

ក-រក Marginal cost ធៀបនឹង x និង Marginal cost ធៀបនឹង y

តាមទំនាក់ទំនង $dTC = (4x - 4y - 6).dx + (-4x + 8y - 6)$

គេទាញបាន $TC'_x = \frac{\partial TC}{\partial x} = 4x - 4y - 6$ ជា Marginal cost ធៀបនឹង x

និង $TC'_y = \frac{\partial TC}{\partial y} = -4x + 8y - 6$ ជា Marginal cost ធៀបនឹង y ។

ខ-កំណត់ រកអនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = TC(x, y)$

ដោយ $\frac{\partial TC}{\partial x} = 4x - 4y - 6 \Rightarrow TC = \int (4x - 4y - 6).dx = 2x^2 - 4xy - 6x + k(y)$

គេបាន $TC'_y = -4x + k'(y)$ ដោយ $TC'_y = \frac{\partial TC}{\partial y} = -4x + 8y - 6$

គេទាញ $-4x + k'(y) = -4x + 8y - 6$

$$k'(y) = 8y - 6 \Rightarrow k(y) = \int (8y - 6).dy = 4y^2 - 6y + c$$

គេទាញ $TC = TC(x, y) = 2x^2 - 4xy - 6x + 4y^2 - 6y + c$

ដោយ ចំណាយថេរស្មើនឹង \$100 នាំឱ្យ $c = \$100$ ។

ដូចនេះ $TC(x, y) = 2x^2 - 4xy + 4y^2 - 6x - 6y + 100$ ។

លំហាត់ទី៤

គេឱ្យអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ផលិតផលពីរប្រភេទកំណត់ដោយ :

$$TP = f(x, y) = -5x^2 - y^2 + 4xy + 280x + 100y$$

ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

ក-Find Maginal Profit ធៀបនឹង x ត្រង់ចំណុច $(20, 25)$ ។

ខ- Find Maginal Profit ធៀបនឹង y ត្រង់ចំណុច $(20, 25)$ ។

គ-កំណត់បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា?

ចូររកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

ចំណេះស្រាយ

ក- Maginal Profit ធៀបនឹង x ត្រង់ចំណុច $(25, 30)$

$$\text{គេបាន } TC'_x = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f'_x(x, y) = -10x + 4y + 280$$

$$\text{ត្រង់ចំណុច } (25, 30) \text{ គេបាន } TC'_x = f'_x(25, 30) = -10(25) + 4(30) + 280 = 150$$

ខ- Maginal Profit ធៀបនឹង y ត្រង់ចំណុច $(25, 30)$

$$\text{គេបាន } TC'_y = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f'_y(x, y) = -2y + 4x + 100$$

$$\text{ត្រង់ចំណុច } (25, 30) \text{ គេបាន } TC'_y = f'_y(25, 30) = -2(30) + 4(25) - 100 = -60$$

គ-កំណត់បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ:

$$\text{គេបាន } TC'_x = -10x + 4y + 280, TC'_y = -2y + 4x - 100$$

$$\text{-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ } \begin{cases} -10x + 4y + 280 = 0 \\ -2y + 4x - 100 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 40, y = 30$$

$$\text{-គណនា } \Delta = ac - b^2 \text{ ដោយ } a = TC''_{xx} = -10, b = TC''_{xy} = 4, c = TC''_{yy} = -2$$

$$\text{គេបាន } \Delta = 20 - 16 = 4 > 0, a = -10 < 0 \text{ នាំឱ្យអនុគមន៍មានអតិបរមា។}$$

ដូចនេះដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមាលុះត្រាតែគេលក់ផលិតផលប្រភេទទី១

ចំនួន 40units និង ប្រភេទទី២ចំនួន 30units ។

លំហាត់ទី៥

អនុគមន៍តម្រូវការនៃផលិតផលពីរប្រភេទ X and Y កំណត់រៀងគ្នាដោយ :

$$p_1 = 60 - x \text{ and } p_2 = 80 - 2y \text{ ហើយអនុគមន៍ចំណាយសរុបផលិតផលទាំងពីរគឺ :}$$

$$TC(x, y) = 20 + 2xy \text{ ដែល } x \& y \text{ ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។}$$

កំណត់បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា?

ចូររកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

ចំណេះស្រាយ

តាង $TP(x, y)$ ជា Total Profit Function

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } TP &= TP(x, y) = TR(x, y) - TC(x, y) \\
 &= p_1x + p_2y - TC(x, y) \\
 &= (60 - x)x + (80 - 2y)y - (20 + 2xy) \\
 &= 60x - x^2 + 80y - 2y^2 - 20 - 2xy \\
 &= -x^2 - 2y^2 - 2xy + 60x + 80y - 20
 \end{aligned}$$

-គណនាដេរីវេ $TP'_x = -2x - 2y + 60$, $TC'_y = -4y - 2x + 80$

-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} -2x - 2y + 60 = 0 \\ -2x - 4y + 80 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 20, y = 10$

-គណនា $\Delta = ac - b^2$ ដោយ $a = TP''_{xx} = -2$, $b = TC''_{xy} = -2$, $c = TC''_{yy} = -4$

គេបាន $\Delta = 8 - 4 = 4 > 0$, $a = -2 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានអប្បបរមា ។

ដូចនេះដើម្បីឱ្យគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមាលុះត្រាតែគេលក់ផលិតផលប្រភេទទី១

ចំនួន 20units និង ប្រភេទទី២ចំនួន 10units ។



លំហាត់អនុវត្ត

1. អនុគមន៍ចំណាយនៃការផលិតនូវផលិតផលពីរប្រភេទ A and B កំណត់ដោយ :

$$TC = f(x, y) = x^2 + y^2 - 4000x - 6000y + 15000000 \quad ។$$

ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

ចូរកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិតដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណាយអប្បបរមា ?

កំណត់រកប្រាក់ចំណាយសរុបអប្បបរមានោះ ?

2. អនុគមន៍ចំណាយនៃការផលិតនូវផលិតផលបីប្រភេទ A , B and C កំណត់ដោយ :

$$TC = f(x, y, z) = 4x^2 + 18y^2 + z^2 - 320x - 360y - 6yz + 60000$$

ដែល x , y and z ជាបរិមាណនៃផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

ចូរកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវផលិតដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណាយអប្បបរមា ?

កំណត់រកប្រាក់ចំណាយសរុបអប្បបរមានោះ ?

3. អនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញពីការកំណត់នូវផលិតផលបីប្រភេទ A , B and C កំណត់ដោយ :

$$TP = f(x, y, z) = -5x^2 - 4y^2 - z^2 + 4xz + 80x + 160y$$

ដែល x , y and z ជាបរិមាណនៃផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

កំណត់បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដើម្បីឱ្យបានចំណេញអតិបរមា?

ចូររកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

4. អនុគមន៍តម្រូវការនៃផលិតផលបីប្រភេទ A , B , C កំណត់រៀងគ្នាដោយ :

$$p_1 = 50 - x, \quad p_2 = 40 - y \quad \text{and} \quad p_3 = 80 - z$$

ហើយអនុគមន៍ចំណាយសរុបផលិតផលទាំងពីរគឺ $TC(x, y) = 20 + 2x + 4y + 6z$

ដែល x , y & z ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ។

កំណត់បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដើម្បីឱ្យបានចំណេញអតិបរមា?

ចូររកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

5. ឧបមាថា $TC = f(x, y)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយសរុបរបស់ផលិតផលពីរប្រភេទ ។

ដែល x & y ជាបរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗ ហើយចំណាយថេរស្មើ \$60 ។

គេដឹងថា Maginal Cost ធៀបនឹង x គឺ $\frac{\partial TC}{\partial x} = 10x - 6y + 40$

Maginal Cost ធៀបនឹង y គឺ $\frac{\partial TC}{\partial y} = -6x + 4y - 40$

ចូរកំណត់អនុគមន៍ចំណាយសរុបនេះ ? រួចរកប្រាក់ចំណាយអប្បបរមានៃការផលិត ។

ការប្រាក់ទោល និង ការប្រាក់ផ្គុំ

១. សញ្ញាណ និង ប្រភេទការប្រាក់

ក. ការប្រាក់ (Interest)

ការប្រាក់គឺជាប្រាក់ដែលអ្នកប្រើទុន ត្រូវបង់ទៅឱ្យម្ចាស់ទុន ដើម្បីប្រើប្រាស់ទុននេះ ក្នុងរយៈពេលមួយកំណត់ ពោលគឺជាប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការប្រាក់ដែលដាក់ឱ្យខ្ចីក្នុង រយៈពេលមួយកំណត់ ។

ខ. អត្រាការប្រាក់ (Interest rate)

ផលធៀបរវាងការប្រាក់ដែលបានបង់ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹងទុនដែលបានខ្ចីហៅថា

អត្រាការប្រាក់ ។

អត្រាការប្រាក់គិតជាភាគរយ ឬ ទសភាគ ។

ឧទាហរណ៍ : អត្រាការប្រាក់ $i = 9\% = 0,09$ ។

គ. ប្រភេទនៃការប្រាក់

ការប្រាក់មានពីរប្រភេទគឺ :

ការប្រាក់ទោល (Simple interest) និង ការប្រាក់សមាស (Compound Interest) ។

២. ការប្រាក់ទោល (Simple Interest)

ក. និយមន័យ :

ការប្រាក់ទោលគឺជាការប្រាក់ដែលគិតលើប្រាក់ដើមដែលបានខ្ចី ក្នុងគ្រប់រយៈពេល ។
ការប្រាក់របស់រយៈពេលនីមួយៗ មិនបានបូកបញ្ចូលជាមួយប្រាក់ដើម ដើម្បីយកការប្រាក់ នៅគ្រាក្រោយៗទៀតឡើយ ។

ខ. រូបមន្តគណនាការប្រាក់ទោល:

បើគេយកសាច់ប្រាក់ចំនួន PV (ប្រាក់ដើម) ទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងរយៈពេល n ខួប ឬ ត្រា ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ i នោះការប្រាក់ដែលទទួលបានអាចគណនាតាមរូបមន្តត្រឹម :

$$I_n = PV \times n \times i \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ ១ : លោកសារី បានយកប្រាក់ដើមចំនួន \$75,000 ទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ដោយទទួលបានការប្រាក់ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គណនាការប្រាក់ដែលលោកសារីទទួលបាន ?

$$\text{តាមរូបមន្ត } I_n = PV \cdot n \cdot i \text{ ដោយ } \begin{cases} PV = \$75,000 \\ n = 3 \\ i = 20\% = 0.2 \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } I_3 = 75,000 \times 3 \times 0.2 = \$45,000 \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ ២ : លោក សារ៉ាតបានយកប្រាក់ដើមចំនួន 450,000,000 រៀល

ទៅធ្វើវិនិយោគដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ $i = 25\%$ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ចូរគណនាការប្រាក់ដែលលោកសារ៉ាតទទួលបានក្នុងរយៈពេល :

ក. 75 ថ្ងៃ ។

ខ. 5 ខែ ។

គ. 2 ឆ្នាំ 7 ខែ ។ (សិស្សដោះស្រាយខ្លួនឯង) ។

គ. រូបមន្តគណនាថ្លៃអនាគត (Future Value)

បើគេយកប្រាក់ដើមចំនួន PV ទៅធ្វើវិនិយោគដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ i

ក្នុងរយៈពេល n ឆ្នាំ នោះនៅចុងឆ្នាំទី n ប្រាក់ដែលគេទទួលបាន ឬថ្លៃអនាគតអាច

គណនាតាមរូបមន្ត :

$$FV = PV + I_n = PV(1 + n \cdot i) \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ ១ : លោក សុគន្ធ បានយកប្រាក់ទៅវិនិយោគចំនួន 240,000,000 រៀល

ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ 5 ខែ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ប្រចាំឆ្នាំ $i=12\%$ ។

ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ទោល ?

តាមរូបមន្ត $FV = PV(1 + n.i)$

ដោយ $n = 2$ ឆ្នាំ 5 ខែ $= (2 + \frac{5}{12})$ ឆ្នាំ (ព្រោះ 5 ខែ $= \frac{5}{12}$ ឆ្នាំ) ។

គេបាន $PV = 240,000,000 \left[1 + (2 + \frac{5}{12}) \times 12\% \right] = \dots$

ឧទាហរណ៍ ២ : លោក សុផល បានខ្ចីប្រាក់គេចំនួន 400 000 000 រៀល ក្នុងរយៈពេល

2 ឆ្នាំជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ $i = 2\%$ ។ ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ទោល

(សិស្សដោះស្រាយខ្លួនឯង) ។

៣. ការប្រាក់ផ្គុំប (Compound Interest)

ក. និយមន័យ :

ការប្រាក់ផ្គុំប គឺជាប្រភេទការប្រាក់ដែលប្រើក្នុងភារកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង ។
ការប្រាក់ផ្គុំបមានន័យថាការប្រាក់របស់គ្រាមុនត្រូវបន្ថែមជាមួយប្រាក់ដើមដែលបានយក
ធ្វើវិនិយោគដើម្បីយកការប្រាក់នៅគ្រាបន្ទាប់ ។ ក្នុងការប្រាក់ផ្គុំប ការប្រាក់បង្កើតការប្រាក់

ខ. រូបមន្តគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ផ្គុំប

បើគេយកប្រាក់ដើម PV ទៅធ្វើវិនិយោគដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ i
តាមការប្រាក់ផ្គុំបក្នុងរយៈពេល n ឆ្នាំ នោះនៅចុងឆ្នាំទី n ប្រាក់ដែលគេទទួលបាន
ឬថ្លៃអនាគតអាចគណនាបានតាមរូបមន្ត : $FV = PV.(1 + i)^n$ ។

ឧទាហរណ៍ ១ : លោកសារីបានយកប្រាក់ដើមចំនួន 75,000,000 រៀល ទៅធ្វើវិនិយោគ

ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ តាមការប្រាក់ផ្គុំបជាមួយអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

គណនាថ្លៃអនាគត ?

$$\text{តាមរូបមន្ត } FV = PV(1+i)^n \text{ ដោយ } \begin{cases} PV = 75,000,000 \\ n = 4 \\ i = 8\% = 0.08 \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } FV = 750,000,000(1 + 0.08)^4 = \dots$$

ឧទាហរណ៍ ២ : លោក សារ៉ាតបានយកប្រាក់ចំនួន \$250,000 ទៅផ្ញើក្នុងធនាគារមួយក្នុង

រយៈពេល 4 ឆ្នាំ 9 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ $i = 5\%$ ក្នុងមួយ ។

គណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ផ្គុំ ។

(សិស្សដោះស្រាយខ្លួនឯង) ។

ឧទាហរណ៍ ៣ : គេយកប្រាក់ដើមចំនួន \$450,000 ទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងរយៈពេល

4 ឆ្នាំ 3 ខែ ។

គេដឹងថាអត្រាការប្រចាំឆ្នាំគឺ $i = 12\%$ ។

ក-ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ទោល ។

ខ-ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ផ្គុំ ។

(សិស្សដោះស្រាយខ្លួនឯង) ។

គ-រូបមន្តគណនាថ្លៃបច្ចុប្បន្ន

$$\text{តាមរូបមន្ត } FV = PV(1+i)^n \text{ គេទាញបាន } PV = \frac{FV}{(1+i)^n} = FV \cdot (1+i)^{-n}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{PV = FV(1+i)^{-n}} \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ ១ : គេបានយកប្រាក់ដើម PV ទៅផ្ញើក្នុងធនាគារមួយក្នុងរយៈពេល 3

ឆ្នាំតាមការប្រាក់ផ្គុំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ 9% ។

គេដឹងថាថ្លៃអនាគតមាន 12 950 290 រៀល ។

ចូរគណនាលៃបច្ចុប្បន្ន PV ?

ចម្លើយ $PV = 10,000,000$ រៀល ។

២-រូបមន្តគណនារយៈពេលវិនិយោគតាមការប្រាក់ផ្គូផ្គង

តាមរូបមន្ត $FV = PV \cdot (1+i)^n$ គេទាញបាន :

$$(1+i)^n = \frac{FV}{PV}$$

$$\ln(1+i)^n = \ln\left(\frac{FV}{PV}\right)$$

$$n \cdot \ln(1+i) = \ln FV - \ln PV$$

ដូចនេះ
$$n = \frac{\ln FV - \ln PV}{\ln(1+i)} \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេយកប្រាក់ដើម $PV = \$15,000,000$ ទៅធ្វើវិនិយោគតាមអត្រាការប្រាក់

ផ្គូផ្គងប្រចាំឆ្នាំ $i = 12\%$ ។

គណនារយៈពេលវិនិយោគដើម្បីឱ្យថ្លៃអនាគតស្មើ $FV = \$23,602,790$

តាមរូបមន្ត $n = \frac{\ln FV - \ln PV}{\ln(1+i)}$ ដោយ $\begin{cases} FV = \$23,602,790 \\ PV = \$15,000,000 \\ i = 12\% = 0.12 \end{cases}$

ដូចនេះ
$$n = \frac{\ln 23602790 - \ln 15000000}{\ln(1+0.12)} \approx 4 \text{ ឆ្នាំ} \quad \text{។}$$

៣-រូបមន្តគណនាអត្រាការប្រាក់តាមការប្រាក់ផ្គូផ្គង

តាមរូបមន្ត $FV = PV(1+i)^n$ គេទាញបាន :

$$(1+i)^n = \frac{FV}{PV}$$

$$1+i = \sqrt[n]{\frac{FV}{PV}}$$

ដូចនេះ
$$i = \sqrt[n]{\frac{FV}{PV}} - 1 \quad \text{។}$$

៤-ការប្រាក់ផ្គូផ្គងបន្តបន្ទាប់

ប្រសិនបើគេអនុវត្តន៍ អត្រាការប្រាក់ផ្គូផ្គងជាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ (សន្មតថា m ដងក្នុង១ឆ្នាំ)

ក្នុងករណីនេះ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយលើកគឺ $\frac{i}{m}$ ។

ដូចនេះតម្លៃអនាគតកំណត់ដោយ $FV = PV \cdot \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn}$ ។

កាលណា $m \rightarrow +\infty$ គេបាន $FV = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[PV \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn} \right]$

បើយើងតាង $\frac{i}{m} = \frac{1}{x}$ ឬ $x = \frac{m}{i}$ កាលណា $m \rightarrow +\infty$ នោះ $x \rightarrow +\infty$

គេបាន $FV = PV \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{i \cdot x \cdot n} = PV \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^{i \cdot n} = PV \cdot e^{i \cdot n}$ ។

(ពីព្រោះតាមរូបមន្តលីមីត $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e = 2.718281828\dots$) ។

ដូចនេះគេបានរូបមន្តតម្លៃអនាគតតាមអត្រាការប្រាក់ផ្ចុំបន្តបន្ទាប់ច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ

(មិនកំណត់) $FV = PV \times e^{i \cdot n}$ ដែល $e = 2.71828\dots$ ជាគោលលោការីតនេពែរ ។

ឧទាហរណ៍ : គេយកប្រាក់ \$50,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់

ផ្ចុំបន្តបន្ទាប់ច្រើនដង (មិនកំណត់) ក្នុងមួយឆ្នាំ $i = 6\% = 0.06$ ។

តើក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំក្រោយមក គេបានតម្លៃអនាគតប៉ុន្មាន ?

ក្រោយពីផ្ញើររយៈពេល 30 ឆ្នាំក្រោយមក គេនឹងទទួលបានតម្លៃអនាគត :

$$FV = \$50000 \times (2.71828)^{(0.06) \times 30} = \$\dots \quad \text{។}$$



លំហាត់អនុវត្ត

១-លោកសារី យកប្រាក់ចំនួន \$10,000,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយជាមួយ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ $i = 25\%$ ។

ក. ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ទោល ។

ខ. ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ផ្គុំ ។

២-លោកសារី យកប្រាក់ \$40,000,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយរយៈពេល 6 ឆ្នាំ 9 ខែ

ជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ $i = 5\% = 0.05$ ។ ចូរគណនាថ្លៃអនាគត ?

៣-គេយកប្រាក់ដើម (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន) ចំនួន C_0 ទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ

ជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ $i = 9\%$ ។ គេដឹងថាថ្លៃអនាគតគឺ \$12,950,290 ។

ចូរគណនាថ្លៃបច្ចុប្បន្ន (ប្រាក់ដើម) ?

៤-លោកសារី បានឱ្យលោកសារីភីតឱ្យប្រាក់ចំនួន \$60,000 តាមអត្រាការប្រាក់ទោល

ប្រចាំឆ្នាំ 8% ។ 3 ឆ្នាំក្រោយមកលោកសារីបានប្រមូលទាំងដើម ទាំងការពិលោកសារីភីត

ហើយគាត់បានយកទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ 6% ។

ចូរគណនាថ្លៃអនាគតបន្ទាប់ពីលោកសារីធ្វើក្នុងធនាគារ 4 ឆ្នាំ ?

៥-លោកសារីភីតបានយកប្រាក់ចំនួន \$200,000 ទៅចងការ តាមអត្រាការប្រាក់ផ្គុំ

ដូចតទៅ :

* $i_1 = 6\%$ (ក្នុង ១ឆ្នាំ) ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំដំបូង

* $i_2 = 8\%$ (ក្នុង ១ឆ្នាំ) ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំបន្ទាប់

* $i_3 = 10\%$ (ក្នុង ១ឆ្នាំ) ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយ ។

គណនាថ្លៃអនាគតនៅចុងឆ្នាំទី 9 ?

៦-លោក សារី បានយកប្រាក់ចំនួន \$40,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយជាមួយ

អត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ $i = 12\%$ ។

តើលោកសារី ត្រូវធ្វើធនាគារ រយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីឱ្យបានថ្លៃអនាគតស្មើនឹង 4 ដង

នៃប្រាក់ដើម ។

៧-លោកសារី យកប្រាក់ \$100,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយតាមអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ ។

គេដឹងថា បើគាត់ធ្វើក្នុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំគាត់នឹងទទួលបានថ្លៃអនាគតស្មើនឹង 4 ដងនៃ

ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ។ ចូរគណនាថ្លៃអនាគតក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយមក ?

៨-លោកសារី បានឱ្យលោក A ខ្ចីប្រាក់ចំនួន \$20,000 តាមអត្រាការប្រាក់ទោល

ប្រចាំឆ្នាំ $t\%$ ។ 3 ឆ្នាំក្រោយមក លោកសារីបានប្រមូលទាំងដើម ទាំងការពិលោក A

ហើយយកទៅឱ្យលោក B ខ្ចីបន្តជាមួយអត្រាការប្រាក់ទោលប្រចាំឆ្នាំ $(t + 4)\%$ ។

2 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីដាក់ឱ្យលោក B ខ្ចី លោកសារីប្រមូលប្រាក់ទាំងអស់ (ទាំងដើម ទាំងការ)

បានចំនួន \$85,540 ។ ចូរកំណត់អត្រាការប្រាក់ t ?

៩-គេយកប្រាក់ចំនួន \$800,000,000 ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយជាមួយអត្រាការប្រាក់ 6%

ក្នុងរយៈពេល 12 ឆ្នាំ តាមអត្រាការប្រាក់ផ្គុំបន្តបន្ទាប់ ។

ចូរគណនាថ្លៃអនាគត ?

១០-គេធ្វើប្រាក់ក្នុងធនាគារមួយ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំ

តាមគោលនយោបាយផ្គុំការប្រាក់បន្តបន្ទាប់ ។ គេដឹងថាថ្លៃអនាគតស្មើ \$7,389,000

ចូរគណនាថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ?

១១-គេយកប្រាក់ចំនួន \$600,000 ទៅធ្វើវិនិយោគរយៈពេល 6 ឆ្នាំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់

ប្រចាំឆ្នាំ $i = 8\%$ ។ ចូរគណនាថ្លៃអនាគតតាមការប្រាក់ទោល ? តាមការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ ?

តាមការប្រាក់ផ្គុំបន្តបន្ទាប់ ?

១២-លោក A បានឱ្យប្រាក់លោក B ខ្ចីចំនួន \$20,000 តាមអត្រាការប្រាក់ទោលប្រចាំឆ្នាំ $t\%$ ។ ឆ្នាំក្រោយមក លោក A បានប្រមូលប្រាក់ទាំងដើម ទាំងការពិលោក B ហើយបានដាក់ឱ្យលោក C ខ្ចីបន្តទៀតតាមអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ $t\%$ ។ 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីដាក់ឱ្យលោក C ខ្ចី លោក A ប្រមូលប្រាក់ទាំងដើម ទាំងការសរុបទាំងអស់បានចំនួន \$29,282 ។ ចូរគណនាអត្រាការប្រាក់ t ?

១៣-គេយកប្រាក់ចំនួន 1 000 000 រៀល ទៅធ្វើក្នុងធនាគារមួយ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គេដឹងថា ធនាគារបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្ញើរបស់ខ្លួន ដោយអនុវត្តន៍

គោលនយោបាយ ការប្រាក់ផ្គុំជាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ (មិនកំណត់) ។

ចូរកំណត់រយៈពេលវិនិយោគដើម្បី ឱ្យបានថ្លៃអនាគតស្មើ 7 389 000 រៀល ។

១៤- លោកសារីបានយកប្រាក់ \$80,000 ទៅដាក់ធ្វើក្នុងធនាគារ A

ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ 6% ។ 2 ឆ្នាំក្រោយមកលោក ផល្លុន

បានប្រមូលប្រាក់ទាំងដើមទាំងការពិលក្នុងធនាគារ A ហើយយកទៅដាក់ធ្វើក្នុងធនាគារ B តាមអត្រាការប្រាក់ផ្គុំប្រចាំឆ្នាំ 8% ។

គេដឹងថា ធនាគារបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្ញើរបស់ខ្លួន ដោយអនុវត្តន៍ គោលនយោបាយ ការប្រាក់ផ្គុំជាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ (មិនកំណត់) ។

ចូរគណនាថ្លៃអនាគតបន្ទាប់ពីដាក់ធ្វើក្នុងធនាគារ B រយៈពេល 3 ឆ្នាំមក ។

១៥-លោកពេជ្រ បានយកប្រាក់ចំនួន \$40,000 ទៅវិនិយោគតាមអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំផ្គុំបន្តបន្ទាប់ ។

ក. ចូរគណនាថ្លៃអនាគត ដែលលោកពេជ្រ ទទួលបានបើគាត់វិនិយោគរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ។

ខ. តើលោកពេជ្រត្រូវវិនិយោគក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទើបទទួលបានថ្លៃអនាគតស្មើនឹង 2 ដងនៃប្រាក់ដើម (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន) ។

ធនាគារ ឬ សំណងប្រចាំគ្រា

១-និយមន័យ :

ក. Annuities : គឺជា សេរី នៃការចំណាយ (សង ឬ បង់ប្រាក់សន្សំជាប្រចាំ)

លើចន្លោះពេលមួយទៀងទាត់ស្មើគ្នា ។

ចន្លោះរយៈពេលស្មើគ្នានីមួយៗ ហៅថា គ្រា ឬកាល ឬហៅថាខួប ដែលជាទូទៅគឺ មួយឆ្នាំ ។

☞ ធនាគារមួយអាចកំណត់បានលុះត្រាតែគេស្គាល់អំពី :

-ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បង់លើកដំបូង

-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ក្នុងមួយលើកៗ

-ចំនួនដងដែលបានបង់

-ចន្លោះរយៈពេលបង់ម្តងៗ ជាទូទៅ គិតជាឆ្នាំ ឆមាស ឬ ត្រីមាស ឬ ខែ ។

-អត្រាការប្រាក់ផ្គូផ្គងប្រចាំគ្រា ឬ កាល ។

☞ គោលបំណងនៃធនាគារ :

-ដើម្បីសន្សំប្រាក់មួយចំនួនក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ ឬ បង្កើនទុនមួយចំនួន

-ដើម្បីសងរំលោះជាបណ្តើរៗនូវទឹកប្រាក់មួយចំនួនដែលបានខ្ចី ។

☞ ប្រភេទនៃធនាគារមានពីរប្រភេទ :

-ធនាគារធម្មតា ឬធនាគារបង់ដើមគ្រា : គឺជាការបូកសរុបទឹកប្រាក់ ដែលបានបង់ ទាំងអស់នៅពេលបានបង់រួចរាល់ ។

-ធនាគារបង់ដើមគ្រា : គឺជាការបូកសរុបទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ទាំងអស់ នៅ ក្រោយមួយគ្រាបន្ទាប់ពីការបង់ចុងក្រោយ ។

២-ថ្លៃអនាគត (Future Value)**១. ធនលាភបង់ចុងគ្រា (Ordinary Annuity)**

ថ្លៃអនាគតរបស់ស្ថិតធនលាភមួយ គឺជាផលបូកសរុបនៃថ្លៃអនាគតរបស់
ធនលាភទាំងឡាយគិតត្រឹមពេលបង់បញ្ចប់ចុងក្រោយបង្អស់ ។

ឧបមាថា A_k ជាប្រាក់ដែលត្រូវបង់នៅលើកទី k ដែល $k = 1, 2, 3, \dots, n$

i ជាអត្រាការប្រាក់

n ជារយៈពេល

FV_A ជាថ្លៃអនាគត

$$\text{គេបាន } FV_A = FV_1 + FV_2 + FV_3 + \dots + FV_n = \sum_{k=1}^n (FV_k)$$

$$\text{ដោយគេមាន : } FV_1 = A_1 \cdot (1+i)^{n-1} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី១ មានរយៈពេល } (n-1) \text{)}$$

$$FV_2 = A_2 \cdot (1+i)^{n-2} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី២មានរយៈពេល } (n-2) \text{)}$$

$$FV_3 = A_3 \cdot (1+i)^{n-3} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី៣មានរយៈពេល } (n-3) \text{)}$$

$$FV_{n-1} = A_{n-1} \cdot (1+i)^{n-(n-1)} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី } n-1 \text{ មានរយៈពេល } 1 \text{)}$$

$$FV_n = A_n \cdot (1+i)^{n-n} = A_n \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី } n \text{ មានរយៈពេល } 0 \text{)}$$

$$\text{ដូចនេះ } FV_A = A_1(1+i)^{n-1} + A_2(1+i)^{n-2} + A_3(1+i)^{n-3} + \dots + A_{n-1}(1+i)^1 + A_n$$

$$FV_A = \sum_{k=1}^n [A_k \cdot (1+i)^{n-k}] \quad (1)$$

-បើគេមាន $A_1 = A_2 = A_3 = \dots = A_n = A$ នោះរូបមន្ត (1) អាចសរសេរ ជា :

$$FV_A = \sum_{k=1}^n [A(1+i)^{n-k}] = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

(ហៅថាថ្លៃអនាគតនៃធនលាភថេរចុងគ្រា Constant annuities) ។

ឧទាហរណ៍ : គេបានដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីមួយរៀងរាល់ចុងឆ្នាំនូវសាច់ប្រាក់ថេរចំនួន \$400 ។ ចូរកំណត់រកចំនួនសាច់ប្រាក់សរុបក្នុងគណនីនេះនៅពេលគាត់បានដាក់ប្រាក់លើកទី 5 បើគេដឹងថាអត្រាការប្រាក់ផ្គូផ្គងប្រចាំឆ្នាំគឺ $i = 12\%$ ។

$$\text{តាមរូបមន្ត } FV_A = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \text{ដោយ} \quad \begin{cases} A = \$400 \\ i = 12\% = 0.12 \\ n = 5 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad FV_A = 400 \times \frac{(1+0.12)^5}{0.12} = \$\dots\dots \quad \text{។}$$

២. ធនលាភបង់ដើមគ្រា (Annuity Due)

ឧបមាថា A_k ជាប្រាក់ដែលត្រូវបង់នៅលើកទី k ដែល $k = 1, 2, 3, \dots, n$

i ជាអត្រាការប្រាក់

n ជារយៈពេល

V_n ជាថ្លៃអនាគត

$$\text{គេបាន } FV_A = FV_1 + FV_2 + FV_3 + \dots + FV_n = \sum_{k=1}^n (FV_k)$$

ដោយគេមាន : $FV_1 = A_1 \cdot (1+i)^n$ (ថ្លៃអនាគតគ្រាទី១ មានរយៈពេល n)

$$FV_2 = A_2 \cdot (1+i)^{n-1} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី២មានរយៈពេល } (n-1))$$

$$FV_3 = A_3 \cdot (1+i)^{n-2} \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី៣មានរយៈពេល } (n-2))$$

$$FV_{n-1} = A_{n-1} \cdot (1+i)^2 \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី } n-1 \text{ មានរយៈពេល } 2)$$

$$FV_n = A_n \cdot (1+i)^1 = A_n (1+i) \quad (\text{ថ្លៃអនាគតគ្រាទី } n \text{ មានរយៈពេល } 1)$$

$$FV_A = A_1(1+i)^n + A_2(1+i)^{n-1} + A_3(1+i)^{n-2} + \dots + A_{n-1}(1+i)^2 + A_n(1+i)$$

$$\boxed{FV_A = \sum_{k=1}^n [A_k \cdot (1+i)^{n-k+1}] \quad (2)}$$

-បើគេមាន $A_1 = A_2 = A_3 = \dots = A_n = A$ នោះរូបមន្ត (2) អាចសរសេរ ជា :

$$FV_A = \sum_{k=1}^n [A(1+i)^{n-k+1}] = A(1+i) \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

(ហៅថាថ្លៃអនាគតនៃធនលាភថេរដើមត្រា Constant annuities) ។

ឧទាហរណ៍ : លោកសារីបានដាក់ប្រាក់ \$300 ទៅក្នុងគណនីសន្សំនៅថ្ងៃ 1 ខែ 1 រៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ 2000 ។ ចូរកម្រិតសរុបដែលលោកសារីទទួលបាននៅថ្ងៃ 31 ខែ 12 ឆ្នាំ 2005 ? គេដឹងថាអត្រាការប្រាក់ផ្តល់ប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង $i = 12\%$ ។

តាមរូបមន្តគេបាន $FV_A = A(1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ ដោយ $\begin{cases} A = \$300 \\ i = 12\% = 0.12 \\ n = 6 \end{cases}$

ដូចនេះ $FV_A = 300 \cdot (1 + 0.12) \cdot \frac{(1 + 0.12)^6 - 1}{0.12} = \$.....$ ។

៣. ថ្លៃអនាគតរបស់ធនលាភថេរដើមត្រា គិតត្រឹម d កាល

ក្រោយពេលបង់លើកក្រោយបង្អស់ :

ឧបមាថា V_n ជាថ្លៃអនាគតនៃធនលាភបង់ចុងត្រាចំនួន n លើកដែលសាច់ប្រាក់ បង់មួយលើកៗមានចំនួនថេរ A ជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្តល់ i នោះគេបាន :

$$FV_A = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \text{។}$$

ក្រោយពីការបង់លើកទី n បើអ្នកពុំបានបង់ប្រាក់បន្ថែម ឬ ដកប្រាក់នោះទេ គឺទុក សម្រាប់យកការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល d កាលទៀត ជាមួយអត្រាការប្រាក់ i ដដែល ។ បើ FV_A^d ជាថ្លៃអនាគតរបស់ធនលាភដែលត្រូវរកនោះគេបាន :

$$FV_A^d = FV_A \cdot (1+i)^d = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \cdot (1+i)^d \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : លោកសារីបានដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីរបស់គាត់ចំនួន 400 000 000 រៀល

រៀងរាល់ចុងឆ្នាំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្គុំ $i = 12\%$ ។

បន្ទាប់ពីគាត់បានបង់ប្រាក់លើកទី 6 រួច គាត់ពុំបានបង់ប្រាក់បន្ថែម ឬក៏ដកប្រាក់នោះទេ

គឺលោកសារីបានទុកប្រាក់នោះសម្រាប់យកការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំទៀត ជាមួយ

អត្រាការប្រាក់ដដែល ។

ចូរគណនាថ្លៃអនាគតដែលលោកសារីទទួលបានបន្ទាប់ពីទុកយកការប្រាក់ 4 ឆ្នាំក្រោយមក ?

$$\text{តាមរូបមន្ត } FV_A^d = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \cdot (1+i)^d \quad \text{ដោយ} \quad \begin{cases} A = 400,000,000 \\ i = 12\% = 0.12 \\ n = 6 \\ d = 4 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ : } FV_A^4 = 400,000,000 \cdot \frac{(1+0.12)^6 - 1}{0.12} \cdot (1+0.12)^4 = \dots$$

៣-ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន (Present Value)

១. ថ្លៃបច្ចុប្បន្ននៃធនលាភបង់ចុងគ្រា :

- គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់វិនិយោគនៅពេលនេះ ជាមួយអត្រាការប្រាក់មួយកំរិត ដើម្បី សម្រាប់ដកចំណាយ ជាបណ្តើរៗនៅថ្ងៃក្រោយ ។

- គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកំណត់សងជាប្រចាំ លើ រយៈពេលស្មើគ្នាចំនួន n ដង

ដើម្បីរំលោះបំណុលដែលបានខ្ចីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន V_0 (ហៅថាសំណងប្រចាំគ្រា) ។

- បើយើងតាង V_0 ជាថ្លៃបច្ចុប្បន្ននោះគេបាន :

$$PV = \frac{A_1}{1+i} + \frac{A_2}{(1+i)^2} + \frac{A_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{A_n}{(1+i)^n} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{A_k}{(1+i)^k} \right] \quad (1)$$

- បើ $A_1 = A_2 = A_3 = \dots = A_n = A$ នោះតាមរូបមន្ត (1) គេទាញបាន :

$$PV = \sum_{k=1}^n \left[\frac{A}{(1+i)^k} \right] = A \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ ១: តើយើងត្រូវដាក់ប្រាក់ធ្វើក្នុងធនាគារចំនួនប៉ុន្មាននៅថ្ងៃ 01/01/2004

ដើម្បីឱ្យយើង

អាចដកវិញបានចាប់តាំងពីថ្ងៃ 01/01/2005 មួយឆ្នាំៗចំនួន \$1000 ចំនួន 4 ដង ?

គេដឹងថាអត្រាការប្រាក់ផ្តល់ប្រចាំឆ្នាំគឺ $i = 18\%$ ។

$$\text{តាមរូបមន្ត } PV = A \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \quad \text{ដោយ} \quad \begin{cases} A = \$1000 \\ i = 18\% = 0.18 \\ n = 4 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ } PV = 1000 \cdot \frac{1 - (1 + 0.18)^{-4}}{0.18} = \$....$$

ឧទាហរណ៍២ : លោក A បានឱ្យលោក B ខ្ចីប្រាក់ចំនួន \$20,000 ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ

ដោយធ្វើកិច្ចសន្យាមួយតម្រូវឱ្យលោក B សងបំណុលនេះរៀងរាល់ចុងឆ្នាំ នូវសាច់ប្រាក់ថេរ

ជាមួយអត្រាការប្រាក់ $i = 20\%$ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

តើលោក B ត្រូវសងបំណុលនេះក្នុងមួយឆ្នាំៗប៉ុន្មាន ?

$$\text{តាមរូបមន្ត } PV = A \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

$$\text{គេទាញបាន } A = \frac{PV}{\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}} \quad \text{ដោយ} \quad \begin{cases} PV = \$20,000 \\ i = 20\% = 0.20 \\ n = 5 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ } A = \frac{20,000}{\frac{1 - (1 + 0.20)^{-5}}{0.20}} = \$....$$

ឧទាហរណ៍៣: លោក A បានខ្ចីប្រាក់ពីលោក B ចំនួន \$800,000 ជាមួយ

អត្រាការប្រាក់ផ្តល់ប្រចាំឆ្នាំ $i = 6\%$ ដោយសន្យា សងបំណុលនេះ ទៅលោក B

វិញរៀងរាល់ចុងឆ្នាំនូវចំនួនសាច់ប្រាក់ \$230,873 ថេរ ។

តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទើបលោក A សងបំណុលទៅលោក B រួចរាល់ ?

(សិស្សដោះស្រាយខ្លួនឯង) ។

៤-មូលនិធិទូទាត់បំណុល (SINKING FUND)

គឺជាមូលនិធិសន្សំទុកដោយឡែក ដោយរដ្ឋាភិបាល-ក្រុមហ៊ុន..... ។ ល . ។

ដែលត្រូវបានគេប្រើ សម្រាប់ទូទាត់ បំណុល តាមកំរិតមួយកំនត់ ។

ឧទាហរណ៍ : នៅចុងឆ្នាំ 2005 លោក A ត្រូវការប្រាក់ចំនួន \$200,000 ដើម្បី

បើកហាងទំនិញមួយ ។ តើលោក A ត្រូវសន្សំប្រាក់តាម Annuities ថែរក្សាមួយឆ្នាំៗ

ចំនួនប៉ុន្មាន ? អត្រាការប្រាក់ 20% ថ្ងៃដែលបង់ប្រាក់សន្សំលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ 2002 ។

តាមរូបមន្តធនលាភបង់ដើមគ្រា : $FV_A = A(1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$

គេទាញបាន $A = \frac{FV_A}{(1+i)} \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1}$ ដោយ $\begin{cases} FV_A = \$200,000 \\ i = 20\% = 0.20 \\ n = 4 \end{cases}$

ដូចនេះ $A = \frac{200,000}{1+0.20} \cdot \frac{0.20}{(1+0.20)^4 - 1} = \$.....$



លំហាត់អនុវត្តន៍

- 1-ដើម្បីបង្កើនទុន អាជីវករម្នាក់បានដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីរបស់គាត់រៀងរាល់ចុងឆ្នាំ នូវចំនួនសាច់ប្រាក់ថេរ \$5000 ជាមួយអត្រាការប្រាក់ផ្គូផ្គងប្រចាំឆ្នាំ 20% ។
ចូរគណនាចំនួនសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អាជីវករនៅពេលដែលគាត់ដាក់ប្រាក់លើកទី 5 ។
- 2-លោក A បានដាក់ប្រាក់សន្សំរៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន \$2500 ចាប់ពីថ្ងៃ 01/01/2000 ។
គេដឹងថាអត្រាការប្រាក់ផ្គូផ្គងប្រចាំឆ្នាំ $i = 20\%$ ។ ចូរកំណត់ប្រាក់ដែលលោក A ទទួលបាន នៅ ថ្ងៃ 01/01/2005 ។
- 3-លោកសារីបានសន្សំប្រាក់ក្នុងធនាគារដោយបង់ជាប្រចាំក្នុងមួយឆ្នាំៗ \$1500
ចាប់ពីថ្ងៃ 01/01/2000 ។
ថ្ងៃបង់ចុងក្រោយ 31/12/2005 ហើយអត្រាការប្រាក់ 18% ។
ចូរគណនាថ្លៃអនាគតនៃធនលាភរបស់លោកសារី :
ក. គិតដល់ថ្ងៃ 31/12/2005 ។
ខ. គិតដល់ថ្ងៃ 01/01/2007 ។
- 4-អាជីវករម្នាក់ត្រូវការប្រាក់ចំនួន \$50,000 ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅចុង ឆ្នាំ 2006 ។
តើអាជីវករនោះត្រូវសន្សំប្រាក់តាម Annuities ថែរក្សាមួយឆ្នាំប៉ុន្មាន ?
គេដឹងថាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 24% ហើយគាត់ចាប់ផ្តើមសន្សំពីដើមឆ្នាំ 2003 ។
- 5-លោក A បានខ្ចីប្រាក់ធនាគារចំនួន \$20,000 ជាមួយអត្រាការប្រាក់ 22%
ហើយត្រូវសងវិញមួយឆ្នាំម្តងៗចំនួន 5 ឆ្នាំតាម Annuities ថែរ ។
តើប្រាក់ដែលត្រូវសងនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗប៉ុន្មាន ?

6-If you invest \$8,000 per period for the following number of period ,how much would you have ?

a / 7 years at 9 percent

b / 40 years at 11 percent

7-You invest a single amount of \$12,000 for 5years at 10 percent. At the end of 5years you take the proceeds and invest them for 12 years at 15 percent. How much will you have after 17 years ?

8-Mrs.Crawford will receive \$6,500 a year for the nex 14 years from her trust. If an 8 percent interest rate is applied, what is the current value of the future payments ?

9-At a growth (interest) rate of 8 percent annually, how long will it take a sum to double ? To triple ? Select the year that is closest to the correct answer .

10-How much would you have to invest to day to receive:

a / \$12,000 in 6 years at 12 percent ?

b / \$15,000 in 15 years at 8 percent ?

c / \$5,000 each year for 10 years at 8 percent ?

d / \$40,000 each year for 40 years at 5 percent ?

11-Your grandfather has offered you choice of one of the three following alternatives:\$5,000 now , \$1,000 a year for eight , or \$12,000 at the end of eight years. Assuming you could earn 11 percent annually, which alternative should you choose ? If you could earn 12 percent annually, would you still choose the same alternative ?

12-លោក A ត្រូវបានលោក B ប្តឹងហើយតុលាការបានតម្រូវឱ្យលោក A សងថ្លៃជំងឺចិត្ត

ទៅឱ្យលោក B តាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម :

-បើបង់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវសងចំនួន \$10,000 ។

-បើបង់សងជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ 5ឆ្នាំ គឺក្នុងមួយឆ្នាំៗត្រូវបង់ \$2,500 ។

-បើបង់សងក្នុងថ្ងៃនេះ \$6,000 រង់ចាំ 2ឆ្នាំទៀតគឺត្រូវបង់សង \$5,600 ។

ឧបមាថាអត្រាការប្រាក់ 8% ត្រូវបានគេអនុវត្តន៍ ។ តើលោក A គួរជ្រើសរើសយកលក្ខខ័ណ្ឌមួយណា សម្រាប់បង់សងទៅឱ្យលោក B ?

២០២០៥២២២២២២

វិភាគលើបឋម

១. ហ្វាក់តូរ្យែល (Factorial) :

ដែលហៅថាហ្វាក់តូរ្យែលនៃចំនួន n ជាផលគុណនៃ n ចំនួនគតិវិជ្ជមានដំបូង ឬ
ជាផលគុណចំនួនគតិវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវ ពី 1 រហូតដល់ n ដែលគេកំនត់សរសេរ :

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : $1! = 1$

$$2! = 1.2 = 2$$

$$3! = 1.2.3 = 6$$

$$4! = 1.2.3.4 = 24$$

$$5! = 1.2.3.4.5 = 120$$

$$6! = 1.2.3.4.5.6 = 720$$

$$7! = 1.2.3.4.5.6.7 = 5040$$

$$8! = 1.2.3.4.5.6.7.8 = 40320$$

$$9! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9 = 362880$$

$$10! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 = 3628800$$

គេពិនិត្យឃើញថា :

$$10! = 9!.10 = 8!.9.10 = 7!.8.9.10 = 6!.7.8.9.10 = 5!.6.7.8.9.10 = \dots$$

ជាទូទៅគេទាញបាន :

$$n! = (n-1)!n = (n-2)!(n-1)n = (n-3)!(n-2)(n-1)n = \dots$$

សំគាល់ : $0! = 1! = 1 \quad \text{។}$

ឧទាហរណ៍ : គេអោយ $S_n = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}$ ។

បង្ហាញថា $S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$ រួចទាញរក $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$?

គេមាន : $\frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{(k+1)}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$

គេបាន : $S_n = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{k}{(n+1)!} \right]$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right] = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

ដូចនេះ $S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)!} \right] = 1$ ។

២. តំរៀបមិនសារឡើងវិញ (Arrangement) :

តំរៀប p ធាតុក្នុងចំណោម n ធាតុនៃសំណុំ E គឺជាសំណុំរងនៃ E ដែលមាន p ធាតុខុសៗគ្នា រៀបតាមលំដាប់មួយកំណត់ ។ គេកំណត់តាងចំនួនតំរៀប p ធាតុក្នុងចំណោម n ធាតុដោយ :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1) \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ : តើគេអាចចំលាស់អក្សរ A, B, C យកម្តងពីរតួបានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា ?

គេបាន $(A, B, C) \Rightarrow \begin{cases} AB, BA \\ AC, CA \\ BC, CB \end{cases}$ មាន 6 របៀបខុសៗគ្នា ។

គេសង្កេតឃើញថា $A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1} = 6$ របៀប ។

ដូចនេះចំនួនចំលាស់នៃតួអក្សរបីតួ A, B, C ខុសៗគ្នា យកម្តងពីរតួ ជាតំរៀបមិនសារឡើងវិញ ជាទូទៅចំនួនចំលាស់ n ធាតុ ចាប់យកម្តង p ធាតុ ជាតំរៀបមិនសារឡើងវិញដែលកំណត់ដោយ

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}, \quad (n \geq p) \quad ។$$

សំគាល់: តំរៀបមិនសារឡើងវិញគិតពីលំដាប់ ពីព្រោះ AB និង BA ជាចំលាស់ខុសគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ :

តើគេអាចតំរៀបតួអក្សរដែលមានពីរពាក្យខុសៗគ្នាចេញពីតួអក្សរដែលមានបួនពាក្យ LOVE ខុសៗគ្នាបានប៉ុន្មានរបៀប ?

របៀបនៃការរៀបតួអក្សរនេះជាតំរៀបមិនសារឡើងវិញដែលកំណត់ដោយ :

$$A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{1.2.3.4}{1.2} = 12 \text{ របៀប ។}$$

គេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចំលើយតាមការគូសបំព្រួញ :

$$(LOVE) \Rightarrow \begin{cases} LO, OL \\ LV, VL \\ LE, EL \\ OV, VO \\ OE, EO \\ VE, EV \end{cases} \text{ មាន } 12 \text{ របៀប ។}$$

៣. ចំលាស់មិនសារឡើងវិញ (Permutation) :

ចំលាស់ n ធាតុខុសៗគ្នា គឺជាតំរៀប n ធាតុ ក្នុងចំណោម n ធាតុ ។

គេកំណត់ចំនួនចំលាស់ n ធាតុដោយ :

$$P_n = A_n^n = n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : តើគេអាចចំលាស់តួអក្សរដែលមានបីពាក្យ ABC បានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា

គេបាន $P_3 = 3! = 1.2.3 = 6$ របៀប ។

$$\text{គេអាចគូសបំព្រួញ : } (ABC) \Rightarrow \begin{cases} ABC, ACB \\ BAC, BCA \\ CAB, CBA \end{cases} \text{ មាន } 6 \text{ របៀប ។}$$

ឧទាហរណ៍ : តើគេអាចបង្កើតពាក្យដែលមានបួនតួអក្សរដោយប្រើតួអក្សរនៃពាក្យ

MATH បានប៉ុន្មានពាក្យ ?

ពាក្យដែលអាចបង្កើតបានមានចំនួន $P_4 = 4! = 1.2.3.4 = 24$ ពាក្យ ។

៤. បន្សំមិនសារឡើងវិញ (Combination) :

បន្សំ p ធាតុក្នុងចំណោម n ធាតុ ជាតំរូវបមិនគិតលំដាប់ដែលកំណត់ដោយ :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad (n \geq p) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ :

ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីបួនគ្រាប់ចុះលេខខុសៗគ្នា A, B, C, D ។

គេចាប់យកឃ្លី បីគ្រាប់ពីក្នុងថង់ ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នានៃការចាប់យកគ្រាប់ឃ្លី ?

ការចាប់យកឃ្លីបីក្នុងចំណោមឃ្លីបួនគឺជាបន្សំ 3 ក្នុងចំណោម 4 ។

$$\text{គេបាន } C_4^3 = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{1.2.3.4}{1.2.3.1} = 4 \text{ របៀប ។}$$

$$\text{គេអាចគូសបំព្រួញ (ABCD) \Rightarrow \begin{cases} ABC \\ ABD \\ ACD \\ BCD \end{cases} \text{ មាន 4 របៀប ។}$$

ឧទាហរណ៍ :

គេហូតយកបៀវ 3 ប៊ីសន្លឹកពីក្នុងហូដែលមានបៀវ 52 សន្លឹក ។

តើមានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នានៃការហូតចាប់យកបៀវជាបន្សំ 3 ក្នុងចំណោម 52 ។

$$\text{គេបាន } C_{52}^3 = \frac{52!}{3!(52-3)!} = \frac{49!.50.51.52}{1.2.3.49!} = 22100 \text{ របៀប ។}$$

៥. តំរូវបសារឡើងវិញ (Arrangement with Repetition) :

តំរូវបសារឡើងវិញ p ធាតុ ក្នុងចំណោម n ធាតុគឺជាតំរូវដែលធាតុនីមួយៗ

អាចមានវត្តមាន $1, 2, 3, \dots, n$ ដង ។

$$\text{គេកំណត់សរសេរ : } \overline{A_n^p} = n^p \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : តើមានប៉ុន្មានចំនួនដែលមានលេខពីរខ្ទង់ ដែលបង្កើតឡើង ពីលេខ $\{1,2,3,4\}$

ចំនួនតំរៀបនៃលេខគឺជាតំរៀបសារឡើងវិញកំនត់ដោយ : $\overline{A}_4^2 = 4^2 = 16$ របៀប ។

លេខទាំងនោះគឺ :
$$\begin{cases} 11, 12, 13, 14 \\ 22, 21, 23, 24 \\ 31, 32, 33, 34 \\ 41, 42, 43, 44 \end{cases} \quad \text{មាន } 16 \text{ ចំនួន ។}$$

៦. ចំលាស់សារឡើងវិញ (Permutation with Repetition) :

គេអោយសំនុំ E មាន n ធាតុ ដែលក្នុងនោះ n_1 ជាធាតុប្រភេទទី១, n_2 ជាធាតុប្រភេទទី២, n_3 ជាធាតុប្រភេទទី៣,, n_p ជាធាតុប្រភេទទី p ដោយ $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_p = n$

ចំនួនចំលាស់សារឡើងវិញនៃ n ធាតុ គឺជាចំលាស់អាចបែងចែកបានដែលកំនត់តាងដោយ :

$$\overline{P}_n = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots \cdot n_p!} \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ : តើគេអាចបង្កើតពាក្យដែលមាន 3 អក្សរបានប៉ុន្មានដោយប្រើអក្សរនៃពាក្យ BBU ?

ក្នុងពាក្យ BBU មានអក្សរ B ចំនួន 2 អក្សរ និង U ចំនួន 1

ដូចនេះចំនួនពាក្យដែលមាន 3 អក្សរគឺ : $\overline{P}_3 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{6}{2} = 3$ ពាក្យ ។

៧. បន្សំសារឡើងវិញ (Combination with Repetition) :

បន្សំសារឡើងវិញនៃ p ធាតុ ក្នុងចំណោម n ធាតុគឺជាបន្សំ ដែលធាតុនីមួយៗអាចមានវត្តមានច្រើនដង ។

គេតាងបន្សំសារឡើងវិញនៃ p ធាតុ ក្នុងចំណោម n ធាតុដោយ :

$$\overline{C}_n^p = \frac{(n+p-1)!}{p! \cdot (n-1)!} \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ :

ចូររកបន្សំនៃពិគ្គរអក្សរចេញពីគូរអក្សរបួន A, B, C, D ដែលអក្សរនីមួយៗអាចមានច្រើនដង
តាមបំរាប់បន្សំនៃគូរអក្សរជាបន្សំសារឡើងវិញ ។

$$\text{គេបាន : } \overline{C}_4^2 = \frac{(4+2-1)!}{2! \cdot (4-1)!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{120}{12} = 10 \quad \text{។}$$

៨. ទ្រឹស្តីប្រូតូន (Binom de Newton)

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} \cdot b + C_n^2 a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^n b^n \quad \text{។}$$

សំគាល់ : ទ្រឹស្តីប្រូតូនខាងក្រោមកត់សំគាល់

1. $(1 + x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots + C_n^n x^n$
2. $(x + 1)^n = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} + C_n^2 x^{n-2} + \dots + C_n^n$



លំហាត់អនុវត្ត

1. គណនាផលបូក : $S_n = 1.1! + 2.2! + 3.3! + \dots + n.n!$ ។

2. តើចំនួន 2005! មានលេខសូន្យប៉ុន្មាន ?

3. គណនាតំលៃ A_5^3, A_6^4, A_7^2 ។

4. គណនាតំលៃនៃ C_4^3, C_6^4, C_7^2 ។

5. ចូរបង្ហាញថា :

ក. $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{A_{n+2}^3 - A_{n+1}^3}{6}$

ខ. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{A_{n+2}^3 + A_{n+1}^3}{6}$

6. ចូរបង្ហាញថា $A_{n+p}^2 + A_{n+p+1}^2 = 2(n+p)^2$

7. ចូរកំណត់តម្លៃរបស់ n ដើម្បីឱ្យ $A_{n+3}^3 + A_{n+4}^3 = 2n^3 + 7n + 150$ ។

8. ចូរគណនាផលបូក $S_n = \frac{1}{A_3^3} + \frac{1}{A_4^3} + \frac{1}{A_5^3} + \dots + \frac{1}{A_{n+1}^3}$ រួចទាញរកលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ។

9. ចូរបង្ហាញថា $\left[\frac{(p-1)!}{n!} + \frac{(n-1)!}{p!} \right] \times \frac{n! \cdot p!}{n(p!)^2 + p(n!)^2} = \frac{1}{np}$ ។

10. ចូរបង្ហាញថា $pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}$

11. ចូរបង្ហាញថា $C_n^p = C_{n-2}^p + 2C_{n-2}^{p-1} + C_{n-2}^{p-2}$

12. ចូរបង្ហាញថា $C_n^p = C_{n-3}^p + 3C_{n-3}^{p-1} + 3C_{n-3}^{p-2} + C_{n-3}^{p-3}$

13. គេមានស្វីត $u_0 = 1$ និង $u_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{C_n^k} \right)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $u_n = 2 + \frac{2}{n} + \sum_{k=2}^{n-2} \left(\frac{1}{C_n^k} \right)$?

14. ដោះស្រាយសមីការ $C_{n+1}^3 + C_{n+2}^3 = \frac{17}{6}n^2 - \frac{23}{6}n$ ។

15. បង្ហាញថា $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ ។ រួចគណនាផលបូក $S_n = \sum_{p=0}^n [(-1)^p \cdot C_n^p]$

16. គេឱ្យ $N = 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 1998!$ ។ ចូររកបីលេខចុងក្រោយនៃចំនួន N ។

17. គេឱ្យចំនួន $N = 2000! + 2001! + 2002! + \dots + 2006!$ ។

តើចំនួន N មានលេខសូន្យចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្មាន?

18. ចូរបង្ហាញថា $C_n^0 + \frac{1}{2}C_n^1 + \frac{1}{3}C_n^2 + \dots + \frac{1}{n+1}C_n^n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$

រួចទាញឱ្យបានថា $C_n^0 \cdot C_n^1 \cdot C_n^2 \cdot \dots \cdot C_n^n \leq (n+1)! \cdot \left[\frac{2^{n+1} - 1}{(n+1)^2} \right]^{n+1}$ ។

19. ក-ដោយប្រើទ្វេធាតុតូនចូរពន្លាត : $(1+x)^{10}$ ។

ខ-ទាញរកតំលៃនៃ $S = C_{10}^0 + C_{10}^1 + C_{10}^2 + \dots + C_{10}^{10}$ ។

20 . បង្ហាញថា : $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$ ។

21. បង្ហាញថា : $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + nC_n^n = n \cdot 2^{n-1}$ ។

22. ក-គណនា $I_n = \int_0^1 (1+x)^n \cdot dx$ ។

ខ-បង្ហាញថា : $C_n^0 + \frac{1}{2}C_n^1 + \frac{1}{3}C_n^2 + \dots + \frac{1}{n+1}C_n^n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$

23. ក-គណនា $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n \cdot dx$

ខ-គណនា $S_n = C_n^0 - \frac{1}{3}C_n^1 + \frac{1}{5}C_n^2 - \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{2n+1} \cdot C_n^n$ ។

24. គេហូតប្រែប្រួលសន្លឹកពីក្នុងហូដោយចៃដន្យ ។

តើមានរបៀបនៃការហូតខុសៗគ្នាប៉ុន្មានរបៀប ?

25. ក្នុងពាក្យ BANANA តើគេអាចសរសេរបានប៉ុន្មានរបៀបអាចបែងចែកបានខុសៗគ្នា

26. សិស្ស 10 នាក់ ចូលរួមប្រឈងប្រជែងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ។

តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលសិស្ស ជាប់ចំនាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣ ?

27. មនុស្សមួយក្រុមមានគ្នា 10 នាក់ តើគេអាចបង្កើតបានប៉ុន្មានគណៈកម្មការខុសៗគ្នា

28. កាក់មួយមានមុខ A និង B ត្រូវបានគេបោះបីដង ។

តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលមុខកាក់ចេញ ?

29. គេមានស្វីត (I_n) កំណត់ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ ដោយ
$$I_n = \frac{1}{n!} \cdot \int_0^1 (1-x)^n \cdot e^x \cdot dx$$

ក-ចូរគណនាតួ I_1 ។

ខ-ចូរបញ្ជាក់ I_{n+1} ជាអនុគមន៍នៃ I_n រួចទាញឱ្យបានថា
$$I_n = e - \sum_{p=0}^n \left(\frac{1}{p!} \right)$$

គ្រប់ $n \geq 1$ ។

គ-ចូររកលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ រួចទាញថា
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e = 2.71828$$
 ។

30. ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ គេឱ្យ
$$I_n = \frac{2}{2^{n+1} \cdot n!} \int_0^1 (1-t)^n \cdot e^{\frac{t}{2}} \cdot dt$$
 ។

ក-ដោយប្រើអាំងតេក្រាលតាមផ្នែកចូរគណនាតួ I_1 ។

ខ-ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$:
$$I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2^{n+1} \cdot (n+1)!}$$
 ។

គ-ទាញឱ្យបានថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n \geq 1$ គេមានសមភាព :

$$\sqrt{e} = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1!} + \frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{2!} + \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{n!} + I_n$$
 ។

ឃ-ចូរទាញបង្ហាញថា
$$\sqrt{e} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1!} + \frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{2!} + \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{n!} \right)$$
 ។

31. ក.ចូរគណនាអាំងតេក្រាល
$$I_n = \int_0^1 (x+2)^n \cdot dx$$

ខ.ទាញឱ្យបានថា
$$\frac{1}{n+1} C_n^0 + \frac{2}{n} C_n^1 + \frac{2^2}{n-1} C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = \frac{3^{n+1} - 2^{n+1}}{n+1}$$

32. ក.គណនាអាំងតេក្រាល
$$I_n = \int_0^1 (1-x)^n \cdot dx$$

ខ.ទាញឱ្យបានថា
$$C_n^0 - \frac{1}{2} C_n^1 + \frac{1}{3} C_n^2 - \frac{1}{4} C_n^3 + \dots + (-1)^n \frac{1}{n+1} C_n^n = \frac{1}{n+1}$$

32. ក.គណនាអាំងតេក្រាល
$$I_n = \int_0^1 (x+1)^n \cdot dx$$

ខ.ទាញឱ្យបានថា
$$\frac{1}{n+1} C_n^0 + \frac{1}{n} C_n^1 + \frac{1}{n-1} C_n^2 + \dots + C_n^n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

33. ក.គណនាអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^1 x(1+x^2)^n .dx$

ខ.ទាញឱ្យបានថា $\frac{1}{2}C_n^0 + \frac{1}{4}C_n^1 + \frac{1}{6}C_n^2 + + \frac{1}{2n+2}C_n^n = \frac{2^{n+1}-1}{2n+2}$

34. ក.គណនាអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n .dx$

ខ.ទាញឱ្យបានថា

$$C_n^0 - \frac{1}{3}C_n^1 + \frac{1}{5}C_n^2 - \frac{1}{7}C_n^3 + + (-1)^n \frac{1}{2n+1}C_n^n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \times 2n}$$

35. ក.គណនាអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^{2n} .dx$

ខ.ទាញរកផលបូក

$$S_n = C_{2n}^0 - \frac{1}{3}C_{2n}^1 + \frac{1}{5}C_{2n}^2 - \frac{1}{7}C_{2n}^3 + + (-1)^n \frac{1}{2n+1}C_{2n}^n + + \frac{1}{4n+1}C_{2n}^{2n}$$



ប្រូបាប៊ីលីតេ

ប្រូបាប៊ីលីតេ មានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដែលយើងប្រើប្រាស់វាសំរាប់ វាស់កំរិតនៃភាពមិនទៀងទាត់ ។ កាលណាយើងគ្រោងធ្វើអ្វីមួយកាលណាអ្នកឧតុនិយម ទស្សន៍ទាយអាកាសធាតុឬ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធ្វើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ចាំបាច់ ត្រូវប្រើ ប្រូបាប៊ីលីតេ ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត ឬធ្វើ ការជ្រើសរើស ។

១-ព្រឹត្តិការណ៍-លំហសំណាក :

ក.វិញ្ញាសា :

វិញ្ញាសា គឺជាការពិសោធន៍មួយដែល :

- អាចអោយគេដឹង នូវសំណុំលទ្ធផលដែលបានកើតឡើង
- ពុំអាចដឹងប្រាកដថា លទ្ធផលណាដែលនឹងកើតមានឡើង
- ការពិសោធន៍ អាចសារឡើងវិញ ជាច្រើនដង ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា ។

ខ.សកល ឬលំហសំណាក :

សំនុំនៃលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចមាន របស់វិញ្ញាសាមួយ ហៅថា សកល

ដែលគេតាងដោយ S or Ω or U ។

គ.ព្រឹត្តិការណ៍ : ជាសំណុំរង របស់សកល ឬលំហសំណាក ។

ឧទាហរណ៍ :

បើយើងបោះកាក់ដែលមានមុខ H និងខ្នង T ចំនួនមួយដងនោះគេអាចបានលទ្ធផល

H ឬ T ។

-សំនុំ $\{H, T\}$ ហៅថា លំហសំណាក តាងដោយ $S = \{H, T\}$ ។

-បើគេប្រាថ្នាបោះបានមុខ H នោះសំណុំ $\{H\}$ ហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ តាងដោយ $A = \{H\}$ ។

-ចំនួនធាតុនៃលំហសំណាក ហៅថាចំនួនករណីអាច គេតាងដោយ $n(S) = 2$ ។

-ចំនួនធាតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ ហៅថាចំនួនករណីស្រប គេតាងដោយ $n(A) = 1$ ។

២. រូបមន្តគោលនៃប្រូបាប :

នៅក្នុងពិសោធន៍មួយ ដែលមានលំហសំណាក S ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ A កើតឡើងកំណត់ដោយ :

$$P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)} \quad \text{។}$$

សំគាល់ : ដោយ $A \subseteq S$ នាំអោយ $0 \leq P(A) \leq 1$ ។

ឧទាហរណ៍ :

ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 10 គ្រាប់ ឃ្លីក្រហម 4 និង ឃ្លីខ្មៅ 6 ។

គេចាប់យកឃ្លី 3 គ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីអោយបាន ឃ្លីដែលមានពណ៌ក្រហមទាំងបី ?

ដំណោះស្រាយ :

រកប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីអោយបាន ឃ្លីដែលមានពណ៌ក្រហមទាំងបី :

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ ចាប់យកឃ្លី 3 បានពណ៌ក្រហមទាំង 3 គ្រាប់

តាមរូបមន្ត :
$$P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-ចំនួនករណីអាច :

ចាប់យកឃ្លី 3 ក្នុងចំណោមឃ្លី 10 វាជាបន្សំ 3 ក្នុង 10

គេបាន :
$$n(S) = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{7! \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7!} = 120$$

-ចំនួនករណីស្រប :

ចាប់ឃ្លី 3 បានពណ៌ក្រហមក្នុងចំណោមឃ្លីក្រហម 4 រំជាបន្សំ 3 ក្នុង 4

$$\text{គេបាន : } n(A) = C_4^3 = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{3}{120} = \frac{1}{40} = 0.025 = 2.5\% \quad \text{។}$$

៣. រូបមន្តគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ :

ក-រូបមន្ត ប្រូបាប៊ីលីតេនៃប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ពីរ

★ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនចុះសំរុងគ្នានោះគេបាន :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

★ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរសាមញ្ញនោះគេបាន :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ខ-រូបមន្ត ប្រូបាប៊ីលីតេនៃប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍បី :

★ បើ A , B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍បីមិនចុះសំរុងគ្នាពីរនោះគេបាន :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

★ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បីសាមញ្ញនោះគេបាន :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

គ-ជាទូទៅ :

★ បើ $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសំរុងគ្នាពីរនោះគេបាន :

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad \text{។}$$

ឃ-រូបមន្តប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្ទុយគ្នា :

បើ A និង $\bar{A}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្ទុយគ្នានោះគេបាន :

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \Leftrightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : ប្រូបាប៊ីលីតេដែលថ្ងៃស្អែកនឹងភ្លៀងនៅផ្សារបឹងឈូកមាន 0.525 ។

រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលថ្ងៃស្អែកមិនភ្លៀងនៅផ្សារបឹងឈូក ?

solution : $P(\bar{A}) = 1 - 0.525 = 0.475$ ។

ង-រូបមន្តប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខ័ណ្ឌ :

★ ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដោយដឹងថា មានព្រឹត្តិការណ៍ B បានកើតឡើងរួចហើយ ហៅថា ប្រូបាបមានលក្ខខ័ណ្ឌ ដែលគេតាងដោយ $P(A/B)$ អានថាប្រូបាបនៃ A ដោយបានដឹង B ។

ដូចនេះ ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ដោយ $P(B) \neq 0$ គេមានរូបមន្ត :

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ឬគេអាចទាញ

$$P(A \cap B) = P(A/B) \times P(B) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេហូតបៀវ 2 សន្លឹកពីក្នុងហ្វីដែលមានបៀវ 52 សន្លឹក ។

រកប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីអោយបៀវសន្លឹកទីមួយជាអាត់ និង សន្លឹកទីពីរជាក្រមុំ ?

solution : $P(A \cap B) = \frac{4}{52} \times \frac{4}{51} = 0.006$ ។

ច-រូបមន្តប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនទាក់ទងគ្នា :

★ ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ដែលអាស្រ័យនឹងគ្នាក្នុងវិធីដែលការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត យើងហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍មិនទាក់ទងគ្នា ។

* បើ A និង B មិនទាក់ទងគ្នាសមមូល :
$$\begin{cases} P(A/B) = P(A) \\ P(B/A) = P(B) \end{cases}$$

* បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ មិនទាក់ទងគ្នានោះគេបាន :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេហូតបៀវត្សមួយសន្លឹកពីរដង (ហូតរួចដាក់វិញ) ។

រកប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីអោយបៀវទាំងពីរស្តុតែជាសន្លឹកអាត់ ?

$$\text{solution : } P(A \cap B) = \frac{C_4^1}{C_{52}^1} \times \frac{C_4^1}{C_{52}^1} = 0.307 \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរសាមញ្ញ និងមិនទាក់ទងគ្នាដែល :

$$P(A \cup B) = 0.725 \quad \text{និង} \quad P(A \cap B) = 0.225 \quad \text{។ ចូរគណនា } P(A) \text{ និង } P(B) ?$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{គេបាន } P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) = 0.725 + 0.225 = 0.950$$

$$\text{ដោយ } A \text{ និង } B \text{ ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនទាក់ទងគ្នានោះ } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.225$$

$$\text{គេបានប្រព័ន្ធ} \quad \begin{cases} P(A) + P(B) = 0.950 \\ P(A) \cdot P(B) = 0.225 \end{cases}$$

$$P(A) \text{ និង } P(B) \text{ ជាឫសសមីការ } X^2 - 0.95X + 0.225 = 0 \text{ មានឫស} \quad \begin{cases} X_1 = 0.45 \\ X_2 = 0.50 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = 0.45, P(B) = 0.50 \text{ ឬ } P(A) = 0.50, P(B) = 0.45 \quad \text{។}$$

* ជាទូទៅបើ $A_1, A_2, \dots, A_n$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ មិនទាក់ទងគ្នាគេបាន :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n) \quad \text{។}$$

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យ A, B, C ជាព្រឹត្តិការណ៍បីសាមញ្ញ និងមិនទាក់ទងគ្នាពីរៗដែល :

$$P(A) = 0.40, P(B) = 0.30, P(C) = 0.25 \quad \text{។}$$

$$\text{ចូររក } P(A \cup B \cup C) ?$$

តាមរូបមន្តគេបាន :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

ដោយ A, B, C ជាព្រឹត្តិការណ៍បីមិនទាក់ទងគ្នាពីរៗ នោះគេបាន :

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= 0.4 + 0.3 + 0.25 - 0.4 \times 0.3 - 0.4 \times 0.25 - 0.3 \times 0.25 + 0.3 \times 0.4 \times 0.25 \\ &= 0.95 - 0.12 - 0.1 - 0.075 + 0.03 = 0.685 \quad \text{។} \end{aligned}$$

លំហាត់មាតិកាបំណែងស្រាយ

លំហាត់ទី១

នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 18 នាក់ និងសិស្សស្រី 22 នាក់ ។

គេហៅឈ្មោះសិស្ស 4 នាក់ដោយចៃដន្យ ។

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សស្រីទាំង 4 នាក់ ។

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សស្រីតែម្នាក់គត់ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សស្រីទាំង 4 នាក់

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ហៅសិស្ស 4 នាក់បានសិស្សស្រីទាំងបួននាក់

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-ចំនួនករណីអាច :

ហៅសិស្ស 4 នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស 40 នាក់ ជាបន្ត 4 ក្នុងចំណោម 40

$$\text{នាំអោយ } n(S) = C_{40}^4 = \frac{40!}{4!(40-4)!} = \frac{36!.37.38.39.40}{24.36!} = 91390$$

-ចំនួនករណីស្រប :

ហៅបានសិស្សស្រីទាំង 4 នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សស្រីទាំងអស់ 22 នាក់ ជាបន្ត 4 ក្នុង 22

$$\text{នាំអោយ } n(A) = C_{22}^4 = \frac{22!}{4!(22-4)!} = \frac{18!.19.20.21.22}{24.18!} = 7315$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{7315}{91390} = 0,08004 \text{ ។}$$

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សស្រីតែម្នាក់គត់

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ហៅសិស្ស 4 នាក់បានសិស្សស្រីតែម្នាក់គត់

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$\text{-ចំនួនករណីអាច : } n(S) = C_{40}^4 = 91390$$

-ចំនួនករណីស្រប :

ហៅបានសិស្សស្រីតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមសិស្សស្រី 22នាក់ គឺជាបន្សំ 1 ក្នុង 22 គឺ

$$n_1 = C_{22}^1 = 22$$

នៅសល់ 3នាក់ទៀតជាសិស្សប្រុស ជាបន្សំ 3 ក្នុងចំណោម 18 គឺ

$$n_2 = C_{18}^3 = \frac{18!}{3!.15!} = \frac{16.17.18}{6} = 816$$

$$\text{នាំអោយចំនួនករណីស្របគឺ } n(A) = n_1 \times n_2 = 22 \times 816 = 17952$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{17952}{91390} = 0,1964 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី២

គេហូតបៀវ 3 សន្លឹកដោយចៃដន្យពីក្នុងហ្វីដែលមានបៀវ 52 សន្លឹក ។

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានអាត់ទាំងបីសន្លឹក ។

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានអាត់ពីរសន្លឹក នឹងក្រមុំមួយសន្លឹក ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានអាត់

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ហូតបៀវ 3សន្លឹកបានអាត់ទាំង 3 សន្លឹក

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-ចំនួនករណីអាច :

ហូតបៀវ 3 សន្លឹកក្នុងចំណោមបៀវ 52 សន្លឹក ជាបន្សំ 3 ក្នុងចំណោម 52

$$\text{នាំអោយ } n(S) = C_{52}^3 = \frac{52!}{3!.(52-3)!} = \frac{49!.50.51.52}{6.49!} = 22100$$

-ចំនួនករណីស្រប :

ហូតបៀ 3សន្លឹកបានអត់ 3 ក្នុងចំណោមអត់ 4សន្លឹក គឺជាបន្សំ 3 ក្នុង 4 គឺ $n(A) = C_4^3 = 4$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{4}{22100} = 0,000180995$$

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានអត់ពីរសន្លឹក នឹងក្រមុំមួយសន្លឹក

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ហូតបៀសន្លឹកបានអត់ពីរសន្លឹក នឹងក្រមុំមួយសន្លឹក

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-ចំនួនករណីអាច $n(S) = 22100$

-ចំនួនករណីស្រប :

$$\text{បានអត់ 2 សន្លឹកក្នុងចំណោមអត់ 4 សន្លឹក គឺ } n_1 = C_4^2 = \frac{4!}{2!.2!} = 6$$

$$\text{បានក្រមុំ 1 សន្លឹកក្នុងចំណោមក្រមុំ 4សន្លឹក គឺ } n_2 = C_4^1 = 4$$

$$\text{នាំអោយចំនួនករណីស្រប } n(A) = 6.4 = 24$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{24}{22100} = 0,001085972 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣

ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 8 គ្រាប់ និង ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 12 គ្រាប់ ។

គេចាប់យកឃ្លីពីក្នុងថង់ 4 គ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីពណ៌ក្រហម 2 គ្រាប់ ។

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីពណ៌ខ្មៅសុទ្ធ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីពណ៌ក្រហម 2 គ្រាប់

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់យកឃ្លី 4 គ្រាប់ បានឃ្លីពណ៌ក្រហម 2 គ្រាប់

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-ចំនួនករណីអាច :

ចាប់យកឃ្លី 4 គ្រាប់ក្នុងចំណោមឃ្លី 20 គ្រាប់ ជាបន្ត 4 ក្នុង 20 ។

$$\text{គេបាន } n(S) = C_{20}^4 = \frac{20!}{4!.16!} = 4845$$

-ចំនួនករណីស្រប :

ចាប់ឃ្លី 4 គ្រាប់ បានឃ្លីមានពណ៌ក្រហម 2 គ្រាប់ក្នុងចំណោមឃ្លីពណ៌ក្រហម 8 គឺ

$$C_8^2 = \frac{8!}{2!.6!} = 28$$

$$\text{នៅសល់ឃ្លី 2 គ្រាប់ ជាឃ្លីពណ៌ខ្មៅក្នុងចំណោមឃ្លីខ្មៅ 12 គឺ } C_{12}^2 = \frac{12!}{2!.10!} = 66$$

$$\text{នាំអោយចំនួនករណីស្រប } n(A) = 28.66 = 1848$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{1848}{4845} = 0,381424 \text{ ។}$$

ខ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីពណ៌ខ្មៅសុទ្ធ :

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់យកឃ្លី 4 គ្រាប់ បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅសុទ្ធ

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$\text{-ចំនួនករណីអាច } n(S) = C_{20}^4 = 4845$$

-ចំនួនករណីស្រប

ចាប់យកឃ្លី 4 គ្រាប់ បានឃ្លីខ្មៅសុទ្ធក្នុងចំណោមឃ្លីខ្មៅ 12 គ្រាប់គឺ

$$n(A) = C_{12}^4 = \frac{12!}{4!.8!} = 495$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{495}{4845} = 0,10216 \text{ ។}$$



លំហាត់ប្រូបាប៊ីលីតេ

1. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 25 នាក់ សិស្សប្រុសមាន 14 នាក់ និងសិស្សស្រីមាន 11 នាក់ ។ គេហៅឈ្មោះសិស្សពីរនាក់ដោយចៃដន្យ ។
 - ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សជាសិស្សស្រីទាំងពីរនាក់ ។
 - ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេហៅបានសិស្សស្រីម្នាក់ និង សិស្សប្រុសម្នាក់ ។
2. គេហូតយកប្រៀ 2 សន្លឹក ពីក្នុងហ្វីដែលមានប្រៀ 52 សន្លឹកដោយចៃដន្យ ។

គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានប្រៀជាសន្លឹកអាត់ទាំងពីរ ។
3. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខៀវ 3 គ្រាប់ ឃ្លីពណ៌ក្រហម 5 គ្រាប់ និង ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 គ្រាប់ ។

គេលូកចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។

 - ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីមានពណ៌ខៀវសុទ្ធ ។
 - ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីមានពណ៌ក្រហមសុទ្ធ ។
 - គ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីមានពណ៌ខ្មៅសុទ្ធ ។
4. ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 10 គ្រាប់ គឺប៊ូលពណ៌ខៀវ 6 គ្រាប់ និងប៊ូលពណ៌ក្រហម 4 គ្រាប់ ។

គេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។

 - ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានប៊ូលមានពណ៌ខៀវ 2 គ្រាប់ ។
 - ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានប៊ូលមានពណ៌ខៀវយ៉ាងតិច 2 គ្រាប់ ។
 - គ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានប៊ូលមានពណ៌ខៀវយ៉ាងច្រើន 2 គ្រាប់ ។
5. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា 14 នាក់ សិស្សពូកែរូបវិទ្យា 8 នាក់ និងសិស្សពូកែខ្មែរ 18 នាក់ ។ គេហៅសិស្ស 4 នាក់ដោយចៃដន្យ ។
 - ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា 2 នាក់ ។
 - ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា 2 នាក់យ៉ាងតិច ។

- គ-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានសិស្សពូកែរូបវិទ្យា 3 នាក់ និងសិស្សពូកែខ្មែរ 1 នាក់ ។
6. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស 6 គ្រាប់ និង ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 8 គ្រាប់ ។
 គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។
 គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានឃ្លីមានពណ៌ខុសគ្នា ។
7. គេហូតយកបៀ 3 សន្លឹក ពីក្នុងហ្វីដែលមានបៀ 52 សន្លឹកដោយចៃដន្យ ។
 ក-គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានបៀជាសន្លឹកអាត់ 2 សន្លឹក ។
 ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានបៀជាសន្លឹកអាត់ 1 សន្លឹក និងសន្លឹកក្រមុំ 2 សន្លឹក ។
8. គេហូតយកបៀ 5 សន្លឹក ពីក្នុងហ្វីដែលមានបៀ 52 សន្លឹកដោយចៃដន្យ ។
 ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានបៀជាសន្លឹកអាត់ 2 សន្លឹក ឬ 3 សន្លឹក ។
 ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេបានបៀជាសន្លឹកអាត់ 2 សន្លឹក យ៉ាងច្រើន ។
9. ក្នុងទូមួយមានអារ 8 គឺអារពណ៌ស 4 អារពណ៌ខៀវ 3 អារពណ៌ក្រហម 1 ។
 គេយកអារមួយចេញពីក្នុងទូមកពាក់ដោយចៃដន្យ ។
 គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យគេយកបានអារពណ៌ ខៀវ ឬ ពណ៌ ស ។
10. កាក់មួយត្រូវបានគេបោះបីដងដោយចៃដន្យ ។
 ក- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យកាក់ចេញមុខផ្ទា 2 ដង ។
 ខ- គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដើម្បីឱ្យកាក់មិនចេញមុខផ្ទា ។
11. គេឱ្យ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរសាមញ្ញ និងមិនទាក់ទងគ្នាដែល :
 $P(A)=0.65$ និង $P(B)=0.25$ ។ ចូរគណនា $P(A \cup B)$?
12. គេឱ្យ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរសាមញ្ញ និងមិនទាក់ទងគ្នាដែល :
 $P(A \cup B)=0.68$ និង $P(A \cap B)=0.12$ ។ ចូរគណនា $P(A)$ និង $P(B)$?

ម៉ាទ្រីស

(MATRICES)

1. វ៉ិចទ័រ :

និយមន័យ : សំណុំមួយមាន n ចំនួនពិតរៀបតាមលំដាប់មួយកំណត់ $a_1, a_2, \dots, a_n$

ហៅថាវ៉ិចទ័រ n ឌីម៉ង់ស្យុងដែលគេកំណត់សរសេរ :

$$A = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \text{ ឬ } A^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ ដែល } a_i \text{ ហៅថាកុំប៉ូហ្សង់ទី } i \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យ $A = (25, 35, 45, 75, 125, 225)$ ជាវ៉ិចទ័រមាន 6 ឌីម៉ង់ស្យុង ។

2. និយមន័យម៉ាទ្រីស

តារាងមួយដែលមាន m វ៉ិចទ័រ និង n ឌីម៉ង់ស្យុងកំណត់សរសេរក្នុងរង្វង់ក្រចកជារាង :

$$A = (a_{ij})_{mn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ ហៅថាម៉ាទ្រីសលំដាប់ } m.n \text{ ។}$$

m : ហៅថាចំនួនលីញ , n : ហៅថាចំនួនកូឡោន និង a_{ij} ជាធាតុនៅលើលីញទី i កូឡោនទី j ។

$$\text{ឧទាហរណ៍ គេឱ្យ } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & 4 \\ 7 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 9 \\ 3 & 8 & 7 \end{pmatrix} \text{ ជាម៉ាទ្រីសលំដាប់ } 5 \times 3 \text{ ។}$$

3. ប្រភេទម៉ាទ្រីស

a / Zero matrix :

ម៉ាទ្រីសទាំងអស់ដែលមានធាតុទាំងអស់ស្មើសូន្យ ហៅថាម៉ាទ្រីសសូន្យ តាងដោយ O_{mn} ។

ឧទាហរណ៍ $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសសូន្យលំដាប់ 5×4 ។

b / Square matrix :

ម៉ាទ្រីសមួយដែលមានចំនួនជួរស្មើនឹងចំនួនក្បួនហៅថា ម៉ាទ្រីសការេ ដែលគេកំណត់សរសេរ :

$$A = (a_{ij})_{nn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

ឧទាហរណ៍ $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 4 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសការេ ។

c / Triangular matrix :

ម៉ាទ្រីសការេមួយដែលមានធាតុ $a_{ij} = 0, \forall i > j$ or $i < j$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសត្រីកោណ

ដែលគេកំណត់សរសេរ : $A = (a_{ij})_{nn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

ឧទាហរណ៍ $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 & 9 \\ 0 & 7 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសត្រីកោណ ។

d / Diagonal matrix :

ម៉ាទ្រីសការេមួយដែលមានធាតុ $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូង

ដែលគេកំនត់សរសេរ : $A = (a_{ij})_{nn} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូង ។

e / Identity matrix :

ម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងដែលមានធាតុ $a_{ii} = 1$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសឯកតា ដែលគេកំនត់សរសេរ :

$I_n = (a_{ij})_{nn} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសឯកតា ។

f / Transpose of matrix :

ម៉ាទ្រីសត្រង់ស្បូវនៃម៉ាទ្រីស $A = (a_{ij})_{mn}$ គឺជាម៉ាទ្រីសដែលតាងដោយ $A^T = (a_{ji})_{nm}$ ។

ឧទាហរណ៍ បើ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ នាំឱ្យ $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ ។

g / Equality of matrix :

ម៉ាទ្រីស $A = (a_{ij})_{mn}$ និង $B = (b_{ij})_{mn}$ ជាម៉ាទ្រីសពីរស្មើគ្នាកាលណា $a_{ij} = b_{ij}$ ។

គេឱ្យម៉ាទ្រីសពីរ $A = \begin{pmatrix} 3a+1 & 4b+5 & 2c+3 \\ 2x-3 & y+2 & 3z-2 \end{pmatrix}$ និង $B = \begin{pmatrix} 7 & 9 & 9 \\ 5 & 8 & 10 \end{pmatrix}$

កំនត់ចំនួនពិត a, b, c, x, y និង z ដើម្បីឱ្យ $A = B$

គេបាន $A = B$ កាលណា $\left\{ \begin{array}{l} 3a+1=7 \\ 4b+5=9 \\ 2c+3=9 \\ 2x-3=5 \\ y+2=8 \\ 3z-2=10 \end{array} \right.$ នាំឱ្យ $a=2, b=1, c=3, x=4, y=6, z=4$

4. ប្រមាណវិធីនៃម៉ាទ្រីស**a / Addition of matrices :**

-ម៉ាទ្រីសពីរអាចបូក ឬ ដកគ្នាបាន កាលណាវាជាម៉ាទ្រីសមានលំដាប់ដូចគ្នា ។

-សន្មតថាមានម៉ាទ្រីសពីរ $A = (a_{ij})_{mn}$ និង $B = (b_{ij})_{mn}$

គេបានរូបមន្តផលបូក $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{mn}$ និងផលដក $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{mn}$

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 17 & 11 & 95 \\ 34 & 25 & 57 \\ 68 & 71 & 75 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 23 & 10 & 83 \\ 21 & 14 & 35 \\ 15 & 50 & 46 \end{pmatrix}$

គេបាន $A + B = \begin{pmatrix} 17+23 & 11+10 & 95+83 \\ 34+21 & 25+14 & 57+35 \\ 68+15 & 71+50 & 75+46 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 21 & 188 \\ 55 & 36 & 92 \\ 83 & 121 & 121 \end{pmatrix}$

និង $A - B = \begin{pmatrix} 17-23 & 11-10 & 95-83 \\ 34-21 & 25-14 & 57-35 \\ 68-15 & 71-50 & 75-46 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 12 \\ 13 & 11 & 22 \\ 53 & 21 & 29 \end{pmatrix}$

b / Scalair multiplication;

ផលគុណ ម៉ាទ្រីស $A = (a_{ij})_{mn}$ នឹងចំនួនថេរ λ គឺជាម៉ាទ្រីសកំនត់ដោយ $\lambda.A = (\lambda.a_{ij})$

ឧទាហរណ៍ : បើ $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 7 \\ 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ គេបាន $7A = \begin{pmatrix} 35 & 21 & 28 \\ 28 & 63 & 49 \\ 49 & 28 & 42 \end{pmatrix}$ ។

c / Multiplication of matrices:

ម៉ាទ្រីសពីរអាចគុណគ្នាបានលុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទីមួយមានចំនួនកូឡោនស្មើនឹងចំនួនលីញនៃ

ម៉ាទ្រីសទីពីរ ។ ឧបមាថាគេមានម៉ាទ្រីសពីរ : $A = (a_{ij})_{mn}$ និង $B = (b_{ij})_{np}$

ផលគុណម៉ាទ្រីស A និង B គឺជាម៉ាទ្រីស C កំនត់ដោយ $C = A.B = (c_{ij})_{mp}$

ដែល $c_{ij} = \sum_{k=1}^n (a_{ik} \cdot b_{kj}) = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{in}b_{nj}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

គេបាន $C = A.B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.1 + 2.2 + 9.3 & 4.3 + 2.4 + 9.5 \\ 1.1 + 5.2 + 4.3 & 1.3 + 5.4 + 4.5 \\ 2.1 + 7.2 + 3.3 & 2.3 + 7.4 + 3.5 \end{pmatrix}$

ដូចនេះ $C = \begin{pmatrix} 35 & 65 \\ 23 & 43 \\ 25 & 49 \end{pmatrix}$ ។

d / Powers of matrices:

បើ $A = (a_{ij})_{nn}$ ជាម៉ាទ្រីសការេនោះគេកំនត់ស្វ័យគុណនៃម៉ាទ្រីសដោយ :

1. $A^2 = A.A$, $A^3 = A^2.A$, $A^4 = A^3.A$, ..., $A^p = A^{p-1}.A$, $p \in \mathbb{N}^*$, $p \geq 2$

2. $A^n . A^p = A^{n+p}$

3. $(A^n)^p = A^{np}$

4. $A^0 = I_n$ ដែល I_n ជាម៉ាទ្រីសឯកតា ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ចូរគណនា A^2 និង A^3

គេបាន $A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 \\ 4 \cdot 2 + 5 \cdot 4 & 4 \cdot 3 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 21 \\ 28 & 37 \end{pmatrix}$

និង $A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 16 & 21 \\ 28 & 37 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \cdot 2 + 21 \cdot 4 & 16 \cdot 3 + 21 \cdot 5 \\ 28 \cdot 2 + 37 \cdot 4 & 28 \cdot 3 + 37 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 116 & 153 \\ 204 & 269 \end{pmatrix}$

ដូចនេះ $A^2 = \begin{pmatrix} 16 & 21 \\ 28 & 37 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 116 & 153 \\ 204 & 269 \end{pmatrix}$ ។

e / Properties of matrix operations

បើ A, B, C ម៉ាទ្រីស និង α, β, μ ជាបីចំនួនពិតឬស្កាលែនោះគេមាន :

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $\alpha(A + B + C) = \alpha A + \alpha B + \alpha C$
4. $(\alpha + \beta + \mu)A = \alpha A + \beta A + \mu A$
5. $O + A = A + O = A$
6. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
7. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
8. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
9. $A \cdot B \neq B \cdot A$
10. $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$

5. ដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីសការេ

a / Determinant of order 2×2

គេឱ្យម៉ាទ្រីសលំដាប់ 2×2 កំនត់ដោយ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ។

ដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A កំនត់ដោយ : $|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$ ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$?

គេបាន $|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 7 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 56 - 15 = 41$

ដូចនេះ $|A| = \det(A) = 41$ ។

b / Minors and Cofactors :

គេឱ្យម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_{nn}$ ។

☞ Minor នៃធាតុ a_{ij} ជាដេទែមីណង់នៃម៉ាទ្រីសដែលបន្លាប់ពីលុបជួរទី i និងកូឡោនទី j ចេញ ដែលគេកំណត់តាង Minor នៃធាតុ a_{ij} ដោយ M_{ij} ។

☞ Cofactor នៃធាតុ a_{ij} កំណត់តាងដោយ $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ ។

ឧទាហរណ៍: គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 7 \\ 9 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ ចូរគណនាដេទែមីណង់នៃធាតុ a_{21} ?

គេបាន $M_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 24 = -16$ និង $C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 16 = 16$ ។

c / Determinant of order 3×3

គេឱ្យម៉ាទ្រីសលំដាប់ 3×3 កំណត់ដោយ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

ដេទែមីណង់នៃម៉ាទ្រីស A កំណត់ដោយ:

$$|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \quad \text{។}$$

d / Determinant of order $n \times n$

គេឱ្យម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_{nn}$ ។ ដេទែមីណង់នៃម៉ាទ្រីសនេះកំណត់តាងដោយ :

$$|A| = \det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} + \dots + a_{1n}C_{1n} = \sum_{k=1}^n (a_{1k} \cdot C_{1k})$$

$$|A| = \det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + a_{i3}C_{i3} + \dots + a_{in}C_{in} = \sum_{k=1}^n (a_{ik} \cdot C_{ik})$$

6. សមីការនៃម៉ាទ្រីស**a / Matix Cofactors :**

ម៉ាទ្រីសកូហ្វាក់ទ័រនៃម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_{nn}$ គឺជាម៉ាទ្រីសកំណត់ដោយ $C = (C_{ij})_{nn}$

ដែល $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ ។

b / Adjoint Matix :

ម៉ាទ្រីស Adjoint នៃម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_n$ គឺជាម៉ាទ្រីសត្រង់ស្បូវនៃម៉ាទ្រីសកូហ្វាក់ទ័រ
នៃម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_n$ ដែលគេកំនត់សរសេរ $\text{Adj}(A) = (C)^T$ ។

c / ម៉ាទ្រីសទោល :

ដែលហៅថាម៉ាទ្រីសទោលគឺជាម៉ាទ្រីសការេដែលមានដេទែមីណង់ស្មើសូន្យ ។

ឧទាហរណ៍ : ចូរបង្ហាញថា $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសទោល ។

d / Invers of Matix :

បើ A មិនមែនជាម៉ាទ្រីសទោលនោះ ចំរាស់នៃម៉ាទ្រីសការេ $A = (a_{ij})_n$ ជាម៉ាទ្រីសដែល

តាងដោយ A^{-1} និងផ្ទៀងផ្ទាត់ $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$ ។

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}$ ។

ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាម៉ាទ្រីសច្រាស់ (Matrix inverses) នៃម៉ាទ្រីស A កំនត់ដោយ :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} .$$

e / រូបមន្តកំនត់រកម៉ាទ្រីសច្រាស់ :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \times \text{Adj}(A)$$

f / រូបមន្តរកម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2×2 :

បើគេមាន $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ : ចូររកម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$?

លំហាត់មានដំណោះស្រាយ

លំហាត់ទី១

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$

ក-ចូរបញ្ជាក់ប្រភេទ និង លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស A ។

ខ-ចូរកំណត់តម្លៃនៃធាតុ a_{25} , a_{34} , a_{52} , a_{43} ។

គ-ចូរសរសេរធាតុទាំងអស់ដែលនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស ។

ដំណោះស្រាយ

ក-ម៉ាទ្រីស A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 5×5 ។

ខ-កំណត់តម្លៃនៃធាតុ :

គេបាន $a_{25} = 2$, $a_{34} = 1$, $a_{52} = 1$, $a_{43} = 4$ ។

គ-ធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេសមាន :

$a_{11} = 2$, $a_{22} = 3$, $a_{33} = 3$, $a_{44} = 3$, $a_{55} = 4$ ។

លំហាត់ទី២

ចូរកំណត់តម្លៃ x, y, z, t ដើម្បីឱ្យ $\begin{pmatrix} e^x & \ln y \\ 2^z & \log_3 t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$

គេបាន $\begin{cases} e^x = 2 \\ \ln y = 3 \\ 2^z = 8 \\ \log_3 t = 2 \end{cases} \Rightarrow x = \ln 2, y = e^3, z = 3, t = 9$ ។

លំហាត់ទី៣

កំណត់កម៉ាទ្រីស X and Y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ :

$$X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \text{ and } 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{គេមាន } X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow 2X + 2Y = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 14 & 18 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\text{និង } 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \quad (2) \quad \text{។ បូកសមីការ (1) និង (2) គេបាន :}$$

$$5X = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 14 & 18 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 20 & 25 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{ហើយ } Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} - X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ដូចនេះ } X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ and } Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៤

$$\text{ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមម៉ាទ្រីស } \begin{cases} 2x + 3y = 107 \\ 3x + 4y = 148 \end{cases}$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{តាង } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 107 \\ 148 \end{pmatrix}$$

$$\text{ប្រព័ន្ធសមីការអាចសរសេរ } A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\text{គេបាន } A^{-1} = \frac{1}{2 \cdot 4 - 3 \cdot 3} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{គេបាន } X = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 107 \\ 148 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4(107) + 3(148) \\ 3(107) - 2(148) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 25 \end{pmatrix} \quad \text{នាំឱ្យ } x = 16, y = 25 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៥

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមម៉ាទ្រីស
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = -3 \\ 2x_1 - 3x_2 - 5x_3 = -7 \\ -x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 9 \end{cases}$$

ចំណោះស្រាយ

តាង $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ 9 \end{pmatrix}$

គេបាន $A.X = B \Rightarrow X = A^{-1}.B$

បន្ទាប់ពីគណនាគេបាន $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

គេទាញ $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

ដូចនេះ $x_1 = 2$, $x_2 = -3$, $x_3 = 4$ ។



លំហាត់អនុវត្តន៍

1. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 7 \\ 4 & 1 & 2 & 8 \\ 2 & 4 & 5 & 1 \\ 5 & 7 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 9 \\ 5 & 1 & 8 & 4 \\ 1 & 2 & 7 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

ក-ចូរគណនា $M = A + B$ and $N = A - B$ ។

ខ-ចូរគណនា $P = 2A + 3B$ and $Q = 3A - 2B$ ។

2. គេឱ្យម៉ាទ្រីសពីរ $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

ចូរគណនាផលគុណម៉ាទ្រីស $A.B$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

ចូរគណនា $A.B$ និង $B.A$ ។

4. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ ។

ចូរគណនា A^2 , A^3 and A^4 ។

5. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 14 & -9 & -12 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 6 & 8 \end{pmatrix}$

ចូរគណនាផលគុណ $A.B$ ។

6. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

ចូរគណនាផលគុណ $A.B$ ។ តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានដូចម្តេច?

7. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

ក- កំណត់រកម៉ាទ្រីសត្រង់ស្ទើរ A^T នៃម៉ាទ្រីស A ។

ខ- គណនាផលគុណ $A.A^T$ និង $A^T.A$ ។

8. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

ក- កំណត់ម៉ាទ្រីសកូហ្វាក់ស៊ីវ នៃម៉ាទ្រីស A ។

ខ- ទាញរកម៉ាទ្រីស $\text{Adj} (A)$ ។

9. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$

រកម៉ាទ្រីសច្រាស់របស់វា ។

10. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

ក- កំណត់ $\text{Adj} (A)$ ។

ខ- កំណត់ A^{-1} ។

11. កំណត់រកម៉ាទ្រីសច្រាស់នៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ ។

12. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ and $C = \begin{pmatrix} 14 & 13 \\ 24 & 23 \end{pmatrix}$

កំណត់ចំនួនពិត a, b, c, d ដើម្បីឱ្យ $A.B = C$ ។

13. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

ចូរបង្ហាញថា A ជាម៉ាទ្រីសទោល រួចគណនា A^2 និង $(A^T)^2$ ។

14. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

ក-ចូរគណនា A^2 , B^2 , $A.B$ រួចទាញរក $A^2 + 2A.B + B^2$ ។

ខ-គណនា $A + B$ and $(A + B)^2$

គ-ប្រៀបធៀប $(A + B)^2$ និង $A^2 + 2A.B + B^2$

15. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ចូរប្រៀបធៀប $A^2.A^3$, $A^3.A^2$, $A^4.A$ and $A.A^4$ ។

16. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

ក-ចូរគណនា A^2 , A^3 , A^4 ។

ខ-ទាញរក A^n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ។

17. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R} - \{0, -1, +1\}$

ក-ចូរគណនា A^2 , A^3 , A^4 ។

ខ-ទាញរក A^n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ។

គ-គណនាផលបូក $S = A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$ ។

18. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ក-គណនា $A^2, (A^T)^2, A^2 + 2A.A^T + (A^T)^2$

ខ-ប្រៀបធៀប $(A + A^T)^2$ and $A^2 + 2A.A^T + (A^T)^2$

19-គេឱ្យ A and B ជាម៉ាទ្រីសការេមានលំដាប់ដូចគ្នា ។

បើ $A.B = B.A$ ចូរបង្ហាញថា $(A.B)^n = A^n.B^n$ ។

20. ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះ សហគ្រាសមួយកន្លែងបានលក់បញ្ចុះថ្លៃ 20%

នូវសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនមាន : អាវដៃខ្លី-អាវដៃវែង និង ខោជើងវែង ក្នុងសាខាបួន ។

តម្លៃទំនិញទាំងបីប្រភេទខាងលើក្នុងសាខាទាំងបួនមុនពេលលក់បញ្ចុះថ្លៃតាងដោយម៉ាទ្រីស:

$$M = \begin{pmatrix} 7500 & 9000 & 30000 \\ 6000 & 12000 & 25000 \\ 8000 & 20000 & 27000 \\ 6500 & 85000 & 15000 \end{pmatrix}$$

ចូររកម៉ាទ្រីសតាងតម្លៃទំនិញក្នុងសាខាទាំងបួនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ ។

21. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}$

ក-បង្ហាញថា $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

ខ-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមម៉ាទ្រីស $\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ -2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7 \\ x_1 - 3x_2 - 5x_3 = -9 \end{cases}$

22. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមម៉ាទ្រីស $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 11 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 13 \end{cases}$

លំហាត់សារឡើងវិញ

លំហាត់ទី១

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុប $TR(x) = -2x^3 + 3x^2 + 14700x$

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលគេត្រូវលក់ ។

តើគេត្រូវលក់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យបានចំណូលសរុបអតិបរមា ?

ចូរកំណត់ប្រាក់ចំណូលអតិបរមានោះ ?

ដំណោះស្រាយ

-គណនាដេរីវេទីមួយ $TR'(x) = -6x^2 + 6x + 14700$

-ដោះស្រាយសមីការ $TR'(x) = 0$ នាំឱ្យ $-6x^2 + 6x + 14700 = 0$

$$\text{ឬ } -x^2 + x + 2450 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(-1)(2450) = 99^2$$

$$\text{គេទាញយក } x_1 = \frac{-1-99}{-2} = 50, \quad x_2 = \frac{-1+99}{-2} = -49 < 0 \quad (\text{មិនយក})$$

-គណនាដេរីវេទីពីរ $TR''(x) = -12x + 6$

ដោយ $TR''(50) = -12(50) + 6 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់

$x = 50$ មានន័យថាដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណូលសរុបអតិបរមាគេត្រូវលក់ផលិតផលចំនួន 50 units

ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបអតិបរមានោះគឺ $TR(50) = 492,500$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

លំហាត់ទី២

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ប្រាក់ចំណូលសរុប $TR(x) = 1800x + 80x^2$ និងអនុគមន៍

ប្រាក់ចំណាយសរុប $TC(x) = 1000 + 5x^2 + x^3$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផល ។

ចូរកំណត់បរិមាណផលិតផលដែលត្រូវលក់ដើម្បីឱ្យបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា ?

ចូរកំណត់រកប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះ ?

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\text{Total Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Cost}$

គេបាន $TP(x) = 1800x + 80x^2 - 1000 - 5x^2 - x^3 = -x^3 + 75x^2 + 1800x - 1000$

-គណនាដេរីវេទីមួយ $TP'(x) = -3x^2 + 150x + 1800$

-ដោះស្រាយសមីការ $TP'(x) = 0$ នាំឱ្យ $-3x^2 + 150x + 1800 = 0$

ឬ $-x^2 + 50x + 600 = 0$

គណនា $\Delta' = (25)^2 - (-1)(600) = 35^2$

គេទាញយក $x_1 = \frac{-25 - 35}{-1} = 60$, $x_2 = \frac{-25 + 35}{-1} = -10 < 0$ (មិនយក)

-គណនាដេរីវេទីពីរ $TP''(x) = -6x + 150$ ។

ដោយ $TP''(60) = -6(60) + 150 < -210$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = 60$ ។

ដូចនេះដើម្បីឱ្យប្រាក់ចំណេញអតិបរមាលុះត្រាតែគេលក់ផលិតផលចំនួន 60 units ។

ប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះគឺ $TP(60) = 161,000$ (ឯកតារូបិយវត្ថុ) ។

លំហាត់ទី៣

គេមានអនុគមន៍ Marginal Profit កំនត់ដោយ $MP(x) = -3x^2 + 150x + 1800$ ។

ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលបានលក់ ។ គេដឹងថាបើគេលក់ទំនិញ 60 ឯកតានោះ

គេនឹងបានប្រាក់ចំណេញ 161 000 ឯកតារូបិយវត្ថុ ។ ចូរកំនត់រកអនុគមន៍ Total Profit ?

ដំណោះស្រាយ

កំនត់រកអនុគមន៍ Total Profit ?

គេបាន $TP(x) = \int MP \cdot dx = \int (-3x^2 + 150x + 1800) \cdot dx = -x^3 + 75x^2 + 1800x + k$

ដោយ $TP(60) = 161000$ នាំឱ្យ $k = -1000$ ។

ដូចនេះ $TP(x) = -x^3 + 75x^2 + 1800x - 1000$

លំហាត់ទី៤ គេមានអនុគមន៍ Marginal Revenue មួយកំនត់ដោយ :

$MR(x) = -6x^2 + 6x + 14700$ ដែល x ជាបរិមាណផលិតផលដែលបានលក់ ។

ចូរកំនត់រកអនុគមន៍ Total Revenue បើគេដឹងថា កាលណាគេលក់ផលិតផល 50 ឯកតា

គេទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុប 492 500 រៀល ។

ដំណោះស្រាយ

រកអនុគមន៍ Total Revenue

គេបាន $TR(x) = \int MR(x) \cdot dx = \int (-6x^2 + 6x + 14700) \cdot dx$
 $= -2x^3 + 3x^2 + 14700x + k$

ដោយ $TR(50) = 492500 \Rightarrow k = 0$ ។

ដូចនេះ $TR(x) = -2x^3 + 3x^2 + 14700x$

លំហាត់ទី៥

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ចំណាយសរុបមួយកំនត់ដោយ : $TC(x) = x^2 + 3x + 22500$

តើគេត្រូវផលិតប៉ុន្មានឯកតាដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុង ១ឯកតា អប្បបរមា ?

ដំណោះស្រាយ

តាង $\overline{TC}(x)$ ជាអនុគមន៍ចំណាយមធ្យម ។

$$\text{គេបាន } \overline{TC}(x) = \frac{TC(x)}{x} = x + 3 + \frac{22500}{x}$$

$$\text{-គណនាដេរីវេទីមួយ } \overline{TC}'(x) = 1 - \frac{22500}{x^2}$$

$$\text{-បើ } \overline{TC}' = 0 \text{ នាំអោយ } 1 - \frac{22500}{x^2} = 0 \text{ នាំអោយ } x = \sqrt{22500} = 150$$

$$\text{-គណនាដេរីវេទីពីរ } \overline{TC}''(x) = \frac{5400}{x^3}$$

$$\text{ដោយគេមាន } \overline{TC}''(90) = \frac{5400}{150^3} > 0 \text{ នាំឱ្យអនុគមន៍ } TC(x) \text{ មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ } x = 150$$

ដូចនេះដើម្បីឱ្យចំណាយមធ្យមក្នុងមួយឯកតាអប្បបរមាគេត្រូវផលិតចំនួន 150 Units ។

លំហាត់ទី៦

គេឱ្យអនុគមន៍ចំណាយក្នុងការថែទាំគ្រឿងយន្តមួយកំណត់ដោយ :

$r(t) = 500 - 6t - 10t^2 + t^3$ ដែល t ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំ និង 400ជាចំណាយថេរ ។

ចូររកចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី 2 ទៅឆ្នាំទី6 ។

ដំណោះស្រាយ

តាង E ជាចំណាយក្នុងការថែទាំពីឆ្នាំទី 4 ទៅឆ្នាំទី6

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } E &= \int_2^6 (500 - 6t - 10t^2 + t^3).dt \\ &= \left[500t - 3t^2 - 3t^3 + \frac{1}{4}t^4 \right]_2^6 \\ &= \left[500(6) - 3(6)^2 - 3(6)^3 + \frac{1}{4}(6)^4 \right] - \left[500(2) - 3(2)^2 - 3(2)^3 + \frac{1}{4}(2)^4 \right] \\ &= (3000 - 108 - 648 + 324) - (1000 - 12 - 24 + 4) = 2568 - 968 = 1,600 \end{aligned}$$

លំហាត់ទី៧

អនុគមន៍តម្រូវការរបស់ការផលិតមួយគឺ $f(q) = \frac{2500}{q+20}$ និងថ្លៃសមតាស្មើនឹង \$100 ។

ចូររកភាពលើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ? ដែល q ជាបរិមាណផលិតផល ។

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ដោយ } p = \$100 \text{ គេបាន } \frac{2500}{q+20} = 100 \Rightarrow q = 5$$

ដូចនេះ $(p = \$100, q = 5)$ ជាចំនុចសមតា

ហើយចំនួនត្រង់ចំនុចសមតាគឺ $TR_0 = 100(5) = \$500$ ។

$$C.S = \int_0^5 \frac{2500}{q+20}.dq - 500 = [2500 \ln |q+20|]_0^5 - 500 = 2500(\ln 25 - \ln 20) - 500$$

ដូចនេះភាពលើសនៃអ្នកប្រើប្រាស់គឺ $C.S = \$ 57.86$ ។

លំហាត់ទី៨

អនុគមន៍តម្រូវការរបស់ផលិតកម្មមួយគឺ $f(q) = \sqrt{50000 - q^2}$ និងអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់

$$g(q) = 2q \quad \forall$$

ចូររកភាពលើសនៃអ្នកផលិត ?

ដំណោះស្រាយ

-រកចំនុចសមគ្នា :

$$\sqrt{50000 - q^2} = 2q$$

$$50000 - q^2 = 4q^2$$

$$50000 = 5q^2 \Rightarrow q = \sqrt{\frac{50000}{5}} = 100$$

គេបាន $q = 100$ units នាំឱ្យ $p = 2(100) = \$200$

$$\begin{aligned} \text{ភាពលើសនៃអ្នកផលិតគឺ } P.S &= 100 \times 200 - \int_0^{100} (2q).dq \\ &= 20000 - [q^2]_0^{100} = 20000 - 10000 = \$10000 \end{aligned}$$

លំហាត់ទី៩

ក្រុមហ៊ុនមួយផលិតទំនិញពីរប្រភេទដែលមានអនុគមន៍ចំនួនសរុប និង ចំណាយសរុប :

-អនុគមន៍ប្រាក់ចំនួនសរុប : $TR = f(x, y) = 4xy + 140y$

-អនុគមន៍ប្រាក់ចំណាយសរុប : $TC = g(x, y) = x^2 + 5y^2 + 900$

ដែល x and y ជាបរិមាណផលិតផលនីមួយៗ ។

ចូរកំណត់ បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដែលត្រូវផលិតនិងលក់ដើម្បីឱ្យចំណេញអតិបរមា ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ បរិមាណផលិតផលប្រភេទនីមួយៗដែលត្រូវផលិតនិងលក់ដើម្បីឱ្យចំណេញអតិបរមា

តាង $TP = F(x, y)$ ជាអនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុប

$$\text{គេបាន } TP = F(x, y) = TR(x, y) - TC(x, y)$$

$$TP = F(x, y) = 4xy + 140y - x^2 - 5y^2 - 900$$

$$\text{-គណនា } TP'_x = 4y - 2x, \quad TP'_y = 4x + 140 - 10y$$

$$\text{-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ} \begin{cases} 4y - 2x = 0 \\ 4x + 140 - 10y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 140, y = 70$$

$$\text{-គណនា } \Delta = ac - b^2 \text{ ដោយ } \begin{cases} a = TP''_{xx} = -2 \\ b = TP''_{xy} = 4 \\ c = TP''_{yy} = -10 \end{cases}$$

គេបាន $\Delta = 20 - 16 = 4 > 0$ and $a = -2 < 0$ នាំឱ្យអនុគមន៍មានអតិបរមាត្រង់ចំនុច

$$x = 140, y = 70 \quad \text{។}$$

ដូចនេះគេត្រូវលក់ផលិតផលទីមួយចំនួន 140 unites និងផលិតផលទីពីរ 70 unites ។

$$\text{ប្រាក់ចំណេញអតិបរមានោះគឺ } TP_{\max} = F(140, 70) = \$ 4000 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី១០

គេតាង $TC = f(x, y)$ អនុគមន៍ចំណាយសរុបនៃពីរផលិតផល ។

$$\text{គេដឹងថាចំណាយម៉ាជីណលធៀបនឹង } x \text{ គឺ } \frac{\partial TC}{\partial x} = 2x + 8y$$

$$\text{និង ចំណាយម៉ាជីណលធៀបនឹង } y \text{ គឺ } \frac{\partial TC}{\partial y} = 8x + 3y^2 \text{ ហើយចំណាយថេរ } \$50 \quad \text{។}$$

ចូរកំណត់អនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = f(x, y)$?

ដំណោះស្រាយ

កំណត់អនុគមន៍ចំណាយសរុប $TC = f(x, y)$

$$\text{គេមាន } \frac{\partial TC}{\partial x} = 2x + 8y \text{ នាំឱ្យ } TC = \int (2x + 8y).dx = x^2 + 8xy + \phi(y)$$

$$\text{គេបាន } TC'_y = \frac{\partial TC}{\partial y} = 8x + \phi'(y) = 8x + 3y^2 \text{ គេទាញ } \phi(y) = \int 3y^2.dy = y^3 + k$$

$$\text{នាំឱ្យ } TC = x^2 + 8xy + y^3 + k \text{ ដោយចំណាយថេរ } \$50 \text{ នាំឱ្យ } k = 50 \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ } TC = f(x, y) = x^2 + 8xy + y^3 + 50$$

លំហាត់ទី១១

គេតាង $TP = f(x, y)$ អនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុបនៃពីរផលិតផល ។

គេដឹងថាចំនាយម៉ាស៊ីណូលធៀបនឹង x គឺ $\frac{\partial TP}{\partial x} = 20 - 2x$

និង ចំនាយម៉ាស៊ីណូលធៀបនឹង y គឺ $\frac{\partial TP}{\partial y} = 70 - 2y$ ។

បើគេលក់ផលិតផលទីមួយចំនួន 10 ឯកតា និងផលិតផលទីពីរ 35 ឯកតានោះគេទទួលបាន
ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា \$1325 ។

ចូរកំណត់អនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុប $TP = f(x, y)$?

ដំណោះស្រាយ

កំណត់អនុគមន៍ប្រាក់ចំណេញសរុប $TP = f(x, y)$

គេមាន $\frac{\partial TP}{\partial x} = 20 - 2x \Rightarrow TP = \int (20 - 2x).dx = 20x - x^2 + \phi(y)$

គេបាន $TP'_y = \frac{\partial TP}{\partial y} = \phi'(y) = 70 - 2y$ នាំឱ្យ $\phi(y) = \int (70 - 2y).dy = 70y - y^2 + k$

គេទាញ $TP = f(x, y) = 20x - x^2 + 70y - y^2 + k = 20x + 70y - x^2 - y^2 + k$

ដោយ $TP = f(10, 35) = 1325 \Rightarrow k = 0$ ។

ដូចនេះ $TP = f(x, y) = 20x + 70y - x^2 - y^2$ ។

លំហាត់ទី១២

គេឧបមាថា $Z = f(x, y)$ ជាអនុគមន៍ ចំនួនសត្វល្អិតដែលត្រូវងាប់ដោយថ្នាំប្រភេទ

ដោយ x ជាចំណុះថ្នាំប្រភេទទីមួយ និង y ជាចំណុះថ្នាំប្រភេទទីពីរ (x, y គិតជាលីត) ។

គេដឹងថាឱឡើងស្បែកសរុប $dZ = 65e^{-0.01x}.dx + 70e^{-0.02y}.dy$ និង $Z = f(0, 0) = 9998$

ចូរកំណត់អនុគមន៍ $Z = f(x, y)$?

ដំណោះស្រាយ

កំនត់អនុគមន៍ $Z = f(x, y)$

គេមាន $dZ = 65e^{-0.01x} \cdot dx + 70e^{-0.02y} \cdot dy$

តាមទំនាក់ទំនងនេះគេទាញ $\begin{cases} \frac{\partial Z}{\partial x} = 65e^{-0.01x} \\ \frac{\partial Z}{\partial y} = 70e^{-0.02y} \end{cases}$

គេបាន $Z = \int 65e^{-0.01x} \cdot dx = -6500e^{-0.01x} + \varphi(y)$

គេបាន $Z'_y = \frac{\partial Z}{\partial y} = \varphi'(y) = 70e^{-0.02y}$ នាំឱ្យ $\varphi(y) = \int 70e^{-0.02y} \cdot dy = -3500e^{-0.02y} + k$

គេទាញ $Z = -6500e^{-0.01x} - 3500e^{-0.02y} + k$ ដោយ $Z = f(0,0) = 9998 \Rightarrow k = 10000$

ដូចនេះ $Z = 10000 - 6500e^{-0.01x} - 3500e^{-0.02y}$ ។

លំហាត់ទី១៣

គេមាន Output : $P = f(L, K)$ ដែល L and K ជាបរិមាណ inputs ។

គេដឹងថា $\frac{\partial P}{\partial L} = 2.16L - 0.09L^2$ and $\frac{\partial P}{\partial K} = 2.36K - 0.24K^2$ ។

ឧបមាថាកាលណា $L = 0$, $K = 0 \Rightarrow P = 0$ ។ ចូររកអនុគមន៍ P ?

ដំណោះស្រាយ

$\frac{\partial P}{\partial L} = 2.16L - 0.09L^2 \Rightarrow P = \int (2.16L - 0.09L^2) \cdot dL = 1.08L^2 - 0.03L^3 + \varphi(K)$

គេមាន $P'_K = \frac{\partial P}{\partial K} = \varphi'(K) = 2.36K - 0.24K^2$

គេបាន $\varphi(K) = \int (2.36K - 0.24K^2) \cdot dK = 1.68K^2 - 0.08K^3 + \lambda$

គេទាញ $P = f(K, L) = 1.08L^2 - 0.03L^3 + 1.68K^2 - 0.08K^3 + \lambda$

ដោយសម្មតិកម្ម $P = f(0,0) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ ។

ដូចនេះ $P = 1.08L^2 - 0.03L^3 + 1.68K^2 - 0.08K^3$ ។

លំហាត់ទី១៤

$$\text{គេឱ្យម៉ាទ្រីស } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

ក-ចូររកម៉ាទ្រីសកូហ្វាក់ទ័រ C នៃម៉ាទ្រីស A រួចទាញរក Adjoint Matrix : Adj(A) ។

ខ-គណនាដេទែមីណង់ $\det(A) = |A|$ ។

គ-ទាញរកម៉ាទ្រីសច្រាស់ A^{-1} នៃម៉ាទ្រីស A (Inverse of Matrix)

$$\text{ឃ-ចូរទាញបញ្ចេញចម្លើយប្រព័ន្ធ (S) : } \begin{cases} 2x + y + 4z = 23 \\ x + y + 2z = 13 \\ 3x + y + 5z = 29 \end{cases}$$

ដំណោះស្រាយ

ក-រកម៉ាទ្រីសកូហ្វាក់ទ័រ C និងម៉ាទ្រីសអាហ្សង់ adj(A)

$$\text{គេមាន } C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix}$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{11} = 2$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 2 = 3$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{12} = 1$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = -M_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -(5 - 6) = 1$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{13} = 4$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot M_{13} = M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 3 = -2$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{21} = 1$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = -M_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -5 + 4 = -1$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{22} = 1$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 12 = -2$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{23} = 2$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \cdot M_{23} = -M_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(2 - 3) = 1$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{31} = 3$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot M_{31} = M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 4 = -2$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{32} = 1$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = -M_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

-រកកូហ្វាក់ទ័រនៃធាតុ $a_{33} = 5$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot M_{33} = M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1$$

$$\text{ដូចនេះ } C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{និង } \text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall$$

ខ-គណនាដេទ័រមីណង់ $\det(A) = |A|$

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត } \det(A) = |A| &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \\ &= 2(3) + 1(1) + 4(-2) = 6 + 1 - 8 = -1 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \det(A) = |A| = -1 \quad \forall$$

គ-ទាញរកម៉ាទ្រីសច្រាស់ A^{-1} នៃម៉ាទ្រីស A

$$\text{តាមរូបមន្តគេបាន } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \forall$$

$$\text{ឃ-ទាញបញ្ចេញមួយប្រព័ន្ធ (S) : } \begin{cases} 2x + y + 4z = 23 \\ x + y + 2z = 13 \\ 3x + y + 5z = 29 \end{cases}$$

$$\text{តាង } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{pmatrix} 23 \\ 13 \\ 29 \end{pmatrix}$$

$$\text{ប្រព័ន្ធសមីការអាចសរសេរជា } A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

$$\text{ដោយ } A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{តាមសម្រាយខាងលើ})$$

$$\text{គេបាន } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 23 \\ 13 \\ 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -69 + 13 + 58 \\ -23 + 26 + 0 \\ 46 - 13 - 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ដូចនេះ } x = 2, y = 3, z = 4 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី១៥

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & x & 6 \\ 7 & 8 & x+4 \end{pmatrix}$ ដែល x ជាចំនួនពិត ។

ចូរកំណត់ x ដើម្បីឱ្យ A គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាស់ ?

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ចំនួនពិត x

ដើម្បីឱ្យ A គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាស់លុះត្រាតែវាជាម៉ាទ្រីសទោល មានន័យថា $\det(A) = 0$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \det(A) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} x & 6 \\ 8 & x+4 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & x+4 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & x \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\ &= x^2 + 4x - 48 - 8x - 32 + 84 + 96 - 21x \\ &= x^2 - 25x + 100 = 0 \Rightarrow x_1 = 5, x_2 = 20 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $x \in \{ 5, 20 \}$ ។