

តារាងតិរិច្យា



១១

តារាង១

រៀបរៀងដោយ សុខ ពិសិដ្ឋ

ស្រាវជ្រាវកម្មវិធីសិក្សា

រក្សាសិទ្ធិ

ពាក្យបណ្តឹង

ស្តីពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់
ជាទីមេត្តិ !

សៀវភៅ **គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ភាគ១** ដែលលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ
ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និង ប្រិយមិត្តកំពុងអាននេះ ខ្ញុំបាទរៀបចំឡើងក្នុង
គោលបំណង ជួយសម្រួលក្នុងការបង្រៀនសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែល
មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំមេរៀនដើម្បីបង្រៀនសិស្ស និង
សម្រាប់ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ក្នុងសៀវភៅនេះ
ខ្ញុំបានរៀបចំយ៉ាងលំអិតនូវមេរៀននីមួយៗ រួមមាន ៖

- ☞ គន្លឹះដោះស្រាយ
- ☞ លំហាត់គំរូ
- ☞ លំហាត់អនុវត្តន៍ និង លំហាត់ជ្រើសរើសផ្សេងៗ

ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោស នូវរាល់កំហុសទាំងឡាយដែលកើតឡើង
ដោយអចេតនា ដោយការពិនិត្យមិនបានសព្វគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ឬ ដោយ
បច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ ខ្ញុំបាទរង់ចាំទទួលនូវមតិវិចារក្នុងការកែលម្អសំណាក់
លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ដោយក្តី
សោមនស្សរីករាយ។

សូមជូនពរ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងប្រិយមិត្តអ្នកអាន
ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច និង ការសិក្សា។

កំពង់ត្របែក ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
អ្នករៀបរៀង

សុខ ពិសិដ្ឋ
លេខទូរស័ព្ទ : 016 510 532
088 80 60 387
E-mail : pisethsok87@yahoo.com

មាតិកា

មេរៀនទី១ ស្ថិតនៃចំនួនពិត	១
១. និយមន័យ	១
២. តួទី n នៃស្ថិត	៧
៣. អថេរភាពស្ថិត	១០
៣.១. ស្ថិតកើន ស្ថិតចុះ	១០
៣.២. ស្ថិតម៉ូណូតូន	១៦
៤. ស្ថិតទាល់	២០
៤.១ ស្ថិតទាល់លើ	២០
៤.២. ស្ថិតទាល់ក្រោម	២១
៤.៣. ស្ថិតទាល់	២២
មេរៀនទី២ ស្ថិតនព្វន្ត	២៩
១. និយមន័យ	២៩
២. តួទី n នៃស្ថិតនព្វន្ត	២៩
៣. ផលបូកតួនៃស្ថិតនព្វន្ត	៣៨
មេរៀនទី៣ ស្ថិតធរណីមាត្រ	៥៣
១. និយមន័យ	៥៣
២. តួទី n នៃស្ថិតធរណីមាត្រ	៥៤
៣. ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង	៦១
៤. ផលបូកតួនៃស្ថិតធរណីមាត្រ	៦៦
៥. ស្ថិតធរណីមាត្រអនន្តតួ	៧៥
មេរៀនទី៤ ផលបូកតួនៃស្ថិតផ្សេងៗ	៨៥
១. របៀបគណនាផលបូក	៨៥
២. គណនាផលបូកតាមគំរូ	៩២
៣. និមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកតួនៃស្ថិត	៩៣
៣.១. សញ្ញាណ Σ	៩៣
៣.២. លក្ខនៈនៃ Σ	៩៤
៤. របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស្ថិត	៩៧

៤.១ ផលសងតួលំដាប់ទី១.....	៩៧
៤.២ ផលសងតួលំដាប់ទី២.....	១០១
មេរៀនទី៥ ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត	១០៩
១. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ	១០៩
២. ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n	១១៨
៣. របៀបកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយ $a_1 = \alpha$, $a_2 = \beta$ និង $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	១១៩

មេរៀនទី
១

ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត

១. និយមន័យ

ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជា អនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

គេកំណត់សរសេរស្វ៊ីតដោយ (a_n) ឬ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ឬ $\{a_n\} : a_n = f(n)$ ។
ឧទាហរណ៍៖ ស្វ៊ីតខាងក្រោមនេះ ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត៖

$$a_n = n^2, \quad b_n = \frac{n}{n+1}, \quad c_n = \sqrt{\ln n}, \quad u_n = \frac{e^n}{n} \quad \forall$$

សម្គាល់៖

- គ្រប់ធាតុនៅក្នុងចន្លោះ $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ ហៅថាធាតុនៃស្វ៊ីតដែល a_1 ហៅថាធាតុទី១, a_2 ហៅថាធាតុទី២, ..., a_n ហៅថាធាតុទី n ។
- ស្វ៊ីតដែលមានតួរាប់អស់ ហៅថា ស្វ៊ីតរាប់អស់ (ស្វ៊ីតកំណត់)។
- ស្វ៊ីតដែលមានតួរាប់មិនអស់ ហៅថាស្វ៊ីតអនន្តតួ (ស្វ៊ីតមិនកំណត់)

ឧទាហរណ៍ : $(a_n): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ជាស្វ៊ីតរាប់អស់ ឬ ស្វ៊ីតកំណត់។
 $(a_n): 1, 3, 9, \dots, 19683$ ជាស្វ៊ីតរាប់អស់ ឬ ស្វ៊ីតកំណត់។
 $(a_n): 5, 10, 15, 20, 25, \dots$ ជាស្វ៊ីតអនន្តតួ ឬ ស្វ៊ីតមិនកំណត់។

លំហាត់គំរូទី១ : បំពេញតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោមឱ្យបានបីតួទៀត៖

ក. $3, 5, 7, 9, \dots$

ខ. $1, 3, 6, 10, \dots$

គ. $3, 8, 15, \dots$

ឃ. $2, 4, 8, 16, \dots$

ង. $1, 8, 27, 64, \dots$

ច. $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

ឆ. $-1, 2, -3, 4, -5, \dots$

ជ. $-1, \frac{1}{2}, -3, \frac{1}{4}, -5, \dots$

ឈ. $9, 6, 3, \dots$

ញ. $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, \frac{7}{6}, \dots$

ចំណោះស្រាយ

ក. $3, 5, 7, 9, \dots$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 5 = 3 + 2$$

$$a_3 = 7 = 5 + 2$$

$$a_4 = 9 = 7 + 2$$

$$\Rightarrow a_5 = a_4 + 2 = 9 + 2 = 11$$

$$\Rightarrow a_6 = a_5 + 2 = 11 + 2 = 13$$

$$\Rightarrow a_7 = a_6 + 2 = 13 + 2 = 15$$

ដូចនេះ បីតួបន្ទាប់គឺ

11, 13, 15

ខ. $1, 3, 6, 10, \dots$

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 3 = a_1 + 2$$

$$a_3 = 6 = a_2 + 3$$

$$a_4 = 10 = a_3 + 4$$

$$\Rightarrow a_5 = a_4 + 5 = 10 + 5 = 15$$

$$\Rightarrow a_6 = a_5 + 6 = 15 + 6 = 21$$

$$\Rightarrow a_7 = a_6 + 7 = 21 + 7 = 28$$

ដូចនេះ បីតួបន្ទាប់គឺ 15, 21, 28

គ. $3, 8, 15, \dots$

$$a_1 = 3 = 2^2 - 1$$

$$a_2 = 8 = 3^2 - 1$$

$$a_3 = 15 = 4^2 - 1$$

$$\Rightarrow a_4 = 5^2 - 1 = 24$$

$$\Rightarrow a_5 = 6^2 - 1 = 35$$

$$\Rightarrow a_6 = 7^2 - 1 = 48$$

ដូចនេះ បីតួបន្ទាប់គឺ 24, 35, 48

ចម្លើយ ពី យ ដល់ ញ

ឃ. $32, 64, 128$

ង. $125, 216, 343$

ច. $21, 34, 55$

ឆ. $6, -7, 8$

ជ. $\frac{1}{6}, 7, \frac{1}{8}$

ឈ. $0, -3, -6$

ញ. $\frac{3}{2}, \frac{11}{6}, \frac{13}{6}$

លំហាត់គំរូទី២ : សរសេរគ្រប់តួនៃស្វ៊ីតរាប់អស់ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $a_n = \frac{1}{n+2}$ ដែល $1 \leq n \leq 4$

ខ. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ដែល $1 \leq n \leq 8$

គ. $a_n = 3n-1$ ដែល $1 \leq n \leq 4$

ឃ. $a_n = 2^{-n+2}$ ដែល $1 \leq n \leq 5$

ច. $a_n = 2^n - 1$ ដែល $1 \leq n \leq 6$

ឆ. $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ ដែល $1 \leq n \leq 5$

$$\text{ជ. } a_n = \frac{n-4}{n(n+2)} \text{ ដែល } 1 \leq n \leq 4$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{ក. } a_n = \frac{1}{n+2} \text{ ដែល } 1 \leq n \leq 4$$

ជំនួស $n=1, 2, 3, 4$ យើងបាន:

$$a_1 = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$$

$$a_2 = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$a_3 = \frac{1}{3+2} = \frac{1}{5}$$

$$a_4 = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}$$

ដូចនេះ បួនតួដែលត្រូវកំណត់គឺ

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$$

$$\text{ខ. } a_n = \frac{(-1)^n}{n} \text{ ដែល } 1 \leq n \leq 8$$

ជំនួស $n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ យើងបាន:

$$a_1 = \frac{(-1)^1}{1} = -1$$

$$a_5 = \frac{(-1)^5}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$a_2 = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_6 = \frac{(-1)^6}{6} = \frac{1}{6}$$

$$a_3 = \frac{(-1)^3}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$a_7 = \frac{(-1)^7}{7} = -\frac{1}{7}$$

$$a_4 = \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4}$$

$$a_8 = \frac{(-1)^8}{8} = \frac{1}{8}$$

ដូចនេះ ៨តួនៃស្វ៊ីតគឺ

$$-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{8}$$

គ. $a_n = 3n - 1$ ដែល $1 \leq n \leq 5$

ជំនួស $n=1, 2, 3, 4, 5$ យើងបាន:

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 1 = 2$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 - 1 = 5$$

$$a_3 = 3 \cdot 3 - 1 = 8$$

$$a_4 = 3 \cdot 4 - 1 = 11$$

$$a_5 = 3 \cdot 5 - 1 = 14$$

ដូចនេះ ប្រាំតួនៃស្វ៊ីតគឺ 2, 5, 8, 11, 14

ចម្លើយពី យ ដល់ ជ

ឃ. $2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$

ង. $-1, 1, -1, 1$

ច. $1, 3, 7, 15, 31, 63$

ឆ. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{6}$

ជ. $-1, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{15}, 0, \frac{1}{35}$ ។

លំហាត់គំរូទី៣ : សរសេរតួនៃស្វ៊ីតលំដាប់តគ្នា:

ក. $a_n = 2 + \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = 2n + 3, n \in \mathbb{N}$

គ. $a_n = 2^n, n = 1, 2, 3, \dots$

ឃ. $a_n = \frac{1}{2n-1}, n \in \mathbb{N}$

ង. $a_n = \frac{2n-1}{2n+1}, n \in \mathbb{N}$

ច. $a_n = \frac{1}{2n}$

ឆ. $a_n = \frac{n}{2^n}, n \in \mathbb{N}$

ជ. $a_n = \frac{n}{n^2+1}, n \in \mathbb{N}$

ឈ. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, n \in \mathbb{N}$

ញ. $a_n = e^n, n \in \mathbb{N}$

ចំណោះស្រាយ

ក. $a_n = 2 + \frac{1}{2^n} = \frac{2^{n+1} + 1}{2^n}$

ជំនួស $n=1, 2, 3, \dots$ យើងបាន:

$$a_1 = \frac{2^2 + 1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$a_2 = \frac{2^3 + 1}{2^2} = \frac{9}{4}$$

$$a_3 = \frac{2^4 + 1}{2^3} = \frac{17}{8}$$

$$a_4 = \frac{2^5 + 1}{2^4} = \frac{33}{16}$$

.....

ដូចនេះ $(a_n): \frac{5}{2}, \frac{9}{4}, \frac{17}{8}, \frac{33}{16}, \dots, 2^n + \frac{1}{2^n}, \dots$ ចំពោះ $n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = 2n + 3$

ជំនួស $n=1, 2, 3, \dots$ យើងបាន:

$$a_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

$$a_2 = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

$$a_3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$$

$$a_4 = 2 \cdot 4 + 3 = 11$$

.....

ដូចនេះ $(a_n): 5, 7, 9, 11, \dots, 2n + 3, \dots$ ចំពោះ $n \in \mathbb{N}$

គ. $a_n = 2^n$

ជំនួស $n=1, 2, 3, 4, \dots$ យើងបាន:

$$a_1 = 2^1 = 2 \qquad a_2 = 2^2 = 4$$

$$a_3 = 2^3 = 8 \qquad a_4 = 2^4 = 16$$

.....

ដូចនេះ $(a_n): 2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots$ ចំពោះ $n \in \mathbb{N}$

ចន្លើយ ពី ប ដល់ ឡ

$$\text{ឃ. } (a_n): 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{2n-1}, \dots$$

$$\text{ង. } (a_n): \frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}, \frac{7}{9}, \dots, \frac{2n-1}{2n+1}, \dots$$

$$\text{ច. } (a_n): \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2n}, \dots$$

$$\text{ឆ. } (a_n): \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{5}{32}, \dots, \frac{n}{2^n}, \dots$$

$$\text{ជ. } (a_n): \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{17}, \frac{5}{26}, \dots, \frac{n}{n^2+1}, \dots$$

$$\text{ឈ. } (a_n): 1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}, \dots$$

$$\text{ញ. } (a_n): e, e^2, e^3, e^4, \dots, e^n, \dots$$

២. តួទី n នៃស្វ៊ីត

ឧទាហរណ៍: គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n): 3, 9, 27, 81, 243$ ដែល $n \in \mathbb{N}$

យើងសង្កេតឃើញថា: $a_1 = 3 = 3^1$

$$a_2 = 9 = 3^2$$

$$a_3 = 27 = 3^3$$

$$a_4 = 81 = 3^4$$

$$a_5 = 243 = 3^5$$

.....

$$\Rightarrow a_n = 3^n$$

យើងបាន 3^n ជាតួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n)

គេសរសេរ $a_n = 3^n$ ហៅថាតួទី n (ឬតួទូទៅ) នៃស្វ៊ីត។

លំហាត់គំរូទី១ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន:

$$a_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2^1}$$

$$a_2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$$

$$a_3 = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

$$a_4 = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

.....

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{2^n}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្លឹកគឺ $a_n = 2^n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

លំហាត់គំរូទី២ : កំណត់តួទី n នៃស្លឹក $2, 5, 10, 17, \dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន:

$$a_1 = 2 = 1^2 + 1$$

$$a_2 = 5 = 2^2 + 1$$

$$a_3 = 10 = 3^2 + 1$$

$$a_4 = 17 = 4^2 + 1$$

.....

$$\Rightarrow a_n = n^2 + 1$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្លឹកគឺ $a_n = n^2 + 1$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

លំហាត់គំរូទី៣ : កំណត់តួទី n នៃស្លឹក: $-1, 2, 7, 14, 23, \dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន:

$$a_1 = -1 = 1^2 - 2$$

$$a_2 = 2 = 2^2 - 2$$

$$a_3 = 7 = 3^2 - 2$$

$$a_4 = 14 = 4^2 - 2$$

$$a_5 = 23 = 5^2 - 2$$

.....

$$\Rightarrow a_n = n^2 - 2$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $\boxed{a_n = n^2 - 2}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

លំហាត់គំរូទី៤ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត៖ $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$ ។

បំណែងស្រាយ

យើងមាន:

$$a_1 = \frac{2}{3} = \frac{1+1}{1+2}$$

$$a_2 = \frac{3}{4} = \frac{2+1}{2+2}$$

$$a_3 = \frac{4}{5} = \frac{3+1}{3+2}$$

$$a_4 = \frac{5}{6} = \frac{4+1}{4+2}$$

.....

$$\Rightarrow a_n = \frac{n+1}{n+2}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $\boxed{a_n = \frac{n+1}{n+2}}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

លំហាត់អនុវត្តទី១

កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

ក. $-3, -5, -7, -9, \dots$ ខ. $-3, -1, 1, 3, 5, \dots$

គ. $16, 13, 10, 7, 4, \dots$

ឃ. $5, 7, 9, 11, 13, \dots$

ង. $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \dots$

ច. $\frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{7}{9}, \frac{15}{17}, \frac{31}{33}, \dots$

ឆ. $-\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$

ជ. $\frac{1}{3}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \frac{1}{24}, \dots$

ឈ. $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{17}, \dots$

ញ. $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{9}, \frac{4}{17}, \dots$

ដ. $-1, 1, -1, 1, \dots$

ប. $1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \dots$

ឡ. $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$

ឈ. $\frac{3}{4}, \frac{4}{9}, \frac{5}{16}, \frac{6}{25}, \dots$

ណ. $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \dots$

ត. $\frac{1}{1 \cdot 4}, \frac{1}{4 \cdot 7}, \frac{1}{7 \cdot 10}, \frac{1}{10 \cdot 13}, \dots$

ថ. $\frac{3}{2^2 \cdot 3^2}, \frac{5}{3^2 \cdot 4^2}, \frac{7}{4^2 \cdot 5^2}, \frac{9}{5^2 \cdot 6^2}, \dots$ ទ. $\frac{3}{4}, \left(\frac{6}{7}\right)^2, \left(\frac{9}{10}\right)^2, \left(\frac{12}{13}\right)^2, \dots$

៣. អថេរភាពនៃស្វ៊ីត

៣.១ ស្វ៊ីតកើន ស្វ៊ីតចុះ

ក. និយមន័យ

- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន លុះត្រាតែ $a_n \leq a_{n+1}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។
- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ លុះត្រាតែ $a_n \geq a_{n+1}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។
- បើ $a_n < a_{n+1}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតកើនដាច់ខាត
- បើ $a_n \geq a_{n+1}$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះដាច់ខាត។

ខ. របៀបសិក្សាអថេរភាពស្វ៊ីត

របៀបទី១: សិក្សាសញ្ញានៃផលដក $a_{n+1} - a_n$ ធៀបនឹង ០

- បើ $a_{n+1} - a_n \geq 0 \Leftrightarrow a_{n+1} \geq a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន
- បើ $a_{n+1} - a_n \leq 0 \Leftrightarrow a_{n+1} \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ
- បើ $a_{n+1} - a_n > 0 \Leftrightarrow a_{n+1} > a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតកើនដាច់ខាត
- បើ $a_{n+1} - a_n < 0 \Leftrightarrow a_{n+1} < a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះដាច់ខាត
- បើ $a_{n+1} - a_n = 0 \Leftrightarrow a_{n+1} = a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតថេរ
- បើ $a_{n+1} - a_n$ មានសញ្ញាមិនថេរ $\forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) មិនមែនជាស្វ៊ីតកើន ហើយក៏មិនមែនជាស្វ៊ីតចុះដែរ ។

លំហាត់គំរូទី១ : សិក្សាភាពកើន ឬ ចុះនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 5n + 3$ ។

ខ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 5}$ ដែល $a_n = \frac{3n}{2}$ ។

គ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 3}$ ដែល $a_n = \frac{2}{n}$ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = 5n + 3 \Rightarrow a_{n+1} = 5(n+1) + 3 = 5n + 8$

យើងបាន $a_{n+1} - a_n = (5n + 8) - (5n + 3) = 5 > 0$

$\Rightarrow a_{n+1} > a_n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 5n + 3$ ជាស្វ៊ីតកើន

ខ. យើងមាន $a_n = \frac{3n}{2} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{3(n+1)}{2} = \frac{3n}{2} + \frac{3}{2}$

យើងបាន $a_{n+1} - a_n = \left(\frac{3n}{2} + \frac{3}{2} \right) - \frac{3n}{2} = \frac{3}{2} > 0$

$\Rightarrow a_{n+1} > a_n$ ចំពោះគ្រប់ $n \geq 5$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 5}$ ដែល $a_n = \frac{3n}{2}$ ជាស្វ៊ីតកើន

គ. យើងមាន $a_n = \frac{2}{n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{2}{n+1}$

យើងបាន $a_{n+1} - a_n = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n}$

$$= \frac{2n - 2n - 2}{n(n+1)}$$

$$= -\frac{2}{n(n+1)} < 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } n \geq 3$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 3}$ ដែល $a_n = \frac{2}{n}$ ជាស្វ៊ីតចុះ

លំហាត់គំរូទី២: សិក្សាភាពកើន ចុះ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $a_n = n^2 - 3n + 2, n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = -n^2 + 7n - 12, n \geq 3$

គ. $a_n = \frac{n^2 - 3n + 6}{2}, n \in \mathbb{N}$

ចំពោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = n^2 - 3n + 2 \Rightarrow a_{n+1} = (n+1)^2 - 3(n+1) + 2 = n^2 - n$

យើងបាន $a_{n+1} - a_n = (n^2 - n) - (n^2 - 3n + 2)$

$$= 2n - 2$$

$$= n(n-1) \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

នោះ $a_{n+1} \geq a_n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = n^2 - 3n + 2, n \in \mathbb{N}$ ជាស្វ៊ីតកើន

ខ. យើងមាន $a_n = -n^2 - 7n - 12$

$$\Rightarrow a_{n+1} = -(n+1)^2 - 7(n+1) - 12 = -n^2 + 5n - 6$$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n &= (-n^2 + 5n - 6) - (-n^2 + 7n - 12) \\ &= -2(n - 3) \leq 0, \forall n \geq 3, n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

$$\text{នាំឱ្យ } a_{n+1} \leq a_n, \forall n \geq 3, n \in \mathbb{N}$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \geq 3}$ ដែល $a_n = -n^2 + 7n - 12$ ជាស្វ៊ីតចុះ

$$\begin{aligned}\text{គ. យើងមាន } a_n &= \frac{n^2 - 3n + 6}{2} \\ \Rightarrow a_{n+1} &= \frac{(n+1)^2 - 3(n+1) + 6}{2} = \frac{n^2 - n + 4}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n &= \frac{n^2 - n + 4}{2} - \frac{n^2 - 3n + 6}{2} = n - 1 \geq 0, \forall n \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow a_{n+1} &\geq a_n, \forall n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ ស្វ៊ីត } (a_n) \text{ ដែល } a_n = \frac{n^2 - 3n + 6}{2} \text{ ជាស្វ៊ីតកើន}$$

លំហាត់គំរូទី២ : សិក្សាអថេរភាពនៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = (-2)^n$ ។

ចំណោះស្រាយ

$$\text{យើងមាន } a_n = (-2)^n \Rightarrow a_{n+1} = (-2)^{n+1} = -2 \cdot (-2)^n$$

$$\text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n = -2 \cdot (-2)^n - (-2)^n = -3 \cdot (-2)^n \text{ មានសញ្ញាមិនថេរ}$$

ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = (-2)^n$ មិនមែនជាស្វ៊ីតកើន ហើយ
ក៏មិនមែនជាស្វ៊ីតចុះដែរ

រង្វង់បទី២ :

បើស្វ៊ីត (a_n) មានគូរជ្រុងមានដាច់ខាត គេប្រាប់ផ្សេង $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ទៅនឹងចំនួន 1

- ស្ថិត (a_n) ជាស្ថិតកើលុះត្រាតែ $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ។
- ស្ថិត (a_n) ជាស្ថិតចុះ លុះត្រាតែ $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ។
- បើ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នោះ (a_n) ជាស្ថិតថេរ។

លំហាត់គំរូទី៣ : សិក្សាអថេរភាពនៃស្ថិត (a_n) ដូចខាងក្រោម:

ក. $a_n = 3^n, \forall n \in \mathbb{N}$ ។

ខ. $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N}$

ចំពោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = 3^n \Rightarrow a_{n+1} = 3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$

យើងបាន $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3 \cdot 3^n}{3^n} = 3 > 1 \Rightarrow a_{n+1} > a_n$

ដូចនេះ ស្ថិត (a_n) ដែល $a_n = 3^n, \forall n \in \mathbb{N}$ ជាស្ថិតកើន

ខ. យើងមាន $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n \Rightarrow a_{n+1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$

យើងបាន $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n$

ដូចនេះ ស្ថិត (a_n) ដែល $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N}$ ជាស្ថិតចុះ

លំហាត់អនុវត្ត

១. បង្ហាញថា ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{1}{n+2}$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

២. បង្ហាញថា ស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$ ជាស្វ៊ីតកើន។

៣. សិក្សាភាពកើន ចុះ នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{3n-1}{2n+3}$, $n \in \mathbb{N}$ ។

៤. សិក្សាអថេរភាពនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $a_n = \frac{n}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = \frac{2n}{3n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

គ. $a_n = \frac{1}{n^3}$, $n \in \mathbb{N}$

ឃ. $a_n = \frac{1}{2^n}$, $n \in \mathbb{N}$

ង. $a_n = -\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$

ច. $a_n = \frac{n-1}{n^2}$, $n = 2, 3, 4, \dots$

៥. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{n+k}{n+1}$ ជាស្វ៊ីតកើន។

៦. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{3n}{4n-5}$ ជាស្វ៊ីតចុះ ចំពោះ $n = 2, 3, 4, \dots$

៧. សិក្សាភាពកើន ចុះ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $a_n = n^2 - 9n + 20$, $n = 4, 5, 6, \dots$

ខ. $a_n = \frac{n}{e^n}$, $n \in \mathbb{N}$

គ. $a_n = |c|^n$, $n \in \mathbb{N}$

ឃ. $a_n = 5^{-n}$, $n \in \mathbb{N}$

ង. $a_n = (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}$

៣.២. ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន

និយមន័យ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូនលុះត្រាតែ $a_n \leq a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
 (ឬ $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots$) ឬ $a_n \geq a_{n+1}$
 ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ (ឬ $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots$) ។

សម្គាល់ :

- ស្វ៊ីតកើន ឬ ស្វ៊ីតចុះជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន។ ដូចនេះ ដើម្បីបង្ហាញថាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន យើងត្រូវបង្ហាញថា (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ឬ ស្វ៊ីតចុះ ។
- បើស្វ៊ីត (a_n) មិនមែនជាស្វ៊ីតកើន ឬ មិនមែនជាស្វ៊ីតចុះ នោះ (a_n) មិនមែនជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូនទេ។
- ស្វ៊ីតថេរ ក៏ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូនដែរ

លំហាត់គំរូទី១ : បង្ហាញថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{2^n}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន។

ចំណោះស្រាយ

រៀបចំ៖

យើងមាន $a_n = \frac{1}{2^n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$

យើងបាន $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n, \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{2^n}$ ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន(ចុះ)

រៀបចំ៖

យើងមាន $a_n = \frac{1}{2^n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$

$$\text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{2^n} < 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} < a_n \quad (a_n) \text{ ជាស្រ្តីតម្លៃ}$$

$$\text{ដូចនេះ ស្រ្តីត } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ដែល } a_n = \frac{1}{2^n} \text{ ជាស្រ្តីតម្លៃណូតូន(មុន)}$$

លំហាត់គំរូទី២ : សិក្សាភាពម្លូណូតូននៃស្រ្តីតខាងក្រោម:

$$\text{ក. } a_n = \frac{2^n}{n}, n \geq 1$$

$$\text{ខ. } a_n = \frac{4n}{n+1}, n \in \mathbb{N}$$

$$\text{គ. } 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\text{ឃ. } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{ក. យើងមាន } a_n = \frac{2^n}{n}, n \geq 1$$

$$\Rightarrow a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1} = \frac{2 \cdot 2^n}{n+1}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \Rightarrow a_{n+1} - a_n &= \frac{2 \cdot 2^n}{n+1} - \frac{2^n}{n} \\ &= \frac{2n \cdot 2^n - n \cdot 2^n - 2^n}{n(n+1)} \\ &= \frac{(n-1) \cdot 2^n}{n(n+1)} \geq 0 \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } n \geq 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} \geq a_n \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } n \geq 1$$

$$\text{ដូចនេះ ស្រ្តីត } (a_n) \text{ ដែល } a_n = \frac{2^n}{n}, n \geq 1 \text{ ជាស្រ្តីតម្លៃណូតូន(កើន)}$$

ខ. យើងមាន $a_n = \frac{4n}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow a_{n+1} = \frac{4(n+1)}{(n+1)+1} = \frac{4n+4}{n+2}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n &= \frac{4n+4}{n+2} - \frac{4n}{n+1} \\ &= \frac{4n^2 + 4n + 4n + 4 - 4n^2 - 8n}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{4}{(n+1)(n+2)} > 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} > a_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

ដូចនេះ ស្ដីពី (a_n) ដែល $a_n = \frac{4n}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ ជាស្ដីពីម៉ូណូតូន(កើន)

គ. យើងមាន $a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow a_{n+1} = (-1)^{n+2} \cdot \frac{1}{n+1} = -(-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } a_{n+1} - a_n &= -(-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} - (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \\ &= (-1)^n \left(-\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{ មានសញ្ញាមិនថេរ } \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

នោះ (a_n) មិនមែនជា ស្ដីពីកើន ចុះ ឬ ថេរទេ

ដូចនេះ ស្ដីពី $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$ មិនមែនជាស្ដីពីម៉ូណូតូនទេ

ឃ. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$

យើងមាន $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, \dots, a_n = \frac{1}{n}$

នោះ $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > a_{n+1} > \dots$

ដូចនេះ ស្ដីពី $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$ ជាស្ដីតម្លៃណូតូន(ចុះ)

អប្បបរមាឯទៀត

យើងមាន $a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$

យើងបាន $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)} < 0$

$\Rightarrow a_{n+1} < a_n$ (a_n) ជាស្ដីចុះ)

ដូចនេះ ស្ដីពី $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$ ជាស្ដីតម្លៃណូតូន(ចុះ)

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. សិក្សាភាពម្លូណូតូន នៃស្ដីត (a_n) ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $a_n = \frac{2n+5}{n+1}$

ខ. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

គ. $a_n = 2^n \cdot 3^{n+1}$

ឃ. $a_n = (n-3)^2$, $n \geq 3$

ង. $a_n = 3 + (-1)^n$

ច. $a_n = \frac{1}{n^2}$

ឆ. $a_n = (-1)^n$

ជ. $a_1 = 1$ និង $a_{n+1} = a_n - 3$

២. បង្ហាញថា ស្ដីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{\pi^n}{n}$ ជាស្ដីតម្លៃណូតូន។

៣. បង្ហាញថាស្ដីត (a_n) ដែល $a_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}$ ជាស្ដីតម្លៃណូតូន

៤. ស្វ័យគណន៍

៤.១ ស្វ័យគណន៍លើ

ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ័យគណន៍ (a_n) ដែល $a_n = -n^2 + 1$

គេបាន $a_1 = 0, a_2 = -3, a_3 = -8, a_4 = -15, \dots, a_{100} = -9999, \dots$

នោះ $0 = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$ ឬ $a_n \leq 0$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ។

គេថា ស្វ័យគណន៍នេះ ជាស្វ័យគណន៍លើ ។ ០ ហៅថាគោលលើនៃស្វ័យគណន៍នេះ។

និយមន័យ ស្វ័យគណន៍ (a_n) ជាស្វ័យគណន៍លើ លុះត្រាតែមានចំនួនពិត M មួយ ដែលចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_n \leq M$ ។ ចំនួន M នេះ ហៅថា គោលលើនៃស្វ័យគណន៍ ។

លំហាត់គំរូទី១ : រកគោលលើនៃស្វ័យគណន៍ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ក. $a_n = 2^{-n}, n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = \frac{2}{n}, n \in \mathbb{N}$

គ. (a_n) ដែល $a_1 = 1$ និង $a_n = \frac{a_{n-1}}{2}$ បើ $n \geq 2$ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = 2^{-n} = \frac{1}{2^n}$

យើងបាន $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{4}, a_3 = \frac{1}{8}, a_4 = \frac{1}{16}, \dots$

នោះ $\frac{1}{2} = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$

$\Rightarrow a_n \leq \frac{1}{2}$

ដូចនេះ គោលលើនៃស្វ័យគណន៍នេះគឺ

$M = \frac{1}{2}$

ខ. យើងមាន $a_n = \frac{2}{n}$

យើងបាន $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = \frac{2}{3}, a_4 = \frac{1}{2}, \dots$

នោះ $2 = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$

$\Rightarrow a_n \leq 2$

ដូចនេះ គោលើនៃស្វ៊ីតនេះគឺ $M = 2$

គ. យើងមាន $a_1 = 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{2}, n \geq 2$

យើងបាន $a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{a_2}{2} = \frac{1}{4}, a_4 = \frac{a_3}{2} = \frac{1}{8}, \dots$

នោះ $1 = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$

$\Rightarrow a_n \leq 1$

ដូចនេះ គោលើនៃស្វ៊ីតនេះគឺ $M = 1$

៤. ២. ស្វ៊ីតទាល់ក្រោម

ឧតាហរណ៍: គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 2^n + 1, n \in \mathbb{N}$ ។

គេបាន $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 9, a_4 = 17, \dots$

នោះ $3 = a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots$

$\Rightarrow a_n \geq 3, \forall n \in \mathbb{N}$

ចំនួន 3 ហៅថា គោលក្រោមនៃស្វ៊ីត។

និយមន័យ ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោម លុះត្រាតែមានចំនួនពិត m មួយ ដែលចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_n \geq m$ ។ ចំនួន m នេះ ហៅថា គោលក្រោមនៃស្វ៊ីត ។

លំហាត់គំរូទី២ : រកគោលក្រោមនៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $a_n = 4n - 1$, $n \in \mathbb{N}$

ខ. $a_n = n + 2$, $n \in \mathbb{N}$

គ. $a_n = 2n + 1$, $n \in \mathbb{N}$ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = 4n - 1$, $n \in \mathbb{N}$

យើងបាន $a_1 = 3, a_2 = 7, a_3 = 11, a_4 = 15, \dots$

នោះ $3 = a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots$

$\Rightarrow a_n \geq 3$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ចំនួនទាល់ក្រោមនៃស្វ៊ីតនេះគឺ $m = 3$

ខ. យើងមាន

$a_n = n + 2$, $n \in \mathbb{N}$

យើងបាន $a_1 = 3, a_2 = 4, a_3 = 5, a_4 = 6, \dots$

នោះ $3 = a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots$

$\Rightarrow a_n \geq 3$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ចំនួនទាល់ក្រោមនៃស្វ៊ីតនេះគឺ $m = 3$

គ . ចម្លើយ $m = 3$

៣.៣ ស្វ៊ីតទាល់

ឧទាហរណ៍: គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{n}{n+1}$

យើងបាន $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{2}{3}, a_3 = \frac{3}{4}, \dots, a_{1000000} = \frac{1000000}{1000001} \approx 1, \dots$

យើងឃើញថា $\frac{1}{2}$ ជាគោលក្រោមនៃស្វ៊ីត និង 1 ជាគោលលើនៃស្វ៊ីត ព្រោះ

កាលណា តម្លៃ n កាន់តែធំ (n ខិតជិតអនន្ត) នោះ $\frac{n}{n+1}$ ខិតជិត 1 ដែល 1 ជាគោលលើនៃស្ដីត។ យើងបាន ស្ដីតនេះ ទាល់លើផង និងទាល់ក្រោមផង។ គេថា ស្ដីត (a_n) ជាស្ដីតទាល់។

និយមន័យ ស្ដីត (a_n) ជាស្ដីតទាល់លុះត្រាតែ (a_n) ជាស្ដីតទាល់ខាងលើ ផង និង ទាល់ខាងក្រោមផង គឺ $m \leq a_n \leq M$ ។

លំហាត់គំរូទី៣ : បង្ហាញថា ស្ដីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{1}{n^2}$ ជាស្ដីតទាល់។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $a_n = \frac{1}{n^2}$, $n \in \mathbb{N}$

យើងបាន $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{4}$, $a_3 = \frac{1}{9}$, $a_4 = \frac{1}{16}$, ...

នោះ $1 = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$

$\Rightarrow a_n \leq 1$ ($M = 1$ ជាចំនួនទាល់លើ)

ម្យ៉ាងទៀត កាលណាតម្លៃ n កាន់តែធំ ($n \rightarrow \infty$) នោះ $a_n = \frac{1}{n^2}$ ខិតទៅរក 0

(EX : $n = 100\,000\,000 \Rightarrow a_{100\,000\,000} = \frac{1}{10\,000\,000\,000\,000\,000} \approx 0$)

នោះ $m = 0$ ជាចំនួនទាល់ក្រោម

យើងបាន $0 \leq a_n \leq 1$

ដូចនេះ ស្ដីត (a_n) ជាស្ដីតទាល់ ដែលមាន $M = 1$ ជាចំនួនទាល់លើ និង $m = 0$ ជាចំនួនទាល់ក្រោម

លំហាត់គំរូទី៤ : បណ្តាស្ដីតខាងក្រោម តើស្ដីតណាខ្លះ ជាស្ដីតទាល់លើ ទាល់ក្រោម និង ជាស្ដីតទាល់ ? រួចរកគោលនៃស្ដីតនីមួយៗ ។

ក. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 - 3n$

ខ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{\pi}{n}$

គ. ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{3^n}{n}$ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. យើងមាន $a_n = 1 - 3n$

យើងបាន $a_1 = -2, a_2 = -5, a_3 = -8, a_4 = -11, \dots$

នោះ $-2 = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots \Rightarrow a_n \leq -2$

$\Rightarrow$ ចំនួន $M = -2$ ជាចំនួនទាស់លើ

ម្យ៉ាងទៀត កាលណា $n \rightarrow \infty$ នោះ $a_n = 1 - 3n \rightarrow -\infty$ (មិនទាស់ក្រោម)

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 - 3n$ ជាស្វ៊ីតទាស់លើ ដែល $M = -2$

ជាចំនួនទាស់លើ

ខ. យើងមាន $a_n = \frac{\pi}{n}$

យើងបាន $a_1 = \pi, a_2 = \frac{\pi}{2}, a_3 = \frac{\pi}{3}, a_4 = \frac{\pi}{4}, \dots, a_{10000} = \frac{\pi}{10000}, \dots$

នោះ $\pi = a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots \Rightarrow a_n \leq \pi$

នោះ $M = \pi$ ជាចំនួនទាស់លើ

ម្យ៉ាងទៀត កាលណា $n \rightarrow \infty$ នោះ $a_n = \frac{\pi}{n} \rightarrow 0$

$\Rightarrow m = 0$ ជាចំនួនទាស់ក្រោម

យើងបាន $0 \leq a_n \leq \pi$

ដូចនេះ ស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{\pi}{n}$ ជាស្វ៊ីតទាស់ ដែលមាន $M = \pi$ ជា

ចំនួនទាស់លើ និង $m = 0$ ជាចំនួនទាស់ក្រោម។

គ. យើងមាន $a_n = \frac{3^n}{n}$

យើងបាន $a_1 = 3$, $a_2 = \frac{9}{2}$, $a_3 = 9$, $a_4 = \frac{81}{4}$, ...

នោះ $3 = a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots \Rightarrow a_n \geq 3$

$\Rightarrow m = 3$ ជាចំនួនទាល់ក្រោម

ម្យ៉ាងទៀត បើ $n \rightarrow \infty$ នោះ $a_n = \frac{3^n}{n}$ មានតម្លៃធំមិនកំណត់បាន (∞)

នោះ (a_n) គ្មានចំនួនទាល់លើទេ

ដូចនេះ ស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{3^n}{n}$ ជាស្ដីតទាល់ក្រោម ដែលមាន $m = 3$
ជាចំនួនទាល់ក្រោម។

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. បង្ហាញថា ស្ដីពី (a_n) ដែល $a_n = \frac{20n}{2n+1}$ ជាស្ដីតទាល់។

២. រកគោលក្រោមនៃស្ដីពី (a_n) ដែល $a_n = \frac{e^n}{n}$

៣. តើបណ្តាស្ដីតខាងក្រោម ជាស្ដីតទាល់ឬទេ ?

ក. ស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n^2 - 1}{n}$

ខ. ស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} - n}$, $n \in \mathbb{N}$

គ. ស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n+1}{n+3}$

ឃ. ស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

៤. បង្ហាញថា ស្ដីពី (a_n) ដែល $a_n = \sqrt{n^4 + n^2} - n^2$ ជាស្ដីតទាល់។

៥. រកគោលលើនៃស្ដីពី $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{2n}{n+3}$ រួចបង្ហាញថា (a_n) ជា
ស្ដីតទាល់។

ចំណាំ : បើ $n \rightarrow \infty$ នោះយើងបាន ៖

$$\Rightarrow \frac{A}{n^p} \rightarrow 0 \text{ ដែល } A, p \text{ ជាចំនួនថេរ និង } p > 0$$

$$\text{គេសរសេរ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{n^p} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{An}{B} \rightarrow \infty, \frac{e^n}{n^p} \rightarrow 0 \text{ ដែល } A, B, p \text{ ជាចំនួនថេរ, } p > 0$$

$$\Rightarrow \frac{\text{មួយចំនួន}}{\infty} = 0 \text{ ហើយ } \frac{\infty}{\text{មួយចំនួន}} = \infty \quad \forall$$

$\Rightarrow$ បើ $a_n = \frac{f(n)}{g(n)}$ ដែល $f(n)$ និង $g(n)$ ជាអនុគមន៍ពហុធា កាលណា $n \rightarrow \infty$ នោះយើងយកតែតួនៃ $f(n)$ និង $g(n)$ ដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ រួចសម្រួល ។

$$\text{ឧទាហរណ៍ : } a_n = \frac{n^2 + 2n + 9}{2n^2 + n - 1}$$

$$\text{បើ } n \rightarrow \infty \text{ នោះ } a_n \rightarrow \frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ឧទាហរណ៍ : } a_n = \frac{3n - 5}{2n^2 + n + 1}$$

$$\text{បើ } n \rightarrow \infty \text{ នោះ } a_n \rightarrow \frac{3n}{2n^2} = \frac{3}{2n} \rightarrow 0$$

$$\text{ឧទាហរណ៍ : } a_n = \frac{2n^2 + n - 5}{n - 4}$$

$$\text{បើ } n \rightarrow \infty \text{ នោះ } a_n \rightarrow \frac{2n^2}{n} = 2n \rightarrow \infty$$

លំហាត់

១. សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម :

ក. $5, 10, 15, 20, \dots$

ខ. $1, 5, 14, 30, 55, \dots$

គ. $3, 4, 7, 11, 18, 29, \dots$

ឃ. $2, 6, 12, 20, 30, 42, \dots$

២. សរសេរតួស្វ៊ីតរាប់អស់ដូចខាងក្រោម :

ក. $a_n = 3^n - n^2$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 4$

ខ. $a_n = \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ ចំពោះ $1 \leq n < 6$

៣. សរសេរប្រាំតួដំបូងនៃស្វ៊ីតនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. $a_n = n^2 + n$

ខ. $a_1 = 2, a_n = 2 + 3a_{n+1}$

គ. $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

ឃ. $a_1 = 0, a_2 = 1, a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}$

៤. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម :

ក. $2, 3, 4, 5, 6, \dots$

ខ. $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$

គ. $2, 0, 2, 0, 2, 0, \dots$

ឃ. $\frac{1}{3}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \frac{1}{24}, \dots$

ង. $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \dots$

ច. $\frac{3}{4}, \frac{4}{9}, \frac{5}{16}, \frac{6}{25}, \dots$

៥. បង្ហាញថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n+2}$ ជាស្វ៊ីតចុះ ។

៦. បង្ហាញថាស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

៧. រកតម្លៃ α ដើម្បីឱ្យស្វ៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{n+\alpha}{n+1}$ ជាស្វ៊ីតកើន ។

៨. គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = 2n^2 + 1$ ។

ក. សរសេរបួនតូចបង្អស់នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ខ. តើតួទីប៉ុន្មានដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 883 ?

៩. គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលមាន $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_3 = 12$ និង

$a_n = xn^2 + yn + z$ ដែល x , y និង z ជាចំនួនពិត។ រកតម្លៃ x , y និង z ។

១០. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម :

ក. $a_n = \frac{2n+5}{n+1}$

ខ. $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$

គ. $a_n = 2^n \cdot 5^{n-1}$

ឃ. $a_1 = 4$ និង $a_n = a_{n-1} - 3$ ។

១១. រកគោលក្រោម និងគោលលើនៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{8n}{2n+3}$

រួចបង្ហាញថា (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ ។



ស្វ៊ីតនព្វន្ត

១. និយមន័យនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ដែលតួនីមួយៗ(ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹង តួមុនបន្ទាប់ បូកនឹង ចំនួនថេរ d មួយហៅថាផលសងរួម ។

$$d = u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = \dots = u_n - u_{n-1}$$

ឧទាហរណ៍: គេឱ្យ $(u_n): 3, 6, 9, 12, \dots$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត។ ចូរគណនាផលសងរួម d ។

ចម្លើយ $d = 6 - 3 = 3$

លំហាត់គំរូ : រកផលសងរួមនៃស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី១០០ ស្មើនឹង១៣៥ និង តួទី១០១ ស្មើនឹង ១៤០ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $u_{100} = 135$ និង $u_{101} = 140$

យើងបាន $d = u_{101} - u_{100} = 140 - 135 = 5$

២. តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

បើ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ដែលមានតួនីមួយៗ u_1 និងមានផលសងរួម d នោះតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះគឺ $u_n = u_1 + (n-1)d$ ។

សម្រាយ (តាមលំដាប់)

យើងមាន $d = u_n - u_{n-1} \Leftrightarrow u_n = u_{n-1} + d$

យើងបាន: $u_2 = u_1 + d = u_1 + (2-1)d$

$$u_3 = u_2 + d = (u_1 + d) + d = u_1 + 2d = u_1 + (3-1)d$$

$$u_4 = u_3 + d = (u_1 + 2d) + d = u_1 + 3d = u_1 + (4-1)d$$

$$u_5 = u_4 + d = (u_1 + 3d) + d = u_1 + 4d = u_1 + (5-1)d$$

.....
.....
.....

$$\Rightarrow u_n = u_1 + (n-1)d$$

សម្រាយ(តាមអនុមាត្ររូបគណិតវិទ្យា ឬ វិមាត្រកំណើន)

ស្រាយថា $u_n = u_1 + (n-1)d$

យើងមាន $u_n = u_{n-1} + d$ (*)

បើ $n = 2$ នោះ $u_2 = u_1 + d = u_1 + (2-1)d$ ពិត

ឧបមាថា(*)ពិតដល់ $n = k$ នោះ $u_k = u_1 + (k-1)d$

យើងនឹងស្រាយថា(*)ពិតដល់ $n = k+1$

យើងបាន $u_{k+1} = u_k + d$

$$= u_1 + (k-1)d + d$$

$$= u_1 + [(k+1)-1]d \text{ ពិត}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វីតេពន្លឺ $u_n = u_1 + (n-1)d$

លំហាត់គំរូទី១ : គេមានស្វីតេពន្លឺ 5,10,15,20,25,... ។

ក. គណនាតួទី 50 នៃស្វីតេ ។

ខ. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វីតេនេះ ។

គ. តើចំនួន 555 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីតេ ?

បំណែកស្រាយ

ក. គណនាតួទី 50 នៃស្វ៊ីត

យើងមានស្វ៊ីត

នោះ ផលសង្កម $d = 10 - 5 = 5$

$$\begin{aligned}\Rightarrow u_{50} &= u_1 + (50-1)d \\ &= 5 + (50-1) \cdot 5 \\ &= 250\end{aligned}$$

ដូចនេះ $u_{50} = 250$ ខ. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ

$$\begin{aligned}u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= 5 + (n-1) \cdot 5 \\ &= 5 + 5n - 5 \\ &= 5n\end{aligned}$$

ដូចនេះ $u_n = 5n$

គ. រកតួដែលត្រូវនឹងចំនួន 555

តាង n ចំនួនតួ ដែល $u_n = 555$ តែ $u_n = 5n$ យើងបាន $5n = 555$

$$\Rightarrow n = \frac{555}{5} = 111$$

ដូចនេះ ចំនួន 555 ត្រូវនឹងតួទី 111

លំហាត់គំរូទី២ : គេមានស្រទាប់ពន្លឺ 5,12,19,26,... ។

ក. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្រទាប់នេះ ។

ខ. តើចំនួន 14089 តួទីប៉ុន្មាននៃស្រទាប់នេះ ?

ចំណោះស្រាយ

ក. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្រទាប់នេះ

$$\text{យើងមាន } d = 12 - 5 = 7$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= 5 + (n-1) \cdot 7 \\ &= 5 + 7n - 7 \\ &= 7n - 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $u_n = 7n - 2$

ខ. រកតួដែលត្រូវនឹងចំនួន 14089

$$\text{តាង } n \text{ ជាចំនួនតួដែល } u_n = 14089$$

$$\text{តែ } u_n = 7n - 2$$

$$\text{យើងបាន } 7n - 2 = 14089$$

$$7n = 14091$$

$$\Rightarrow n = 2013$$

ដូចនេះ ចំនួន 14089 តួទី 2013

លំហាត់គំរូទី៣ : កំណត់ចំនួនតួនៃស្រទាប់ពន្លឺខាងក្រោម ។

ក. 3,11,19,...,9867

ខ. 2000,1985,1970,...,5

គ. 6,11,16, 21, ...,11111

ឃ. 3, 9, 15, 21, ...,597

បំណែកស្រាយ

ក. 3,11,19,...,9867

យើងមាន $d = 11 - 3 = 8$ តាង n ជាចំនួនតួ ដែល $u_n = 9867$ ដោយ $u_n = u_1 + (n-1)d$

$$= 3 + (n-1) \cdot 8$$

$$= 8n - 5$$

យើងបាន $u_n = 9867 \Leftrightarrow 8n - 5 = 9867$

$$\Leftrightarrow 8n = 9872$$

$$\Rightarrow n = 1234$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីតនព្វន្ត 3,11,19,...,9867 មាន 1234 តួ

ខ. 2000,1985,1970,...,5

យើងមាន $d = 1985 - 2000 = -15$ តាង n ជាចំនួនតួ ដែល $u_n = 5$ តែ $u_n = u_1 + (n-1)d$

$$= 2000 + (n-1) \cdot (-15)$$

$$= 2015 - 15n$$

យើងបាន $2015 - 15n = 5$

$$15n = 2010$$

$$n = 134$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីតនព្វន្ត 2000,1985,1970,...,5 មាន 134 តួ

គ. 2222 តួ

ឃ. 100 តួ

លំហាត់គំរូទី៤ : ស្វ៊ីតនិរន្តរៈមួយមានតួទីមួយស្មើ -20 និងផលសង្ខេបស្មើ 3 ។

ក. គណនាតួទី១០នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ខ. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ

គ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតនេះ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 310 ?

ចំណោះស្រាយ

ក. គណនាតួទី១០នៃស្វ៊ីតនេះ

យើងមាន តួទីមួយ $u_1 = -20$ និង ផលសង្ខេប $d = 3$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន តួទី១០: } u_{10} &= u_1 + (10-1)d \\ &= -20 + 9 \cdot 3 \\ &= 7\end{aligned}$$

ដូចនេះ តួទី១០នៃស្វ៊ីតនេះគឺ $u_{10} = 7$

ខ. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ

$$\begin{aligned}u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= -20 + (n-1) \cdot 3 \\ &= 3n - 23\end{aligned}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះគឺ $u_n = 3n - 23$

គ. រកតួដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 310 ?

តាង n ជាចំនួនតួ ដែល $u_n = 310$

តែ $u_n = 3n - 23$

យើងបាន $3n - 23 = 310$

$$3n = 333$$

$$n = 111$$

ដូចនេះ តួទី 111 មានតម្លៃស្មើនឹង 310

លំហាត់គំរូទី៥: រកតួទូទៅ (u_n) និង តួទីដប់ (u_{10}) នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ខាងក្រោម:

ក. $1, 7, 13, \dots$

ខ. $6, \frac{11}{2}, 5, \dots$

ចំណោះស្រាយ

ក. $1, 7, 13, \dots$

យើងមាន $d = 7 - 1 = 6$

យើងបាន
$$\begin{aligned} u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= 1 + (n-1) \cdot 6 \\ &= 6n - 5 \end{aligned}$$

ដូចនេះ តួទី n គឺ
$$u_n = 6n - 5$$

តួទី១០ : $u_{10} = 6 \cdot 10 - 5 = 55$

ខ. $6, \frac{11}{2}, 5, \dots$

យើងមាន $d = \frac{11}{2} - 6 = -\frac{1}{2}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= 6 + (n-1) \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{12 - n + 1}{2} \\ &= \frac{13 - n}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$u_n = \frac{13 - n}{2}$$

តួទី១០ : $u_{10} = \frac{13 - 10}{2} = \frac{3}{2}$

លំហាត់គំរូទី៦ : គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង:

$$\begin{cases} a_1 = 7 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \end{cases}, n \in \mathbb{N} \text{ ។}$$

ក. កំណត់ a_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ខ. គណនា a_{13} , a_{19} និង a_{100} ។

គ. គណនា p បើ $a_p = 154$ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. កំណត់ a_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ជាអនុគមន៍នៃ n

យើងមាន $a_{n+1} = a_n + 3 \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n = 3$ (ជាចំនួនថេរ)

នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតស្រទាប់ដែលមានផលសង្ខេប $d = 3$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } a_n &= a_1 + (n-1)d \\ &= 7 + (n-1) \cdot 3 \\ &= 3n + 4 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $a_n = 3n + 4$

ខ. គណនា a_{13} , a_{19} និង a_{100}

យើងមាន $a_n = 3n + 4$

- $a_{13} = 3 \cdot 13 + 4 = 43$
- $a_{19} = 3 \cdot 19 + 4 = 61$
- $a_{100} = 3 \cdot 100 + 4 = 604$

ដូចនេះ $a_{13} = 43, a_{19} = 61, a_{100} = 604$

គ. គណនា p

យើងមាន $a_n = 3n + 4$ នោះ $a_p = 3p + 4$

តែ $a_p = 154$

$$\text{យើងបាន} \quad 3p + 4 = 154$$

$$3p = 150$$

$$p = 50$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad \boxed{p = 50}$$

☞ **ចំណាំ:** បើយើងដឹង u_p ($p \in \mathbb{N}$) នោះយើងអាចគណនា u_n បានគឺ:

$$\boxed{u_n = u_p + (n - p)d}$$

សម្រាយ

$$\text{យើងមាន} \quad u_n = u_1 + (n - 1)d \quad (1)$$

$$\text{នោះ} \quad u_p = u_1 + (p - 1)d \quad (2)$$

$$\text{យកក (1) - (2) យើងបាន } u_n - u_p = (n - p)d$$

$$\Rightarrow u_n = u_p + (n - p)d$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad \boxed{u_n = u_p + (n - p)d} \quad \text{នោះ} \quad \boxed{d = \frac{u_n - u_p}{n - p}}$$

លំហាត់គំរូទី៧ : គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត។ បើគេដឹងថា $u_{35} = 9, u_{45} = 17$ ។

គណនា u_{40} ។

ចំណោះស្រាយ

$$\text{យើងមាន } u_{35} = 9, u_{45} = 17$$

$$\text{ដោយ } (u_n) \text{ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តយើងបាន } u_{45} = u_{35} + (45 - 35)d$$

$$\Rightarrow d = \frac{u_{45} - u_{35}}{45 - 35} = \frac{17 - 9}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\text{យើងបាន } u_{40} = u_{35} + (40 - 35) \cdot \frac{4}{5}$$

$$= 9 + 5 \cdot \frac{4}{5}$$

$$= 13$$

ដូចនេះ $u_{40} = 13$

របៀបទី២: ដោយ (u_n) ជាស្វ៊ីតពន្លឺនោះ $u_{40} = \frac{u_{35} + u_{45}}{2} = \frac{9 + 17}{2} = 13$

លំហាត់អនុវត្ត

១. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតពន្លឺដែលកំណត់ដោយ $u_8 - u_5 = 30$ ។

គណនាផលសងរួម d នៃស្វ៊ីតនេះ ។

២. រកតួទី n នៃស្វ៊ីតពន្លឺដែល $u_3 = 4$ និង $u_7 = -24$ ។

៣. គេឱ្យស្វ៊ីតពន្លឺ: $3, 2\frac{1}{2}, 2, -6$ ។

ក. រក u_1 និង d

ខ. តើស្វ៊ីតនេះ មានប៉ុន្មានតួ ?

៤. គេឱ្យស្វ៊ីត (u_n) ដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង: $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 7 \\ u_1 = 5 \end{cases}, n \in \mathbb{N}$ ។

ចូរគណនា u_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីត។

៣. ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតពន្លឺ

ក. ផលបូកស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ផលបូកស្មើចម្ងាយពីតួចុង ស្មើនឹងផលបូកតួចុងទាំងពីរ ។

គេកំណត់សរសេរ $u_1 + u_n = u_p + u_{n-p+1}$

ឬ បើ $m + n = p + k$ នោះ $u_m + u_n = u_p + u_k$ ។

សម្គាល់ :➤ បើគេមានស្វ៊ីតនព្វន្ឋ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6$

$$\text{នោះ } u_1 + u_6 = u_2 + u_5 = u_3 + u_4$$

➤ បើ u_1, u_2, u_3 ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋ នោះ $2u_2 = u_1 + u_3$ ➤ បើ u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋ

$$\text{នោះ } u_1 + u_5 = u_2 + u_4 = 2u_3$$

➤ បើ $m+n=2p$ ឬ $p = \frac{m+n}{2}$ នោះ $u_p = \frac{u_m + u_n}{2}$

លំហាត់គំរូទី១ : រកបីចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋ ដោយដឹងថាផលបូកតួនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 30 ហើយផលគុណវាស្មើនឹង 910 ។

ចំណោះស្រាយ

រកបីចំនួននោះ

តាង u_1, u_2, u_3 ជាបីចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋនោះ

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 30 & (1) \\ u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 = 910 & (2) \end{cases} \quad (\text{សន្មតយក } u_1 < u_2 < u_3)$$

តែ u_1, u_2, u_3 ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋនោះ $u_1 + u_3 = 2u_2$ (3)តាម (1) និង (3) យើងបាន $3u_2 = 30 \Rightarrow u_2 = 10$

$$\text{យក } u_2 = 10 \text{ ជំនួសក្នុង (1) និង (2) យើងបាន } \begin{cases} u_1 + u_3 = 20 \\ u_1 \cdot u_3 = 91 \end{cases}$$

នោះ u_1 និង u_3 ជាឫសនៃសមីការ $U^2 - 20U + 91 = 0$

$$U^2 - 20U + 91 = 0$$

$$\Delta' = 100 - 91 = 9 = 3^2$$

$$U = 10 - 3 = 7, \quad U' = 10 + 3 = 13$$

នោះ $u_1 = 7, u_3 = 13$ ដូចនេះ បីចំនួននោះ គឺ

7, 10, 13

លំហាត់គំរូទី២ : គេឱ្យ (u_n) ជាស្វីតពន្លឺដែល $u_7 = 25$ និង $u_{103} = 313$ ។
គណនា u_{55} ។

ចំណោះស្រាយ

គណនា u_{55}

$$\text{ដោយ } 55 = \frac{7+103}{2} \quad \text{នោះ } u_{55} = \frac{u_7 + u_{103}}{2} = \frac{25+313}{2} = 169$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{u_{55} = 169}$$

➤ ករណីទី២ស្រេច :

បីចំនួន a, b, c ជាបីតួគត្នានៃស្វីតពន្លឺកាលណា $2b = a + c$ ឬ $b = \frac{a+c}{2}$
 b ហៅថា មធ្យមនព្វន្ឋ នៃ a និង c ។

ឬចនេះ បើប្រើបង្ហាញថា បីចំនួនគត្នា a, b, c ជាស្វីតពន្លឺ យើងត្រូវ

$$\text{បង្ហាញ } 2b = a + c \text{ ឬ } b = \frac{a+c}{2}$$

លំហាត់គំរូទី៣ : បង្ហាញថា $\frac{a}{a-1}, \frac{3a-2}{a^2-1}, \frac{4-a}{a+1}$ ជាបីតួគត្នានៃស្វីតពន្លឺ។

ចំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } \frac{a}{a-1} + \frac{4-a}{a+1} &= \frac{a(a+1) + (4-a)(a-1)}{(a-1)(a+1)} \\ &= \frac{a^2 + a + 4a - 4 - a^2 + a}{a^2 - 1} \\ &= \frac{6a - 4}{a^2 - 1} = 2 \left(\frac{3a - 2}{a^2 - 1} \right) \end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } 2 \left(\frac{3a - 2}{a^2 - 1} \right) = \frac{a}{a-1} + \frac{4-a}{a+1}$$

$$\text{ដូចនេះ } \frac{a}{a-1}, \frac{3a-2}{a^2-1}, \frac{4-a}{a+1} \text{ ជាបីតួគត្នានៃស្វីតពន្លឺ}$$

លំហាត់អនុវត្ត

១. រកបីចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 30 និងផលគុណវា ស្មើនឹង 910 ។
២. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $u_{15} = 71, u_{2015} = 8071$ ។ គណនា u_{1015} ។
៣. . គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមាន $u_7 = 25$ និង $u_{103} = 313$ ។ គណនា u_{55} ។
៤. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមាន $u_{35} = 9$ និង $u_{45} = 17$ ។ គណនា u_{40} ។
៥. រកបីតួបន្តបន្ទាប់គ្នា នៃស្វ៊ីតនព្វន្តមួយ ដោយដឹងថាផលបូករបស់វាស្មើនឹង 3 និង ផលគុណរបស់វាស្មើនឹង -15 ។
៦. បង្ហាញថា ចំនួនខាងក្រោមជាស្វ៊ីតនព្វន្ត
 - ក. $\frac{1}{x+1}, \frac{x}{x^2-1}, \frac{1}{x-1}$
 - ខ. $(a^2+b^2)^2, a^4+b^4, (a^2-b^2)^2$
 - គ. $\frac{4}{x-1}, \frac{6x}{x^3-1}, \frac{4-4x}{x^2+x+1}$
 - ឃ. $(a^2-2ab-b)^2, (a^2+b^2)^2, (a^2+ab-b^2)^2$
៧. បើ $\frac{1}{a+b}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{b+c}$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត បង្ហាញថា a^2, b^2, c^2 ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។
៨. បើ a, b, c ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ បង្ហាញថា a^2-bc, b^2-ac, c^2-ab ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។
៩. បើ a, b, c ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត បង្ហាញថា a^2+ab+b^2, a^2+ac+c^2 និង b^2+bc+c^2 ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។

ខ. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតពន្លឺ

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតពន្លឺដែលមាន u_1 ជាតួទី១ និង u_n ជាតួទី n គឺ $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ ឬ $S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់

តាង S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតពន្លឺ

$$\text{យើងបាន} \quad S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{n-2} + u_{n-1} + u_n \quad (1)$$

$$\text{ឬ} \quad S_n = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} + \dots + u_3 + u_2 + u_1 \quad (2)$$

(1) + (2) យើងបាន:

$$2S_n = (u_1 + u_n) + (u_2 + u_{n-1}) + \dots + (u_{n-1} + u_2) + (u_n + u_1)$$

$$\text{តែ } u_1 + u_n = u_2 + u_{n-1} = \dots = u_{n-1} + u_2 = u_n + u_1$$

(តាមផលបូកស្មើគ្នាទៅនឹងតួចុង)

យើងបាន:

$$2S_n = (u_1 + u_n) + (u_1 + u_n) + \dots + (u_1 + u_n) + (u_1 + u_n) = n(u_1 + u_n)$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) \text{ ហើយ ដោយ } u_n = u_1 + (n-1)d$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]}$$

Note : $S_1 = u_1$, $S_2 = u_1 + u_2$, $S_3 = u_1 + u_2 + u_3$

$$S_{n-1} = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} \text{ ហើយ } S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

នោះ $S_n - S_{n-1} = u_n$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{u_n = S_n - S_{n-1}}$$

លំហាត់គំរូទី១: គណនាផលបូក 12 តួដំបូងនៃស្រ្តីតនព្វន្ត 5, 12, 19, 26, ...

ចំណោះស្រាយ

គណនាផលបូក 12 តួដំបូងនៃស្រ្តីតនព្វន្ត 5, 12, 19, 26, ...

យើងមាន $d = 12 - 5 = 7$

ហើយ $u_1 = 5 \Rightarrow u_{12} = u_1 + (12 - 1)d = 5 + 11 \cdot 7 = 82$

តាមរូបមន្ត $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$

យើងបាន $S_{12} = \frac{12}{2}(u_1 + u_{12})$
 $= \frac{12}{2}(5 + 82)$
 $= 522$

ដូចនេះ $S_{12} = 522$

របៀបម្យ៉ាងទៀត

យើងមាន $d = 12 - 5 = 7$

តាមរូបមន្ត $S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n - 1)d]$

យើងបាន $S_{12} = \frac{12}{2}[2u_1 + (12 - 1)d]$
 $= 6(2 \cdot 5 + 11 \cdot 7)$
 $= 6(10 + 77)$
 $= 552$

លំហាត់គំរូទី២: គណនាផលបូក $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \dots + 64$

ចំណោះស្រាយ

តាង $S_n = (-6) + (-1) + 4 + 9 + \dots + 64$

រកចំនួនតួនៃផលបូលតួស្ដីតនេះ (ស៊េរី)

តាង n ជាចំនួនតួ ដែល $u_n = 64$

យើងមាន $d = (-1) - (-6) = 5$

$$\begin{aligned}\text{នោះ } u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= -6 + (n-1) \cdot 5 \\ &= 5n - 11\end{aligned}$$

យើងបាន $5n - 11 = 64$

$$5n = 75$$

$$n = 15$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } S_{15} &= \frac{15}{2}(u_1 + u_{15}) \\ &= \frac{15}{2}(-6 + 64) \\ &= 435\end{aligned}$$

ដូចនេះ $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \cdots + 64 = 435$

លំហាត់គំរូទី៣ : គណនា $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1)$

ចំណោះស្រាយ

តាង $S_n = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1)$

ដោយស្ដីត $1, 3, 5, 7, \dots, (2n-1)$ ជាស្ដីតនព្វន្តដែលមាន $d = 3 - 1 = 2$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } S_n &= \frac{n}{2}(u_1 + u_n) \\ &= \frac{n}{2}[1 + (2n-1)] \\ &= n^2\end{aligned}$$

ដូចនេះ $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1) = n^2$

លំហាត់គំរូទី៤ : គណនាផលបូក 25 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 9, 16, 25, \dots$

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $d = 9 - 2 = 7$ ហើយ $u_1 = 2$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } S_{25} &= \frac{25}{2} [2u_1 + (25-1)d] \\ &= \frac{25}{2} (2 \cdot 2 + 24 \cdot 7) \\ &= 2150 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $S_{25} = 2150$

លំហាត់គំរូទី៥ : គេមានការងាររដូវក្ដៅ២ សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ

ឬ ១២សប្តាហ៍។ ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 325000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង 100000 រៀល រៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 80000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយដំឡើង 3000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍។

តើគេគួរប្រើសេរីសយកការងារណាប្រសើរជាង ?

ចំណោះស្រាយ

➤ ចំពោះការងារ A ប្រាក់បៀវត្សគឺ

$$\begin{aligned} S_A &= 325000 + (325000 + 100000) + (325000 + 100000 + 100000) \\ &= 325000 + 425000 + 525000 \\ &= 1275000 \text{ រៀល} \end{aligned}$$

➤ ចំពោះការងារ B ប្រាក់បៀវត្សគឺ 80000, (80000 + 3000),

(80000 + 3000 + 3000), ... ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមាន $u_1 = 80000$

និងផលសងរួម $d = 3000$

$$\begin{aligned} \text{នោះប្រាក់បៀវត្សនៅ១២ សប្តាហ៍គឺ } S_B &= \frac{12}{2} [2u_1 + (12-1)d] \\ &= 6(2 \cdot 80000 + 11 \cdot 3000) \\ &= 1158000 \text{ រៀល} \end{aligned}$$

ដោយ $S_A = 1275000$ រៀល $> S_B = 1158000$ រៀល

ដូចនេះ គេគួរជ្រើសរើសការងារ A ប្រសើរជាង

លំហាត់គំរូទី៦ : គេមានស្វ័យគុណ 51, 47, 43, ... ។ កំណត់ចំនួនគូ (n)
ដើម្បីឱ្យផលបូក n តួដំបូង(S_n) មានតម្លៃអតិបរមា និង កំណត់ S_n ។

ចំណោះស្រាយ

កំណត់ចំនួនគូ

តាង u_n ជាតួទូទៅនៃស្វ័យគុណនេះ

ដោយ $d = 47 - 51 = -4$ ហើយ $u_1 = 51$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } u_n &= u_1 + (n-1)d \\ &= 51 + (n-1)(-4) \end{aligned}$$

$$u_n = 55 - 4n$$

ផលបូក n តួដំបូងមានតម្លៃអតិបរមា កាលណា $u_n \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

យើងបាន $55 - 4n \geq 0$

$$\Rightarrow n \leq \frac{55}{4} = 13.75, n \in \mathbb{N}$$

នោះយើងទាញបាន S_n មានតម្លៃអតិបរមា កាលណា $n = 13$

គណនា S_{13}

$$\text{យើងមាន } u_n = 55 - 4n \Rightarrow u_{13} = 55 - 4 \cdot 13 = 3$$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } S_{13} &= \frac{13}{2}(u_1 + u_{13}) \\
 &= \frac{13}{2}(51 + 3) \\
 &= 351
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ ផលបូក n តួដំបូង (S_n) មានតម្លៃអតិបរមាកាលណា $n=13$

$$\text{ហើយ } S_{13} = 351$$

លំហាត់គំរូទី៧ : កំណត់តម្លៃ n ដើម្បីឱ្យផលបូក n តួដំបូង (S_n) នៃស្វ៊ីតនព្វន្តៈ $-28, -25, -22, \dots$ មានតម្លៃអប្បបរមា រួចគណនាតម្លៃអប្បបរមានោះ។

ចំណោះស្រាយ

តាង u_n ជាតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$\text{ដោយ } d = (-25) - (-28) = 3 \text{ ហើយ } u_1 = -28$$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } u_n &= u_1 + (n-1)d \\
 &= -28 + (n-1) \cdot 3 \\
 &= 3n - 31
 \end{aligned}$$

S_n មានតម្លៃអប្បបរមាកាលណា $u_n \leq 0$

$$\text{យើងបាន } 3n - 31 \leq 0$$

$$\Rightarrow n \leq \frac{31}{3} = 10.33$$

នោះ យើងទាញបាន $n=13$

$$\begin{aligned}
 S_{10} &= \frac{10}{2}[2u_1 + (10-1)d] \\
 &= 5[2 \cdot (-28) + 9 \cdot 3] \\
 &= -145
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{n=10, S_{10} = -145}$$

លំហាត់អនុវត្ត

១. គេឱ្យស្វីតពន្លា $5, 12, 19, 26, \dots$

ក. គណនា តួទី 16 ។

ខ. គណនាផលបូក 16 តួដំបូងនៃស្វីតនេះ ។

២. គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស្វីតពន្លា $12, 9, 6, \dots$ ។

៣. គណនាផលបូកនៃស្វីតពន្លាខាងក្រោម៖

ក. $2 + 6 + 10 + 14 + \dots + 122$

ខ. $100 + 95 + 90 + 85 + \dots + (-20)$

គ. $4 + 10 + 16 + 22 + \dots + 334$

៤. គណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្វីតពន្លា $7, 3, -1, -5, \dots$

៥. កំណត់ចំនួនតួនៃស្វីតពន្លាខាងក្រោម រួចគណនាផលបូកតួនៃស្វីតនេះ

ក. $5, 8, 11, 14, \dots, 62$

ខ. $1, 6, 11, 16, \dots, 506$

គ. $-193, -189, -185, \dots, -17$

ឃ. $2\frac{1}{4}, 2\frac{17}{20}, 3\frac{9}{20}, \dots, 20\frac{1}{4}, 20\frac{17}{20}$

៦. កំណត់តួទី១ និងផលសងរួមនៃស្វីតពន្លាមួយ ដោយដឹងថាផលបូក n តួ

ដំបូងស្មើនឹង $\frac{n^2}{2}$ ។

៧. គណនាផលបូក 10 តួដំបូងនៃស្វីតពន្លា $17, 14, 11, 8, 5, \dots$ រួចកំណត់

ចំនួនតួដើម្បីឱ្យផលបូកនៃស្វីតនេះមានតម្លៃអតិបរមា (ធំបំផុត) ។

គណនាតម្លៃអតិបរមានៃ S_n ។

៨. គេមានស្វីតពន្លា $85, 73, 61, 49, \dots$ ។ កំណត់ចំនួនតួ (n) ដើម្បីឱ្យ

ផលបូក n តួដំបូងមានតម្លៃអតិបរមា រួចគណនាតម្លៃអតិបរមានៃ S_n ។

លំហាត់

១. សរសេររូបមន្តតួទី n រួចគណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋខាងក្រោម :

ក. $1, 5, 9, \dots$

ខ. $50, 48, 46, \dots$

គ. $-7, -3, 1, \dots$

២. គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ឋ $-8, -3, 2, 7, \dots$ ។

ក. គណនា u_{17} និង u_{43} ។

ខ. តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតដែលស្មើនឹង 322?

៣. កំណត់ចំនួនតួ រួច គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋខាងក្រោម :

ក. $18, 13, 8, \dots, -102$

ខ. $-9, -4, 1, \dots, 171$

គ. $105, 110, 115, \dots, 995$

ឃ. $1, 6, 11, 16, \dots, 506$

៤. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋ បើគេដឹងថា

ក. $u_7 = \frac{7}{2}$ និង $u_{13} = \frac{13}{2}$ ។ ចូរគណនា u_2 ។

ខ. $u_2 = -12$ និង $S_{12} = 18$ ។ គណនា u_1, d និង u_6 ។

៥. គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋ ។ គណនាចំនួនទាំងនោះ បើគេដឹងថា ផលបូកស្មើនឹង 125 ហើយផលបូកពីរតួដំបូងស្មើនឹង 38 ។

៦. ផលបូក 9 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋស្មើនឹង 162 ហើយផលបូក 12 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋស្មើនឹង 288 ។ គណនាផលបូក 30 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋ ។

៧. រកបីចំនួនតភ្ជាប់នៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋមួយដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 36 និង ផលគុណវាស្មើនឹង 1428 ។

៨. គេឱ្យស្ថិតន្តមួយដែលមានតួទីបីស្មើ 18 និង តួទី17 ស្មើ 30 ។

គណនាផលបូក 33 តួដំបូងនៃស្ថិតនេះ ។

៩. គេឱ្យស្ថិតន្តមួយមាន $u_4 = 15$ និង $S_5 = 55$ ។ គណនា u_1 និង d ។

១០. ស្ថិតន្តមួយមាន $u_{13} = 6u_2$ និង $S_{15} = 615$ ។ គណនា u_1 និង d ។

១១. ស្ថិតន្តមួយមានតួទី៣ស្មើនឹង -20 និង តួទី១១ស្មើនឹង 20 ។

គណនាផលបូក 13 តួដំបូងនៃស្ថិតនេះ ។

១២. គេឱ្យបីចំនួនបង្កើតបានជាស្ថិតន្តមួយ ។ ផលបូកនៃចំនួនទាំងបីនេះស្មើនឹង 18 ហើយផលបូកនៃការេរបស់វាស្មើនឹង 206 ។

រកចំនួនទាំងបីនោះ ។

១៣. ផលបូកបីតួនៃស្ថិតន្តស្មើ 33 ហើយផលគុណរបស់វាស្មើ 1287 ។

រកចំនួនទាំងបីនោះ ។

១៤. តើគេអាចយកប៉ុន្មានតួនៃស្ថិតន្តមួយដែលមានផលសងរួម $d = 3$

ហើយតួទីមួយ $u_1 = 7$ និង ផលបូកតួស្មើ 205 ។

១៥. គេឱ្យស្ថិតន្ត 5, 8, 11, 14, ... ។ តើគេត្រូវបូកប៉ុន្មានតួនៃស្ថិតនេះ

ដើម្បីឱ្យផលបូកមានតម្លៃស្មើនឹង 98 ។

១៦. គេឱ្យ (u_n) ជាស្ថិតន្តដែលមានតួទី $u_1 = 1$ និងផលសងរួម d ។

គណនា d ដើម្បីឱ្យផលបូក 100 តួដំបូងស្មើនឹង 1 ។ តើមានតួណាស្មើនឹងសូន្យ ឬទេ ? បើមានតើនៅតួទីប៉ុន្មាន ?

១៧. នៅក្នុងស្ថិតន្តមួយ គេឱ្យផលបូក $2n$ តួដំបូង ស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃផលបូក $3n$ តួដំបូង ។ ប្រសិនបើតួទី១ ស្មើនឹង 12 និង ផលសងរួមស្មើនឹង 3 ចូរគណនាតម្លៃនៃ n ។

១៨. គេឱ្យស្ថិតន្ត (u_n) មាន $u_3 = -15$ និង $u_{14} = 18$ ។

គណនាផលបូក 20 តួដំបូងនៃស្ថិតនេះ ។

១៩. កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $10-3x$, $2x^2+3$, $7-4x$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។

២០. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $u_1+u_4+u_7+u_{10}+u_{13}+u_{16}=2013$ ។
ចូរគណនា $u_1+u_6+u_{11}+u_{16}$ ។

២១. គណនាតួទី n និង ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត $1, \frac{n-1}{n}, \frac{n-2}{n}, \frac{n-3}{n}, \dots$

២២. បង្ហាញថាស្វ៊ីត (u_n) ដែល $u_n = \frac{2n+3}{5}$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តកើន រួចគណនា S_{10} ។

២៣. គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 7, 12, \dots$ និងស្វ៊ីតនព្វន្ត $2, 5, 8, \dots$ ។

តើក្នុងចំណោម ១២១ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតទាំងពីរនេះ មានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា?

២៤. គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $1, 3, 5, \dots$ និងស្វ៊ីតនព្វន្ត $1, 5, 9, \dots$ ។

តើក្នុងចំណោម ១៥០ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតទាំងពីរនេះ មានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា?

២៥. គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត $1, 4, 7, \dots$ និងស្វ៊ីតនព្វន្ត $1, 5, 11, \dots$ ។

តើក្នុងចំណោម ២០១៣ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតទាំងពីរនេះ មានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា ?

២៦. ស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមាន តួទី១ $u_1 = -23$ និងផលសងរួម $d = 2.5$ ។

កំណត់តម្លៃអប្បបរមានៃ n ដើម្បីឱ្យ $S_n > 0$ ។

២៧. ស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមាន តួទី១ $u_1 = -61$ និងផលសងរួម $d = 4$ ។

កំណត់តម្លៃអប្បបរមានៃ n ដើម្បីឱ្យ $S_n > 0$ ។

២៨. ស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានតួទី១ $u_1 = 10$ និងផលសងរួម $d = 0.25$ ។

រកចំនួនតួតិចបំផុតដែលផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនេះមានតម្លៃលើសពី 300 ។

២៩. ស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានតួទី១ $u_1 = -5$ និងផលសងរួម $d = 1.5$ ។

រកចំនួនតួច្រើនបំផុតដែលផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនេះមានតម្លៃមិនលើសពី 450 ។

មេរៀនទី

៣ ស្ថិតធរណីមាត្រ

១. និយមន័យ

ស្ថិតធរណីមាត្រ គឺជាស្ថិតនៃចំនួនពិត ដែលតួនីមួយៗ(ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់ គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្ថិតធរណីមាត្រ ។

- Note : ឯកសារខ្លះតាង ផលធៀបរួមនៃស្ថិតធរណីមាត្រដោយ r (ratio)
 ➢ ផលធៀបរួមនៃស្ថិតធរណីមាត្រ ($q \neq 0$ ឬ $r \neq 0$)កំណត់ដោយ:

$$q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{u_4}{u_3} = \dots = \frac{u_n}{u_{n-1}}$$

ឧទាហរណ៍ : ស្ថិត(a_n): 2, 4, 8, 16, 32, ... គឺជាស្ថិតធរណីមាត្រដែលមាន

$$\text{ផលធៀបរួម } q = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \frac{16}{8} = 2$$

លំហាត់គំរូ : រកផលធៀបរួមនៃស្ថិតធរណីមាត្រដែលមានតួទី 12 ស្មើនឹង 531441 និង តួទី 13 ស្មើនឹង 1594323 ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $u_{12} = 531441$ និង $u_{13} = 1594323$

$$\text{យើងបាន } q = \frac{1594323}{531441} = 3$$

ដូចនេះ ផលធៀបរួមនៃស្ថិតនេះគឺ $q = 3$

២. តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

បើ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទី១ u_1 និងផលធៀបរួម q
 នោះតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ កំណត់ដោយ $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ ។

សម្រាយ(តាមលំដាប់)

យើងមាន $q = \frac{u_n}{u_{n-1}}$ ឬ $u_n = u_{n-1} \cdot q$ ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$)

យើងបាន $u_2 = u_1 \cdot q = u_1 \cdot q^{2-1}$
 $u_3 = u_2 \cdot q = (u_1 \cdot q) \cdot q = u_1 \cdot q^2 = u_1 \cdot q^{3-1}$
 $u_4 = u_3 \cdot q = (u_1 \cdot q^2) \cdot q = u_1 \cdot q^3 = u_1 \cdot q^{4-1}$

 $\Rightarrow u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

ដូចនេះ $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

សម្រាយតាមអនុមាណាណូមែត្រិកវិទ្យា

ស្រាយថា $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ (*)

យើងមាន $u_n = u_{n-1} \cdot q$

បើ $n = 2$ នោះ $u_2 = u_1 \cdot q = u_1 \cdot q^{2-1}$ ពិត

ឧបមាថា (8) ពិតដល់ $n = k$ នោះ $u_k = u_1 \cdot q^{k-1}$

យើងនឹងស្រាយថា (*) ពិតដល់ $n = k + 1$

$u_{k+1} = u_k \cdot q = u_1 \cdot q^{k-1} \cdot q = u_1 \cdot q^{(k+1)-1}$ ពិត

ដូចនេះ $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

លំហាត់គំរូទី១ : គណនាតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $3, 12, 48, 192, \dots$

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $3, 12, 48, 192, \dots$

$$q = \frac{12}{3} = 4$$

យើងបាន $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot 4^{n-1}$

លំហាត់គំរូទី២ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6, 18, 54, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី៨ ។

ខ. សរសេរ រូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។

គ. តើចំនួន 118098 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត។

ចំណោះស្រាយ

ក. គណនា u_8

យើងមាន $u_1 = 6$ ហើយ $q = \frac{18}{6} = 3$

យើងបាន
$$\begin{aligned} u_8 &= u_1 \cdot q^{8-1} \\ &= 6 \cdot 3^7 \\ &= 13122 \end{aligned}$$

ដូចនេះ តួទី៨ គឺ $u_8 = 13122$

ខ. សរសេរ រូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 \cdot q^{n-1} \\ &= 6 \cdot 3^{n-1} \\ &= 2 \cdot 3^n \end{aligned}$$

ដូចនេះ $u_n = 2 \cdot 3^n$

គ. រកតួដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 118098

តាង n ជាចំនួនតួដែល $u_n = 118098$

តែ $u_n = 2 \cdot 3^n$

យើងបាន $2 \cdot 3^n = 118098$

$$3^n = 59049 = 3^{10}$$

$$\Rightarrow n = 10$$

ដូចនេះ ចំនួន 118098 នៅតួទី 10

លំហាត់គំរូទី៣ : កំណត់ចំនួនតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. 1, 2, 4, 8, ..., 8192

ខ. $20, 10, 5, \frac{5}{2}, \dots, \frac{5}{256}$

ចំណោះស្រាយ

ក. 1, 2, 4, 8, ..., 8192

យើងមាន $q = \frac{2}{1} = 2$

តាង n ជាចំនួនតួ ដែល $u_n = 8192$

តែ $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

$$= 1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

យើងបាន $2^{n-1} = 8192 = 2^{13}$

$$n-1 = 13$$

$$\Rightarrow n = 14$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ 1, 2, 4, 8, ..., 8192 មាន 14 តួ

ខ. $20, 10, 5, \frac{5}{2}, \dots, \frac{5}{256}$

យើងមាន $q = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

តាង n ជាចំនួនតួដែល $u_n = \frac{5}{256}$

តែ $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

$$= 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{20}{2^{n-1}}$$

យើងបាន $\frac{20}{2^{n-1}} = \frac{5}{256}$

$$20 \cdot 256 = 5 \cdot 2^{n-1}$$

$$2^{n-1} = \frac{20 \cdot 256}{5} = 1024 = 2^{10}$$

$$n-1=10$$

$$\Rightarrow n=11$$

ដូចនេះ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $20, 10, 5, \frac{5}{2}, \dots, \frac{5}{256}$ មាន 11 តួ

លំហាត់គំរូទី៤ : គេឱ្យស្វ៊ីត (u_n) កំណត់ដោយ $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n, n \in \mathbb{N} \end{cases}$ ។

ក. កំណត់ u_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ខ. គណនា u_{11} ។

គ. គណនា p បើ $u_p = 20480$ ។

បំណោះស្រាយ

ក. កំណត់ u_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ជាអនុគមន៍នៃ n

យើងមាន $u_{n+1} = 2u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$ (ជាចំនួនថេរ)

នោះ (u_n) ជាស្វ៊ីតឌីផរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម $q = 2$

យើងបាន $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 5 \cdot 2^{n-1}$

ដូចនេះ

$$u_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

ខ. គណនា u_{11}

យើងមាន $u_n = 5 \cdot 2^{n-1}$

$$\Rightarrow u_{11} = 5 \cdot 2^{11-1} = 5 \cdot 1024 = 5120$$

ដូចនេះ

$$u_{11} = 5120$$

គ. គណនា p

យើងមាន $u_n = 5 \cdot 2^{n-1} \Rightarrow u_p = 5 \cdot 2^{p-1}$

តែ $u_p = 20480$

យើងបាន $5 \cdot 2^{p-1} = 20480$

$$2^{p-1} = 4096 = 2^{12}$$

$$p-1=12$$

$$\Rightarrow p=13$$

ដូចនេះ

$$p=13$$

☞ **ចំណាំ**

❶ ដើម្បីបង្ហាញថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ យើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = C \text{ ដែល } C \text{ ជាចំនួនថេរ}$$

❷ បើយើងដឹង u_p ($p \in \mathbb{N}$) នោះយើងអាចគណនា u_n បានគឺ

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$

យើងមាន $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ (1)

នោះ $u_p = u_1 \cdot q^{p-1}$ (2)

ធ្វើផលធៀប (1) និង (2) យើងបាន $\frac{u_n}{u_p} = \frac{u_1 \cdot q^{n-1}}{u_1 \cdot q^{p-1}} = q^{n-p}$

$$\Rightarrow u_n = u_p \cdot q^{n-p}$$

ដូចនេះ $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$

លំហាត់គំរូទី៥ : គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតមួយកំណត់ដោយ $u_3 = 27$ និង

$u_{n+1} = 3u_n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

ក. បង្ហាញថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។

ខ. គណនា u_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ចំណោះស្រាយ

ក. បង្ហាញថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

យើងមាន $u_{n+1} = 3u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ ជាចំនួនថេរ

ដូចនេះ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម $q = 3$

ខ. គណនា u_n ជាអនុគមន៍នៃ n

ដោយ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម $q = 3$

យើងបាន $u_n = u_3 \cdot q^{n-3}$

$$= 27 \cdot 3^{n-3}$$

$$= 3^3 \cdot 3^{n-3}$$

$$= 3^n$$

ដូចនេះ $u_n = 3^n$

លំហាត់គំរូទី៦ : គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។ បើគេដឹងថា ៖

ក. $u_3 = 18$, $u_7 = 1458$ ។ គណនា q និង u_{10} ។

ខ. $u_3 = 20$, $u_6 = 1280$ ។ គណនា q និង u_1 ។

គ. $u_1 = 3$, $u_3 = 21$ ។ គណនា q ។

ចំណោះស្រាយ

ក. គណនា q និង u_{10}

យើងមាន $u_3 = 18$, $u_7 = 1458$

យើងបាន $u_7 = u_3 \cdot q^{7-3}$

$$1458 = 18 \cdot q^4$$

$$q^4 = 81$$

$$\Rightarrow q = \pm \sqrt[4]{81} = \pm 3$$

• $u_{10} = u_3 \cdot q^{10-3}$

$$= 18 \cdot (\pm 3)^7$$

$$= \pm 39366$$

ដូចនេះ $q = \pm 3$, $u_{10} = \pm 39366$

ខ. ចម្លើយគឺ $q = 4$, $u_1 = \frac{5}{4}$

គ. ចម្លើយគឺ $q = \pm \sqrt{7}$

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែល $\frac{u_8}{u_5} = 8$ ។ គណនាផលធៀបរួម q ។

២. គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $4, 8, 16, \dots$ ។

ក. កំណត់តួទី៥នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ខ. តើចំនួន 16384 ត្រូវជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតនេះ ?

៣. កំណត់ចំនួនតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

ក. $16, 8, 4, \dots, \frac{1}{32}$

ខ. $1, -4, 16, -64, \dots, 65536$

៤. គេឱ្យស្វ៊ីត (u_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនង $u_1 = 25$ និង $u_{n+1} = 5u_n, n \in \mathbb{N}$ ។

ក. បង្ហាញថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។

ខ. គណនា u_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៥. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែល $u_3 = \frac{8}{27}$ និង $u_6 = \frac{64}{729}$ ។

គណនា q និង u_1 ។

៦. រកតួទូទៅនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែល $u_3 = 36$ និង $u_7 = 2916$ ។

៧. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

ក. $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - \dots + 1024$

ខ. $\frac{3}{8} + \frac{3}{4} + \frac{3}{2} + \dots + 96$

៣. ផលគុណតួស្មើបម្លាយពីតួចុង

ឧទាហរណ៍៖ គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6$ ។ u_1 និង u_6 ហៅថា តួចុង។ u_2 និង u_5 ហើយ u_3 និង u_4 ហៅថា តួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង។

☞ បង្ហាញថា $u_1 \times u_6 = u_2 \times u_5 = u_3 \times u_4$

សម្រាយ

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ៖ $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ យើងបាន៖

$$u_1 \times u_6 = u_1 \times (u_1 \cdot q^5) = u_1^2 \cdot q^5 \quad (1)$$

$$u_2 \times u_5 = (u_1 \cdot q) \times (u_1 \cdot q^4) = u_1^2 \cdot q^5 \quad (2)$$

$$u_3 \times u_4 = (u_1 \cdot q^2) \times (u_1 \cdot q^3) = u_1^2 \cdot q^5 \quad (3)$$

តាម (1), (2) និង (3) យើងបាន $u_1 \times u_6 = u_2 \times u_5 = u_3 \times u_4$

ចាំបាច់ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង ស្មើនឹងផលគុណតួចុងទាំងពីរ។

$$\text{គេកំណត់សរសេរ } u_p \times u_{n-p+1} = u_1 \times u_n$$

$$\text{ឬ បើ } m+n=k+p \text{ នោះ } u_m \times u_n = u_k \times u_p$$

ដែល m, n, k, p ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ($\mathbb{N}$) ។

សម្គាល់: ករណីស្ថិតិធរណីមាត្រមាន ៖

☞ ចំនួនតួជាចំនួនសេស

$$\text{EX : } u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 \text{ យើងបាន } u_1 \times u_5 = u_2 \times u_4 = u_3^2$$

☞ ចំនួនតួជាចំនួនគូ

$$\text{EX : } u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6 \text{ យើងបាន } u_1 \times u_6 = u_2 \times u_5 = u_3 \times u_4$$

➤ **ករណីពិសេស**

បីចំនួនគត្តា a, b, c ជាស្ថិតិធរណីមាត្រកាលណា $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = q$ ថេរ ឬ $b^2 = a \times c$ ។

($b = \sqrt{a \times c}$ នោះ b ហៅថាមធ្យមធរណីមាត្ររវាង a និង c)

☞ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញថា បីចំនួន a, b, c ជាស្ថិតិធរណីមាត្រ យើងត្រូវ

$$\text{បង្ហាញថា } \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = q \text{ ថេរ ឬ } b^2 = a \times c \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី១ : គេឱ្យបីចំនួន a, b, c ជាស្ថិតិធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថា a^2, b^2, c^2 ក៏ជាស្ថិតិធរណីមាត្រដែរ។

ចំណេះស្រាយ

បង្ហាញថា a^2, b^2, c^2 ក៏ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

យើងមាន a, b, c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ នោះ $b^2 = a \cdot c$

$$\Rightarrow (b^2)^2 = (a \cdot c)^2$$

$$\Rightarrow (b^2)^2 = a^2 \cdot c^2$$

នោះ b^2 ជាមធ្យមធរណីមាត្ររវាង a^2 និង c^2 ។

ដូចនេះ បង្ហាញថា a^2, b^2, c^2 ក៏ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែរ

លំហាត់គំរូទី២ : តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន 3, 24, 94 ដើម្បីឱ្យបីចំនួនគត្តា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ?

ចំណេះស្រាយ

រកចំនួនដែលត្រូវបន្ថែម

តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវបន្ថែមលើ 3, 24, 94

នោះចំនួនថ្មីគឺ $(3+x), (24+x), (94+x)$

ចំនួនថ្មី: $(3+x), (24+x), (94+x)$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រកាលណា:

$$(24+x)^2 = (3+x) \cdot (94+x)$$

$$576 + 48x + x^2 = 282 + 3x + 94x + x^2$$

$$-49x = -294$$

$$\Rightarrow x = 6$$

ដូចនេះ ចំនួនដែលត្រូវបន្ថែមគឺ 6

លំហាត់គំរូទី៣ : រកមធ្យមធរណីមាត្ររវាង 4 និង 9 ។

ដំណោះស្រាយ

តាង x ជាមធ្យមធរណីមាត្ររវាង 4 និង 9 នោះ $x = \sqrt{4 \cdot 9} = 6$

ដូចនេះ មធ្យមធរណីមាត្ររវាង 4 និង 9 គឺ 6

លំហាត់គំរូទី៤ : គេឱ្យស្ថិតធរណីមាត្រដែល $u_3 = 4$ និង $u_5 = 36$ ។

គណនា u_1 និង ផលធៀបរួម q ។

ចំពោះស្រាយ

របៀបទី១

ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុងយើងមាន $u_1 \times u_5 = u_3^2$

$$\text{នោះ } u_1 = \frac{u_3^2}{u_5} = \frac{4^2}{36} = \frac{4}{9}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } u_5 = u_3 \cdot q^2 \Rightarrow q = \pm \sqrt{\frac{u_5}{u_3}} = \pm \sqrt{\frac{36}{4}} = \pm 3$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{u_1 = \frac{4}{9}, q = \pm 3}$$

របៀបទី២ :

$$\text{យើងមាន } u_5 = u_3 \cdot q^{5-3}$$

$$36 = 4 \cdot q^2$$

$$q^2 = \frac{36}{4} = 9$$

$$\Rightarrow q = \pm \sqrt{9} = \pm 3$$

$$\text{ហើយ } u_1 = u_3 \cdot q^{1-3} = 4 \cdot (\pm 3)^{-2} = 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{u_1 = \frac{4}{9}, q = \pm 3}$$

Note : ចំពោះលំហាត់នេះ បើគេឱ្យយើងរក u_1 រួចរក q យើងត្រូវធ្វើតាមរបៀបទី១

លំហាត់អនុវត្ត

១. គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែល $u_3 = 12$ និង $u_{11} = 3072$ ។ គណនា u_7 ។

២. គេឱ្យបីចំនួន a, b, c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\text{ក. } (a^2 + b^2)(b^2 + c^2) = (ab + bc)^2$$

$$\text{ខ. } (ab + bc + ca)^3 = abc(a + b + c)^3$$

៣. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន $4, 14, 30$ ដើម្បីឱ្យបានបីចំនួនតតា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ?

៤. បើ $x, 2x+6, 4x+36$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ចូរគណនា x ។

៥. រកតួទី១ (u_1) និង ផលធៀបរួម (q) នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

$$\text{ក. } u_3 = 1 \quad \text{និង} \quad u_7 = 81 \quad \quad \quad \text{។}$$

$$\text{ខ. } u_3 = 10 \quad \text{និង} \quad u_6 = 80 \quad \quad \quad \text{។}$$

$$\text{គ. } u_7 = 8u_4 \quad \text{និង} \quad u_{10} = 1024 \quad \quad \quad \text{។}$$

$$\text{ឃ. } u_2 + u_3 = 9 \quad \text{និង} \quad u_7 = 27u_4 \quad \quad \quad \text{។}$$

៦. កំណត់ផលធៀបរួម (q) និង តួទី១ (u_1) នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រចុះ

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ បើគេដឹងថា } \begin{cases} u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 = 64 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 84 \end{cases} \quad \text{។}$$

៧. គេឱ្យ a, b, c ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា៖

$$\text{ក. } \frac{1}{a^2}, \frac{1}{b^2}, \frac{1}{c^2} \text{ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។}$$

$$\text{ខ. } \frac{1}{a^p}, \frac{1}{b^p}, \frac{1}{c^p} \text{ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។}$$

៨. គេឱ្យ $x, 28, y$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និង $x + y = 119$ ។ គណនា x និង y ។

៤. ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមាន u_1 ជាតួទី១ និង q ជាផលធៀបរួម

$$(q \neq 0) \text{ គឺ } S_n = u_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{ឬ} \quad S_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

សម្រាយ

របៀបទី១

$$\text{តាង } S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n \quad (1)$$

គុណ (1) នឹងផលធៀបរួម q

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } qS_n &= u_1 \cdot q + u_2 \cdot q + u_3 \cdot q + \cdots + u_n \cdot q \\ &= u_2 + u_3 + u_4 + \cdots + u_{n+1} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{យក (2) - (1) យើងបាន } (q-1)S_n &= u_{n+1} - u_1 = u_1 \cdot q^n - u_1 = u_1(q^n - 1) \\ \Rightarrow S_n &= \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } S_n = u_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

របៀបទី២

$$\begin{aligned} \text{តាង } S_n &= u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n \\ &= u_1 + (u_1 \cdot q) + (u_1 \cdot q^2) + \cdots + (u_1 \cdot q^{n-1}) \\ S_n &= u_1(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) \quad (*) \end{aligned}$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ(*) នឹង $(1-q)$ យើងបាន:

$$\begin{aligned} (1-q)S_n &= u_1(1-q)(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = u_1(1 - q^n) \\ \Rightarrow S_n &= \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q} \end{aligned}$$

លំហាត់គំរូទី១ : គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម:

ក. $3+12+48+\cdots$

ខ. $125-25+5+\cdots$

ចំណោះស្រាយ

ក. តាង $S_n = 3+12+48+\cdots$

យើងមាន $q = \frac{12}{3} = 4$

យើងបាន
$$\begin{aligned} S_n &= u_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \\ &= 3 \cdot \frac{4^n - 1}{4 - 1} \\ &= 4^n - 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $S_n = 4^n - 1$

ខ. តាង $S_n = 125 - 25 + 5 + \cdots$

យើងមាន $q = \frac{-25}{125} = -\frac{1}{5}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} S_n &= u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \\ &= 125 \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{5}} \\ &= 125 \cdot \frac{5}{6} \left[1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^n \right] \\ &= \frac{625}{6} \left[1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^n \right] \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$S_n = \frac{625}{6} \left[1 - \left(-\frac{1}{5} \right)^n \right]$$

លំហាត់គំរូទី២ : គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6, 3, 1.5, 0.75, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី៧ ។

ខ. គណនាផលបូក ៧ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. គណនាតួទី៧

យើងមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $6, 3, 1.5, 0.75, \dots$

នោះ $q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$

យើងបាន
$$\begin{aligned} u_7 &= u_1 \cdot q^{7-1} \\ &= 6 \cdot (0.5)^6 \\ &= 0.09375 \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$u_7 = 0.09375$$

ខ. គណនាផលបូក ៧ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ

តាមរូបមន្ត $S_n = u_1 \frac{1-q^n}{1-q}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} S_7 &= u_1 \cdot \frac{1-q^7}{1-q} \\ &= 6 \cdot \frac{1-(0.5)^7}{1-0.5} \\ &= \frac{6 \times 0.9921875}{0.5} \\ &= 11.90625 \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$S_7 = 11.90625$$

សំហាត់គំរូទី៣ : គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

$$\text{ក. } 48 + 24 + 12 + \cdots + \frac{3}{8}$$

$$\text{ខ. } 2 + 4 + 8 + \cdots + 512$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{ក. } 48 + 24 + 12 + \cdots + \frac{3}{8}$$

អប្បបរមាទី១

$$S_n = 48 + 24 + 12 + \cdots + \frac{3}{8}$$

$$\text{នោះ } q = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$$

$$\text{តាង } n \text{ ជំនួញដែល } u_n = \frac{3}{8}$$

$$\text{តែ } u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 48 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{48}{2^{n-1}} = \frac{96}{2^n}$$

$$\text{នោះ } \frac{96}{2^n} = \frac{3}{8}$$

$$2^n = \frac{96 \times 8}{3} = 256 = 2^8$$

$$\Rightarrow n = 8$$

$$\text{យើងបាន } S_8 = u_1 \frac{1 - q^8}{1 - q}$$

$$= 48 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{765}{8}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{48 + 24 + 12 + \cdots + \frac{3}{8} = \frac{765}{8}}$$

រៀបរៀង

$$\text{នោះ } q = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ហើយ } u_n = \frac{3}{8} \Rightarrow u_{n+1} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } S_n &= \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{u_1 - u_{n+1}}{1-q} \\ &= \frac{48 - \frac{3}{16}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{765}{8} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{48 + 24 + 12 + \dots + \frac{3}{8} = \frac{765}{8}}$$

$$\text{ខ. } 2 + 4 + 8 + \dots + 512$$

រៀបរៀង

$$S_n = 2 + 4 + 8 + \dots + 512$$

$$\text{នោះ } q = \frac{4}{2} = 2$$

$$\text{តាង } n \text{ ជំនួសតួ ដែល } u_n = 512$$

$$\text{តែ } u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

$$\text{នោះ } 2^n = 512 = 2^9 \Rightarrow n = 9$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } S_8 &= u_1 \frac{1-q^8}{1-q} \\ &= 2 \cdot \frac{2^9 - 1}{2 - 1} = 1022 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{2 + 4 + 8 + \dots + 512 = 1022}$$

រូប្យថ្មី២

$$S_n = 2 + 4 + 8 + \cdots + 512$$

នោះ $q = \frac{4}{2} = 2$ ហើយ $u_n = 512 \Rightarrow u_{n+1} = 512 \cdot 2 = 1024$

យើងបាន
$$S_n = \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{u_{n+1} - u_1}{q - 1}$$

$$= \frac{1024 - 2}{2 - 1} = 1022$$

ដូចនេះ $2 + 4 + 8 + \cdots + 512 = 1022$

សំហាត់គំរូទី៤ : គណនា

ក. $S_n = 9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{999 \dots 9}_{n \text{ ដងលេខ } 9}$

ខ. $S_n = 7 + 77 + 777 + \cdots + \underbrace{777 \dots 7}_{n \text{ ដងលេខ } 7}$

ចំណោះស្រាយ

ក.
$$S_n = 9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{999 \dots 9}_{n \text{ ដងលេខ } 9}$$

$$= (10 - 1) + (10^2 - 1) + (10^3 - 1) + \cdots + (10^n - 1)$$

$$= (10 + 10^2 + 10^3 + \cdots + 10^n) - (1 + 1 + 1 + \cdots + 1)$$

$$= 10 \cdot \frac{10^n - 1}{10 - 1} - n$$

$$= \frac{10^{n+1} - 9n - 10}{9}$$

ដូចនេះ $S_n = 9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{999 \dots 9}_{n \text{ ដងលេខ } 9} = \frac{10^{n+1} - 9n - 10}{9}$

$$\begin{aligned}
 \text{ខ. } S_n &= 7 + 77 + 777 + \cdots + \underbrace{777\ldots 7}_{n \text{ ដងលេខ } 7} \\
 &= \frac{7}{9} (9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{999\ldots 9}_{n \text{ ដងលេខ } 9}) \\
 &= \frac{7}{9} [(10 - 1) + (10^2 - 1) + (10^3 - 1) + \cdots + (10^n - 1)] \\
 &= \frac{7}{9} [(10 + 10^2 + 10^3 + \cdots + 10^n) - (1 + 1 + 1 + \cdots + 1)] \\
 &= \frac{7}{9} \left(10 \cdot \frac{10^n - 1}{10 - 1} - n \right) \\
 &= \frac{7}{9} \cdot \frac{10^{n+1} - 9n - 10}{9} \\
 &= \frac{7}{81} (10^{n+1} - 9n - 10)
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$S_n = 7 + 77 + 777 + \cdots + \underbrace{777\ldots 7}_{n \text{ ដងលេខ } 7} = \frac{7}{81} (10^{n+1} - 9n - 10)$$


លំហាត់គំរូទី៥ : គេឱ្យការេមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង a ។ គេសង់ការេមួយទៀតមានគំពូលជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃការេមុន។ គេសង់ការេប្រែប្រួលនេះរហូតដល់ n ការេ។

- ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាការេទី n ។
- ខ. គណនាផលបូកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាការេទី n

តាង $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ ជារង្វាស់ជ្រុងនៃការេទាំងនោះ ហើយ តាង $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ជាផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងនោះ



យើងបាន

$$\bullet d_1 = a \Rightarrow A_1 = d_1^2 = a^2$$

$$\bullet d_2 = \left(\frac{a}{2}\right)\sqrt{2} \Rightarrow A_2^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$\bullet d_3 = \left(\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2}\right)\sqrt{2} = \frac{a}{2} \Rightarrow A_3^2 = \frac{a^2}{4}$$

.....

.....

នោះ $(A_n): A_1, A_2, A_3, \dots$ ដែល $A_1 = a^2, A_2 = \frac{a^2}{2}, A_3 = \frac{a^2}{4}, \dots$

ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ដែលមានផលធៀបរួម $q = \frac{1}{2}$

យើងបាន

$$A_n = A_1 \cdot q^{n-1}$$

$$= a^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{a^2}{2^{n-1}}$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាការេទី n គឺ

$$A_n = \frac{a^2}{2^{n-1}}$$

ខ. គណនាផលបូកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់

តាង S_n ជាផលបូកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់

យើងបាន $S_n = A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n$

$$= A_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

$$= a^2 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{a^2(2^n - 1)}{2^{n-1}}$$

ដូចនេះ ផលបូកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ

$$S_n = \frac{a^2(2^n - 1)}{2^{n-1}}$$

លំហាត់អនុវត្តទី១

១. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

ក. $\left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n$

ខ. $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 2 + \dots$

២. គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $1, -2, 4, -8, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី 11 ។

ខ. គណនាផលបូក 11 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

៣. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

ក. $100 + 50 + 25 + \dots + \frac{25}{16}$

ខ. $-100 + 50 - 25 + \dots + \frac{25}{128}$

៤. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

ក. $S_n = 8 + 88 + 888 + \dots + \underbrace{888\dots8}_{n \text{ ដងលេខ } 8}$

ខ. $18 + 198 + 1998 + 19998 + \dots + 1999\dots998$, $(n-1)$ ដងលេខ 8

$$\text{គ. } S_n = 25 + 2525 + 252525 + \cdots + \underbrace{252525 \dots 25}_{25 \text{ ចំនួន } n \text{ ដង}}$$

$$\text{ឃ. } 2013 + 20132013 + 201320132013 + \cdots + \underbrace{201320132013 \dots 2013}_{2013 \text{ ចំនួន } n \text{ ដង}}$$

៥. គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

$$\text{ក. } S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 16 + \cdots + n \cdot 2^n$$

$$\text{ខ. } T_n = 2 + 4x + 6x^2 + 8x^3 + \cdots + 2nx^{n-1}$$

៦. គេមានការេមួយដែលជ្រុងវាមានរង្វាស់ 8 cm ។ គេសង់ការេមួយទៀតដែលកំពូលវាជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុងការេមុន។ គេសង់ការេបន្តបន្ទាប់រៀបរៀងនេះ រហូតបានការេ 8 ។

ក. គណនាប្រវែងជ្រុងនីមួយៗនៃការេទាំងនោះ ។

ខ. គណនាផលបូកវិមាត្រនៃការេទាំងអស់ ។

គ. គណនាផលបូកផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងអស់ ។

៥. ស៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

យើងមាន $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$

នោះផលបូកអនន្តត្រូវកំណត់ដោយ $S_\infty = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$

$$\text{ដោយ } S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{u_1}{1-q} - \frac{u_1q^n}{1-q}$$

❶ បើ $|q| < 1$ នោះ $q^n \rightarrow 0$ កាលណា $n \rightarrow \infty$

$$\text{នោះ } S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{u_1}{1-q} - \frac{u_1q^n}{1-q}$$

$$\Rightarrow S_\infty = \frac{u_1}{1-q} - \frac{u_1 \cdot 0}{1-q} = \frac{u_1}{1-q}$$

❷ បើ $|q| > 1$ នោះ $q^n \rightarrow \infty$ កាលណា $n \rightarrow \infty$

នោះ S_∞ មិនកំណត់

❸ បើ $q = \pm 1$ នោះ
$$\begin{cases} S_{\infty} = u_1 + u_1 + u_1 + u_1 + \dots \\ S_{\infty} = u_1 - u_1 + u_1 - u_1 + \dots \end{cases} \text{មិនកំណត់}$$

ជានិច្ចទៅ $\triangleright$ បើ $|q| < 1$ នោះផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

កំណត់ដោយ:
$$S_{\infty} = \frac{u_1}{1-q}$$

$\triangleright$ បើ $|q| \geq 1$ នោះ S_{∞} មិនអាចកំណត់បាន

លំហាត់គំរូទី១ : គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត $16+12+9+\dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $u_1 = 16$ ហើយ $q = \frac{12}{16} = \frac{3}{4} < 1$

យើងបាន
$$S_{\infty} = \frac{u_1}{1-q} = \frac{16}{1-\frac{3}{4}} = 64$$

ដូចនេះ
$$S_{\infty} = 64$$

លំហាត់គំរូទី២ : គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $3+\frac{3}{4}+\frac{3}{16}+\dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $u_1 = 3$ ហើយ $q = \frac{3}{4} \div 3 = \frac{1}{4} < 1$

យើងបាន
$$S_{\infty} = \frac{u_1}{1-q} = \frac{3}{1-\frac{1}{4}} = 4$$

ដូចនេះ
$$S_{\infty} = 4$$

លំហាត់គំរូទី៣ : គណនាផលធៀបរួមនៃស្ថិតធរណីមាត្រអនន្តតូ ដែលមាន

$$u_1 = 5 \text{ និង } S_\infty = 15 \text{ ។}$$

ចំណោះស្រាយ

យើងមាន $u_1 = 5$ និង $S_\infty = 15$

តាម ផលបូកស្ថិតធរណីមាត្រអនន្តតូ $S_\infty = \frac{u_1}{1-q}$

យើងបាន $15 = \frac{5}{1-q}$

$$15 - 15q = 5$$

$$-15q = -10$$

$$q = \frac{-10}{-15} = \frac{2}{3}$$

ដូចនេះ $q = \frac{2}{3}$

លំហាត់គំរូទី៤ : សរសេរចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោមជាទម្រង់ប្រភាគ $\frac{a}{b}$:

ក. $0.\bar{7}$

ខ. $2.\bar{34}$

គ. $0.\bar{235}$

ចំណោះស្រាយ

ក. $0.\bar{7} = 0.77777777\ldots = 0.7 + 0.07 + 0.007 + \ldots$

ជាផលបូកតូនៃស្ថិតធរណីមាត្រអនន្តតូដែលមាន $u_1 = 0.7 = \frac{7}{10}$

និង $q = 0.1 = \frac{1}{10}$

តាមរូបមន្ត $S_\infty = \frac{u_1}{1-q}$ យើងបាន $0.\bar{7} = \frac{7}{10} \div \left(1 - \frac{1}{10}\right) = \frac{7}{9}$

ដូចនេះ $0.\bar{7} = \frac{7}{9}$

ប្រែប្រួលម្យ៉ាងទៀត

តាង $N = 0.\overline{7} = 0.7777\ldots$ (1)

គុណ (1) នឹង 10 យើងបាន $10N = 7.7777\ldots$ (2)

យក (2) - (1) យើងបាន $9N = 7 \Rightarrow N = \frac{7}{9}$

ដូចនេះ $0.\overline{7} = \frac{7}{9}$

ខ. $2.\overline{34} = 2 + 0.\overline{34} = 2 + 0.34 + 0.0034 + 0.000034 + \ldots$

$$= 2 + \frac{0.34}{1 - 0.01} = 2 + \frac{0.34}{0.99}$$

$$= 2 + \frac{34}{99}$$

$$= \frac{232}{99}$$

ដូចនេះ $2.\overline{34} = \frac{232}{99}$

ប្រែប្រួលម្យ៉ាងទៀត

តាង $N = 2.\overline{34} = 2.343434\ldots$ (1)

នោះ $100N = 234.343434\ldots$ (2)

យក (2) - (1) យើងបាន $99N = 232 \Rightarrow N = \frac{232}{99}$

ដូចនេះ $2.\overline{34} = \frac{232}{99}$

គ. $0.\overline{235} = 0.235235235 = 0.235 + 0.000235 + 0.000000235 + \ldots$

$$= \frac{0.235}{1 - 0.001} = \frac{0.235}{0.999} = \frac{235}{999}$$

ដូចនេះ
$$0.\overline{235} = \frac{235}{999}$$

របៀបម្យ៉ាងទៀត

តាង $N = 0.\overline{235} = 0.235235235\dots$ (1)

នោះ $1000N = 235.235235235\dots$ (2)

យក (2) - (1) យើងបាន $999N = 235 \Rightarrow N = \frac{235}{999}$

ដូចនេះ
$$0.\overline{235} = \frac{235}{999}$$

លំហាត់គំរូទី៥ : បុរសម្នាក់បានលោតពីលើស្ពានដោយចងខ្សែពួរទៅនឹងជើងរបស់គាត់ប្រវែង 120 m ហើយយឺតឡើងមកវិញបាន $\frac{1}{3}$ នៃប្រវែងដើម។ រាល់ពេលដែលយឺតឡើង វាធ្លាក់ចុះមកវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃប្រវែងដែលយឺតឡើង។ គណនាប្រវែងខ្សែសរុបចាប់តាំងពីគាត់លោតចុះ រហូតដល់ខ្សែមានលំនឹង។


ចំណោះស្រាយ

គណនាប្រវែងខ្សែសរុបចាប់តាំងពីគាត់

លោតចុះ រហូតដល់ខ្សែមានលំនឹង

តាមបំរាប់ យើងបាន:

- $u_1 = 120$
- $u_2 = \frac{1}{3}u_1$
- $u_3 = \frac{2}{3}u_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}u_1 = \frac{2}{3^2}u_1$
- $u_4 = \frac{1}{3}u_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3^2}u_1 = \frac{2}{3^3}u_1$



$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad u_5 = \frac{2}{3}u_4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3^3}u_1 = \frac{2^2}{3^4}u_1 \\
 & \bullet \quad u_6 = \frac{1}{3}u_5 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^2}{3^4}u_1 = \frac{2^2}{3^5}u_1 \\
 & \bullet \quad u_7 = \frac{2}{3}u_6 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2^2}{3^5}u_1 = \frac{2^3}{3^6}u_1 \\
 & \bullet \quad u_8 = \frac{1}{3}u_7 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^3}{3^6}u_1 = \frac{2^3}{3^7}u_1 \\
 & \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

តាង S ជាប្រវែងខ្សែសរុបនៃការធ្លាក់ចុះ និង យឺតឡើង
យើងបាន:

$$\begin{aligned}
 S &= u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + u_7 + u_8 + \dots \\
 &= u_1 + \frac{1}{3}u_1 + \frac{2}{3^2}u_1 + \frac{2}{3^3}u_1 + \frac{2^2}{3^4}u_1 + \frac{2^2}{3^5}u_1 + \frac{2^3}{3^6}u_1 + \frac{2^3}{3^7}u_1 + \dots \\
 &= u_1 \left[\left(1 + \frac{2}{3^2} + \frac{2^2}{3^4} + \frac{2^3}{3^6} + \dots \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3^3} + \frac{2^2}{3^5} + \frac{2^3}{3^7} + \dots \right) \right] \\
 &= u_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3^2}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3^2}} \right) \\
 &= u_1 \left(\frac{9}{7} + \frac{3}{7} \right) \\
 &= \frac{12u_1}{7} \\
 &= \frac{12 \times 120}{7} = \frac{1440}{7} = 205.71
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ ប្រវែងខ្សែសរុបចាប់តាំងពីគាត់លោតចុះ រហូតដល់ខ្សែមានលំនឹង

គឺ $S = 205.71m$

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតូ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $\frac{9}{4} + \frac{3}{2} + 1 + \dots$

ខ. $100 + 50 + 25 + \dots$

គ. $-20 + 10 - 5 + \dots$

ឃ. $12 + 4 + \frac{4}{3} + \dots$

២. គណនាផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតូដែលមាន:

ក. $u_1 = 8$ និង $S_\infty = 10$

ខ. $u_1 = 4$ និង $S_\infty = 12$

៣. សរសេរចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោមជាប្រភាគសនិទាន $\frac{a}{b}$

ក. $0.\overline{5}$

ខ. $0.\overline{50}$

គ. $0.4\overline{52}$

ឃ. $0.2\overline{35}$

៤. រកតួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតូដែលមានផលធៀបរួម $q = \frac{3}{5}$ និង

ផលបូកអនន្តតូ $S_\infty = 40$ ។

៥. ផលបូក ២ តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើនឹង ៩ ហើយផលបូកអនន្តតូនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រនេះស្មើនឹង ២៥ ។ បើស្វ៊ីតធរណីមាត្រនេះមានផលធៀបរួម r ជាចំនួនវិជ្ជមាន គណនា r និង តួដំបូង ។

៦. គេសង្កេតមុខនាឡិកាមួយ ។ នៅពេលទ្រនិចម៉ោង និង ទ្រនិចនាទីកំពុងតែត្រួតស៊ីគ្នា កំណត់រយៈពេលដែលទ្រនិចទាំងពីរជួបគ្នាលើកទី២ ។

៧. បាល់មួយត្រូវបានគេទម្លាក់ពីកម្ពស់ $12m$ ។ រាល់ពេលដែលវាធ្លាក់ទៅ

ប៉ះដី បាល់នោះលោតឡើងវិញបានកម្ពស់ $\frac{3}{4}$ នៃកម្ពស់ដែលវាធ្លាក់។

គណនាប្រវែងសរុប ដែលបាល់លោតចុះឡើង ដោយគិតចាប់តាំងពីបាល់ធ្លាក់ចុះ រហូតដល់វាមានលំនឹង។

លំហាត់

១. រកតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

ក. $125, 25, 5, \dots$

ខ. $-3, 9, -27, \dots$

២. គេឱ្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $2, 6, 18, \dots$ ។

ក. គណនាតួទី៨ នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ខ. តើចំនួន 486 ត្រូវជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីតនេះ ?

៣. រកចំនួនតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

ក. $2, 4, 8, \dots, 512$

ខ. $81, 27, 9, \dots, \frac{1}{27}$

៤. គេឱ្យ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា :

ក. $U_3 = 18$, $U_7 = 1458$ ។ គណនា q និង U_{10} ។

ខ. $U_1 = 3$, $S_3 = 21$ ។ គណនា q និង S_7 ។

៥. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

ក. $48 + 24 + 12 + \dots + \frac{3}{8}$

ខ. $9 - 6 + 4 - \dots - \frac{128}{243}$

គ. $100 + 50 + 25 + \dots + \frac{25}{16}$

ឃ. $\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n$

ង. $\frac{1}{3} + 1 + 3 + \dots + 6561$

ច. $-100 + 50 - 25 + \dots + \frac{25}{128}$

ឆ. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{2^5} + \dots - \frac{1}{2^{2n-1}} + \frac{1}{3^{2n}}$

៦. គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_2 = -9$ និង $U_5 = \frac{1}{3}$

៧. គណនាផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_1 = 5$ និង $S_\infty = 15$

៨. ផលបូកពីរតួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើនឹង 9 និងផលបូកស្វ៊ីត ធរណីមាត្រ អនន្តតួស្មើនឹង 25 ។ គណនា q និង U_1 បើផលធៀបរួម $q > 0$ ។

៩. តួទី៣ នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រស្មើនឹង 3 និង តួទី៦ ស្មើនឹង $\frac{3}{8}$ ។

គណនាផលធៀបរួម និង ផលបូក ៨ តួដំបូង ។

១០. គណនា a ដើម្បីឱ្យចំនួន $(a-3)$, $(a+1)$, $(4a-2)$ ជាបីតួគ្នា
នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

១១. ក. ដោះស្រាយសមីការ $3x^2 - 8x + 4 = 0$ (E) ក្នុងសំណុំ $\mathbb{R}$ ។

ខ. គេមាន $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រកើនដែលមាន U_3 និង U_4
នៃស្វ៊ីតនេះជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

a) ទាញរកផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតនេះ ។

b) គណនាតួទីមួយ (U_1) នៃស្វ៊ីតនេះ ។

១២. គេឱ្យ (U_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែល $U_3 = 12$ និង $U_{11} = 3072$ ។
គណនា U_7 ។

១៣. គណនាតួទី១ (U_1) និងផលធៀបរួម (q) នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម:

ក. $U_3 = 10$ និង $U_6 = 80$ ខ. $U_7 = 8U_4$ និង $U_{10} = 1024$

គ. $U_2 + U_3 = 9$ និង $U_7 = 27U_4$ ឃ. $U_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

១៤. បើ x , $2x+6$, $4x+36$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ចូរគណនា x ។

១៥. គេមាន $x, 28, y$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និង $x+y=119$ ។ គណនា x និង y ។

១៦ រកបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយ ដែលមានផលបូកបីតួនេះស្មើ 26
ហើយផលគុណរបស់វាស្មើ 216 ។

១៧. រកពីរចំនួនខុសគ្នា a និង b ដែល $a, b, 10$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
ហើយ $b, a, 10$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

១៨. ផលគុណបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយស្មើ 216 ហើយផលបូកបីតួ
ដំបូងនេះស្មើ 21 ។ រកបីតួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ បើគេដឹងថា ផលធៀបរួម
របស់វាតូចជាង 1 ។

មេរៀនទី

៤

ផលបូកតួនៃស្ថិតផ្សេងៗ

១. របៀបគណនាផលបូក

លំហាត់គំរូទី១ : គណនាផលបូកតួនៃស្ថិតខាងក្រោម:

ក. $1+2+3+\dots+n$

ខ. $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2$

គ. $1^3+2^3+3^3+\dots+n^3$

ចំណោះស្រាយ

ក. តាង $S_n = 1+2+3+\dots+(n-2)+(n-1)+n$ (1)

ឬ $S_n = n+(n-1)+(n-2)+\dots+3+2+1$ (2)

(1) + (2) យើងបាន:

$$2S_n = \underbrace{(n+1)+(n+1)+(n+1)+\dots+(n+1)}_{n \text{ តួនៃ } (n+1)} = n(n+1)$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

ដូចនេះ

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

ខ. តាង $S_n = 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2$

យើងមាន $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$

$$\Leftrightarrow 3k^2 = (k+1)^3 - k^3 - 3k - 1$$

យក $k = 1, 2, 3, \dots, n$ យើងបាន :

$$+ \begin{cases} k=1 \Rightarrow 3 \cdot 1^2 = 2^3 - 1^3 - 3 \cdot 1 - 1 \\ k=2 \Rightarrow 3 \cdot 2^2 = 3^3 - 2^3 - 3 \cdot 2 - 1 \\ k=3 \Rightarrow 3 \cdot 3^2 = 4^3 - 3^3 - 3 \cdot 3 - 1 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ k=n \Rightarrow 3 \cdot n^2 = (n+1)^3 - n^3 + 3 \cdot n - 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 3S_n &= (n+1)^3 - 1^3 - 3(1+2+3+\dots+n) - n \\ &= (n+1)^3 - 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\ &= \frac{(n+1)}{2} [2(n+1)^2 - 3n - 2] \\ &= \frac{(n+1)}{2} (2n^2 + 4n + 2 - 3n - 2) \\ &= \frac{(n+1)}{2} (2n^2 + n) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} \\ \Rightarrow S_n &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

គ. តាង $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

យើងមាន $(k+1)^4 = k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$

$$\Leftrightarrow 4k^3 = (k+1)^4 - k^4 - 6k^2 - 4k - 1$$

យក $k = 1, 2, 3, \dots, n$ យើងបាន :

$$\begin{aligned}
 S &= \underbrace{(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2)}_{10 \text{ តួ}} + 11^2 + 12^2 + 13^2 + \dots + 100^2 \\
 &\quad - \underbrace{(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2)}_{10 \text{ តួ}} \\
 &= \frac{100(100+1)(2 \cdot 100 + 1)}{6} - \frac{10(10+1)(2 \cdot 10 + 1)}{6} \\
 &= \frac{100 \cdot 101 \cdot 201 - 10 \cdot 11 \cdot 21}{6} \\
 &= 337965
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $11^2 + 12^2 + 13^2 + \dots + 100^2 = 337965$

ខ. $12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3$

តាង $S = 12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3$ យើងបាន :

$$\begin{aligned}
 S &= \underbrace{(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 11^3)}_{11 \text{ តួ}} + 12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3 \\
 &\quad - \underbrace{(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 11^3)}_{11 \text{ តួ}} \\
 &= \left[\frac{50(50+1)}{2} \right]^2 - \left[\frac{11(11+1)}{2} \right]^2 \\
 &= 1625625 - 4356 = 1621269
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $12^3 + 13^3 + 14^3 + \dots + 50^3 = 1621269$

គ. $2000^2 - 1999^2 + 1998^2 - 1997^2 + \dots + 2^2 - 1^2$

តាង $S = 2000^2 - 1999^2 + 1998^2 - 1997^2 + \dots + 2^2 - 1^2$ យើងបាន

$$\begin{aligned}
 S &= [(2000 - 1999)(2000 + 1999)] + [(1998 - 1997)(1998 + 1997)] \\
 &\quad + \dots + [(2 - 1)(2 + 1)] \\
 &= 2000 + 1999 + 1998 + 1997 + \dots + 2 + 1
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2000(2000+1)}{2} = 2001000$$

ដូចនេះ

$$2000^2 - 1999^2 + 1998^2 - 1997^2 + \dots + 2^2 - 1^2 = 2001000$$

លំហាត់គំរូទី៣: គណនាផលបូកតួនៃស្ថិតខាងក្រោម:

ក. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$

ខ. $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

គ. $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

ចំណោះស្រាយ

ក. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$

យើងមាន $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ជំនួស $k = 1, 2, 3, \dots, n$ យើងបាន :

$$+ \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \end{array} \right.$$

$$S_n = \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

ដូចនេះ
$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

ចំណាំ
$$\frac{1}{a \times b} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

ខ.
$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

យើងមាន
$$\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

ជំនួស $k=1, 2, 3, \dots, n$ យើងបាន :

$$+ \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) \\ \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\ \frac{1}{5 \times 7} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{array} \right.$$

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}$$

ដូចនេះ
$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

$$\text{គ. } \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$\text{យើងមាន } \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right]$$

ជំនួស $k=1, 2, 3, \dots, n$ យើងបាន :

$$+ \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1 \times 2 \times 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{2 \times 3} \right) \\ \frac{1}{2 \times 3 \times 4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} \right) \\ \frac{1}{3 \times 4 \times 5} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} \right) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \end{array} \right.$$

$$S_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

ដូចនេះ

$$\boxed{\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}}$$

លំហាត់អនុវត្ត

១. ក. គេឱ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$ ។

a) គណនា S_n ដែលជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ។

b) គណនាផលបូក 39999 តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ។

ខ. គណនា $S_n = \frac{1}{1\sqrt{2} + 2\sqrt{1}} + \frac{1}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$

២. គណនាផលបូកតួនៃស្វីតខាងក្រោម:

ក. $\frac{1}{1 \times 5} + \frac{1}{5 \times 9} + \frac{1}{9 \times 13} + \dots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$

ខ. $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

គ. $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{3 \times 6} + \dots + \frac{1}{n(n+3)}$

៣. គណនាផលបូកតួនៃស្វីតខាងក្រោម:

ក. $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \dots, \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$

ខ. $\frac{1}{(1 \times 3)^2}, \frac{2}{(3 \times 5)^2}, \frac{3}{(5 \times 7)^2}, \dots, \frac{n}{[(2n-1)(2n+1)]^2}$

៤. គណនា S_n បើ: ក. $a_n = \sqrt{(2n+1) - 2\sqrt{n^2 + n}}$

ខ. $a_n = \frac{n}{(n+1)!}$

២. គណនាផលបូកតាមគំរូ

លំហាត់ទី១ : គេឱ្យលំនាំគំរូ :

$$1 = 1^2$$

$$1 + 3 = 2^2$$

$$1 + 3 + 5 = 3^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5^2$$

តាមលំនាំគំរូនេះ ចូរគណនា ផលបូក $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2013$

លំហាត់ទី២ : គេឱ្យលំនាំគំរូនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម

$$1 = 1$$

$$1 + 7 = 8$$

$$1 + 7 + 19 = 27$$

$$1 + 7 + 19 + 37 = 64$$

$$1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 125$$

តាមលំនាំគំរូនេះ ចូរគណនាផលបូក នៃស្វ៊ីតនេះដែលមាន 10 តួ ។

លំហាត់ទី៣ : គេឱ្យលំនាំគំរូ :

$$1 \times 8 + 1 = 9$$

$$12 \times 8 + 2 = 98$$

$$123 \times 8 + 3 = 987$$

$$1234 \times 8 + 4 = 9876$$

តាមលំនាំគំរូនេះ ចូរគណនា $123456789 \times 8 + 9$

លំហាត់ទី៤ : គេឱ្យ :

$$a + 4b + 9c + 16d + 25e + 36f + 49g = 1$$

$$4a + 9b + 16c + 25d + 36e + 49f + 64g = 12$$

$$9a + 16b + 25c + 36d + 49e + 64f + 81g = 123$$

ចូរគណនា តម្លៃនៃ $16a + 25b + 36c + 49d + 64e + 81f + 100g$

៣. និមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកតួនៃស្វ៊ីត

៣.១ សញ្ញាណ Σ (summation or Sigma Notation)

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

ឧទាហរណ៍ : ក. $1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k$

ខ. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2$

គ. $1^2 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=1}^n k^3$

ឃ. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2013} = \sum_{k=1}^{2013} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{k}$

លំហាត់ ៖ សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ

ក. $2 + 5 + \dots + (3n - 1)$

ខ. $3 + 6 + 12 + \dots + 3 \cdot 2^{n-1}$

គ. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{100}$

ឃ. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 + \dots + 2012 \cdot 6035$

ង. $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{9999}$ ។

៣.២ លក្ខណៈនៃ Σ

ក. $\sum_{k=1}^n c = cn$

ខ. $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

គ. $\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$

ឃ. $\sum_{k=1}^n a_k \cdot b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n b_k$

ង. $\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{b_k} \right) \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$

ច. $\sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \pm 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2$

កំណត់ចំណាំ

- $\sum_{k=1}^{m-1} a_k + \sum_m^n a_k = \sum_1^n a_k$ ឬ $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$
- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$
- $\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$
- $\sum_{k=1}^n a^k = \frac{a(a^n-1)}{a-1} = \frac{a}{a-1}(a^n-1)$

លំហាត់គំរូ : គណនាផលបូកខាងក្រោម:

ក. $\sum_{k=1}^{20} (3k+1)$

ខ. $\sum_{k=1}^7 2^k$

គ. $\sum_{k=4}^{14} (4k-3)$

ឃ. $\sum_{k=1}^{30} k(k+1)$

ចំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned}
 \text{ក. } \sum_{k=1}^{20} (3k+1) &= 3 \sum_{k=1}^{20} k + \sum_{k=1}^{20} 1 \\
 &= 3 \cdot \frac{20(20+1)}{2} + 20 \\
 &= 650
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$\sum_{k=1}^{20} (3k+1) = 650$$

$$ខ. \sum_{k=1}^7 2^k = \frac{2(2^7 - 1)}{2 - 1} = 2(128 - 1) = 254$$

ដូចនេះ $\sum_{k=1}^7 2^k = 254$

$$\begin{aligned} គ. \sum_{k=4}^{14} (4k - 3) &= \sum_{k=1}^{14} (4k - 3) - \sum_{k=1}^3 (4k - 3) \\ &= \left(4 \sum_{k=1}^{14} k - \sum_{k=1}^{14} 3 \right) - \left(4 \sum_{k=1}^3 k - \sum_{k=1}^3 3 \right) \\ &= \left[4 \cdot \frac{14(14+1)}{2} - 3 \cdot 14 \right] - \left[4 \cdot \frac{3(3+1)}{2} - 3 \cdot 3 \right] \\ &= 420 - 42 - 24 + 9 \\ &= 363 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\sum_{k=4}^{14} (4k - 3) = 363$

$$\begin{aligned} ឃ. \sum_{k=1}^{30} k(k+1) &= \sum_{k=1}^{30} k^2 + \sum_{k=1}^{30} k \\ &= \frac{30(30+1)(2 \cdot 30 + 1)}{6} + \frac{30(30+1)}{2} \\ &= 9455 + 465 \\ &= 9920 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\sum_{k=1}^{30} k(k+1) = 9920$

លំហាត់អនុវត្តន៍

ក. គណនា $S_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)$

ខ. គណនា $S_n = 1+3+7+\dots+(n^2-n+1)$

គ. គណនា $S_n = 1+15+65+\dots+(4n^3-6n^2+4n-1)$

ឃ. គណនា $S_n = 5+35+113+\dots+(4n^3+2n-1)$

៤. របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស្វ៊ីត

៤.១ ផលសងតួលំដាប់ទី១

គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n): a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$

តាង $(b_n): a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, \dots, a_n - a_{n-1}$ ជាផលសងតួលំដាប់ទី១

នៃស្វ៊ីត (a_n) នោះ $b_n = a_{n+1} - a_n$ យើងបាន:

$$a_2 - a_1 = b_1$$

$$a_3 - a_2 = b_2$$

$$a_4 - a_3 = b_3$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_n - a_{n-1} = b_{n-1}$$

$$\frac{a_n - a_1 = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}}{a_n - a_1 = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} b_k} \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

ជំនួសទៅ: គេមានស្វ៊ីត $(a_n): a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ ។ ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ

$(b_n): b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$ ដែល $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \dots,$

$b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ហៅថាផលសងនៃស្វ៊ីតលំដាប់ទី១នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

នោះតួទីទៅ ស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

គួរចងចាំ

$$\begin{aligned} &\triangleright \sum_{k=1}^{n-1} c = c(n-1) && \triangleright \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2} \\ &\triangleright \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} && \triangleright \sum_{k=1}^{n-1} k^3 = \left[\frac{n(n-1)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

លំហាត់គំរូទី១ : កំណត់តួទី n នៃស្វីត $2, 4, 8, 14, 22, 32, \dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

តាង a_n ជាតួទី n នៃស្វីតដែលត្រូវរក

នោះ $(a_n): 2, 4, 8, 14, 22, 32, \dots$

តាង ស្វីត (b_n) ជាផលសងលំដាប់១នៃស្វីត (a_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

យើងបាន $(b_n): 2, 4, 6, 8, \dots$

នោះ ស្វីត (b_n) ជាស្វីតធួនដែលមានតួទី១ស្មើ 2 និងផលសងរួមស្មើ 2

យើងបាន $b_n = 2 + (n-1)2 = 2n$, $\forall n \geq 2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k \\ &= 2 + 2 \frac{(n-1)[(n-1)+1]}{2} \\ &= n^2 - n + 2 \end{aligned}$$

ផ្ទៀងផ្ទាត់: ចំពោះ $n=1, a_1 = 1^2 - 1 + 2 = 2$ ពិត

ដូច្នេះស្វីត តួទី n នៃស្វីត $2, 4, 8, 14, 22, 32, \dots$ គឺ $a_n = n^2 - n + 2$

លំហាត់គំរូទី២ : កំណត់តួទី n នៃស្វីត $4, 5, 7, 10, 14, \dots$ រួចគណនា

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតនេះ ។

បំណែកស្រាយ

តាង $(a): 4, 5, 7, 10, 14, \dots$

តាង (b_n) ជាផលសងគ្នាដាច់ទី១ នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

យើងបាន $(b_n): 1, 2, 3, 4, \dots$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d = 1$

$$\Rightarrow b_n = n$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 4 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 4 + \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \frac{n^2 - n + 8}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $a_n = \frac{n^2 - n + 8}{2}$

គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^2 - k + 8}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 4 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 4n \\ &= \frac{n}{12} [(n+1)(2n+1) - 3(n+1) + 48] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n}{12} (2n^2 + n + 2n + 1 - 3n - 3 + 48) \\
 &= \frac{n}{12} (2n^2 + 46) \\
 &= \frac{n(n+23)}{6}
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតគឺ $S_n = \frac{n(n^2 + 23)}{6}$

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. គេឱ្យស្វ៊ីត $1, 2, 5, 10, 17, \dots$ ។
 - ក. ចូរកំណត់ តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។
 - ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។
២. គេឱ្យស្វ៊ីត $(a_n): 3, 5, 8, 12, 17, 23, \dots$ ។
 - ក. ចូរកំណត់ a_n ដែលជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។
 - ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។
៣. គេឱ្យស្វ៊ីត $1, 17, 45, 85, 137, 201, \dots$ ។
 - ក. ចូរកំណត់ តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។
 - ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។
៤. គេឱ្យស្វ៊ីត $-1, 6, 19, 38, 63, 94, \dots$ ។
 - ក. ចូរកំណត់ តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។
 - ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ ។

៤.២ ផលសងតួលំដាប់ទី២

យើងមានស្លឹក $(a_n): a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ។ ស្លឹក $(b_n): b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$ ជាផលសងតួលំដាប់ទី១ នៃស្លឹក (a_n) ។ ផលសងតួលំដាប់ទី២ នៃស្លឹក (a_n) កំណត់ដោយ $(c_n): c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ ដែល $c_n = b_{n+1} - b_n$ ឬ (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី១ នៃ (b_n) ។

យើងបាន $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ នាំឱ្យ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូទី១: កំណត់តួទី n នៃស្លឹក $(a_n): 1, 2, 6, 15, 31, 56, \dots$ ។

ចំណោះស្រាយ

រៀបរៀង យើងមាន $(a_n): 1, 2, 6, 15, 31, 56, \dots$ ។

តាង (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី១ នៃ (a_n)

យើងបាន $(b_n): 1, 4, 9, 16, 25, \dots$ នោះ $b_n = n^2$

$$\begin{aligned} \text{ចំពោះ } n \geq 2 \text{ យើងបាន } a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= 1 + \frac{(n-1)[(n-1)+1][2(n-1)+1]}{6} \\ &= 1 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

ចំពោះ $n=1 \Rightarrow a_1 = 1$ ពិត

ដូចនេះ
$$a_n = \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1) + 1 \quad \forall$$

អប្បបរមាទី២ (តាមមធ្យមសងតួលំដាប់ទី២)

យើងមាន $(a_n): 1, 2, 6, 15, 31, 56, \dots$ ។

តាង (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី១ នៃ (a_n)

យើងបាន $(b_n): 1, 4, 9, 16, 25, \dots$ (មិនមែនជា ស្វីតនព្វន្ត ឬធរណីមាត្រ)

តាង (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី២នៃ (a_n) (ឬជាផលសងតួលំដាប់ទី១នៃ (b_n))

នោះ $(c_n): 3, 5, 7, 9, \dots$ ជាស្វីតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួម $d = 2$

យើងបាន $c_n = c_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)2 = 2n + 1$ ។

$$\begin{aligned} \text{ចំពោះ } \forall n \geq 2 \text{ យើងបាន } b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) \\ &= 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 1 \\ &= 1 + 2 \frac{n(n-1)}{2} + (n-1) \\ &= n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= 1 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

ចំពោះ $n=1 \Rightarrow a_1 = 1$ ពិត

ដូចនេះ
$$a_n = \frac{1}{6} n(n-1)(2n-1) + 1$$

លំហាត់គំរូទី២ : ក. កំណត់តួទី n នៃស្រ្តីត 4,18,48,100,180,294,... ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្រ្តីតនេះ ។

ចំណោះស្រាយ

ក. កំណត់តួទី n នៃស្រ្តីត 4,18,48,100,180,294,...

តាង (a_n) : 4,18,48,100,180,294,...

តាង (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី១នៃ ស្រ្តីត (a_n)

$\Rightarrow (b_n)$: 14,30,52,80,114,...

តាង (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី២ (ផលសងតួលំដាប់ទី១នៃ (b_n))

$\Rightarrow (c_n)$: 16,22,28,34,... ជាស្រ្តីតព្រួញដែលមានផលសងរួម $d = 6$

$\Rightarrow c_n = c_1 + (n-1)d = 16 + (n-1)6 = 16 + 6n - 6 = 6n + 10$

$$\begin{aligned} \text{ចំពោះ } n \geq 2 \text{ យើងបាន } b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \\ &= 14 + \sum_{k=1}^{n-1} (6k + 10) \\ &= 14 + 6 \sum_{k=1}^{n-1} k + 10(n-1) \\ &= 14 + 6 \frac{n(n-1)}{2} + 10(n-1) \\ &= 3n^2 + 7n + 4 \end{aligned}$$

$$\text{ចំពោះ } \forall n \geq 2 \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k^2 + 7k + 4) = n^3 + 2n^2 + n$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្រ្តីត 4,18,48,100,180,294,... គឺ $a_n = n^3 + 2n^2 + n$

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្រ្តីតនេះ

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (k^3 + 2k^2 + k) = \sum_{k=1}^n k^3 + 2 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\
 &= \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2 + 2 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} n(n+1) \\
 &= \frac{1}{12} n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)
 \end{aligned}$$

ចំពោះ $n=1 \Rightarrow S_1 = 4 = a_1$ ពិត ។

ដូចនេះ
$$S_n = \frac{1}{12} n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

១. កំណត់តួទី n នៃស្វីតខាងក្រោម:

ក. $0, 1, 4, 10, 20, 35, \dots$

ខ. $2, 10, 28, 60, 110, 182, \dots$

គ. $-1, 2, 15, 44, 95, 174, \dots$

ឃ. $2006, 1996, 1974, 1934, 1870, 1776, \dots$

ង. $0, 4, 18, 48, 100, 180, \dots$

២. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វីត $1, 5, 14, 30, 55, 91, \dots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតនេះ ។

៣. ក. កំណត់តួទី n នៃស្វីត $4, 26, 90, 220, 440, 774, \dots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វីតនេះ ។

លំហាត់

១. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots$

ខ. $1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + \dots$

២. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $\frac{1}{2 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{4}{5 \times 9} + \frac{8}{9 \times 17} + \dots + \frac{2^{n-1}}{(2^{n-1} + 1)(2^n + 1)}$

ខ. $\frac{7}{(1 \times 2)^3} + \frac{19}{(2 \times 3)^3} + \frac{37}{(3 \times 4)^3} + \dots + \frac{3n^2 + 3n + 1}{[n(n+1)]^3}$

៣. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4^2 + \dots + (n-1) \cdot n^2$

ខ. $1 + 3 + 6 + 10 + \dots + \frac{n(n+1)}{2}$

៤. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)$

ខ. $1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 10 + \dots + n(3n+1)$

៥. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + n(n+1)(n+2)$

ខ. $2 + 7 + 14 + \dots + (n^2 + 2n - 1)$

៦. គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \frac{3^2}{5 \cdot 9} + \dots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)}$

ខ. $\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{2}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{3}{5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots + \frac{n}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$

៧. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $S_n = \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(n+3)(n+4)}$

ខ. $S_n = \frac{7}{1 \cdot 8} + \frac{7}{8 \cdot 15} + \frac{7}{15 \cdot 22} + \dots + \frac{7}{(7n-6)(7n+1)}$

៨. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $1 + \frac{3}{2} + \frac{7}{4} + \frac{15}{8} + \dots + \frac{2^n - 1}{2^{n-1}}$

ខ. $\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n}{2^n}$

៩. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2012^2} + \frac{1}{2013^2}}$

ខ. $S_n = \frac{1}{1!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}$

១០. គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម:

ក. $S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 + \dots + 100 \cdot 299$

ខ. $S_n = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$

១១. គណនា:

ក. $S = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4i^2 - 1}$

ខ. $S = \sum_{k=1}^n [k(k+1)(k+2)]$ ។ រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $4S + 1$ ជាការេ

ប្រាកដចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

១២. ក. យើងមាន $u_n = 2^n(an^2 + bn + c)$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ a, b, c

បើ $u_{n+1} - u_n = n^2 \cdot 2^n$ ។

ខ. ដោយប្រើ (ក) ចូរគណនា $\sum_{k=1}^n 2^k \cdot k^2$

គ. ចូរគណនា $\sum_{k=1}^n 2^k \cdot k$

១៣. គេឱ្យ $u_n = \frac{\sqrt{2n+2\sqrt{n^2-1}} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}}$, $n \in \mathbb{N}$ ។

ចូរគណនា S_n ដែលជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្ថិត។

១៤. គណនា $A = \sqrt{2014} + \sqrt{8056} + \sqrt{18126} + \dots + \sqrt{20140000}$

$$B = \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + (2n)^2}{3^2 + 6^2 + 9^2 + \dots + (3n)^2}$$

១៥. គេឱ្យ $S_n = 1 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 8 + 3 \cdot 6 \cdot 12 + \dots + n \cdot 2n \cdot 4n$ និង

$$S'_n = 1 \cdot 3 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 18 + 3 \cdot 9 \cdot 27 + \dots + n \cdot 3n \cdot 9n$$

ចូរគណនា $T_n = \sqrt[3]{\frac{S_n}{S'_n}}$

១៦. ចូរកំណត់តួទី n នៃស្ថិតខាងក្រោម៖

ក. $0, 0, 2, 6, 12, 20, 30, \dots$

ខ. $0, -2, -2, 0, 4, 10, 18, \dots$

គ. $p, q, p, q, p, q, \dots$

មេរៀនទី

៥ ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

១. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

ក. ស្វ៊ីតទម្រង់ $a_1 = \alpha$ (ឬ $a_k = \alpha$) និង $a_{n+1} = qa_{n+1} + f(n)$
ដែល $f(n)$ ជាអនុគមន៍ ពហុធាមានដឺក្រេ n ដែល $n \in \mathbb{N}$

អប្បបរមា

តាង $b_n = g(n)$ ដែល (b_n) ជាស្វ៊ីតជំនួយដែលផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងស្វ៊ីត (a_n)

$$\text{គឺ } (a_n): a_{n+1} = qa_n + f(n) \quad (1)$$

$$\text{នោះ } (b_n): b_{n+1} = bq_n + f(n) \quad (2)$$

ជំនួស b_n និង b_{n+1} ក្នុង (2) រួចផ្ដើមមេគុណត្រូវគ្នានៃ n ដើម្បីកំណត់មេគុណនៃពហុធា $g(n)$

យើងបាន $b_n = g(n)$ រួចទាញរក $b_1 = g(1)$ (ឬទាញរក b_k)

ធ្វើផលដក (1) និង (2) យើងបាន $a_{n+1} - b_{n+1} = q(a_n - b_n)$ (3)

$$\text{តាង } c_n = a_n - b_n \Rightarrow c_{n+1} = a_{n+1} - b_{n+1}$$

តាម (3): $c_{n+1} = qc_n \Rightarrow (c_n)$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម q
រក c_1 ដែល $c_1 = a_1 - b_1$ បន្ទាប់មក កំណត់ c_n ដែល $c_n = c_1 \cdot q^{n-1}$

$$\text{តែ } c_n = a_n - b_n \Rightarrow a_n = c_n + b_n$$

អប្បបរមាស្វ៊ីតជំនួយ b_n

- បើ $q \neq 1$ នោះ តាង $b_n = g(n)$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$
- បើ $q = 1$ នោះ តាង $b_n = n \cdot g(n)$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$

របៀបទី២

- បើ $q \neq 1$ នោះតាង $b_n = a_n + g(n)$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេ ដូច $f(n)$
- បើ $q = 1$ នោះ តាង $b_n = a_n + n \cdot g(n)$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេ ដូច $f(n)$ ។

របៀបទី៣: យើងមាន $a_{n+1} = qa_n + f(n)$ (*)

☞ ចម្លើយទូទៅនៃ (*) កំណត់ដោយ $a_n = a'_n + a''_n$ ដែល ៖

- a'_n ជាចម្លើយទូទៅនៃស្វ៊ីត $a_{n+1} = qa_n$ គឺ $a'_{n+1} = qa'_n$
 $\Rightarrow a'_n = k \cdot q^{n-1}$ ដែល k កំណត់រកតាម a_1 ។
- a''_n ជាចម្លើយពិសេសនៃ (*) ដែល $\begin{cases} a''_n = g(n) & \text{បើ } q \neq 1 \\ a''_n = n \cdot g(n) & \text{បើ } q = 1 \end{cases}$
 ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$ ។

របៀបទី៤: យើងមាន $a_{n+1} = qa_n + f(n)$ (*)

ចែកអង្គទាំងពីរនៃ (*) នឹង q^{n+1} យើងបាន $\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{a_n}{q^n} + \frac{f(n)}{q^{n+1}}$ (**)

$$\text{តាង } b_n = \frac{a_n}{q^n} \Leftrightarrow a_n = b_n \cdot q^n$$

តាម (**) យើងបាន $b_{n+1} = b_n + \frac{f(n)}{q^{n+1}}$

$$\Leftrightarrow b_{n+1} - b_n = \frac{f(n)}{q^{n+1}}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q^{k+1}}$$

$$\Leftrightarrow b_n - b_1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q^{k+1}}$$

$$\Rightarrow b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q^{k+1}}$$

ឧទាហរណ៍១ : គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 1$ និង $a_{n+1} = 2a_n + 3$ ។
កំណត់តួទី n ។

ចម្លើយ ៖ $a_n = 2^{n+1} - 3$

ឧទាហរណ៍២ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 5$ និង

$$a_n = 2a_{n-1} - n$$

ចម្លើយ ៖ $a_n = 2^n + n + 2$

ឧទាហរណ៍៣: គេឱ្យស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} = 3a_n - 2n \end{cases}, n \in \mathbb{N}$ ។

កំណត់ a_n ដៃជាតួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ចម្លើយ ៖ $a_n = \frac{7}{2} \cdot 3^{n-1} + n + \frac{1}{2}, n \in \mathbb{N}$

ឧទាហរណ៍៤: រកតួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដោយ :

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + n^2 + 2n + 3 \end{cases} \quad \text{។}$$

ចម្លើយ $a_n = 7 \cdot 2^n - n^2 - 4n - 8, n \in \mathbb{N}$

ឧទាហរណ៍៥: រកតួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដោយ $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = a_n + 2n \end{cases}$

ចម្លើយ ៖ $a_n = n^2 - n + 2$

លំហាត់

១. កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 4 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - \frac{1}{4} \end{cases}$

គ. $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 5a_n + 6 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_{n+1} = 4a_n + 15 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} a_1 = -\frac{8}{9} \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - \frac{2}{3} \end{cases}$

ច. $\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n + 7 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 7a_n + 36 \end{cases}$

ជ. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 3a_n + 1 \end{cases}$

ឈ. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n + 4 \end{cases}$

ញ. $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = 3a_n + 12 \end{cases}$

២. កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក. $\begin{cases} a_5 = 33 \\ a_{n+1} = 2a_n - 1 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} a_5 = 87 \\ a_{n+1} = 3a_n + 12 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} a_4 = 66 \\ a_{n+1} = 3a_n + 3 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} a_3 = 74 \\ a_{n+1} = 5a_n + 4 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 5 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} a_3 = 11 \\ a_{n+1} = 5a_n + 3 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} a_3 = -5 \\ a_{n+1} = 2a_n + \frac{7}{3} \end{cases}$

ជ. $\begin{cases} a_2 = -3 \\ a_{n+1} = 2a_n - 5 \end{cases}$

ឈ. $\begin{cases} a_2 = 2 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2 \end{cases}$

ញ. $\begin{cases} a_5 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - 1 \end{cases}$

៣. កំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

$$\text{ក. } \begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = 3a_n - 2n + 1 \end{cases}$$

$$\text{ខ. } \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n + n - 2 \end{cases}$$

$$\text{គ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 2 \end{cases}$$

$$\text{ឃ. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = 5a_n + 20n - 5 \end{cases}$$

$$\text{ង. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n - \frac{3}{4}n - 2 \end{cases}$$

$$\text{ច. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 1 \end{cases}$$

$$\text{ឆ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2n + 5 \end{cases}$$

$$\text{ជ. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = 4a_n + 30n - 5 \end{cases}$$

$$\text{ឈ. } \begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = 2a_n + 3n - 3 \end{cases}$$

$$\text{ញ. } \begin{cases} a_1 = 9 \\ a_{n+1} = 2a_n + n - 1 \end{cases}$$

$$\text{ដ. } \begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} = 2a_n - n \end{cases}$$

$$\text{ប. } \begin{cases} a_2 = 6 \\ a_{n+1} = 2a_n - n + 1 \end{cases}$$

$$\text{ឌ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n - 2n + 3 \end{cases}$$

$$\text{ឍ. } \begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = 3a_n - 2n - 3 \end{cases}$$

$$\text{ណ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n - 2n + 3 \end{cases}$$

$$\text{ត. } \begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 3 \end{cases}$$

$$\text{ថ. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2n + 3 \end{cases}$$

$$\text{ទ. } \begin{cases} a_1 = 7 \\ a_{n+1} = 3a_n - 2n - 5 \end{cases}$$

$$\text{ធ. } \begin{cases} a_2 = 8 \\ a_{n+1} = a_n + 4n + 3 \end{cases}$$

$$\text{ន. } \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = a_n + 6n + 4 \end{cases}$$

ខ. ស្វ៊ីតទម្រង់ $a_1 = \alpha$ (ឬ $a_k = \alpha$) និង

$a_{n+1} = qa_n + f(n) \cdot r^n$ ដែល $f(n)$ ជាពហុធានីក្រេដឺក្រេ n
និង α, p, q ជាចំនួនពិតថេរ

រៀបចំ

ក. ករណី $p \neq q$

តាង $b_n = g(n) \cdot r^n$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធានីក្រេដឺក្រេ $f(n)$
ដែល (b_n) ជាស្វ៊ីតជំនួញផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងស្វ៊ីត (a_n)

គឺ $(a_n): a_{n+1} = qa_n + f(n) \cdot r^n$ (1)

នោះ $(b_n): b_{n+1} = qb_n + f(n) \cdot r^n$ (2)

ជំនួស b_n និង b_{n+1} ក្នុង (2) រួចផ្តើមមេគុណត្រូវគ្នានៃ n ដើម្បីកំណត់មេគុណ
នៃពហុធានី $g(n)$

យើងបាន $b_n = g(n)$ រួចទាញរក $b_1 = g(1)$

ធ្វើផលដក (1) និង (2) យើងបាន $a_{n+1} - b_{n+1} = q(a_n - b_n)$ (3)

តាង $c_n = a_n - b_n \Rightarrow c_{n+1} = a_{n+1} - b_{n+1}$

តាម (3): $c_{n+1} = qc_n \Rightarrow (c_n)$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម q

រក c_1 ដែល $c_1 = a_1 - b_1$ បន្ទាប់មក កំណត់ c_n ដែល $c_n = c_1 \cdot q^{n-1}$

តែ $c_n = a_n - b_n \Rightarrow a_n = c_n + b_n$

ខ. ករណី $p = q$

តាង $b_n = n \cdot g(n) \cdot r^n$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធានីក្រេដឺក្រេ $f(n)$
រួចបកស្រាយតាមរបៀបដូចករណី $p \neq r$ ដែរ

រូប្យបទី២

- បើ $q \neq 1$ នោះ តាង $b_n = a_n + g(n) \cdot r^n$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$
- បើ $q \neq 1$ នោះតាង $b_n = a_n + n \cdot g(n) \cdot r^n$ ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$

រូប្យបទី៣ : យើងមាន $a_{n+1} = qa_n + f(n) \cdot r^n$ (*)

ចែកអង្គទាំងពីរនៃ (*) នឹង q^{n+1} យើងបាន

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{a_n}{q^n} + f(n) \cdot \frac{r^n}{q^{n+1}} \quad (**)$$

$$\text{តាង } b_n = \frac{a_n}{q^n} \Leftrightarrow a_n = b_n \cdot q^n$$

តាម (**) យើងបាន

$$b_{n+1} = b_n + f(n) \cdot \frac{r^n}{q^{n+1}} \Leftrightarrow b_{n+1} - b_n = \frac{f(n)}{q} \cdot \left(\frac{r}{q}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q} \cdot \left(\frac{r}{q}\right)^k$$

$$\Leftrightarrow b_n - b_1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q} \cdot \left(\frac{r}{q}\right)^k$$

$$\Rightarrow b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{q} \cdot \left(\frac{r}{q}\right)^k$$

របៀបទូទៅ

យើងមាន $a_{n+1} = qa_n + f(n) \cdot r^n$ (*)

ចម្លើយទូទៅនៃ (*) កំណត់ដោយ $a_n = a'_n + a''_n$ ដែល ៖

- a'_n ជាចម្លើយទូទៅនៃស្វ៊ីត $a_{n+1} = qa_n$ គឺ $a'_{n+1} = qa'_n$
 $\Rightarrow a'_n = k \cdot q^{n-1}$
- a''_n ជាចម្លើយពិសេសនៃ (*) ដែល $\begin{cases} a''_n = g(n) \cdot r^n & \text{បើ } q \neq r \\ a''_n = n \cdot g(n) \cdot r^n & \text{បើ } q = r \end{cases}$
 ដែល $g(n)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $f(n)$

របៀបកំណត់តួទូទៅនៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលកំណត់ដោយ $a_1 = \alpha$ និង

$$a_{n+1} = qa_n + f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_k(n)$$

☞ ចម្លើយទូទៅគឺ $a_n = a'_n + g_1(n) + g_2(n) + g_3(n) + \dots + g_k(n)$ ដែល ៖

- a'_n ជាចម្លើយទូទៅនៃស្វ៊ីត $a_{n+1} = qa_n$ គឺ $a'_{n+1} = qa'_n$
 $\Rightarrow a'_n = \beta \cdot q^{n-1}$ ដែល β កំណត់តាម a_1
- $g_1(n)$ ជាចម្លើយពិសេសត្រូវនឹង $a_{n+1} = qa_n + f_1(n)$
 $\Rightarrow g_1(n+1) = qg_1(n) + f_1(n)$
- $g_2(n)$ ជាចម្លើយពិសេសត្រូវនឹង $a_{n+1} = qa_n + f_2(n)$
 $\Rightarrow g_2(n+1) = qg_2(n) + f_2(n)$
- $g_3(n)$ ជាចម្លើយពិសេសត្រូវនឹង $a_{n+1} = qa_n + f_3(n)$
 $\Rightarrow g_3(n+1) = qg_3(n) + f_3(n)$
- $\vdots$
- $g_k(n)$ ជាចម្លើយពិសេសត្រូវនឹង $a_{n+1} = qa_n + f_k(n)$
 $\Rightarrow g_k(n+1) = qg_k(n) + f_k(n)$

លំហាត់

១. រកតួទី n នៃស្រ្តីត (a_n) ដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ៖

$$\text{ក. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2^n \end{cases}$$

$$\text{ខ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 3 \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{គ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + n \cdot 3^n \end{cases}$$

$$\text{ឃ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + (n+4) \cdot 3^n \end{cases}$$

$$\text{ង. } \begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} = 2a_n + (n+1) \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{ច. } \begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = 5a_n - 3^n \end{cases}$$

$$\text{ឆ. } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + 2n \cdot 3^n \end{cases}$$

$$\text{ជ. } \begin{cases} a_1 = 8 \\ a_{n+1} = 2a_n + 6 \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{ឈ. } \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} - 2a_n = n + 3^n \end{cases}$$

$$\text{ញ. } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + n^2 + 3 \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{ដ. } \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - 2n - 1 + 2^{-n} \end{cases}$$

$$\text{ប. } \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n - n + n^2 + (1-n) \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{ឡ. } \begin{cases} a_1 = 6 \\ a_{n+1} - 2a_n = (n^2 + 1) \cdot 2^n \end{cases}$$

$$\text{ឈ. } \begin{cases} a_0 = 17 \\ a_{n+1} = 2a_n - n^2 + 2n + 1 + 6 \cdot 2^n \end{cases}$$

២. ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

យើងមាន $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n$ (1)

និង $S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1}$ (2)

យក (1)-(2) យើងបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ ចំពោះ $n \geq 2$

ដូចនេះ ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n គឺ $a_n = S_n - S_{n-1}, S_1 = a_1$

លំហាត់

១. S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្រ្តីត (a_n) ។ ប្រសិនបើ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌៈ

$$S_n = 4 - a_n - \frac{1}{2^{n-2}}, (n=1, 2, 3, \dots) \text{ ។}$$

ក. រកទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

ខ. រកតួទី n នៃស្រ្តីត (a_n) ។

២. ឧបមាថាផលបូក $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $2a_n - S_n = 3^n$

($n=1, 2, 3, \dots$) ។ ចូររកតួទីទៅ a_n ។

៣. យក $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ។ ប្រសិនបើ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n + n = 3^n$ ចំពោះ

$n=1, 2, 3, \dots$ ។ ចូររកតួទីទៅនៃស្រ្តីត (a_n) ។

៤. ឧបមាថាផលបូក $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ :

$$S_1 = 1, S_{n+1} - 3S_n = 2^{n+1} - 1, (n=1, 2, 3, \dots) \text{ ។}$$

ចូររកតួទីទៅនៃស្រ្តីត (a_n) ។

៥. ឧបមាថា S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្រ្តីត (a_n) ដែល $a_1 = 1$ ។

ប្រសិនបើ S_n និង a_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $a_n = \frac{2S_n^2}{2S_n - 1}, (n \geq 2) \text{ ។}$

រកតួទី n នៃស្រ្តីត (a_n) ។

៣. របៀបកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង:

$$\begin{cases} a_1 = \alpha, a_2 = \beta \\ a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0 \end{cases} \text{ ដែល } \alpha, \beta, p, q \text{ ជាចំនួនពិតច្រើន}$$

$$(n \in \mathbb{N})$$

របៀបដោះស្រាយ

- សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ (*) គឺ $x^2 + px + q = 0$ មាន $\Delta = p^2 - 4q$
- ❶ បើ $\Delta > 0$ នោះសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា ($x_1 \neq x_2$) នោះតួទី n នៃ (*) កំណត់ដោយ $a_n = Ax_1^n + Bx_2^n$ ដែល A និង B កំណត់តាម a_1 និង a_2 ។
 - ❷ បើ $\Delta = 0$ នោះសមីការមានឫសពីរស្មើគ្នា (ឬសឌុប $x_1 = x_2 = x_0$) នោះតួទី n នៃ (*) កំណត់ដោយ $a_n = (An + B)x_0^n$ ដែល A និង B កំណត់តាម a_1 និង a_2 ។
 - ❸ បើ $\Delta < 0$ នោះសមីការមាន ឬសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $x_{1,2} = a \pm bi$ នោះតួទី n នៃ (*) កំណត់ដោយ $a_n = r^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta)$ ដែល:
 - $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
 - $\begin{cases} \cos \theta = \frac{a}{r} \\ \sin \theta = \frac{b}{r} \end{cases} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$
 ហើយដែល A និង B កំណត់តាម a_1 និង a_2 ។

លំហាត់គំរូទី១ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង:

$$a_1 = 0, a_2 = 3 \text{ និង } a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{យើងមាន } a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } x^2 - 4x + 3 = 0$$

ដោយ $a+b+c=1-4+3=0$ នោះសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា គឺ

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a} = 3$$

នោះតួទី n នៃស្វ៊ីតកំណត់ដោយ $a_n = A \cdot 1^n + B \cdot 3^n = A + B \cdot 3^n$

$$\text{ដោយ } a_1 = 0, a_2 = 3 \text{ គេបាន: } \begin{cases} A + 3B = 0 \\ A + 9B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{3}{2} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ តួទី } n \text{ នៃស្វ៊ីតគឺ } \boxed{a_n = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot 3^n = \frac{3^n - 3}{2}}, n \in \mathbb{N}$$

លំហាត់គំរូទី២ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង:

$$a_1 = -3, a_2 = -36 \text{ និង } a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{យើងមាន } a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$\Delta' = 9 - 9 = 0$$

នោះសមីការមានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 3$

នោះតួទី n នៃស្វ៊ីតកំណត់ដោយ $a_n = (An + B) \cdot 3^n$

ដោយ $a_1 = -3, a_2 = -36$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} 3A+3B=-3 \\ 18A+9B=-36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=2 \end{cases}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $a_n = (-3n+2) \cdot 3^n$, $n \in \mathbb{N}$

លំហាត់គំរូទី៣ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនង :

$$a_1 = 3, a_2 = 4 \text{ និង } a_{n+2} + 2a_{n+1} + 2a_n = 0$$

ចំណោះស្រាយ

$$\text{សមីការសម្គាល់} \quad x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$\Delta' = 1 - 2 = -1 = i^2$$

$$\sqrt{\Delta'} = i$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = -1 \pm i$$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \theta &= \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$$

នោះចម្លើយទូទៅនៃ (a_n) កំណត់ដោយ

$$a_n = r^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta) = \sqrt{2}^n \left(A \cos \frac{3\pi}{4} n + \sin \frac{3\pi}{4} n \right)$$

ដោយ $a_1 = 3, a_2 = 4$ យើងបាន

$$\begin{cases} \sqrt{2} \left(A \cos \frac{3\pi}{4} + B \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 3 \\ \sqrt{2}^2 \left(A \cos \frac{3\pi}{2} + B \sin \frac{3\pi}{2} \right) = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -5 \\ B = -2 \end{cases}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស្វ៊ីតគឺ $a_n = \sqrt{2}^n \left(-5 \cos \frac{3\pi}{4} n - 2 \sin \frac{3\pi}{4} n \right)$

លំហាត់

១. ចូរកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតដែលកំណត់ដោយទំនាក់ទំនងខាងក្រោម:

ក.
$$\begin{cases} a_1 = 6, a_2 = 16 \\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n \end{cases}$$

ខ.
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 0 \\ a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \end{cases}$$

គ.
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2\sqrt{2} \\ a_{n+2} = 2\sqrt{2}a_{n+1} - 4a_n \end{cases}$$

ឃ.
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 13 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n \end{cases}$$

ង.
$$\begin{cases} a_1 = \frac{3-2\sqrt{3}}{2}, a_2 = \frac{3-6\sqrt{3}}{2} \\ a_{n+2} - 3a_{n+1} + 3a_n = 0 \end{cases}$$

ច.
$$\begin{cases} a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, a_2 = \frac{1}{2} \\ a_{n+2} = \sqrt{3}a_{n+1} - a_n \end{cases}$$

២. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក.
$$\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 2 \\ a_{n+2} - 7a_{n+1} + 12a_n = 0 \end{cases}$$

ខ.
$$\begin{cases} a_0 = 2, a_1 = 3 \\ 2a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0 \end{cases}$$

គ.
$$\begin{cases} a_0 = 0, a_1 = 1 \\ a_{n+2} = 7a_{n+1} + 8a_n \end{cases}$$

ឃ.
$$\begin{cases} a_0 = 2, a_1 = 3 \\ a_{n+2} = \frac{1}{3}(4a_{n+1} - a_n) \end{cases}$$

ង.
$$\begin{cases} a_0 = a_1 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n \end{cases}$$

ច.
$$\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 2 \\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n \end{cases}$$

ឆ.
$$\begin{cases} a_0 = a_1 = 1 \\ a_{n+2} = \frac{3}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n \end{cases}$$

ជ.
$$\begin{cases} a_0 = 2, a_1 = 5 \\ a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n \end{cases}$$

ឈ.
$$\begin{cases} a_0 = 0, a_1 = 1 \\ a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n \end{cases}$$

ញ.
$$\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = -3 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \end{cases}$$

៣. កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ក.
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 3 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0 \end{cases}$$

ខ.
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 9a_n \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} \text{គ.} \quad \begin{cases} a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, a_2 = \frac{1}{2} \\ a_{n+2} = \sqrt{3}a_{n+1} - a_n \end{cases} & \text{ឃ.} \quad \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2\sqrt{3} \\ a_{n+2} = 2a_{n+1} - 4a_n \end{cases} \\ \text{ង.} \quad \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 4\sqrt{3}a_{n+1} - 16a_n \end{cases} & \text{ច.} \quad \begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases} \end{array}$$

