


គណិតវិទ្យា

កម្រិតវិទ្យាល័យ

ធរណីមាត្រ

សំរាប់ការប្រឡងសិស្សពូកែ និង ប្រឡងប្រជែងនានា

- ទ្រឹស្តី
- ឧទាហរណ៍
- វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ
- លំហាត់
- ដំណោះស្រាយ



គណិតវិទ្យា

ចរណីមាត្រ

សំរាប់ការប្រលងសិស្សពូកែ និង ប្រលងប្រជែងនានា

រៀបរៀងដោយ ហេង សុខា

សហការណ៍ដោយ

ឈួរ គីមហ៊ុ

ម៉ូរ ម៉េងតាំង

មាតិកា

ជំពូក ១ សង្ខេបបូរណ៍សំខាន់ៗ.....	១
ជំពូក ២ លំហាត់.....	១១
ជំពូក ៣ ដំណោះស្រាយ.....	៣១
ជំពូក ៤ លំហាត់ត្រិះរិះ.....	១២៥

១. ទំនាក់ទំនងក្នុងត្រីកោណ

និមិត្តសញ្ញាដែលប្រើ:

a, b, c	: រង្វាស់ជ្រុងដែលឈមមុំ A, B, C នៃ $\triangle ABC$
S	: ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ
p	: កន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ
h_a, h_b, h_c	: ប្រវែងកំពស់គូសចេញពីកំពូល A, B, C
l_a, l_b, l_c	: ប្រវែងកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុង
m_a, m_b, m_c	: ប្រវែងមេដ្យានគូសចេញពីកំពូលទាំងបី
r_a, r_b, r_c	: ប្រវែងការង្វង់
R	: ប្រវែងការង្វង់ចារីក្រៅត្រីកោណ ABC
r	: ការង្វង់ចារីកក្នុង $\triangle ABC$

១. ទ្រឹស្តីបទស៊ីនីសៈ:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

២. ទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនីសៈ:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

៣. ទ្រឹស្តីបទចំនោល:

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = c \cos A + a \cos C$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$

៤. រូបមន្តក្រលាផ្ទៃ:

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$$

$$= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$= \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$= \frac{abc}{4R} = pr = (p-a)r_a = (p-b)r_b = (p-c)r_c$$

$$= 2R^2 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$$

៥. រូបមន្តកាំមារីកកុង:

$$r = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\cos \frac{A}{2}} = \frac{b \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2}}{\cos \frac{B}{2}} = \frac{c \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}}{\cos \frac{C}{2}}$$

$$= (p-a) \tan \frac{A}{2} = (p-b) \tan \frac{B}{2} = (p-c) \tan \frac{C}{2}$$

$$r_a = p \tan \frac{A}{2} = \frac{a \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}}{\cos \frac{A}{2}}$$

$$r_b = p \tan \frac{B}{2} = \frac{b \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}}{\cos \frac{B}{2}}$$

$$r_c = p \tan \frac{C}{2} = \frac{c \cos \frac{B}{2} \cos \frac{A}{2}}{\cos \frac{C}{2}}$$

៦. រូបមន្តកន្លះបន្ទាត់ព័ទ្ធមុំក្នុង:

$$l_a = \frac{2bc \sin \frac{A}{2}}{b+c} = \frac{2}{a+c} \sqrt{pbc(p-a)}$$

$$l_b = \frac{2ac \cos \frac{B}{2}}{a+c} = \frac{2}{a+c} \sqrt{pac(p-b)}$$

$$l_c = \frac{2ab \cos \frac{C}{2}}{a+b} = \frac{2}{a+b} \sqrt{pab(p-c)}$$

៧. រូបមន្តមេដ្យាន:

$$4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$$

$$4m_b^2 = 2c^2 + 2a^2 - b^2 = c^2 + a^2 + 2ca \cos B$$

$$4m_c^2 = 2a^2 + 2b^2 - c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$$

២. វិសមភាព

១. វិសមភាព Cauchy:

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$ គេបាន $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ។

សមភាពកើតឡើងកាលណា $a = b$ ។

2. ជាទូទៅ $\forall a_i \in \mathbb{R} (i=1,2,3,\dots,n)$ គេបាន :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq n\sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n$ ។

២. វិសមភាព Bernoulli:

1. $\forall x > -1, n \in \mathbb{N}^*$ គេបាន: $(1+x)^n \geq 1+nx$ ។

សមភាពកើតឡើងកាលណា $x = 0$ រឺ $n = 1$ ។

2. $\forall x > -1, r \in \mathbb{Q}, r \geq 1$ គេបាន $(1+x)^r \geq 1+rx$ ។

សមភាពកើតឡើងកាលណា $x = 0$ រឺ $r = 1$ ។

3. $\forall x > -1, r \in \mathbb{Q}, 1 \leq r \leq 1$ គេបាន $(1+x)^r \leq 1+rx$ ។

សមភាពកើតឡើងកាលណា $x = 0$ រឺ $r = 1$ ។

៣. វិសមភាព Bunyakovsky:

1. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$ គេបាន: $|ac + bd| \leq \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)}$

រឺ $(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ។

2. $\forall a_i, b_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ តែបាន:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ ។

៤. វិសមភាព Minkowski:

1. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$ តែបាន: $\sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}$ ។

សមភាពកើតឡើងកាលណា $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ។

2. $\forall a_i, b_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ តែបាន:

$$\begin{aligned} \sqrt{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2} \\ \leq \sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} + \dots + \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \end{aligned}$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ ។

៥. វិសមភាពត្រីកោណ:

បើ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ គេបានវិសមភាព:

$$1. |b - c| < a < b + c$$

$$2. |a - c| < b < a + c$$

$$3. |a - b| < c < a + b$$

៣. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

១. ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ:

$$1. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$2. \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0)$$

$$3. \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad (\sin \alpha \neq 0)$$

២. រូបមន្តផលបូក និង ផលដក:

$$1. \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$2. \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$3. \sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$4. \sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$5. \tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \left(a, b, (a + b) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$$

$$6. \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} \quad \left(a, b, (a - b) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$$

៣. រូបមន្តមុំ 2α និង 3α :

$$1. \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$2. \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$3. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$4. \cos 2\alpha = \cos^2 - \sin^2 \alpha$$

$$5. \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$6. \cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$7. \cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

$$8. \sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$$

$$9. \tan 3\alpha = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}$$

$$10. \cot 3\alpha = \frac{\cot^3 \alpha - 3 \cot \alpha}{3 \cot^2 \alpha - 1}$$

៤. រូបមន្តកន្លះមុំ:

$$1. \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$2. \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$3. \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

$$4. \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

៥. គណនា $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ ជាអនុគមន៍ t ($t = \tan \frac{\alpha}{2}$)

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

៦. រូបមន្តបំប្លែង:

៦.១ បំប្លែងពីផលគុណទៅផលបូក

$$1. \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$2. \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$3. \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

$$4. \sin b \sin a = \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$

៦.២ បំលែងពីផលបូកទៅផលគុណ

$$1. \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$2. \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$3. \sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$4. \sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$$

$$5. \tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$$

$$6. \tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$$

$$7. \cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q}$$


$$8. \cot p - \cot q = \frac{\sin(q-p)}{\sin p \sin q}$$

៤. បណ្តាទ្រឹស្តីបទផ្សេងទៀត

១. ទ្រឹស្តីបទអង្កត់ធ្នូប្រសព្វគ្នា:

បើអង្កត់ធ្នូ AB & CD នៃរង្វង់ប្រសព្វគ្នាត្រង់ X នោះ


$$AX.XB = CX.XD$$



២. ទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

បើ AX ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle A$ នៃ $\triangle ABC$ គេបាន:


$$\frac{BX}{XC} = \frac{AB}{AC}$$



៣. ទ្រឹស្តីបទ Ptolémé

បើ $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ និង មាន AC & BD ជាអង្កត់ទ្រូង គេបាន:

$$CD.AB + BC.AD = AC.BD$$




៤. ទ្រឹស្តីបទ Céva:

បើ X, Y, Z ជាចំនុចនៅលើជ្រុង BC, AC, AB នៃ $\triangle ABC$ ដែល AX, BY, & CZ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយ គេបាន:

$$\frac{AZ}{ZB} \cdot \frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{YA} = 1$$


(បំភ្លឺស្រាយនៅលំហាត់លេខ ៦៦)



៥. ទ្រឹស្តីបទ Simson:

គេអោយ P ជាចំនុចនៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ និង E, F, G ជាជើងចំនោលកែងពី P ទៅលើជ្រុងទាំង៣នៃ $\triangle ABC$ គេបាន: E, F, G រត់ត្រង់គ្នា។

(បំភ្លឺស្រាយនៅលំហាត់លេខ ៦៧)



១. បណ្តាញហាត់ទាក់ទងនឹងរូបមន្តទំនាក់ទំនងក្នុងត្រីកោណ

០១. បង្ហាញថាក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ផ្សេងផ្ទៃតំ $S = \frac{1}{4}(a^2 \sin 2B + b^2 \sin 2A)$ ។

០២. តាង R ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ ។ ស្រាយថា:

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{R(a^2 + b^2 + c^2)}{abc}$$

០៣. ក្នុង $\triangle ABC$, AM ជាមេដ្យាន ហើយ $\hat{A}MB = \alpha$ ។ ស្រាយថា $\cot \alpha = \frac{\sin(B-C)}{2\sin B \sin C}$ ។

០៤. ក្នុង $\triangle ABC$, CM ជាមេដ្យាន ហើយ $\hat{A}CM = \alpha$; $\hat{B}CM = \beta$ ។

a. ស្រាយថា $\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$

b. គណនាមុំ A, B, C ជាអនុគមន៍ α, β ។

០៥. $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ហើយ $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d$ ។

ស្រាយថា: $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-d)}{(p-b)(p-c)}}$ ដែល $p = \frac{a+b+c+d}{2}$ ។

០៦. ស្រាយថាគ្រប់ $\triangle ABC$ គេបាន: $(a-b)\cot \frac{C}{2} + (b-c)\cot \frac{A}{2} + (c-a)\cot \frac{B}{2} = 0$ ។

០៧. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើមេដ្យាន AA' និង BB' នៃ $\triangle ABC$ កែងគ្នា គេបាន:

$$\cot C = 2(\cot A + \cot B)$$

២. បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសមភាព

០៨. ស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្រប់ចតុកោណ ABCD គេបានវិសមភាព $AB + DC < AC + BD$ ។
០៩. ក្នុងចតុកោណប៉ោង ABCD មាន O ជាចំនុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង ហើយ S ជាក្រលាផ្ទៃ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា :
- $$OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2 \geq 2S \quad (\text{សមភាពកើតឡើងនៅពេលណា}) \quad \text{។}$$
១០. គេអោយ $\triangle ABC$ មានក្រលាផ្ទៃស្មើ 1 និងរង្វាស់ជ្រុង a, b, c ($a \geq b \geq c$) ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $b \geq \sqrt{2}$ ។
១១. គេអោយ $\triangle ABC$ មានក្រលាផ្ទៃ S ។ ចតុកោណកែង MNPQ ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ ។
 $M \in (AB), N \in (AC), P \in (BC)$ ។ តាង S' ជាក្រលាផ្ទៃ MNPQ ។
ស្រាយថា $S \geq 2S'$ ។
១២. ABCD ជាការេកតាមានជ្រុងស្មើ 1 ។ M ជាចំនុចមួយនៅលើជ្រុង [AD] & N ជា
ចំនុចមួយនៅលើជ្រុង [CD] ដែល $\angle MBN = 45^\circ$ ។ ស្រាយថា $\sqrt{2} - 1 \leq S_{MBN} \leq \frac{1}{2}$ ។
១៣. គេអោយចតុកោណ ABCD; O ជាចំនុចប្រសព្វអង្កត់ទ្រូង។ តាង $S_1 = S_{AOB}$; $S_2 = S_{COD}$
 $S = S_{ABCD}$ ។ ស្រាយថា $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} \leq \sqrt{S}$ ។
១៤. គេអោយចតុកោណ ABCD មានក្រលាផ្ទៃ S ។ ស្រាយថា $S \leq \frac{1}{8} (AC + BD)^2$ ។
១៥. គេអោយ $\triangle ABC$ មានមុំទាំងបីជាមុំស្រួច។ H ជាអរតូសង់នៃ $\triangle ABC$ ហើយ AM; BN;
CL ជាកំពស់។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$a. \frac{HM}{AM} + \frac{HN}{BN} + \frac{HL}{CL} = 1$$

$$b. \frac{AM}{HM} + \frac{BN}{HN} + \frac{CL}{HL} \geq 9$$

$$c. AM \cdot HM \leq \frac{BC^2}{4}$$

១៦. គេអោយ $\triangle ABC$ & O ជាចំនុចមួយស្ថិតក្នុងត្រីកោណ ។ បន្ទាត់ OA; OB; OC កាត់ BC; CA; AB រៀងគ្នាត្រង់ P; Q; R ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$a. \frac{OP}{AP} + \frac{OQ}{BQ} + \frac{OR}{CR} = 1$$


$$b. \frac{AP}{OP} + \frac{BQ}{OQ} + \frac{CR}{OR} \geq 9$$

១៧. គេអោយការេ QPSR ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A ដែល P; R នៅលើជ្រុង AB & AC ហើយ Q & R នៅលើជ្រុង BC ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $BC \geq 3QR$ តើសមភាពកើតនៅពេលណា ?

១៨. គេអោយចតុកោណប៉ោង ABCD ។ ស្រាយថា $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$ ។

១៩. គេអោយ $\triangle ABC$; O ជាចំនុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណ ។ AO; BO; CO កាត់ BC; CA & AB ត្រង់ P; Q; R ។ ស្រាយថា $\sqrt{\frac{OA}{OP}} + \sqrt{\frac{OB}{OQ}} + \sqrt{\frac{OC}{OR}} \geq 3\sqrt{2}$ ។

២០. តាមចំនុច O នៅក្នុង $\triangle ABC$ គូសបន្ទាត់បីស្របរវៀង គ្នានឹងជ្រុង (AB); (BC); (CA) ដូចរូបខាងស្តាំ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\delta} \geq \frac{3}{2}$ ។ បំរាប់ a; b; c
ជាក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ហើយ α ; β ; δ ជាក្រលាផ្ទៃ
ចតុកោណ ។



២១. គេអោយត្រីកោណ ABC មាន AM ជាមេដ្យាន ។

1. បើ $A < \frac{\pi}{2}$ ស្រាយថា: a. $BC^2 < AB^2 + AC^2$

b. $BC < 2AM$

2. បើ $A > \frac{\pi}{2}$ ស្រាយថា: a. $BC^2 > AB^2 + AC^2$

b. $BC > 2AM$

២២. គេអោយត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ។ D ជាជើងកំពស់គូសចេញពី A ។ យក O_1 ; O_2
ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABD$ & $\triangle ACD$ ។ បន្ទាត់កាត់តាម O_1 ; O_2 កាត់ (AB) & (AC)
ត្រង់ E & F ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2S_{AEF} \leq S_{ABC}$ ។

២៣. គេអោយត្រីកោណ ABC មានមុំទាំងអស់ជាមុំស្រួច ។ H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ និង
a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុង ។ ស្រាយថា $(AH+BH+CH)^2 \leq a^2 + b^2 + c^2$ ។

២៤. គេអោយត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងគូសចេញពី A កាត់ BC ត្រង់ A_1 និងរង្វង់ត្រង់ A_2 ។ ដូចគ្នាចំពោះកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងគូសចេញពី B & C កាត់ត្រង់ B_1 ; B_2 ; C_1 ; C_2 ។ ស្រាយថា $S = \frac{A_1A_2}{BA_2 + A_2C} + \frac{B_1B_2}{AB_2 + B_2C} + \frac{C_1C_2}{AC_2 + C_2B} \geq \frac{3}{4}$ ។

២៥. គេអោយចតុកោណ ABCD មាន $AB=a$; $CD=c$; $AD=BC$; $\hat{ADC} + \hat{DCB} = 90^\circ$ ។ M, N, P, Q ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ AB, AC, CD, BD ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S_{MNPQ} \geq \frac{(a-c)^2}{8}$ ។

២៦. គេអោយ Δ មានរង្វាស់ជ្រុង a; b; c & កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំទាំងបីមានប្រវែង l_a ; l_b ; l_c ។ ស្រាយថា $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{l_a} + \frac{1}{l_b} + \frac{1}{l_c}$ ។

២៧. គេអោយ ΔABC មាន $A > B > C$ ។ O ជាចំនុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណ។ បណ្តាបន្ទាត់ (AO); (BO); (CO) កាត់ BC; CA; AB ត្រង់ P; Q; R ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $OP + OQ + OR < BC$ ។

២៨. គេអោយ ΔABC មាន O ជិតនៅក្នុងត្រីកោណនោះ។ បណ្តាបន្ទាត់ AO; BO; CO កាត់ BC; CA; AB ត្រង់ D; E; F ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

a. $\frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} = 2$

b. $\frac{OA}{OD} + \frac{OB}{OE} + \frac{OC}{OF} \geq 6$

២៩. គេអោយ $\triangle ABC$ មានមុំ B ជាមុំទាល ។ នៅលើ (BC) គេដៅពីរចំនុច $M; N$ ដែល $BM=CN$ ។ ស្រាយថា $AB + AC > AM + AN$ ។

៣០. ក្នុង $\triangle ABC$ ដៅ A_1 លើ BC ; B_1 លើ CA ; C_1 លើ AB ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម $\triangle AB_1C_1$; $\triangle BC_1A_1$; $\triangle CA_1B_1$ មានក្រលាផ្ទៃតូចជាងរឺស្មើ $\frac{1}{4}$ នៃក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។

៣១. ស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្រប់ $\triangle ABC$ គេបាន: $m_a \cdot m_b \cdot m_c \leq \frac{27R^2}{8}$ ។

៣២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $l_a r_a + l_b r_b + l_c r_c \leq p^2$ ។

៣៣. គេអោយ P ជាចំនុចមួយនៅក្នុង $\triangle ABC$ ។ ចំងាយពី P ទៅកំពូល A, B, C គឺ x, y, z និងចំងាយពី P ទៅ ជ្រុង AB, BC, CA គឺ p, q, r ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

- $x + y + z \geq 2(p + q + r)$
- $xyz \geq 8pqr$

៣៤. កំនត់តំលៃ p តូចបំផុតដែលគេអាចទាញបាន $S^2 \leq p(a^4 + b^4 + c^4)$ ។

៣៥. គេអោយត្រីកោណ ABC មានក្រលាផ្ទៃ S និង m_a, m_b, m_c ជាមេដ្យានគូសចេញពីកំពូលទាំង ៣ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 \geq 3\sqrt{3}S$ ។

៣៦. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \geq 3\sqrt{\frac{4R^2}{r(a+b+c)abc}}$ ។

៣៧. គេអោយត្រីកោណ ABC មានក្រលាផ្ទៃ S និង មានប្រវែងជ្រុង a, b, c ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \geq 16S^2$ ។

៣៨. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ ។

៣៩. គេអោយត្រីកោណ ABC ដែលមាន $A \geq B \geq C$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$\frac{h_a}{h_b} + \frac{h_b}{h_c} + \frac{h_c}{h_a} \geq \frac{h_b}{h_a} + \frac{h_a}{h_c} + \frac{h_c}{h_b}$$

៤០. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{m_a}{h_a} + \frac{m_b}{h_b} + \frac{m_c}{h_c} \leq \frac{R+r}{r}$ ។

៤១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2)(h_a^2 + h_b^2 + h_c^2) \geq 27S^2$ ។

៤២. គេអោយ $\triangle ABC$ មានមុំស្រួចបី ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

ក. $h_a + h_b + h_c \geq 9r$

ខ. $\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} + \frac{1}{m_c} \geq \frac{2}{r}$

សញ្ញា (=) កើតមាននៅពេលណា ?

៤៣. គេអោយ $\triangle ABC$ មានកំពូល C ។ គេយក $\frac{AC}{AB} = k$ ($k \neq 1$) ។ គូសកន្លះបន្ទាត់ពុះ CM ,

AN និង BP ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា :

ក) $\frac{S_{ABC}}{S_{MNP}} = \left(\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}}\right)^2$ ខ) $S_{MNP} < \frac{S_{ABC}}{4}$

៤៤. គេអោយ $\triangle ABC$ មានទីប្រជុំទំងន់ G និង ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ R ។

បណ្តាមេដ្យានដែលគូសចេញពីកំពូល A , B , C កាត់ផ្ទៃរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ D , E , F ។

ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{3}{R} \leq \frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \leq \sqrt{3}\left(\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{BC}\right)$ ។

៤៥. គេអោយ $\triangle ABC$, តាង D ជាចំនុចនៅលើជ្រុង BC ។ នៅលើបណ្តាជ្រុង AB និង AC គេដៅ ចំនុច P និង Q រៀងគ្នា ។ បណ្តាបន្ទាត់ដែលកូសចេញពី P និង Q ស្របនឹង AD ហើយកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ N និង M ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា : $S_{MNPQ} \leq \max \{ S_{ABD}, S_{ACD} \}$ ។ សមភាពកើតមានឡើងនៅពេលណា ?

៣. បញ្ហាបំបាត់ទាក់ទងនឹងតំលៃតូចនិងធំបំផុត

៤៦. គេអោយ $\triangle ABC$ មានរង្វាស់ជ្រុង a, b, c និងបរិមាត្រ 10cm ។ គណនាក្រលាផ្ទៃធំបំផុតនៃ $\triangle ABC$ រួចកំណត់ប្រភេទត្រីកោណដែលមានក្រលាផ្ទៃធំបំផុតនេះ ។
៤៧. គេអោយ $\triangle ABC$ មានមុំបីជាមុំស្រួច ។ ពីចំនុច I មួយបិតនៅក្នុង $\triangle ABC$ គូស IH, IK, IL កែងនឹង BC, CA, & AB ។ រកទីតាំងចំនុច I ដែលធ្វើអោយ $AK^2 + BH^2 + CK^2$ តូចបំផុត ។
៤៨. គេអោយការេ ABCD មានរង្វាស់ជ្រុង a ។ H ជាចំនុចមួយនៅលើ [AC] ។ E & F ជាចំនោលកែងនៃ H លើ [AB] & [BC] ។ កំណត់ទីតាំង H ដើម្បីអោយ S_{DEF} មានតំលៃតូចបំផុត ។
៤៩. គេអោយត្រីកោណសម័ង្ស ABC; ចំនុច M & N នៅលើ [AB] & [AC] ដែល $\frac{AM}{MB} + \frac{AN}{NC} = 1$ ។ រកទីតាំងចំនុច M & N ដើម្បីអោយ S_{AMN} ធំបំផុត ។

៥០. គេអោយ $\triangle ABC$ មាន $\angle A = 30^\circ$, $AB = c$, $AC = b$, និង មេដ្យាន AM ។

គូសបន្ទាត់(d)មួយ កាត់តាមទីប្រជុំទំងន់ G នៃ $\triangle ABC$ ហើយកាត់ AB ត្រង់ P និងកាត់ AC ត្រង់ Q ។

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = 3$

ខ. តាង $AP = x$, រកតំលៃអតិបរមានិងតំលៃអប្បបរមានៃ x ។

៥១. គេអោយការេ $ABCD$ មានប្រវែងជ្រុង a ។ តាង M, N, P

ជាបីចំនុចរៀងគ្នានៅលើបណ្តាជ្រុង BC, CD, DA ដែល $\triangle MNP$ ជាត្រីកោណសម្ងាត់ ។

ក) បង្ហាញថា: $CN^2 - AP^2 = 2 DP \cdot BM$ ។

ខ) កំនត់ទីតាំង M, N, P ដើម្បីអោយ $\triangle MNP$ មានក្រលាផ្ទៃតូចបំផុត ។

៤. បណ្តាញចាត់ចែង៖

៥២. នៅលើជ្រុង AC នៃ $\triangle ABC$ ដោយចំនុច E ។ តាម E គូស $(DE) \parallel (BC)$ & $(EF) \parallel (AB)$


។ ស្រាយថា $S_{BDEF} = 2\sqrt{S_{ADE} \cdot S_{EFC}}$ ។

៥៣. តំបន់ $ABCDEFGH$ ផ្ទុកការេចំនួន 13 ប៉ុន្មានគ្នា ហើយ


តំបន់នេះចារឹកក្នុងចតុកោណកែង $PQRS$ (មើលរូប)។

គេអោយ $PQ = 28$ & $QR = 26$ ។


គណនាក្រលាផ្ទៃតំបន់នេះ ។




៥៤. ក្នុងរូបខាងស្តាំ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ហើយ P ជាចំនុចមួយក្នុងត្រីកោណ ។ បន្ទាត់កែង PR, PS & PT ត្រូវបានគូសចេញពីចំនុច P ទៅកាន់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ។ បង្ហាញថា ផលបូកក្រលាផ្ទៃឆ្នុតទាំងបីស្មើ $\frac{1}{2}$ នៃក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។



៥៥. តាមចំនុច P ក្នុង $\triangle ABC$ បន្ទាត់ AX, BY, CZ ត្រូវបានគូសដូចបានបង្ហាញ ។ បង្ហាញថាបើត្រីកោណដែលមានផ្ទៃឆ្នុតទាំងបីមានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា នោះត្រីកោណតូចទាំង៦មានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា ។




៥៦. ក្នុងរូបខាងស្តាំ $ABCD$ & $AXYZ$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល X នៅលើ $[BC]$ និង D នៅលើ $[YZ]$ ។ បង្ហាញថា ប្រលេឡូក្រាមទាំងពីរមានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា ។



៥៧. ក្នុងរូបខាងស្តាំ បន្ទាត់ឈរមានប្រវែង 5cm កែងបន្ទាត់ដេកដែល មានប្រវែង $10\sqrt{3}\text{ cm}$ ត្រង់ចំនុចកណ្តាល ហើយធ្លាក់កោងជាផ្នែកមួយ នៃរង្វង់ ។ គណនាក្រលាផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយធ្នូកោង និង បន្ទាត់ដេក ។




៥៨. តាមចំនុចមួយក្នុង $\triangle ABC$ គេគូសបន្ទាត់ចេញពីកំពូលត្រីកោណកាត់តាមចំនុចនេះ ហើយចែក $\triangle ABC$ ជា ៦ ផ្នែក ។ បួនចំនែកមានក្រលាផ្ទៃ ដូចបានបង្ហាញ ។ គណនា S_{ABC} ។



៥៩. $\triangle ABC$ មាន $AC = 7$; $BC = 24$; $\hat{C} = 90^\circ$ ។ M ជាចំនុចកណ្តាល $[AB]$; D នៅតែម្ខាងនៃ (AB) ជាមួយ C និង $DA = DB = 15$ ។ រកក្រលាផ្ទៃ $\triangle CDM$ ។

៦០. គេអោយ $\triangle ABC$ មានក្រលាផ្ទៃ ១ ឯកតា។ X, Y, Z ជាចំនុចស្ថិតនៅលើអង្កត់ $[AB], [BC], [AC]$ រៀបគ្នាដែល $\frac{AX}{AB} = \frac{BY}{CB} = \frac{CZ}{CA} = \frac{1}{3}$ ។ គណនាក្រលាផ្ទៃ $\triangle XYZ$ ។

៦១. $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណដែលគេអោយមុន ។ ប្រៀបធៀបក្រលាផ្ទៃនៃកោណទាំងពីរ ។



៦២. $[BC]$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត O ។ A ជាចំនុចមួយនៅលើរង្វង់ដែលមុំ $\angle AOC > 60^\circ$ ។ $[EF]$ ជាអង្កត់ធ្នូ និងជាមេដ្យាទ័រនៃ $[AO]$ ។ D ជាចំនុចកណ្តាលនៃធ្នូតូច AB ។ បន្ទាត់កាត់តាម O ហើយស្រប $[AD]$ កាត់ $[AC]$ ត្រង់ J ។ បង្ហាញថា J ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle CEF$ ។

៦៣. គេអោយប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលមានកំពូល A ជាមុំស្រួច ។ លើកន្លះបន្ទាត់ AB & CB តាងចំនុច H & K ដែល $CH=CB$ & $AK=AB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

- $DH=DK$
- $\triangle DKH \cong \triangle ABK$ ។

៦៤. សង់ការេ $BRSC$ & $DCTU$ នៅលើជ្រុងពីរនៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។ ស្រាយថា $AC=ST$ ហើយបន្ទាយនៃ (AC) កែងនឹង (ST) ។


៦៥. គេអោយបន្ទាត់ (XY) និងរង្វង់ផ្ចិត O (បន្ទាត់មិនកាត់តាមរង្វង់ទេ) ។ ពីចំនុច A នៅលើ (XY) សង់បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ (AB) & (AC) ត្រង់ B & C ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា BC កាត់តាមចំនុចនឹងមួយកាលណា A រត់នៅលើ (XY) ។

៦៦. គេអោយ E; F; G ជាចំនុចនៅលើជ្រុង AB; AC; BC នៃ $\triangle ABC$ ដែល AG; BF & CE កាត់គ្នាត្រង់ចំនុចមួយ ។ ស្រាយថា $\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$ ។

៦៧. តាង P ជាចំនុចនៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ ។ A_1 ; B_1 ; C_1 ជាជើងចំនោលកែងគូសពី P ទៅលើជ្រុង AB; BC; CA ។ ស្រាយថា A_1 ; B_1 ; C_1 រត់ត្រង់គ្នា ។

៦៨. គេអោយចតុកោណកែង ABCD; M ជាចំនុចកណ្តាល [AB]; N ជាចំនុចកណ្តាល [CD]; Q នៅលើ [AC] ។ បន្ទាត់ (QM) កាត់បន្ទាត់ (BC) ត្រង់ P ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\angle QNM = \angle MNP$ ។

៦៩. ក្នុងរូបខាងស្តាំ បន្ទាត់ AB, CD & PQ ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរដែល A & C នៅលើរង្វង់តែមួយ ហើយ B & D នៅលើរង្វង់មួយទៀត ។ ចំនុច P & Q នៅលើ AB & CD ។ ស្រាយថា $PB = QC$ ។



៧០. បណ្តាចំនុច P, Q, & R ត្រូវបានដៅនៅលើជ្រុង BC, AC, AB រៀងគ្នា នៃ $\triangle ABC$ ដែល $BP = \frac{1}{3}BC$, $CQ = \frac{1}{3}CA$, $AR = \frac{1}{3}AB$ ។ បណ្តាចំនុច X, Y ត្រូវបានដៅនៅលើអង្កត់ PR & QP ដែល $PX = \frac{1}{3}PR$ & $QX = \frac{1}{3}PQ$ ។ ស្រាយថា $(XY) \parallel (BC)$ ។

៧១. គេអោយ $\triangle ABC$ មានកំពូលត្រង់ A ។ តាង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$, D ជាចំនុចកណ្តាលជ្រុង AB , E ជាទីប្រជុំទំងន់នៃ $\triangle ACD$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា : $IE \perp CD$ ។
៧២. គេអោយចតុកោណប៉ោង $ABCD$, នៅលើបណ្តាអង្កត់ AB, BC, CD, DA គេដៅបណ្តាចំនុច M, N, P, Q ដែល $AQ = DP = CN = BM$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $MNPQ$ ជាការេនោះ $ABCD$ ក៏ជាការេដែរ ។
៧៣. គេអោយចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត (O) , អង្កត់ទ្រូងទាំងពីរនៃចតុកោណកាត់គ្នាត្រង់ M ។ ពិចារណាចំនុច P នៅលើជ្រុង AB គូសបន្ទាត់ PM , ពិចារណាចំនុច Q នៅលើជ្រុង BC គូសបន្ទាត់ QM ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ $PM \perp CD$ នោះ $QM \perp AD$ ដែរ ។
៧៤. រង្វង់ (S) កាត់ R ប៉ះនឹងបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា (t_1) & (t_2) ។ រង្វង់ (S_1) កាត់ r_1 ប៉ះនឹងរង្វង់ (S) និងបន្ទាត់ (t_1) ។ រង្វង់ (S_2) កាត់ r_2 ប៉ះនឹងរង្វង់ (S) និងបន្ទាត់ (t_2) ហើយរង្វង់ (S_1) & (S_2) ជារង្វង់ប៉ះគ្នាផងដែរ ។ គណនា R ជាអនុគមន៍នៃ r_1 & r_2 ។
៧៥. $ABCD$ ជាចតុកោណប៉ោងដែល $AB = 8$; $BC = 6$; $BD = 10$; $\hat{A} = \hat{D}$ & $\hat{ABD} = \hat{C}$ ។ គណនា CD ។
៧៦. ក្នុង $\triangle ABC$; $\hat{BAC} = 100^\circ$ & $AB = AC$ ។ D ជាចំនុចមួយនៅលើ $[AC]$ ដែល $\hat{ABD} = \hat{CBD}$ ។ បង្ហាញថា $AB + DB = BC$ ។
៧៧. ក្នុង $\triangle ABC$ ដៅចំនុច P មួយ ។ នៅលើជ្រុង AC & BC ដៅចំនុច M & L ដែល $\hat{PAC} = \hat{PBC}$ & $\hat{PLC} = \hat{PMC} = 90^\circ$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ D ជាចំនុចកណ្តាល $[AB]$ នោះ $DM = DL$ ។

៧៨. ក្នុង $\triangle ABC$ គេមាន $\hat{A} = 30^\circ; \hat{B} = 50^\circ; M \in (AC)$ ដែល $CM = CB$ ។ ស្រាយថា $BM = AC$ ។

៧៩. ក្នុងត្រីកោណសមបាត ABC ដែលមានមុំកំពូល $\hat{C} = 80^\circ$ ដោយចំណុច M ដែល $\hat{MBA} = 30^\circ; \hat{MAB} = 10^\circ$ ។ គណនា $\hat{AMC}$ ។


៨០. គេអោយចតុកោណកែង $ABCD$ មានបាត $AB=a; CD=b$ & ជ្រុងទ្រូត $AD=c; BC=d$ & អង្កត់ទ្រូង $AC=p; BD=q$ ។ ស្រាយថា $p^2 + q^2 = c^2 + d^2 + 2ab$ ។

៨១. D ជាចំនុចមួយនៅលើជ្រុង $[AB]$ នៃ $\triangle ABC$ ដែល $AB=4AD$ ។ P ជាចំនុចមួយនៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ ដែល $\hat{ADP} = \hat{ACB}$ ។ បង្ហាញថា $PB=2PD$ ។

៨២. គេអោយ $\triangle ABC$ សម័ង្សចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ P ជាចំនុចមួយនៅលើធ្នូ BC ។ ស្រាយថា $PA = PB + PC$ ។

៨៣. គេអោយការេ $ABCD$ មួយ ។ ដោយចំនុច P ក្នុងការេដែល $\hat{PAB} = \hat{PBA} = 15^\circ$ ។ ស្រាយថា PCD ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

៨៤. ក្នុងរូបខាងស្តាំ $ABCD$ ជាបន្ទាត់ត្រង់ដែល $AB=BC=CD=2$ & $AF=DE=2; BE=4$ & $FC=CE$ ។ គណនា FB ។



៨៥. គេអោយរង្វង់ផ្ចិត (O) កាំ r ប៉ះរង្វង់ (O') កាំ R ។ បន្ទាត់ (L) ប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ S & T ។ គណនា $|ST|$ ។

៨៦. គេកំនត់ $|PQR|$ ជាក្រលាផ្ទៃនៃ PQR ។ បណ្តាអង្កត់ទ្រូងនៃ $ABCD$ កាត់គ្នាត្រង់ E ។
 ឧបមាថា $|AEB|=3$; $|DEC|=10$; $|BEC|=2|AED|$ ។ គណនា $|AED|$ ។

៨៧. គេអោយ $\triangle ABC$ ដូចរូបខាងក្រោម ។ ដោយ $(SR) \parallel (CB)$; $(TU) \parallel (AC)$; $(PQ) \parallel (BC)$
 ចូររកក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ដោយដឹងថាបន្ទាត់ (PQ) ; (TU) ; (SR) ចែក $\triangle ABC$ ជាពីរ
 ចំនែកមានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា ហើយ $S_{XYZ}=1$ ។

៨៨. គេអោយ $ABCD$ ជាចតុកោណប៉ោងមាន K ; L ; M ; N ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ DC ;
 DA ; AB ; BC ។ ឧបមាថា AK កាត់ BL ; DN ត្រង់ P ; S ហើយ CM កាត់ BL ; DN
 ត្រង់ Q ; R ។ គណនាក្រលាផ្ទៃនៃចតុកោណ $PQRS$ ដោយដឹងថា $S_{ABCD}=3000$;
 $S_{AMQP}=513$ និង $S_{CKSR}=388$ ។

៨៩. គេអោយចតុកោណ $ABCD$ មាន $AD=\sqrt{3}$; $\hat{ABD} = \hat{ACD} = 60^\circ$; E & F
 ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABD & ACD ; បើ $EF = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$ ។ គណនា BC ។

៩០. នៅលើជ្រុងកែង $[AC]$ & $[BC]$ នៃ $\triangle ABC$ សង់ខាងក្រៅនូវការេ $ACKL$ &
 $BCMN$ ។ (BL) កាត់ (AC) & (AN) រៀងគ្នាត្រង់ P & R ។ (AN) កាត់ (BC) ត្រង់
 Q ។ ស្រាយថា $S_{CPRQ} = S_{ABR}$ ។

៩១. បន្ទាត់ (L) កាត់ជ្រុង $[AB]$ & $[AD]$ នៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ត្រង់ E & F រៀងគ្នា។
 ឧបមាថា G ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (L) & (AC) ។ ស្រាយថា $\frac{AC}{AG} = \frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF}$ ។

៩២. គេអោយរង្វង់ $(O_1; R_1)$; $(O_2; R_2)$ ប៉ះគ្នា ហើយរង្វង់ $(O_3; R_3)$ ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ $O_1; O_2$ រួចប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះក្រៅរវាង O_1 & O_2 ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{\sqrt{R_3}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}}$ ។

៩៣. ក្នុងបញ្ចកោណ ABCD មានរង្វាស់ជ្រុង 1; 2; 3; 4 & 5 ដោយមិនគិតពីលំដាប់ ។ គេយក F; G; H; I ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ AB; BC; CD; DE ។ X ជាចំនុចកណ្តាលនៃ [FH] & Y ជាចំនុចកណ្តាលនៃ [GI] ។ អង្កត់ [XY] មានតំលៃប្រវែងជាចំនួនគត់ ។ គណនាតំលៃដែលអាចមានរបស់ AE ។

៩៤. នៅលើជ្រុង BC នៃ $\triangle ABC$ ដោយចំនុច P ដែល $PC = 2BP$ ។ គណនា $\hat{ACB}$ បើ $\hat{ABC} = 45^\circ$; $\hat{APC} = 60^\circ$ ។


៩៥. បណ្តាអង្កត់ទ្រូង AC & CE នៃឆកោណនិយ័ត ABCDEF ត្រូវបែកដោយចំនុច M & N ដែល $AM : AC = CN : CE = \lambda$ ។ គណនា λ បើ B, M, N រត់ត្រង់គ្នា ។

៩៦. រូបខាងស្តាំកើតឡើងពីត្រីកោណសមបាតប៉ុន្មានចំនួន 6 ដែលត្រូវបានតំរូវដោយមិនអោយជាន់គ្នា ។ ត្រីកោណនីមួយៗមានបាតប្រវែង 1 ឯកតា និង ជ្រុងប្រវែង ២ ឯកតា ។ គណនាប្រវែង AB ។




៩៧. នៅផ្នែកខាងក្នុងចតុកោណ ABCD ដោយ M ដែល ABMD ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ស្រាយថា បើ $\hat{CDM} = \hat{CBM}$ នោះ $\hat{ACD} = \hat{BCM}$ ។

៩៨. ក្នុងរូបខាងស្តាំ រង្វង់ពីរប៉ះគ្នា ហើយចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ដែលមានកាំ 2cm ។ បើរង្វង់ធំប៉ះអង្កត់ផ្ចិតនៃកន្លះរង្វង់ត្រង់ផ្ចិត C របស់វា គណនាកាំនៃរង្វង់តូច ។



៩៩. ក្នុងរូបខាងស្តាំ D ជាចំនុចកណ្តាលធ្នូ AC និង $DE \perp AB$ ។

ស្រាយថា $AE = EB + BC$ ។



១០០. $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A មានប្រវែងបណ្តាជ្រុង $BC=a$, $AB=c$, $CA=b$

ចារឹកក្នុងរង្វង់អង្កត់ ផ្ចិត BC ។ចំនុច P មួយនៅលើរង្វង់ដែល P និង A នៅសងខាង BC ។តាម P គូស $PK \perp BC$ ត្រង់ K, $PL \perp AC$ ត្រង់ L និង $PM \perp AB$ ត្រង់ M ។តាងប្រវែងបណ្តាអង្កត់ PK, PL និង PM ជាលំដាប់រៀងគ្នា x, y, z ។

$$\text{រកតំលៃអប្បបរមានៃផលបូក : } S = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \text{ ។}$$

១០១. គេអោយចតុកោណប៉ោង ABCD ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ។ គេដឹងថាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃបណ្តាមុំ BAD និង ABC កាត់គ្នាត្រង់ចំនុច E នៅលើជ្រុង CD ។

ក) បង្ហាញថា : $AD + BC = CD$ ។

$$\text{ខ) គេដឹងថា } \frac{CD}{CB} = k > 1 \text{ ។ គណនា } \frac{S_{ADE}}{S_{BCE}} \text{ ។}$$

១០២. គេអោយ $\triangle ABC$ មានជ្រុង $a; b; c$ & កំពស់ $h_a; h_b; h_c$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ

$$\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{\sqrt{p(p-a)}} + \frac{1}{\sqrt{p(p-b)}} + \frac{1}{\sqrt{p(p-c)}}$$

នោះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៣. គេអោយ $\triangle ABC$ មាន $0 < B < 90^\circ$ ។ តាង AH; AD; AM ជាកំពស់

ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ និងជាមេដ្យានគូសចេញពី A ។ ស្រាយថា D នៅចន្លោះ M & H ។

១០៤. ក្នុង $\triangle ABC$ គូសកំពស់ AD, BE & CF ។ ស្រាយថា $\frac{P'}{P} = \frac{r}{R}$ ដែល P' ជាបរិមាត្រ $\triangle EDF$ & P ជាបរិមាត្រ $\triangle ABC$ ។

១០៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើត្រីកោណ ABC មានជ្រុងដែលផ្ទៀងផ្ទាត់:

$$2(a^3 + b^3 + c^3) = a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2)$$

នោះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៦. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ $m_a + m_b + m_c = \frac{9R}{2}$ នោះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៧. ស្រាយថាគ្រប់ $\triangle ABC$ គេបាន:

$$(a-b)\cot\frac{C}{2} + (b-c)\cot\frac{A}{2} + (c-a)\cot\frac{B}{2} = 0$$

១០៨. កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់:

$$a. S = \frac{1}{4}(a+b-c)(a-b+c)$$

$$b. S = \frac{\sqrt{3}}{36}(a+b+c)^2$$

១០៩. ពិជ្ជិត O នៃរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ គូសបន្ទាត់កែង OA', OB' & OC' ទៅលើជ្រុង BC, CA & AB រៀងគ្នា(មុំ $\triangle ABC$ ជាមុំស្រួច) ។ ស្រាយថា

$$OA' + OB' + OC' = R + r$$

៥. បញ្ហាជំហានៗប្រឆាំង Olympiad

១១០. P ជាចំនុចក្នុង $\triangle ABC$ ។ PA កាត់ BC ត្រង់ D; PB កាត់ AC ត្រង់ E & PC កាត់ AB ត្រង់ F ។ បង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម $\frac{AP}{PD}; \frac{BP}{PE}; \frac{CP}{PF}$ មានតំលៃមិនលើសពី 2 និងយ៉ាងហោចណាស់មានមួយមានតំលៃធំជាង 2 ។
១១១. ក្នុងរង្វង់មួយដៅអង្កត់ធ្នូ AB និង ចំនុច C ដៅលើរង្វង់ដែល ចំងាយពី C ទៅ AB ស្មើ 4cm ។ បើ $CA=6\text{cm}$ & $CB=10\text{cm}$ គណនាអង្កត់ធ្នូនៃរង្វង់ ។
១១២. គេអោយចតុកោណប៉ោង ABCD ដែលអង្កត់ទ្រូង AC & BD កាត់គ្នាត្រង់ O ។ ឧបមាថា r_1, r_2, r_3, r_4 ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ OAB, OBD, OCD & ODA រៀងគ្នា ហើយផ្សេងផ្គុំថា $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_4}$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ABCD ជាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ។
១១៣. ក្នុង $\triangle ABC$ គេអោយ D, E, F ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC, CA, AB និង P, Q, R ជា ចំនុចកណ្តាលនៃមេដ្យាន AD, BE, CF រៀងគ្នា ។ ស្រាយថាតំលៃផលធៀប T ខាងក្រោម មិនអាស្រ័យនឹងរូបរាងរបស់ត្រីកោណ ហើយរកតំលៃនោះ ។
- $$T = \frac{AQ^2 + AR^2 + BP^2 + BR^2 + CP^2 + CQ^2}{AB^2 + BC^2 + CA^2}$$
១១៤. ក្នុង $\triangle PQR$ មាន $PQ=8, QR=13$ & $PR=15$ ។ បង្ហាញថាមានចំនុច S មួយនៅលើ PR (តែមិននៅចំនុចចុងនៃអង្កត់ទេ) ដែល PS & QS មានតំលៃគត់ ។

១១៥. គេអោយបញ្ចកោណនិយ័ត ABCDE ចារឹកក្នុងរង្វង់ (O) ។ នៅលើធ្នូ AB នៃ (O) ដេរ៉ាចនុច M (M មិនស្ថិតលើ A រឺ B ឡើយ) ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$MA + MB + MD = MC + ME$$

១១៦. គេអោយត្រីកោណ ABC មួយ ។ សង់ត្រីកោណ ABR, BCP, CAQ ដែលស្ថិតនៅជាប់ខាងក្រៅ $\triangle ABC$ ហើយមាន $\widehat{PBC} = \widehat{CAQ} = 45^\circ$, $\widehat{BCP} = \widehat{QCA} = 30^\circ$ និង $\widehat{ABR} = \widehat{BAR} = 15^\circ$ ។ ស្រាយថា $\widehat{QRP} = 90^\circ$ & $QR = RP$ ។

១១៧. គេអោយ a, b, c ជារង្វង់នៃ $\triangle ABC$ និង A ជាក្រលាផ្ទៃ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}A$ ។ តើសមភាពកើតឡើងពេលណា ?

១១៨. កាំនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណសមបាតមួយមានប្រវែង R និង កាំរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះគឺ r ។ បង្ហាញថាចំងាយរវាងផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរគឺ $\sqrt{R(R - 2r)}$ ។

១១៩. ត្រីកោណ ABC មានប្រវែងជ្រុង a, b, c ។ បន្ទាត់ប៊ីដែលប៉ះទៅនឹងរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រូវបានគូសស្របទៅនឹងជ្រុងទាំងបី ។ បន្ទាត់ប៉ះនីមួយៗផ្គុំជាមួយជ្រុងពីរៗនៃត្រីកោណបង្កើតបានជាត្រីកោណដែលមានចំនួនសរុប៣ ។ គណនាផលបូកសរុបរវាងក្រលាផ្ទៃរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណទាំង៣ និង រង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ ។

០១. បញ្ជាក់ថា $S = \frac{1}{4}(a^2 \sin 2B + b^2 \sin 2A)$ _____

តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$: $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$ គេបាន:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{4}(a^2 \sin 2B + b^2 \sin 2A) = R^2(\sin^2 A \sin 2B + \sin^2 B \sin 2A) \\ &= 2R^2 \sin A \sin B(\sin A \cos B + \sin B \cos A) = 2R^2 \sin A \sin B \sin(A + B) \\ &= 2R^2 \sin A \sin B \sin(180^\circ - C) = 2R^2 \sin A \sin B \sin C \quad \text{ពិត} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $S = \frac{1}{4}(a^2 \sin 2B + b^2 \sin 2A)$ ។

០២. ស្រាយថា $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{R(a^2 + b^2 + c^2)}{abc}$ _____

យើងមាន $\cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}{\frac{a}{2R}} = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{abc}$

ដូចគ្នាដែរគេបាន $\cot B = \frac{R(a^2 + c^2 - b^2)}{abc}$, $\cot C = \frac{R(b^2 + a^2 - c^2)}{abc}$

ដូចនេះគេបាន $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{R(a^2 + b^2 + c^2)}{abc}$ ។

០៣. ស្រាយថា $\cot \alpha = \frac{\sin(B - C)}{2 \sin B \sin C}$ _____

តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$ យើងបាន :

$$\frac{c}{\sin \alpha} = \frac{BM}{\sin \widehat{BAM}} = \frac{a}{2\sin(B + \alpha)}$$


$$\Rightarrow \frac{\sin(B + \alpha)}{\sin \alpha} = \frac{a}{2c} = \frac{\sin A}{2\sin C} = \frac{\sin(B + C)}{2\sin C}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin B \cos \alpha + \sin \alpha \cos B}{\sin \alpha} = \frac{\sin B \cos C + \sin C \cos B}{2\sin C}$$

$$\Leftrightarrow \sin B \cdot \cot \alpha = \frac{\sin B \cos C + \sin C \cos B}{2\sin C} - \cos B$$

$$\Rightarrow \sin B \cot \alpha = \frac{\sin(B - C)}{2\sin C}$$

ដូចនេះ $\cot \alpha = \frac{\sin(B - C)}{2\sin B \sin C}$ ។




0៤. a. ស្រាយថា $\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ _____

តាមទ្រឹស្តីបទ sin ក្នុង $\triangle ACM$ & $\triangle BCM$ យើងបាន:

$$\frac{AM}{\sin \alpha} = \frac{CM}{\sin A} \quad (1), \quad \frac{BM}{\sin \beta} = \frac{CM}{\sin B} \quad (2)$$

ដោយ $AM = BM$

តាម (1) & (2) គេបាន $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin A}{\sin B}$



b. គណនាមុំ A, B, C ជាអនុគមន៍ α, β

បើ $\alpha = \beta$ នោះ $A = B = \frac{\pi}{2} - \alpha$ & $C = 2\alpha$

បើ $\alpha \neq \beta$, ឧបមាថា $\alpha > \beta$ នោះ $\sin \alpha > \sin \beta$

តាម (a) : $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin A}{\sin B} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\sin A - \sin B} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin A + \sin B}$

$$\Rightarrow \frac{\sin A - \sin B}{\sin A + \sin B} = \frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{A-B}{2} \cot \frac{A+B}{2} = \tan \frac{\alpha-\beta}{2} \cot \frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\text{ដោយ } \alpha + \beta = C \text{ នោះ } \frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha+\beta}{2} \Rightarrow \cot \frac{A+B}{2} = \tan \frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{A-B}{2} \tan \frac{\alpha+\beta}{2} = \tan \frac{\alpha-\beta}{2} \cot \frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{A-B}{2} = \tan \frac{\alpha-\beta}{2} \cot^2 \frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\text{តាង } \tan \frac{\varphi}{2} = \tan \frac{\alpha-\beta}{2} \cot^2 \frac{\alpha+\beta}{2} \text{ នោះ } \tan \frac{A-B}{2} = \tan \frac{\varphi}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{A-B}{2} = \frac{\varphi}{2} \\ \frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha+\beta}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{\varphi}{2} \\ B = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha+\beta}{2} - \frac{\varphi}{2} \end{cases} \quad \text{។}$$

០៥. ស្រាយថា: $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-d)}{(p-b)(p-c)}}$

$$\text{យើងមាន } \tan^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin^2 \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2}} = \frac{1 - \cos A}{1 + \cos A}$$


$$\text{ដោយ } \hat{A} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \cos A = -\cos C$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសក្នុង $\triangle ABD$ & $\triangle CBD$:

$$BD^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos C = b^2 + c^2 + 2bccos A$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$$

$$\bullet 1 - \cos A = 1 - \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{2ad - a^2 - d^2 + 2bc + b^2 + c^2}{2(ad + bc)} \\
&= \frac{(b+c)^2 - (a-d)^2}{2(ad + bc)} \\
&= \frac{(b+c+d-a)(b+c+a-d)}{2(ad + bc)} \\
&= \frac{2(p-a)(p-d)}{ad + bc} \\
\bullet 1 + \cos A &= 1 + \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)} = \frac{(a+d)^2 - (b-c)^2}{2(ad + bc)} \\
&= \frac{2(p-b)(p-c)}{ad + bc}
\end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } \tan^2 \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{1 + \cos A} = \frac{(p-a)(p-d)}{(p-b)(p-c)}$$

$$\text{ដូចនេះ } \tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-d)}{(p-b)(p-c)}} \quad \text{។}$$

០៦. ស្រាយថា $(a-b)\cot \frac{C}{2} + (b-c)\cot \frac{A}{2} + (c-a)\cot \frac{B}{2} = 0$ _____

$$\text{យើងមាន } r = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\cos \frac{A}{2}} = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\sin \left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2} \right)} = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \cos \frac{B}{2}}$$

$$\Rightarrow a = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ គេបាន } b = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$c = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{A}{2} \right)$$

$$\bullet (a-b) = r \left(\cot \frac{B}{2} - \cot \frac{A}{2} \right)$$

$$\bullet (b-c) = r \left(\cot \frac{C}{2} - \cot \frac{B}{2} \right)$$

$$\bullet (c-a) = r \left(\cot \frac{A}{2} - \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$\text{គេបាន } (a-b) \cot \frac{C}{2} + (b-c) \cot \frac{A}{2} + (c-a) \cot \frac{B}{2} = 0 \quad \forall$$

០៧. ស្រាយថា $\cot C = 2(\cot A + \cot B)$ _____

យក G ជាទីប្រជុំទំងន់នៃ $\triangle ABC$

$$\text{គេបាន } AG^2 = \left(\frac{2}{3} m_a \right)^2 = \frac{4m_a^2}{9}$$

$$= \frac{1}{9} (2b^2 + 2c^2 - a^2)$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ គេបាន } BG^2 = \frac{1}{9} (2a^2 + 2c^2 - b^2)$$


$$\text{ដោយ } AA' \perp BB' \Rightarrow AB^2 = AG^2 + BG^2$$

$$\Leftrightarrow c^2 = \frac{1}{9} (a^2 + b^2 + 4c^2)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 = 5c^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c^2 = 4c^2$$

$$\Leftrightarrow 2ab \cos C = 4c^2$$



តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$ គេបាន $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$

$$\Rightarrow 2 \cdot 2R \sin A \cdot 2R \sin B \cdot \cos C = 4(2R \sin C)^2$$

$$\Leftrightarrow \sin A \sin B \cos C = 2 \sin^2 C \quad (1)$$

$$\text{យើងពិនិត្យ } \cot C = 2(\cot A + \cot B) \Leftrightarrow \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{2 \sin(A+B)}{\sin A \cos B}$$

$$\Leftrightarrow \sin A \sin B \sin C = 2 \sin^2 C \quad (2)$$

តាម (1) & (2) គេបាន $\cot C = 2(\cot A + \cot B)$ ។

០៨. ស្រាយថា $AB + DC < AC + BD$


តាង O ជាអង្កត់ទ្រូងធម្មតា ABCD

យើងមាន $AC = OA + OC$

$BD = OB + OD$

$$\Rightarrow AC + BD = (OA + OB) + (OC + OD) > AB + DC$$

ដូចនេះ $AB + DC < AC + BD$ ។



០៩. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2 \geq 2S$

យើងមាន $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$

$$2S = 2S_1 + 2S_2 + 2S_3 + 2S_4$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2OA \cdot OD \sin \alpha_1 + \frac{1}{2} \cdot 2OA \cdot OB \sin \alpha_2 + \frac{1}{2} \cdot 2OB \cdot OC \sin \alpha_3 + \frac{1}{2} \cdot 2OC \cdot OD \sin \alpha_4$$

$$= OA \cdot OD \sin \alpha_1 + OA \cdot OB \sin \alpha_2 + OB \cdot OC \sin \alpha_3 + OC \cdot OD \sin \alpha_4$$

ដោយ $\sin \alpha_1 \leq 1$; $\sin \alpha_2 \leq 1$; $\sin \alpha_3 \leq 1$; $\sin \alpha_4 \leq 1$


$$\Rightarrow OA \cdot OD \sin \alpha_1 + OA \cdot OB \sin \alpha_2 + OB \cdot OC \sin \alpha_3 + OC \cdot OD \sin \alpha_4$$

$$\leq OA \cdot OD + OA \cdot OB + OB \cdot OC + OC \cdot OD$$

$$\leq \frac{OA^2 + OD^2 + OA^2 + OB^2 + OB^2 + OC^2 + OC^2 + OD^2}{2}$$

$$= OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2$$

ដូចនេះ $2S \leq OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2$



សមភាពកើតឡើងកាលណា $OA=OB=OC=OD$; $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=90^\circ$ គឺ ABCD ជាការេ ។

១០. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $b \geq \sqrt{2}$ _____

$$\text{យើងមាន } S = \frac{1}{2} bc \sin A \leq \frac{1}{2} bc \quad (\sin A \leq 1)$$

$$\text{ដោយ } b \geq c \Rightarrow \frac{1}{2} bc \leq \frac{1}{2} b^2$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{1}{2} b^2 \quad \text{ដូចនេះ } \underline{b \geq \sqrt{2}} \quad \text{។}$$

១១. ស្រាយថា $S \geq 2S'$ _____

តាង H ជាកំពស់ $\triangle ABC$ គូសចេញពីនិមិត្ត A ។

$$\text{យើងមាន } S = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC; \quad S' = MN \cdot NP$$

$$\text{ដោយ } (MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \quad (1)$$

$$(PN) \parallel (AH) \Rightarrow \frac{CN}{CA} = \frac{PN}{AH} \quad (2)$$


$$\text{តាម (1) \& (2) គេបាន } \frac{MN \cdot PN}{BC \cdot AH} = \frac{AN \cdot CN}{AC^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{S'}{2S} = \frac{AN \cdot CN}{AC^2}$$

$$\text{តាម Cauchy: } AN^2 + CN^2 \geq 2 \cdot AN \cdot CN \Rightarrow (AN + CN)^2 \geq 4AN \cdot CN$$

$$\Leftrightarrow \frac{AC^2}{4} \geq AN \cdot CN$$

$$\text{គេបាន } \frac{S'}{2S} \leq \frac{AC^2}{4AC^2} \Rightarrow \underline{S \geq 2S'} \quad \text{។}$$



១២. ស្រាយថា $\sqrt{2} - 1 \leq S_{MBN} \leq \frac{1}{2}$ _____

យើងមាន $S_{MBN} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot BN \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot BM \cdot BN$

តាង $S = S_{MBN} = S_{ABC} - (S_1 + S_2 + S_3)$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} \cdot AM \cdot AB + \frac{1}{2} \cdot BC \cdot NC + \frac{1}{2} \cdot DM \cdot DN \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} (AM + NC + DM \cdot DN)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} [AM + NC + (1 - AM) \cdot DN]$$

$$= 1 - \frac{1}{2} [AM - AM \cdot DN + NC + DN]$$

$$= 1 - \frac{1}{2} [AM(1 - DN) + CD]$$

$$S = 1 - \frac{1}{2} [AM \cdot CN + 1] \Rightarrow AM \cdot CN = 1 - 2S$$

ម្យ៉ាងទៀត $S = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot BM \cdot BN = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{(1 + AM^2)(1 + CN^2)}$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{AM^2 \cdot CN^2 + AM^2 + CN^2 + 1}$$

$$\Leftrightarrow S^2 = \frac{1}{8} [(1 - 2S^2) + BM^2 - 1 + BN^2 - 1 + 1]$$


$$\Leftrightarrow 8S^2 = 1 - 4S + 4S^2 + BM^2 + BN^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow 4S^2 + 4S = BM^2 + BN^2 \geq 2BM \cdot BN = \frac{8}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot BM \cdot BN = \frac{8}{\sqrt{2}} S$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}S^2 + \sqrt{2}S - 2S \geq 0$$

$$\Leftrightarrow S(\sqrt{2}S + \sqrt{2} - 2) \geq 0 \quad \text{ដោយ } S > 0$$

$$\Rightarrow S + 1 - \sqrt{2} \geq 0 \Leftrightarrow S \geq \sqrt{2} - 1$$



$$\text{ហើយ } S = 1 - \frac{1}{2}(AM \cdot CN + 1)$$

$$\text{បើ } M \text{ ត្រួតលើ } A \text{ រឺ } D \Rightarrow AM \cdot CN = 0 \Leftrightarrow S = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{បើ } M \text{ មិនត្រួតលើ } A \text{ រឺ } D \Rightarrow AM \cdot CN > 0 \Leftrightarrow S < 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } \sqrt{2} - 1 \leq S_{MBN} \leq \frac{1}{2} \quad \forall$$

១៣. ស្រាយថា $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} \leq \sqrt{S}$ _____

$$\text{យើងមាន } S_1 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \sin \alpha$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot OD \cdot OC \sin \alpha$$

$$S_1 \cdot S_2 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \sin \alpha \times \frac{1}{2} \cdot OD \cdot OC \sin \alpha$$

$$\text{តែ } \alpha + \beta = 180^\circ \Rightarrow \sin \alpha = \sin \beta$$


$$\text{គេបាន } S_1 \cdot S_2 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \sin \beta \times \frac{1}{2} \cdot OD \cdot OC \sin \beta$$

$$\text{នាំអោយ } S_1 \cdot S_2 = S_{OAD} \cdot S_{OBC}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } S = S_1 + S_2 + S_{OAD} + S_{OBC} \geq S_1 + S_2 + 2\sqrt{S_{OAD} \cdot S_{OBC}}$$

$$\Leftrightarrow S \geq S_1 + S_2 + 2\sqrt{S_1 \cdot S_2} = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$$

$$\text{ដូចនេះ } \sqrt{S} \geq \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} \quad \forall$$



១៤. ស្រាយថា $S \leq \frac{1}{8} (AC+BD)^2$ _____

យើងមាន $S = S_{AOB} + S_{OBC} + S_{ODC} + S_{OAD}$

តែ $S_{AOB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \sin \hat{AOB} \leq \frac{1}{2} (OA \cdot OB)$

ធ្វើដូចគ្នាដែរ គេបាន $S_{OBC} \leq \frac{1}{2} (OB \cdot OC)$

$$S_{OCD} \leq \frac{1}{2} (OD \cdot OC)$$

$$S_{OAD} \leq \frac{1}{2} (OA \cdot OD)$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{1}{2} (OB \cdot OA + OB \cdot OC + OC \cdot OD + OD \cdot OA)$$


$$\Leftrightarrow S \leq \frac{1}{2} [OB(AO + OC) + OD(OA + OC)]$$

$$\Leftrightarrow S \leq \frac{1}{2} AC \cdot DB$$

តាម Cauchy $\Rightarrow AC^2 + DB^2 \geq 2AC \cdot DB$

$$\Leftrightarrow \frac{(AC + DB)^2}{4} \geq AC \cdot DB$$

នោះ $S \leq \frac{1}{8} (AC + DB)^2$ ។




១៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

a. $\frac{HM}{AM} + \frac{HN}{BN} + \frac{HL}{CL} = 1$

យើងមាន $S_{ABC} = \frac{1}{2} AM \cdot BC$

$$S_{HBC} = \frac{1}{2} HM \cdot BC$$



$$\Rightarrow \frac{S_{HBC}}{S_{ABC}} = \frac{HM}{AM}$$

ដូចគ្នាដែរគេបាន $\frac{S_{HAC}}{S_{ABC}} = \frac{HN}{BN}$; $\frac{S_{HAB}}{S_{ABC}} = \frac{HL}{CL}$

នោះ $\frac{HM}{AM} + \frac{HN}{BN} + \frac{HL}{CL} = \frac{S_{HBC} + S_{HAC} + S_{HAB}}{S_{ABC}} = \frac{S_{ABC}}{S_{ABC}} = 1$

b. $\frac{AM}{HM} + \frac{BN}{HN} + \frac{CL}{HL} \geq 9$

តាមសំរាយខាងលើ $\Rightarrow \frac{AM}{HM} + \frac{BN}{HN} + \frac{CL}{HL} = S_{ABC} \left(\frac{1}{S_{HBC}} + \frac{1}{S_{HAC}} + \frac{1}{S_{AHB}} \right)$

$$= (S_{HBC} + S_{HAC} + S_{AHB}) \left(\frac{1}{S_{HBC}} + \frac{1}{S_{HAC}} + \frac{1}{S_{AHB}} \right)$$

តាម Cauchy: $S_{HBC} + S_{HAC} + S_{AHB} \geq 3\sqrt[3]{S_{HBC} \cdot S_{HAC} \cdot S_{AHB}}$

$$\frac{1}{S_{HBC}} + \frac{1}{S_{HAC}} + \frac{1}{S_{AHB}} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{S_{HBC} \cdot S_{HAC} \cdot S_{AHB}}}$$

$$\Rightarrow \frac{AM}{HM} + \frac{BN}{HN} + \frac{CL}{HL} \geq 9$$

c. $AM \cdot HM \leq \frac{BC^2}{4}$

$\triangle ABM$ & $\triangle HMC$ ជាត្រីកោណកែង $\widehat{BAM} = \widehat{LCB}$ (មុំជ្រុងកែងរៀងគ្នា)

$$\Rightarrow \triangle ABM \sim \triangle HMC \text{ នោះ } \frac{AM}{BM} = \frac{MC}{HM} \Leftrightarrow AM \cdot HM = BM \cdot MC$$

តាម Cauchy: $BM^2 + MC^2 \geq 2BM \cdot MC$

$$\Leftrightarrow \frac{(BM + MC)^2}{4} \geq BM \cdot MC \text{ តែ } BM + MC = BC$$

$$\text{ដូចនេះ } AM \cdot HM \leq \frac{BC^2}{4} \quad \text{។}$$

១៦. ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$a. \frac{OP}{AP} + \frac{OQ}{BQ} + \frac{OR}{CR} = 1$$

តាង $[AH]$ ជាកំពស់ $\triangle ABC$

H' ជាចំណោលកែងពី $O \rightarrow AH$

$\Rightarrow [HH']$ ជាកំពស់ $\triangle OBC$


$$\left. \begin{aligned} S_{ABC} &= \frac{1}{2} AH \cdot BC \\ S_{OBC} &= \frac{1}{2} HH' \cdot BC \end{aligned} \right| \Rightarrow \frac{S_{OBC}}{S_{ABC}} = \frac{HH'}{AH}$$

$$\text{ដោយ } (OH') \parallel (BC) \Rightarrow \frac{HH'}{AH} = \frac{OP}{AP}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{OBC}}{S_{ABC}} = \frac{OP}{AP}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } \frac{S_{OAC}}{S_{ABC}} = \frac{OQ}{BQ}; \frac{S_{OAB}}{S_{ABC}} = \frac{OR}{CR}$$

$$\text{គេបាន } \frac{OP}{AP} + \frac{OQ}{BQ} + \frac{OR}{CR} = \frac{S_{OBC} + S_{OAC} + S_{OAB}}{S_{ABC}} = 1$$



$$b. \frac{AP}{OP} + \frac{BQ}{OQ} + \frac{CR}{OR} \geq 9$$

$$\frac{AP}{OP} + \frac{BQ}{OQ} + \frac{CR}{OR} = S_{ABC} \left(\frac{1}{S_{OBC}} + \frac{1}{S_{OAC}} + \frac{1}{S_{OAB}} \right)$$

$$= (S_{OBC} + S_{OAC} + S_{OAB}) \left(\frac{1}{S_{OBC}} + \frac{1}{S_{OAC}} + \frac{1}{S_{OAB}} \right) \geq 9$$

១៧. ប្រយោជន៍ពាក់កណ្តាល $BC \geq 3QR$

យើងមាន:

$$\widehat{BPQ} = \widehat{SCB} \text{ (មុំមានជ្រុងកែងរៀងគ្នា)}$$

$\Rightarrow \triangle PBQ \text{ \& } \triangle SCR$ ជាត្រីកោណកែងមាន:

$$\widehat{BPQ} = \widehat{SCB} \text{ នោះ } \triangle PBQ \sim \triangle SCR$$

$$\text{វិញ្ញាបនបត្រ} \quad \frac{BQ}{SR} = \frac{PQ}{RC} \Leftrightarrow SR \cdot PQ = BQ \cdot RC \quad (1)$$


$$\text{តែ } PQ = SR = QR \Rightarrow QR^2 = BQ \cdot RC$$

$$BC = BQ + RC + QR \geq 2\sqrt{BQ \cdot RC} + QR = 3QR$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $BQ = RC$

$$\text{តាម (1)} \Rightarrow BQ^2 = QR^2 \Rightarrow BQ = QR \text{ នោះ } \widehat{ABC} = 45^\circ$$

ដូចនេះ $BC \geq 3QR$ សមភាពកើតឡើងកាលណា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។



១៨. ប្រយោជន៍ $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$

តាង K ជាចំណុចមួយនៅក្នុងចតុកោណដែល

$$\widehat{ABK} = \widehat{DBC}; \widehat{BAK} = \widehat{BDC}$$


គេបាន $\triangle AKB \sim \triangle BCD$

$$\text{វិញ្ញាបនបត្រ} \quad \frac{AK}{DC} = \frac{BK}{CB} = \frac{AB}{BD}$$

$$\text{នោះ } AB \cdot DC = BD \cdot AK \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } \widehat{ABD} = \widehat{ABK} + \widehat{KBD}; \widehat{KBC} = \widehat{KBD} + \widehat{DBC}$$

$$\text{នោះ } \widehat{ABD} = \widehat{KBC} \text{ តែ } \frac{AB}{BD} = \frac{BK}{CB} \Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle BKC$$



$$\text{វិញ្ញាបន៍ } \frac{AB}{BK} = \frac{BD}{BC} = \frac{AD}{CK} \Rightarrow BC \cdot AD = BD \cdot CK \quad (2)$$

យក (1)+(2) $\Rightarrow$

$$AB \cdot DC + BC \cdot AD = BD(AK + CK) \geq BD \cdot AC \quad (AK + KC \geq AC)$$

ដូចនេះ $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$

សមភាពកើតឡើងកាលណា K លើ (AC) ។

១៩. ស្រាយថា $\sqrt{\frac{OA}{OP}} + \sqrt{\frac{OB}{OQ}} + \sqrt{\frac{OC}{OR}} \geq 3\sqrt{2}$ _____

$$\text{តាង } S_{OBC} = S_1; S_{OCA} = S_2; S_{OAB} = S_3; S_{ABC} = S$$

$$\Rightarrow S = S_1 + S_2 + S_3$$

$$\text{យើងមាន } \frac{S}{S_1} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{S_1} = 1 + \frac{S_2 + S_3}{S_1} \quad (1)$$

$$\text{តែ } \frac{S}{S_1} = \frac{AP}{OP} = \frac{OA + OP}{OP} = 1 + \frac{OA}{OP} \quad (2)$$


$$(1) \& (2) \text{ គេបាន } \frac{OA}{OP} = \frac{S_2 + S_3}{S_1} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{OA}{OP}} = \frac{\sqrt{S_2 + S_3}}{\sqrt{S_1}}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } \sqrt{\frac{OB}{OQ}} = \frac{\sqrt{S_1 + S_3}}{\sqrt{S_2}}; \sqrt{\frac{OC}{OR}} = \frac{\sqrt{S_1 + S_2}}{\sqrt{S_3}}$$

$$\text{តាម Cauchy: } S_2 + S_3 \geq 2\sqrt{S_2 S_3} \Rightarrow 2(S_2 + S_3) \geq (\sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{S_2 + S_3} \geq \frac{\sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{នាំអោយ } \sqrt{\frac{OA}{OP}} \geq \frac{\sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{S_1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}} + \frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S_1}} \right)$$



$$\sqrt{\frac{OA}{OP}} + \sqrt{\frac{OB}{OQ}} + \sqrt{\frac{OC}{OR}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}} + \frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S_1}} + \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2}} + \frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_2}} + \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_3}} + \frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_3}} \right] \geq \frac{6}{\sqrt{2}}$$

ដូច្នេះ $\sqrt{\frac{OA}{OP}} + \sqrt{\frac{OB}{OQ}} + \sqrt{\frac{OC}{OR}} \geq 3\sqrt{2}$ ។

២០. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\delta} \geq \frac{3}{2}$ _____

តាម Cauchy: $\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\delta} \geq 3\sqrt[3]{\frac{abc}{\alpha\beta\delta}}$

ដោយ $a = \frac{1}{2}OE \cdot OF \sin \alpha_2$

$b = \frac{1}{2}OG \cdot OH \sin \alpha_3$

$c = \frac{1}{2}OJ \cdot OI \sin \alpha_1$

$\Rightarrow abc = \frac{1}{8}OE \cdot OF \cdot OG \cdot OH \cdot OI \cdot OJ$
 $\times \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \alpha_3$


ម្យ៉ាងទៀត $\alpha = OH \cdot OI \sin \alpha_2$

$\beta = OJ \cdot OE \sin \alpha_3$

$\delta = OF \cdot OG \sin \alpha_1$

$\Rightarrow \alpha\beta\delta = OE \cdot OF \cdot OG \cdot OH \cdot OI \cdot OJ \cdot \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \alpha_3$

នាំអោយ $\frac{abc}{\alpha\beta\delta} = \frac{1}{8}$ នេះ $\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\delta} \geq \frac{3}{2}$ ។



២១. សំរាយវិសមភាព

1. យើងមាន : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$

បើ $A < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos A > 0 \Rightarrow \underline{BC^2 < AB^2 + AC^2}$

ម្យ៉ាងទៀត : $4AM^2 = 2(AB^2 + AC^2) - BC^2 > 2BC^2 - BC^2$
 $\Rightarrow 4AM^2 > BC^2 \Rightarrow \underline{2AM > BC}$

2. ស្រាយដូចសំណួរទី (1) ដែរ ។

២២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2S_{AEF} \leq S_{ABC}$

តាងរង្វង់ O_1 មានកាំ R_1

រង្វង់ O_2 មានកាំ R_2 និង $AD = h$

យើងមាន : $IO_2 = JO_2 - IJ$

តែ $JO_2 = AM = AH = AD - HD$
 $= AD - O_2P = h - R_2$

$IJ = O_1L = R_1$

នោះ $IO_2 = h - R_1 - R_2$

ធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះ $IO_1 = h - R_1 - R_2$


ដូចនេះ $IO_1 = IO_2$ ។

$\Delta \perp IO_1O_2$ មាន $IO_1 = IO_2$ នោះ ΔIO_1O_2 ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

តែ $O_1\hat{O}_2I = O_2\hat{F}A = 45^\circ$ ហើយ $F\hat{M}O_2 = 90^\circ$

នាំអោយ ΔMO_2F ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

វិបាក $O_2M = MF = R_2$



$$AF = AM + MF = AH + MF = h - R_2 + R_2 = h$$

$\triangle AEF$ ជាត្រីកោណកែងមាន $\angle AFE = 45^\circ \Rightarrow AE = AF = h$

$$S_{AEF} = \frac{1}{2}h^2$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}h \cdot BC$$

$$\Rightarrow \frac{S_{AEF}}{S_{ABC}} = \frac{h}{BC} = \frac{BC \cdot h}{BC^2} = \frac{AB \cdot AC}{AB^2 + AC^2} \leq \frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $\underline{2S_{AEF} \leq S_{ABC} \quad \forall}$

២៣. ស្រាយថា $(AH+BH+CH)^2 \leq a^2 + b^2 + c^2$ _____

ដោយ $\angle BAA_1$ ជាមុំរួមរវាង $\triangle \perp AHC_1$ & $\triangle \perp AA_1B$

$$\Rightarrow \triangle AHC_1 \sim \triangle AA_1B$$

វិញ្ញាក $\frac{AC_1}{AA_1} = \frac{AH}{AB} \Leftrightarrow AH \cdot AA_1 = AC_1 \cdot AB$

ក្នុង $\triangle AC_1C$: $\cos A = \frac{AC_1}{AC} \Rightarrow AC_1 = \cos A \cdot AC$


នោះ $AH \cdot AA_1 = AB \cdot AC \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$

ធ្វើដូចគ្នាដែរ $\Rightarrow CH \cdot CC_1 = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$; $BH \cdot BB_1 = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}$

នាំអោយ $AH \cdot AA_1 + BH \cdot BB_1 + CH \cdot CC_1 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$

ម្យ៉ាងទៀត តាមលំហាត់លេខ ១៥.a : $\frac{HA_1}{AA_1} + \frac{HB_1}{BB_1} + \frac{HC_1}{CC_1} = 1$

$$\Leftrightarrow \frac{AA_1 - AH}{AA_1} + \frac{BB_1 - BH}{BB_1} + \frac{CC_1 - CH}{CC_1} = 1 \Rightarrow \frac{AH}{AA_1} + \frac{BH}{BB_1} + \frac{CH}{CC_1} = 2$$



តាមវិសមភាព Bunyakovsky :

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\sqrt{AH}}{\sqrt{AA_1}} \sqrt{AH} \cdot \sqrt{AA_1} + \frac{\sqrt{BH}}{\sqrt{BB_1}} \sqrt{BH} \sqrt{BB_1} + \frac{\sqrt{CH}}{\sqrt{CC_1}} \sqrt{CH} \cdot \sqrt{CC_1} \right)^2 \\ & \leq \left(\frac{AH}{AA_1} + \frac{BH}{BB_1} + \frac{CH}{CC_1} \right) (AH \cdot AA_1 + BH \cdot BB_1 + CH \cdot CC_1) \\ & \Leftrightarrow (AH + BH + CH)^2 \leq 2 \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} \\ & \Rightarrow (AH + BH + CH)^2 \leq a^2 + b^2 + c^2 \\ & \text{ដូចនេះ } \underline{(AH + BH + CH)^2 \leq a^2 + b^2 + c^2} \quad \forall \end{aligned}$$

២៤. ស្រាយថា $S = \frac{A_1A_2}{BA_2 + A_2C} + \frac{B_1B_2}{AB_2 + B_2C} + \frac{C_1C_2}{AC_2 + C_2B} \geq \frac{3}{4}$ _____

យើងមាន : $[AA_2)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $A \Rightarrow A_2B = A_2C$

តែ $AA_2 \cdot BC = AB \cdot A_2C + BA_2 \cdot AC$

នាំអោយ $AA_2 \cdot BC = A_2C(AB + AC)$

$$\Leftrightarrow \frac{BC}{AB + AC} = \frac{A_2C}{AA_2}$$

$\triangle ACA_2$ និង $\triangle A_1A_2C$ មាន :


$$A_1\hat{C}A_2 = B\hat{A}A_2 = A_2\hat{A}C$$

$\angle A_2$ ជាមុំរួម

នាំអោយ $\triangle ACA_2 \sim \triangle A_1A_2C$

វិញ្ញាបក $\frac{A_1A_2}{A_2C} = \frac{A_2C}{AA_2}$

នោះ $\frac{A_1A_2}{A_2C} = \frac{BC}{AB + AC} \Leftrightarrow \frac{A_1A_2}{BA_2 + A_2C} = \frac{BC}{2(AB + AC)}$



$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow \frac{B_1 B_2}{AB_2 + B_2 C} = \frac{AC}{2(AB + BC)}; \frac{C_1 C_2}{AC_2 + C_2 B} = \frac{AB}{2(AC + BC)}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \left[\frac{BC}{AB + AC} + \frac{AC}{AB + BC} + \frac{AB}{AC + BC} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(AB + BC + AC) \left(\frac{1}{AB + AC} + \frac{1}{AB + BC} + \frac{1}{AC + BC} \right) - 3 \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(AB + AC + AB + BC + AC + BC) \left(\frac{1}{AB + AC} + \frac{1}{AB + AC} + \frac{1}{AC + BC} \right) - 6 \right] \\ &\geq \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } S = \frac{A_1 A_2}{BA_2 + A_2 C} + \frac{B_1 B_2}{AB_2 + B_2 C} + \frac{C_1 C_2}{AC_2 + C_2 B} \geq \frac{3}{4} \text{ ។}$$

២៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S_{MNPQ} \geq \frac{(a-c)^2}{8}$

តាង A' ជាចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាយ (DA) & (BC)

ដោយ $\hat{ADC} + \hat{DCB} = 90^\circ$

$$\Rightarrow \hat{DA'C} = 90^\circ$$

M កណ្តាល AB


Q កណ្តាល DB

$$\Rightarrow MQ = \frac{AD}{2} \text{ \& } (MQ) \parallel (AD) \quad (1)$$

N កណ្តាល AC

$$P \text{ កណ្តាល } DC \mid \Rightarrow NP = \frac{AD}{2}; (NP) \parallel (AD) \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) នាំអោយ $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។



$$\text{តែ } MN = \frac{BC}{2} = \frac{AD}{2} = MQ ; \widehat{QMN} = \widehat{DA'C} = 90^\circ (MQ \parallel A'D; MN \parallel A'C)$$

$\Rightarrow$ MNPQ ជាការេ ។

$$S_{MNPQ} = MQ^2 = \frac{QN^2}{2}$$

$$\text{តាង } K \text{ កណ្តាល } [AD] \Rightarrow KQ = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2} ; KN = \frac{DC}{2} = \frac{c}{2}$$

$$\text{តែ } |QN| \geq |KN - KQ| = \frac{|a - c|}{2}$$

$$\text{យើងបាន } S_{MNPQ} \geq \frac{(a - c)^2}{8} \quad \text{។}$$

២៦. ស្រាយថា $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{l_a} + \frac{1}{l_b} + \frac{1}{l_c}$ _____


តាង $[AA']$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ A ។

តាម B គូសបន្ទាត់ស្រប AA' កាត់បន្ទាយ (CA) ត្រង់ D ។

នោះ $(BD) \parallel (AA') \Rightarrow \widehat{BDA} = \widehat{A'AC} ; \widehat{DBA} = \widehat{BAA'}$

តែ $\widehat{BAA'} = \widehat{A'AC}$

$$\Rightarrow \widehat{BDA} = \widehat{DBA} \Rightarrow AB = AD$$



$$\text{ម្យ៉ាងឡើយ } (BD) \parallel (AA') \Rightarrow \frac{AC}{DC} = \frac{A'A}{DB} \Leftrightarrow \frac{1}{AA'} = \frac{DC}{AC \cdot DB} = \frac{AC + AD}{AC \cdot DB}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{AA'} > \frac{AC + AD}{AC \cdot (AB + AD)} = \frac{AC + AB}{2AC \cdot AB} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{AC} + \frac{1}{AB} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{l_a} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \quad (1)$$

$$\text{ស្រាយដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow \frac{1}{l_b} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) \quad (2); \quad \frac{1}{l_c} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right) \quad (3)$$

$$\text{បូកអង្គនឹងអង្គនៃ(1);(2);(3)} \Rightarrow \frac{1}{l_a} + \frac{1}{l_b} + \frac{1}{l_c} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

$$\text{ដូចនេះ } \underline{\frac{1}{l_a} + \frac{1}{l_b} + \frac{1}{l_c} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \quad \text{។}}$$

២៧. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $OP + OQ + OR < BC$


យើងឧបមាថា $\hat{A}PB > 90^\circ$

$$\Rightarrow \hat{A}PB > \hat{A}BP$$

$$AB > AP$$

$$\text{តែ } \hat{A} > \hat{C} \Rightarrow BC > AB$$

$$\text{នោះ } BC > AP$$



$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow BC > CR; BC > BQ$$

$$\text{យើងមាន } \frac{S_{OBC}}{S_{ABC}} = \frac{OP}{AP}; \frac{S_{OAC}}{S_{ABC}} = \frac{OQ}{BQ}; \frac{S_{OAB}}{S_{ABC}} = \frac{OR}{CR}$$

$$\text{នោះ } \frac{OP}{AP} + \frac{OQ}{BQ} + \frac{OR}{CR} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{OP}{BC} + \frac{OQ}{BC} + \frac{OR}{BC} < 1$$

$$\Rightarrow OP + OQ + OR < BC$$

$$\text{ដូចនេះ } \underline{OP + OQ + OR < BC \quad \text{។}}$$

២៨. ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$\text{a. } \frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} = 2$$


យើងមាន $\frac{OA}{AD} = \frac{AD - OD}{AD} = 1 - \frac{OD}{AD}$

$$\frac{OB}{BE} = 1 - \frac{OE}{BE} ; \frac{OC}{CF} = 1 - \frac{OF}{CF}$$

តែបាន $\frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} =$

$$= 3 - \left(\frac{OD}{AD} + \frac{OE}{BE} + \frac{OF}{CF} \right) = 3 - 1 = 2$$

ដូចនេះ $\frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} = 2$ ។



b. $\frac{OA}{OD} + \frac{OB}{OE} + \frac{OC}{OF} \geq 6$

យើងមាន $\frac{OA}{OD} = \frac{AD - OD}{OD} = \frac{AD}{OD} - 1 = \frac{S_{ABC}}{S_{OBC}} - 1$

ដូចគ្នាដែរ $\Rightarrow \frac{OB}{OE} = \frac{S_{ABC}}{S_{OAC}} - 1 ; \frac{OC}{OF} = \frac{S_{ABC}}{S_{OAB}} - 1$

$$\Rightarrow \frac{OA}{OD} + \frac{OB}{OE} + \frac{OC}{OF} = S_{ABC} \left(\frac{1}{S_{OBC}} + \frac{1}{S_{OAC}} + \frac{1}{S_{OAB}} \right) - 3$$

$$= (S_{OBC} + S_{OAC} + S_{OAB}) \left(\frac{1}{S_{OBC}} + \frac{1}{S_{OAC}} + \frac{1}{S_{OAB}} \right) - 3$$

$$\geq 9 - 3 = 6$$

២៩. ស្រាយថា $AB + AC > AM + AN$

បន្ទាយ AM អោយបាន $AN = MD$

យើងមាន $\hat{A}NC = \hat{A}MN + \hat{M}AN$

$$\Rightarrow \hat{A}NC > \hat{A}MN = \hat{B}MD$$


$$\Rightarrow AC > BD$$

$\triangle ABD$ មាន $AD < AB + BD < AB + AC$

$$\Leftrightarrow AM + MD < AB + AC$$

$$\Leftrightarrow AM + AN < AB + AC$$

ដូចនេះ $AB + AC > AM + AN$ ។



៣០. សំរាយបញ្ជាក់

$$\text{តាង } S_1 = S_{AC_1B_1}; S_2 = S_{BC_1A_1}; S_3 = S_{CA_1B_1}; S = S_{ABC}$$

$$\text{គេបាន } \frac{S_1}{S} = \frac{AC_1 \cdot AB_1}{AB \cdot AC}; \frac{S_2}{S} = \frac{BC_1 \cdot BA_1}{AB \cdot BC};$$

$$\frac{S_3}{S} = \frac{CA_1 \cdot B_1C}{BC \cdot AC}$$

$$\Rightarrow \frac{S_1 \cdot S_2 \cdot S_3}{S^3} = \frac{AC_1 \cdot BC_1}{AB^2} \cdot \frac{AB_1 \cdot B_1C}{AC^2} \cdot \frac{BA_1 \cdot CA_1}{BC^2}$$


$$\text{តែ } \frac{AC_1 \cdot BC_1}{AB^2} \leq \frac{(AC_1 + BC_1)^2}{4AB^2} = \frac{AB^2}{4AB^2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{S_1}{S} \cdot \frac{S_2}{S} \cdot \frac{S_3}{S} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \text{យ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម } \frac{S_1}{S}; \frac{S_2}{S}; \frac{S_3}{S} \text{ មានតំលៃតូចជាងរឺស្មើ } \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow S_1 \leq \frac{1}{4}S \text{ រឺ } S_2 \leq \frac{1}{4}S \text{ រឺ } S_3 \leq \frac{1}{4}S$$

ដូចនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម $\triangle AB_1C_1$; $\triangle BC_1A_1$; $\triangle CA_1B_1$



មានក្រលាផ្ទៃតូចជាងរឺស្មើ $\frac{1}{4}$ នៃក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។

៣១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $m_a \cdot m_b \cdot m_c \leq \frac{27R^2}{8}$ _____

$$\text{យើងមាន } b^2 + c^2 = 2m_a^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow 4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$$

$$\Rightarrow 4(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = 3(a^2 + b^2 + c^2) = 3 \cdot 4R^2 (\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C)$$

$$\text{យើងពិនិត្យ } \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$$

$$= 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$$

$$= 2 - [\cos^2(A+B) + \cos(A+B)\cos(A-B)]$$

$$= \frac{9}{4} - \left[\left[\cos(A+B) + \frac{1}{2} \cos(A-B) \right]^2 + \frac{1}{4} \sin^2(A-B) \right] \leq \frac{9}{4}$$

$$\text{គេបាន } \frac{27R^2}{4} \geq m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 \geq 3\sqrt{m_a^2 \cdot m_b^2 \cdot m_c^2}$$

$$\Rightarrow m_a \cdot m_b \cdot m_c \leq \frac{27R^2}{8} \quad \text{។}$$

៣២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $l_a r_a + l_b r_b + l_c r_c \leq p^2$ _____

$$\text{យើងមាន } S = r_a(p-a) = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \Rightarrow r_a = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p-a}$$

$$\text{ហើយ } l_a = \frac{2\sqrt{bc} \cdot \sqrt{p(p-a)}}{b+c}$$

$$\text{គេបាន } l_a \cdot r_a = \frac{2\sqrt{bc} \cdot \sqrt{p(p-a)}}{b+c} \cdot \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p-a}$$

ដូចគ្នាដែរ គេបាន $l_b.r_b \leq p.\frac{b}{2}$; $l_c.r_c \leq p.\frac{c}{2}$

$$\Rightarrow l_a.r_a + l_b.r_b + l_c.r_c \leq p\left(\frac{a+b+c}{2}\right) = p^2 \quad \forall$$

a. $x + y + z \geq 2(p + q + r)$

[AX) របស់មុំ A ។

$$PA = P'K' = p$$

យើងមាន $S_{ABC} = S_{P'AB} + S_{P'BC} + S_{P'CA}$


$$\Rightarrow x \geq \frac{c}{a}r + \frac{b}{a}p \quad (1)$$

ធ្វើដូចគ្នាដែរ គេបាន $y \geq \frac{a}{c}r + \frac{b}{c}q$ (2)

$$z \geq \frac{c}{b}q + \frac{a}{b}p \quad (3)$$

$$\text{සහ (1) + (2) + (3) } \Rightarrow x + y + z \geq \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right)r + \left(\frac{b}{a} + \frac{b}{a}\right)p + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right)q$$

តាមវិសមភាព Cauchy $\Rightarrow x + y + z \geq 2(r + p + q)$



b. $xyz \geq 8pqr$

តាម (1), (2) & (3) ក្នុងសំនួរ (a) នឹង ដោយប្រើវិសមភាព Cauchy គេបាន:

$$x \geq 2\sqrt{\frac{bc}{a^2}}rp, \quad y \geq 2\sqrt{\frac{ab}{c^2}}rq, \quad z \geq \sqrt{\frac{ac}{b^2}}pq$$

$$\Rightarrow xyz \geq 8\sqrt{\frac{a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}}p^2q^2r^2 = 8pqr \quad \forall$$

៣៤. កំនត់តំលៃ p តូចបំផុត

តាមរូបមន្ត Heron យើងបាន $S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$

តាមរូបមន្ត Cauchy គេបាន $(p-a)(p-b)(p-c) \leq \left[\frac{3p-(a+b+c)}{3} \right]^3 = \frac{p^3}{27}$

$$\Rightarrow S^2 \leq \frac{p^4}{27} = \frac{1}{16 \times 27} (a+b+c)^4 \quad (1)$$

តាមវិសមភាព Bunyakovsky:

$$+ (a+b+c)^2 \leq (1+1+1)(a^2+b^2+c^2) = 3(a^2+b^2+c^2)$$

$$\Rightarrow (a+b+c)^4 \leq 9(a^2+b^2+c^2)^2$$

$$+ (a^2+b^2+c^2)^2 \leq 3(a^4+b^4+c^4)$$

$$\text{គេបាន } (a+b+c)^4 \leq 27(a^4+b^4+c^4) \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) } \Rightarrow S^2 \leq \frac{1}{16 \times 27} \cdot 27(a^4+b^4+c^4)$$

$$\Leftrightarrow S^2 \leq \frac{1}{16} (a^4+b^4+c^4)$$

$$\text{បើ } p \geq \frac{1}{16} \text{ នោះ } S^2 \leq p(a^4+b^4+c^4)$$

$$\text{ដូចនេះ តំលៃ } p \text{ តូចបំផុតគឺ } \underline{p = \frac{1}{16}} \quad \forall$$

៣៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 \geq 3\sqrt{3}S$ _____

$$\text{យើងមាន } \begin{cases} b^2 + c^2 = 2m_a^2 + \frac{a^2}{2} \\ c^2 + a^2 = 2m_b^2 + \frac{b^2}{2} \\ a^2 + b^2 = 2m_c^2 + \frac{c^2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) \quad (1)$$

$$\text{តាមរូបមន្ត Heron: } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត Cauchy គេបាន } (p-a)(p-b)(p-c) \leq \left[\frac{3p-(a+b+c)}{3} \right]^3 = \frac{p^3}{27}$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{p^2}{3\sqrt{3}} \Leftrightarrow S \leq \frac{(a+b+c)^2}{4 \cdot 3\sqrt{3}} \leq \frac{(1+1+1)(a^2+b^2+c^2)}{4 \cdot 3\sqrt{3}} = \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{4 \cdot 3\sqrt{3}}$$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{3}S \leq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{4} \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) } \Rightarrow \underline{m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 \geq 3\sqrt{3}S} \quad \text{។}$$

៣៦. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \geq 3\sqrt{\frac{4R^2}{r(a+b+c)abc}}$ _____

$$\text{យើងនមាន } S = (p-a)r_a = (p-b)r_b = (p-c)r_c$$

$$\text{យើងបាន } \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{(p-a) + (p-b) + (p-c)}{S} = \frac{p}{S} = \frac{a+b+c}{2S}$$

$$\text{តាមវិសមភាព Cauchy យើងបាន } \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \geq \frac{3}{2} \sqrt{\frac{abc}{S^3}}$$

$$\text{ដោយ } S = \frac{abc}{4R} = pr \Rightarrow \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \geq \frac{3}{2} \sqrt{\frac{abc}{\left(\frac{a^2b^2c^2}{16R^2}\right) \cdot (pr)}} = 3\sqrt{\frac{2R^2}{abcpr}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \geq \frac{3}{\sqrt{r(a+b+c)abc}} \quad \text{។}$$

៣៧. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \geq 16S^2$ _____

យើងមាន:

$$\begin{aligned} + 4S^2 &= b^2c^2 \sin^2 A \Leftrightarrow 16S^2 = 4b^2c^2 \sin^2 A \\ + a^4 + b^4 + c^4 + 2b^2c^2 - 2a^2b^2 - 2a^2c^2 &= (b^2 + c^2 - a^2)^2 = 4b^2c^2 \cos^2 A \\ \Rightarrow 16S^2 + a^4 + b^4 + c^4 + 2b^2c^2 - 2a^2b^2 - 2a^2c^2 &= 4b^2c^2 \\ \Leftrightarrow 16S^2 &= 2(b^2c^2 + a^2b^2 + a^2c^2) - (a^4 + b^4 + c^4) \quad (1) \end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Bunyakovsky:

$$(b^2c^2 + a^2b^2 + a^2c^2) \leq \sqrt{(b^4 + a^4 + c^4)(c^4 + b^4 + a^4)} = (a^4 + b^4 + c^4) \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) } \Rightarrow \underline{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \geq 16S^2} \quad \text{។}$$

៣៨. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ _____

$$\text{យើងមាន } \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} = \frac{c}{(p-a)(p-b)} \geq \frac{c}{\left(\frac{p-a+p-b}{2}\right)^2} = \frac{4}{c} \quad (1)$$

$$\text{ស្រាយដូចគ្នាដែរ យើងបាន } \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq \frac{4}{a} \quad (2) ; \quad \frac{1}{p-c} + \frac{1}{p-a} \geq \frac{4}{b} \quad (3)$$

$$\text{យក (1)+(2)+(3) } \Rightarrow \underline{\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)} \quad \text{។}$$

៣៩. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{h_a}{h_b} + \frac{h_b}{h_c} + \frac{h_c}{h_a} \geq \frac{h_b}{h_a} + \frac{h_a}{h_c} + \frac{h_c}{h_b}$ _____

យើងមាន $2S = ah_a = bh_b = ch_c$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{h_b}{h_a}; \frac{b}{c} = \frac{h_c}{h_b}; \frac{c}{a} = \frac{h_a}{h_c}$$

យើងស្រាយថា $\frac{h_a}{h_b} + \frac{h_b}{h_c} + \frac{h_c}{h_a} \geq \frac{h_b}{h_a} + \frac{h_a}{h_c} + \frac{h_c}{h_b}$

$$\Leftrightarrow \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b}$$

$$\Leftrightarrow b^2c + ac^2 + a^2b \geq a^2c + bc^2 + ab^2$$

$$\Leftrightarrow (b-a)(b-c)(c-a) \geq 0 \quad (*)$$

តាមសម្មតិកម្ម $A \geq B \geq C \Rightarrow a \geq b \geq c \Rightarrow (*)$ ពិត

ដូចនេះ $\frac{h_a}{h_b} + \frac{h_b}{h_c} + \frac{h_c}{h_a} \geq \frac{h_b}{h_a} + \frac{h_a}{h_c} + \frac{h_c}{h_b}$ ។

៤០. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{m_a}{h_a} + \frac{m_b}{h_b} + \frac{m_c}{h_c} \leq \frac{R+r}{r}$ _____

តាង (O, R) ជារង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ ។


M, N, P ជាចំនុចកណ្តាល BC, CA & AB រៀងគ្នា ។

គេបាន $AM < OA + OM$

$$\Leftrightarrow m_a < R + OM$$

$$\Leftrightarrow \frac{m_a}{h_a} < \frac{R}{h_a} + \frac{OM}{h_a}$$

នាំអោយ $\frac{m_a}{h_a} + \frac{m_b}{h_b} + \frac{m_c}{h_c} < R \left(\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right) + \frac{OM}{h_a} + \frac{ON}{h_b} + \frac{OP}{h_c}$



$$\begin{aligned} \text{យើងពិនិត្យ} + \frac{OM}{h_a} + \frac{ON}{h_b} + \frac{OP}{h_c} &= \frac{aOM + bON + cOP}{2S} = \frac{2S}{2S} = 1 \\ &+ \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{a+b+c}{2S} = \frac{p}{S} = \frac{1}{r} \\ \Rightarrow \frac{m_a}{h_a} + \frac{m_b}{h_b} + \frac{m_c}{h_c} &< \frac{R}{r} + 1 \Leftrightarrow \frac{m_a}{h_a} + \frac{m_b}{h_b} + \frac{m_c}{h_c} \leq \frac{R+r}{r} \quad \forall \end{aligned}$$

៤១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2)(h_a^2 + h_b^2 + h_c^2) \geq 27S^2$ _____

$$\text{យើងមាន} \begin{cases} b^2 + c^2 = 2m_a^2 + \frac{a^2}{2} \\ c^2 + a^2 = 2m_b^2 + \frac{b^2}{2} \\ a^2 + b^2 = 2m_c^2 + \frac{c^2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) \geq \frac{9}{4}\sqrt{a^2 b^2 c^2} \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } h_a^2 + h_b^2 + h_c^2 = 4S^2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \geq 4 \cdot 3S^2 \sqrt{\frac{1}{a^2 b^2 c^2}} \quad (2)$$

$$\text{យក } (1) \times (2) \Rightarrow \underline{(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2)(h_a^2 + h_b^2 + h_c^2) \geq 27S^2} \quad \forall$$

៤២. ក) ស្រាយថា $h_a + h_b + h_c \geq 9r$ _____

$$\text{យើងមាន : } ah_a = 2S = r(a+b+c) \Rightarrow h_a = r \left(1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right)$$

$$\text{ធ្វើដូច្នោះដែរ : } h_b = r \left(1 + \frac{a}{b} + \frac{c}{b} \right), h_c = r \left(1 + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \right)$$

$$\Rightarrow h_a + h_b + h_c = r \left(3 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{c} \right)$$

តាមវិសមភាព Cauchy : $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{c} \geq 6$

$$\Rightarrow h_a + h_b + h_c \geq 9r$$

ខ) ស្រាយថា $\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} + \frac{1}{m_c} \geq \frac{2}{r}$

យើងមាន : $AO + OM \geq AM$

$$\Rightarrow AO \geq AM - OM$$

$$\Rightarrow \frac{AO}{AM} \geq 1 - \frac{OM}{AM}$$


ដោយ $AH \leq AM \Rightarrow \frac{1}{AH} \geq \frac{1}{AM}$

$$\Rightarrow \frac{AO}{AM} \geq 1 - \frac{OM}{AH}$$

$$\Leftrightarrow \frac{AO}{AM} \geq 1 - \frac{S_{BOC}}{S_{ABC}} \Rightarrow \frac{R}{m_a} \geq 1 - \frac{S_{BOC}}{S}$$

ធ្វើដូច្នោះដែរគេបាន : $\frac{R}{m_b} \geq 1 - \frac{S_{COA}}{S}, \frac{R}{m_c} \geq 1 - \frac{S_{AOB}}{S}$

$$\Rightarrow \frac{R}{m_a} + \frac{R}{m_b} + \frac{R}{m_c} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} + \frac{1}{m_c} \geq \frac{2}{R} \quad \text{។}$$



៤៣. ក) ស្រាយថា $\frac{S_{ABC}}{S_{MNP}} = \left(\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \right)^2$ _____

តាង : $S_{ABC} = S, S_{CPN} = S_1, S_{AMP} = S_2, S_{BMN} = S_3$

$$\Rightarrow S_{MNP} = S - S_1 - S_2 - S_3$$

ដោយ AN ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ


$$\Rightarrow \frac{NC}{NB} = \frac{AC}{AB} = k$$

$$\Rightarrow \frac{CB}{BN} = k+1 \text{ និង } \frac{CN}{BC} = \frac{k}{k+1}$$

យើងមាន : $\Delta CPN \sim \Delta ABC$

$$\Rightarrow \frac{S_{PNC}}{S} = \frac{S_1}{S} = \left(\frac{CN}{BC} \right)^2 = \left(\frac{k}{k+1} \right)^2$$

$$\Rightarrow S_1 = \left(\frac{k}{k+1} \right)^2 \cdot S$$



យើងមាន : $\frac{S_{MBN}}{S_{MBC}} = \frac{BN}{BC} = \frac{1}{k+1}$

$\Delta APM \cong \Delta BMN$ (ជ-ម-ជ)

$$\Rightarrow \frac{S_{APM} + S_{BMN}}{S} = \frac{1}{k+1} \Rightarrow S_{APM} + S_{BMN} = \frac{S}{k+1}$$

$$\Rightarrow S_{MNP} = S - \frac{S}{k+1} - \left(\frac{k}{k+1} \right)^2 \cdot S = \frac{k}{(k+1)^2} \cdot S$$

$$\Rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{MNP}} = \frac{(k+1)^2}{k} = \left(\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \right)^2 \quad \forall$$

ខ) ស្រាយថា $S_{MNP} < \frac{S_{ABC}}{4}$

តាមវិសមភាព Cauchy យើងបាន : $\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \geq 2$

សញ្ញា (=) កើតមានកាលណា : $k = 1$

$$\text{តែបើ } k \neq 1 \Rightarrow \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} > 2 \Rightarrow \left(\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \right)^2 > 4$$

$$\text{ដូចនេះ : } \frac{S_{ABC}}{S_{MNP}} > 4 \Rightarrow S_{MNP} < \frac{S_{ABC}}{4} \text{ ។}$$

៤៤. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{3}{R} \leq \frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \leq \sqrt{3} \left(\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{BC} \right)$ _____

តាង AM, BN, CP ជាបណ្តាមេដ្យាននៃ $\triangle ABC$,

តាង $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, $AM = m_a$

យើងបាន : $MD \cdot MA = MB \cdot MC \Rightarrow MD \cdot m_a = \frac{a^2}{4}$

នាំអោយ $MD = \frac{a^2}{4m_a}$ ដោយ $GD = GM + MD =$

$$\frac{1}{3}m_a + \frac{a^2}{4m_a} \geq 2\sqrt{\frac{m_a}{3} \cdot \frac{a^2}{4m_a}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

យើងបាន : $\frac{1}{GD} \leq \frac{\sqrt{3}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{BC}$.

ស្រាយដូចគ្នាដែរចំពោះអង្កត់ GE និង GF, ហើយបូកអង្កត់និងអង្កត់យើងបាន :


$$\frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \leq \sqrt{3} \left(\frac{1}{BC} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{AB} \right)$$

តែ $GA = \frac{2}{3}m_a$, នាំអោយ $\frac{GA}{GD} = \frac{\frac{2}{3}m_a}{\frac{1}{3}m_a + \frac{a^2}{4m_a}} = \frac{8m_a^2}{4m_a^2 + 3a^2}$.

អនុវត្តន៍តាមរូបមន្តគណនាមេដ្យានយើងបាន : $4m_a^2 = 2(b^2 + c^2) - a^2$

នោះ $\frac{GA}{GD} = \frac{2(2b^2 + 2c^2 - a^2)}{2b^2 + 2c^2 - a^2 + 3a^2} = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{a^2 + b^2 + c^2}$

ធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះផលធៀប : $\frac{GB}{GE}; \frac{GC}{GF}$ យើងបាន :



$$\frac{GA}{GD} + \frac{GB}{GE} + \frac{GC}{GF} = \frac{3a^2 + 3b^2 + 3c^2}{a^2 + b^2 + c^2} = 3.$$

យើងមាន : $\frac{AD}{GD} = \frac{AG+GD}{GD} = 1 + \frac{AG}{GD}$, ហើយធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះ $\frac{BE}{GE}, \frac{CF}{GF}$

$$\text{យើងបាន : } \frac{AD}{GD} + \frac{BE}{GE} + \frac{CF}{GF} = 3 + \frac{GA}{GB} + \frac{GB}{GE} + \frac{GC}{GF} = 6 \quad (1)$$

ដោយបណ្តាអង្កត់ AD, BE, CF ធំជាង 2R នាំអោយតាម (1)យើងបាន :

$$6 = \frac{AD}{GD} + \frac{BE}{GE} + \frac{CF}{GF} \leq \frac{2R}{GD} + \frac{2R}{GE} + \frac{2R}{GF} = 2R \left(\frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \right)$$

$$\text{នាំអោយ : } \frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \geq \frac{6}{2R} = \frac{3}{R}.$$

$$\text{ដូចនេះ : } \frac{3}{R} \leq \frac{1}{GD} + \frac{1}{GE} + \frac{1}{GF} \leq \sqrt{3} \left(\frac{1}{BC} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{AB} \right) \quad \text{។}$$

៤៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា : $S_{MNPQ} \leq \max \{ S_{ABD}, S_{ACD} \}$ _____

$$\text{តាង } \frac{AP}{AB} = x \text{ និង } \frac{AQ}{AC} = y,$$

ចំពោះ $0 < x, y < 1$, យើងបាន :

$$\frac{S_{APQ}}{S_{ABC}} = \frac{AP \cdot AQ}{AB \cdot AC} = xy, \text{ នាំអោយ } S_{APQ} = xy \cdot S_{ABC} \quad (1)$$


$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្តយើងមាន : } \frac{BN}{BD} &= \frac{BP}{BA} = 1-x \\ \frac{CM}{CD} &= \frac{CQ}{CA} = 1-y \end{aligned}$$

$$\text{នាំអោយ } S_{BNP} = (1-x)^2 \cdot S_{ABD} \quad (2)$$

$$S_{CMQ} = (1-y)^2 \cdot S_{ACD} \quad (3)$$

តាម (1), (2) និង (3) យើងបាន :

$$S_{MNPQ} = S_{ABC} - S_{APQ} - S_{BNP} - S_{CMQ}$$



$$= [(1-xy)-(1-x)^2] \cdot S_{ABD} + [(1-xy)-(1-y)^2] \cdot S_{ACD}$$

$$= (2x-xy-x^2) \cdot S_{ABD} + (2y-xy-y^2) \cdot S_{ACD}$$

ដោយ $2x-xy-x^2 = x(2-y-x) > 0$ និង $2y-xy-y^2 = y(2-x-y) > 0$

នាំអោយ $S_{MNPQ} \leq [(2x-xy-x^2) + (2y-xy-y^2)] \cdot \max\{S_{ABD}, S_{ACD}\}$

$$\Leftrightarrow S_{MNPQ} \leq [2(x+y)-(x+y)^2] \cdot \max\{S_{ABD}, S_{ACD}\}$$

$$\Leftrightarrow S_{MNPQ} \leq [1-(x+y-1)^2] \cdot \max\{S_{ABD}, S_{ACD}\}$$

នាំអោយ $S_{MNPQ} \leq \max\{S_{ABD}, S_{ACD}\}$

សញ្ញា (=) កើតមានកាលណា $S_{ABD} = S_{ACD}$ និង

$$x + y = 1, \text{ ហើយ } BD = AC \text{ និង } \frac{AP}{AB} + \frac{AQ}{AC} = 1 \quad \forall$$

៤៦. គណនាក្រលាផ្ទៃបំបំផុតនៃ $\triangle ABC$

តាង S ជាក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$\Rightarrow S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{តែ } p = \frac{10}{2} = 5$$

$$\text{នោះ } S = \sqrt{5(5-a)(5-b)(5-c)} \Leftrightarrow S^2 = 5(5-a)(5-b)(5-c)$$

តាមវិសមភាព Cauchy: $(5-a) + (5-b) + (5-c) \geq 3 \sqrt{(5-a)(5-b)(5-c)}$

$$\Leftrightarrow 15-(a+b+c) \geq 3 \sqrt{(5-a)(5-b)(5-c)} \quad (a+b+c=10)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^3 \geq (5-a)(5-b)(5-c) \Leftrightarrow \frac{5^4}{3^3} \geq 5(5-a)(5-b)(5-c) = S^2$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{25\sqrt{3}}{9} \quad \text{ដូចនេះ } \text{Max} S = \frac{25\sqrt{3}}{9}$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $a = b = c \Rightarrow \triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

៤៧. កំនត់ទីតាំងចំនុច I

យើងមាន: $AL^2 = AI^2 - IL^2 = AK^2 + IK^2 - IL^2$

$BH^2 = BI^2 - IH^2 = BL^2 + IL^2 - IH^2$

$CK^2 = IC^2 - IK^2 = CH^2 + IH^2 - IK^2$

$\Rightarrow AL^2 + BH^2 + CK^2 = BL^2 + CH^2 + AK^2$

$\Leftrightarrow 2(AL^2 + BH^2 + CK^2) = (AL^2 + BL^2) + (BH^2 + CH^2) + (AK^2 + KC^2)$

យក a; b ជាពីរចំនួនវិជ្ជមាន

នោះតាមវិសមភាព Cauchy

គេបាន $a^2 + b^2 \geq 2ab$

$\Leftrightarrow a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$

គេបាន:

$$\begin{cases} AL^2 + BL^2 \geq \frac{(AL + BL)^2}{2} = \frac{AB^2}{2} \\ BH^2 + CH^2 \geq \frac{(BH + HC)^2}{2} = \frac{BC^2}{2} \\ AK^2 + KC^2 \geq \frac{(AK + KC)^2}{2} = \frac{AC^2}{2} \end{cases}$$

នោះ $2(AL^2 + BH^2 + CK^2) \geq \frac{1}{2}(AB^2 + BC^2 + AC^2)$


$(AL^2 + BH^2 + CK^2) \geq \frac{1}{4}(AB^2 + BC^2 + AC^2)$

$\min(AL^2 + BH^2 + CK^2) = \frac{1}{4}(AB^2 + BC^2 + AC^2)$

សមភាពកើតមានកាលណា $AL=LB$; $BH=HC$; $CK=KA$

នាំអោយ L; H; K ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ AB; BC; AC

តែ $(IL) \perp (AB)$; $(IH) \perp (BC)$; $(IK) \perp (AC)$




ដូចនេះដើម្បីអោយផលបូកតូចបំផុតចុះត្រាតែ I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$ ។

៤៨. កំនត់ទីតាំង M ដើម្បីអោយ S_{DEF} មានតំលៃតូចបំផុត

យើងមាន:

$$\begin{aligned} S_{DEF} &= S_{ABCD} - (S_{BEF} + S_{AED} + S_{FCD}) \\ &= a^2 - \left[\frac{1}{2}(a-x)(a-y) + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}ay \right] \\ &= a^2 - \frac{1}{2}(a^2 - ax - ay + xy + ax + ay) \\ &= \frac{1}{2}(a^2 - xy) \geq \frac{1}{2} \left[a^2 - \frac{(x+y)^2}{4} \right] \end{aligned}$$



$\triangle DHFC$ មាន $\widehat{HCF} = 45^\circ \Rightarrow HFC$ ជាត្រីកោណកែងសមបាត

$$\Rightarrow HF = y = EB = a-x \Rightarrow x + y = a$$

$$\text{នាំអោយ } S_{DEF} \geq \frac{1}{2} \left(a^2 - \frac{a^2}{4} \right) = \frac{3a^2}{8} \Rightarrow \min S_{DEF} = \frac{3a^2}{8}$$


$$\text{សមភាពកើតឡើងកាលណា } x=y \Leftrightarrow x=a-x \Leftrightarrow x = \frac{a}{2}$$

គេបាន E កណ្តាល [AB]

ដូចនេះ H កណ្តាល [AC] ធ្វើអោយ S_{BEF} តូចបំផុត ។

៤៩. រកទីតាំងចំនុច M & N ដើម្បីអោយ S_{AMN} ធំបំផុត

$$\text{យើងមាន } \frac{AM}{MB} + \frac{AN}{NC} = 1$$



$$\Leftrightarrow \frac{AB-MB}{MB} + \frac{AC-NC}{NC} = 1 \Leftrightarrow \frac{AB}{MB} + \frac{AC}{NC} = 3$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{NC} \right) AB = 3 \Leftrightarrow \frac{AB(MB+NC)}{MB \cdot NC} = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{AB} = \frac{1}{MB} + \frac{1}{NC}$$

$$S_{AMN} = \frac{1}{2} AM \cdot AN \sin 60^\circ = \frac{(AB-MB)(AC-NC)}{4} = \frac{(AB-MB)(AB-NC)}{4}$$

$$= \frac{AB^2 - (MB+NC)AB + MB \cdot NC}{4} = \frac{AB^2 - 2MB \cdot NC}{4}$$

$$\text{តាម Cauchy: } \frac{1}{MB} + \frac{1}{NC} \geq 2\sqrt{\frac{1}{MB \cdot NC}} \Leftrightarrow \frac{3}{AB} \geq 2\sqrt{\frac{1}{MB \cdot NC}}$$

$$\Leftrightarrow 2MB \cdot NC \geq \frac{4AB^2}{9}$$

$$\text{នាំអោយ } S_{AMN} \leq \frac{AB^2 - \frac{4AB^2}{9}}{4} = \frac{AB^2}{36}$$

$$\text{តំលៃ } \max S_{AMN} = \frac{AB^2}{36}$$

$$\text{តំលៃនេះកើតឡើងកាលណា } MB = NC \Rightarrow \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MB} \right) AB = 3$$

$$\Leftrightarrow MB = \frac{2AB}{3} \text{ \& } NC = \frac{2AC}{3}$$

$$\text{ដូចនេះតំលៃ } S_{AMN} \text{ ធំបំផុតកាលណា } MB = \frac{2AB}{3}; NC = \frac{2AC}{3} \text{ ។}$$

៥០. ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = 3$ _____

គូស BE ស្របនឹង PQ , គូស CF ស្របនឹង PQ

$$\Rightarrow \triangle BME \cong \triangle CMF \text{ (ម-ជ-ម) វិបាក } ME = MF$$

យើងមាន : $\frac{AB}{AP} = \frac{AE}{AG}$, $\frac{AC}{AQ} = \frac{AF}{AG}$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = \frac{AE + AF}{AG} = \frac{(AM - ME) + (AM + MF)}{AG} = \frac{2AM}{AG} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = 3$$

ខ) រកតំលៃអតិបរមានិងតំលៃអប្បបរមានៃ x

កាលណា (d) កាត់តាម B និង G $\Rightarrow$ ចំនុច $P \equiv B$


$$\Rightarrow AP = AB \Rightarrow x = c$$

កាលណា (d) កាត់តាម C និង G $\Rightarrow P \equiv N$

ជាចំនុចកណ្តាលនៃ AB

$$\Rightarrow AP = AN \Rightarrow x = \frac{c}{2} \Rightarrow \frac{c}{2} \leq x \leq c$$

ដូចនេះតំលៃអតិបរមានៃ x គឺ c និង តំលៃអប្បបរមានៃ x គឺ $\frac{c}{2}$ ។



៥១. ក) បង្ហាញថា: $CN^2 - AP^2 = 2 DP \cdot BM$


យើងមាន: $MN^2 = MC^2 + CN^2 = (a - BM)^2 + CN^2$

ហើយ : $MP^2 = AB^2 + (BM - AP)^2 = a^2 + (BM - AP)^2$

$$\Rightarrow (a - BM)^2 + CN^2 = a^2 + (BM - AP)^2$$

$$\Leftrightarrow CN^2 - AP^2 = 2aBM - 2BM \cdot AP = 2BM(a - AP)$$

$$= 2BM \cdot DP$$



ដូចនេះ : $CN^2 - AP^2 = 2 DP \cdot BM$ ។

ខ) កំនត់ទីតាំង M, N, P

យើងមាន : $S_{MNP} = \frac{MP^2 \sqrt{3}}{4}$, នាំអោយ : S_{MNP} អប្បបរមា $\Leftrightarrow MP$ ខ្លីបំផុត

$\Leftrightarrow MP = a \Leftrightarrow MP \parallel AB$


យើងបាន : $\triangle PDN \cong \triangle MCN \Rightarrow ND = NC$

$\Rightarrow N$ ជាចំនុចកណ្តាល CD នាំអោយ $CM = DP = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ។

៥២. ស្រាយថា $S_{BDEF} = 2\sqrt{S_{ADE} \cdot S_{EFC}}$

យើងមាន $S_{BDF} = \frac{1}{2} S_{BDEF}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{S_{BDEF}}{2S_{ADE}} &= \frac{S_{BDF}}{S_{ADE}} = \frac{1/2 \cdot BD \cdot BF \cdot \sin B}{1/2 \cdot AD \cdot DE \cdot \sin D} \\ &= \frac{EF \cdot BF \cdot \sin B}{AD \cdot BF \cdot \sin B} = \frac{EF}{AD} \end{aligned}$$





យើងពិនិត្យឃើញថា $\triangle ADE \sim \triangle EFC \Rightarrow \frac{EF}{AD} = \sqrt{\frac{S_{EFC}}{S_{ADE}}}$

$$\Rightarrow \frac{S_{BDEF}}{2S_{ADE}} = \sqrt{\frac{S_{EFC}}{S_{ADE}}} \Rightarrow S_{BDEF} = 2\sqrt{S_{EFC} \cdot S_{ADE}} \quad \text{។}$$

៥៣. គណនាក្រលាផ្ទៃតំបន់ $ABCDEF GHIJ$

ក្នុងការេនីមួយៗ គូសបន្ទាត់ឈរពីរ និង
ដេកពីរដូចបានបង្ហាញ ។ អង្កត់ទាំង 4 ផ្ទុប
នឹងជ្រុងការេ បង្កើតបានត្រីកោណកែង 4
ប៉ុន្មាន ។ យក a & b ជាប្រវែងជ្រុងជាប់នៃ
ត្រីកោណទាំងនោះ ។ តាមរូប គេបានប្រវែង



បណ្តោយ និង ទទឹង នៃចតុកោណកែងគឺ $5a + 3b$ & $5a + b$ ។

$$\text{គេបាន } \begin{cases} 5a + 3b = 28 \\ 5a + b = 26 \end{cases} \Rightarrow a = 5 \& b = 1$$

ប្រវែងជ្រុងនៃការេនីមួយៗគឺ $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{26}$

ក្រលាផ្ទៃនៃការេនីមួយៗគឺ $\sqrt{26} \times \sqrt{26} = 26$

ដូចនេះក្រលាផ្ទៃនៃតំបន់ ABCBDEFGHIJ គឺ $13 \times 26 = 333$ ។

៥៤. បង្ហាញថា ផលបូកក្រលាផ្ទៃឆ្នូតទាំងបីស្មើ $\frac{1}{2}$ នៃក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$

កូសបន្ទាត់ (UV), (WX), (YZ) ស្របនឹងជ្រុងនឹង

ជ្រុងទាំង 3 នៃ $\triangle ABC$ ។

នោះ មុំទាំង 3 នៃ $\triangle PVY$ មានតំលៃ 60°

$\Rightarrow \triangle PVY$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

$\Rightarrow$ កំពស់ PR ចែក $\triangle PVY$ ជាពីរមុំត្រីកោណសម័ង្ស

មានផ្ទៃឆ្នូត ។


ដូចគ្នាដែរចំពោះ $\triangle PXU$ & $\triangle PZW$ (1)

យើងពិនិត្យចតុកោណ PWBV មាន (WP)//(BV) & (BW)//(VP)

$\Rightarrow$ PWBV ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow$ BP ចែក PWBV ជាពីរមុំត្រីកោណសម័ង្ស

ដូចគ្នាដែរចំពោះ ចតុកោណ PXCY & PZAU (2)


តាម (1) & (2) $\Rightarrow$ ផលបូកក្រលាផ្ទៃឆ្នូតទាំងបីស្មើ $\frac{1}{2}$ នៃក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។



៥៥. ស្រាយថាត្រីកោណតូចទាំង 6 មានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា

ដោយជ្រើសរើសយកឯកតាសមស្របមួយ យើងអាច
សន្មតថាក្រលាផ្ទៃនៃត្រីកោណនីមួយៗ ដែលមានផ្ទៃរួត
មានតំលៃស្មើ 1 ឯកតាក្រលាផ្ទៃ។

តាង x, y, z ជាក្រលាផ្ទៃនៃ $\triangle BXP, \triangle CYP$ &
 $\triangle AZP$



ដោយ $\triangle PBX$ & $\triangle PCX$ មានកំពស់ដូចគ្នា

$$\Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{BX}{CX} \Leftrightarrow x = \frac{BX}{CX}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរចំពោះ } \triangle ABX \text{ \& } \triangle ACX \Rightarrow \frac{1+x+z}{2+y} = \frac{BX}{CX}$$

$$\text{នោះ } x = \frac{1+x+z}{2+y} \Leftrightarrow x = \frac{1+z}{1+y} \quad (1)$$

$$\text{ដូចគ្នានេះដែរគេបាន } y = \frac{1+x}{1+z} \quad (2), \quad z = \frac{1+y}{1+x} \quad (3)$$

$$\text{យក } (1) \times (2) \times (3) \Rightarrow xyz = 1$$

$$\Rightarrow x = y = z = 1 \text{ ជាវិសម្មនៃប្រព័ន្ធសមីការ}$$

ឧបមាថាយើងអាចរកវិសម្មផ្សេងទៀតបាន

$$\begin{aligned} \text{បើ } x > 1 \text{ តាម (1)} &\Rightarrow z > y \Rightarrow \frac{1+y}{1+x} > \frac{1+x}{1+z} \Rightarrow (1+y)(1+z) > (1+x)^2 \\ &\Rightarrow (1+z)^2 > (1+x)^2 \Rightarrow z > x > 1 \quad (a) \end{aligned}$$

$$\text{តែ } y = \frac{1}{xz} \Rightarrow y < 1 \Rightarrow y < x \Rightarrow 1+y < 1+x$$

$$\text{តាម (3)} \quad z = \frac{1+y}{1+x} < 1 \quad (b)$$

$$\text{តាម (a) \& (b)} \Rightarrow x > 1 \text{ ធ្វើអោយប្រព័ន្ធសមីការគ្មានវិសម្ម}$$

$$\Rightarrow x, y, z \text{ មិនអាចធំជាង } 1$$

$$\text{នោះ } x < 1 \text{ តាម (1)} \Rightarrow z < y \Rightarrow \frac{1+y}{1+x} < \frac{1+x}{1+z}$$

$$\Rightarrow (1+y)(1+z) < (1+x)^2 \Rightarrow (1+z)^2 < (1+x)^2 \Rightarrow z < x$$

$$\text{តាម (2) } y = \frac{1+x}{1+z} > \frac{1+z}{1+z} > 1 \text{ មិនអាច}$$

ដូចនេះប្រព័ន្ធសមីការមានរឹសតែមួយគត់គឺ $x = y = z = 1$


ដូចនេះត្រីកោណតូចទាំង៦ មានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា ។

៥៦. បង្ហាញថា ប្រលេឡូក្រាមទាំងពីរមានក្រលាផ្ទៃស្មើគ្នា

តាង P ជាចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាយ BC & ZY ។

ដោយ (AX)//(DP) & (AD)//(XP)

នាំអោយ AXPD ជាប្រលេឡូក្រាម



យើងឃើញថាប្រលេឡូក្រាម AXYZ & AXPZ មាន ជ្រុង AX រួមគ្នា និង ZY & DP ត្រួតលើគ្នា

$$\Rightarrow S_{AXYZ} = S_{AXPD} \quad (1)$$


$$\text{ដូចគ្នាដែរចំពោះ } ABCD \text{ \& } AXPZ \Rightarrow S_{ABCD} = S_{AXPD} \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) } \Rightarrow \underline{S_{AXYZ} = S_{ABCD}} \quad \text{។}$$

៥៧. គណនាក្រលាផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយធ្នូកោង និង បន្ទាត់ដេក

តាង O ជាផ្ចិតរង្វង់កាំ r ដែលមានធ្នូ AB

PX ជាបន្ទាត់ឈរ



$\Rightarrow OP$ & PX ត្រួតលើគ្នា

យើងមាន $PX = 5$, $AX = BX = 5\sqrt{3}$ គេបាន $OX = r - 5$

$$AOX \text{ ជាត្រីកោណកែង} \Rightarrow (r-5)^2 + (5\sqrt{3})^2 = r^2 \Rightarrow r=10$$

$$\text{នាំអោយ } BX = \frac{\sqrt{3}}{2}OB \Rightarrow \angle XOB = 60^\circ$$

$$\text{ក្រលាផ្ទៃចំនិតរង្វង់គឺ } \frac{\pi}{3} \cdot 10^2 = \frac{100\pi}{3}$$

$$\text{ក្រលាផ្ទៃ } \triangle ABO \text{ គឺ } \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10\sqrt{3} = 25\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \text{ក្រលាផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយផ្ទៃកោង និង បន្ទាត់ដេកគឺ } \frac{100\pi}{3} - 25\sqrt{3} \text{ ។}$$

៥៨. គណនា S_{ABC}

$$\text{តាង } S_1 = S_{AB'O} ; S_2 = S_{OCA'}$$

$$\text{យើងមាន } S_{AOB} = \frac{1}{2} \cdot AO \cdot OB \cdot \sin \angle AOB$$

$$S_{OBA'} = \frac{1}{2} \cdot OB \cdot OA' \cdot \sin \angle BOA'$$

$$\text{គេបាន } \frac{S_{AOB}}{S_{OBA'}} = \frac{AO}{OA'} \cdot \frac{\sin \angle AOB}{\sin \angle BOA'}$$


$$\text{ដោយ } \angle AOB + \angle BOA' = 180^\circ \Rightarrow \sin \angle AOB = \sin \angle BOA'$$

$$\text{នោះ } \frac{S_{AOB}}{S_{OBA'}} = \frac{AO}{OA'} = \frac{40+30}{35} = 2$$

$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះ } \triangle OAB; \triangle OAB' \Rightarrow \frac{S_{OB'A}}{S_{AOB}} = \frac{S_1}{70} = \frac{OB'}{OB}$$

$$\triangle OCB; \triangle OCB' \Rightarrow \frac{S_{B'OC}}{S_{OCB}} = \frac{84}{S_2 + 35} = \frac{OB'}{OB}$$

$$\triangle AOC; \triangle OCA' \Rightarrow \frac{S_{AOC}}{S_{OCA'}} = \frac{S_1 + 84}{S_2} = \frac{AO}{OA'} = 2$$



$$\text{តេបាន} \begin{cases} \frac{S_1}{70} = \frac{84}{S_2 + 35} & (1) \\ \frac{S_1 + 84}{2} = S_2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow S_1(S_2 + 35) = 5880 \Leftrightarrow S_1 \left(\frac{S_1 + 84}{2} + 35 \right) = 5880$$

$$\Leftrightarrow S_1^2 + 84S_1 + 70S_1 = 11760$$

$$\Leftrightarrow S_1^2 + 154S_1 - 11760 = 0$$

$$\Delta' = 133$$

$$\text{តេបាន } S_1 = 56; S_2 = 70$$

$$\text{ដូចនេះ } S_{ABC} = 70 + 56 + 84 + 40 + 30 + 35 = 315 \text{ ឯកតាក្រលាផ្ទៃ ។}$$

៥៩. គណនាក្រលាផ្ទៃ $\triangle CDM$

$$\text{ក្នុង } \triangle ABC: AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25$$

$$\text{ដោយ } AD = DB = 15 \Rightarrow ADB \text{ ជាត្រីកោណសមបាត}$$

$$\text{តែ } M \text{ កណ្តាល } [AB] \Rightarrow [DM] \text{ ជាមេដ្យាទ័រ } [AB]$$

$$\Rightarrow (DM) \perp (MB)$$

$$\text{ក្នុង } \triangle \perp DMB:$$

$$DM = \sqrt{DB^2 - MB^2} = \sqrt{15^2 - \frac{25^2}{2^2}} = 5\sqrt{\frac{11}{4}} = \frac{5}{2}\sqrt{11}$$


$$\Rightarrow \sin \hat{DBM} = \frac{DM}{DB} = \frac{5\sqrt{11}}{15 \cdot 2} = \frac{\sqrt{11}}{6}$$

$$\text{នោះ } S_{DMB} = DB \cdot BM \cdot \sin \hat{DBM} = 15 \cdot \frac{25}{2} \cdot \frac{\sqrt{11}}{6} = \frac{125\sqrt{11}}{4}$$

$$\text{ក្នុង } \triangle ABC: \sin \hat{CBA} = \frac{BC}{AB} = \frac{7}{25}$$

$$\hat{DBC} = \hat{ABC} - \hat{DBM}$$

$$\sin \hat{DBC} = \sin(\hat{ABC} - \hat{DBM})$$



$$\Leftrightarrow \sin \hat{D}\hat{B}\hat{C} = \sin \hat{A}\hat{B}\hat{C} \cdot \cos \hat{D}\hat{B}\hat{M} - \sin \hat{D}\hat{B}\hat{M} \cdot \cos \hat{A}\hat{B}\hat{C}$$

$$\Leftrightarrow \sin \hat{D}\hat{B}\hat{C} = \frac{7}{25} \cdot \cos \hat{D}\hat{B}\hat{M} - \frac{\sqrt{11}}{6} \cdot \cos \hat{A}\hat{B}\hat{C}$$

$$\text{តែ } \cos \hat{D}\hat{B}\hat{M} = \sqrt{1 - \frac{11}{36}} = \frac{5}{6} ; \cos \hat{A}\hat{B}\hat{C} = \sqrt{1 - \frac{49}{25^2}} = \frac{24}{25}$$

$$\Rightarrow \sin \hat{D}\hat{B}\hat{C} = \frac{7}{25} \cdot \frac{5}{6} - \frac{\sqrt{11}}{6} \cdot \frac{24}{25} = \frac{7}{30} - \frac{4\sqrt{11}}{25}$$

$$\text{តែង } S_{DBC} = \frac{1}{2} CB \cdot DB \cdot \sin \hat{D}\hat{B}\hat{C} = 42 - \frac{144\sqrt{11}}{5}$$

$$S_{ACM} = \frac{1}{2} AC \cdot AM \cdot \sin \hat{C}\hat{B}\hat{M} = \frac{1}{2} \cdot \frac{BC}{AB} \cdot AC \cdot AM = 42$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = 84$$

$$\Rightarrow S_{MCD} = 84 - 42 + \frac{144\sqrt{11}}{5} - 42 = \frac{144\sqrt{11}}{5} \quad \text{។}$$


៦០. គណនាក្រលាផ្ទៃ $\triangle XYZ$

$$\text{យើងមាន: } S_{ABC} = \frac{1}{2} \sin \alpha_1 \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sin \alpha_2 \cdot BA \cdot BC = \frac{1}{2} \sin \alpha_3 \cdot CA \cdot CB = 1$$


$$\begin{aligned} S_{AXZ} &= \frac{1}{2} \sin \alpha_1 \cdot AX \cdot AZ \\ &= \frac{1}{2} \sin \alpha_1 \cdot \frac{AB}{3} \cdot \frac{2AZ}{3} = \frac{2}{9} S_{ABC} = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S_{AXZ} = S_{BXY} = S_{CZY} = \frac{2}{9}$$

$$S_{XYZ} = S_{ABC} - (S_{AXZ} + S_{BXY} + S_{CZY}) = 1 - \frac{3 \times 2}{9} = \frac{1}{3} \quad \text{។}$$



៦១. ប្រៀបធៀបក្រលាផ្ទៃសកោណទាំងពីរ



តាមរូបទី(1) $S_{ABC} = S_2 = S_4 = S_6$

$$S_1 + S_{ABC} = \frac{1}{2}(a+c)(a+b)\sin A = \frac{1}{2}(a^2 + ab + bc + ac)\sin A$$

$$\Rightarrow S_1 = \frac{1}{2}a(a+b+c)\sin A + \frac{1}{2}bc.\sin A - S_{ABC} = \frac{1}{2}a(a+b+c)\sin A$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow S_3 = \frac{1}{2}c(a+b+c)\sin C; S_5 = \frac{1}{2}b(a+b+c)\sin B$$

ក្រលាផ្ទៃរូបទី(1): $S_{(1)} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_{ABC}$

$$\begin{aligned} \text{នោះ } S_{(1)} &= \frac{1}{2}a(a+b+c)\sin A + \frac{1}{2}b(a+b+c)\sin B + \frac{1}{2}c(a+b+c)\sin C + 4S_{ABC} \\ &= \frac{1}{2}(a+b+c)(a\sin A + b\sin B + c\sin C) + 4S_{ABC} \quad (a) \end{aligned}$$

$$\text{តាមរូបទី (2): } S'_2 = \frac{1}{2}b^2 \sin B; S'_4 = \frac{1}{2}a^2 \sin A; S'_6 = \frac{1}{2}c^2 \sin C$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } S'_1 + S_{ABC} = \frac{1}{2}(b+c)^2 \sin A = \frac{1}{2}c^2 \sin A + \frac{1}{2}b^2 \sin A + 2S_{ABC}$$

$$S'_1 = \frac{1}{2}b^2 \sin A + \frac{1}{2}c^2 \sin A + S_{ABC}$$

$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ គេបាន } S'_3 = \frac{1}{2}a^2 \sin C + \frac{1}{2}b^2 \sin C + S_{ABC}$$

$$S'_5 = \frac{1}{2}a^2 \sin B + \frac{1}{2}c^2 \sin B + S_{ABC}$$

ក្រលាផ្ទៃរូបទី(2): $S_{(2)} = S'_1 + S'_2 + S'_3 + S'_4 + S'_5 + S'_6 + S_{ABC}$

$$\begin{aligned} \text{នោះ } S_{(2)} &= \frac{1}{2}a^2 \sin A + \frac{1}{2}b^2 \sin B + \frac{1}{2}c^2 \sin C + \frac{1}{2}a^2 \sin B + \frac{1}{2}c^2 \sin B \\ &\quad + \frac{1}{2}b^2 \sin C + \frac{1}{2}a^2 \sin C + \frac{1}{2}b^2 \sin A + \frac{1}{2}c^2 \sin A + 4S_{ABC} \\ &= \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)(\sin A + \sin B + \sin C) + 4S_{ABC} \quad (b) \end{aligned}$$

តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$ ក្នុង $\triangle ABC$ យើងបាន:

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{a \sin A + b \sin B + c \sin C} \\ \Rightarrow (a+b+c)(a \sin A + b \sin B + c \sin C) &= (a^2 + b^2 + c^2)(\sin A + \sin B + \sin C) \quad (c) \end{aligned}$$

តាម (a); (b); (c) $\Rightarrow S_{(1)} = S_{(2)}$ ។

៦២. បង្ហាញថា J ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ចារឹកក្នុង $\triangle CEF$

យើងមាន $[EF]$ ជាមេដ្យាទ័រនៃ $[OA]$

$[EF] \perp [OA]$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល $[OA]$

រឺ $[OA]$ ជាកាំរង្វង់កែង $[EF]$

$\Rightarrow [OA]$ ជា មេដ្យាទ័រនៃ $[EF]$

នោះ $\widehat{AE} = \widehat{AF} \Leftrightarrow \widehat{ECA} = \widehat{ACF}$


គេបាន $[CJ]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle ECF$ (1)

ដោយ $[AO] \perp [EF]$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល; $OE = OF$

$\Rightarrow OEAF$ ជាចតុកោណស្មើ

វិបាក $EA = OE = AF = OF$

ម្យ៉ាងទៀត D កណ្តាល $\widehat{AB} \Rightarrow [OD] \perp [AB]$



តែ $[AB] \perp [AC] \Rightarrow [OD] \parallel [AC]$

តែ $[DA] \parallel [OJ]$ នោះ $ODAJ$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow OD=OE=AE=AJ$

គេបាន AEJ ជាត្រីកោណសមបាត

វិបាក $\widehat{AEJ} = \widehat{AJE} = \widehat{JEC} + \widehat{JCE}$

តែ $\widehat{AEJ} = \widehat{AEF} + \widehat{FEJ} = \widehat{JCE} + \widehat{FEJ} (\widehat{AE} = \widehat{AF} \Rightarrow \widehat{ACE} = \widehat{AEF})$

$\Rightarrow \widehat{FEJ} = \widehat{JEC}$ នាំអោយ $[EJ]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle FEC$ (2)

តាម (1) & (2) កន្លះបន្ទាត់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ J

ដូចនេះ J ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ចារឹកក្នុង $\triangle CEF$ ។

៦៣. a. ស្រាយថា $DH=DK$

យើងមាន $AK=AB$; $CB=CH$

$\Rightarrow \triangle AKB$ & $\triangle CBH$ ជាត្រីកោណសមបាត

ដោយ $\widehat{ABK} = \widehat{CBH}$

គេបាន $\widehat{KAB} = \widehat{BCH}$

$\widehat{DAK} = \widehat{DAB} + \widehat{KAB}$

$\widehat{DCH} = \widehat{DCB} + \widehat{BCH}$


តែ $\widehat{DAB} = \widehat{DCB} \Rightarrow \widehat{DAK} = \widehat{DCH}$

$\triangle ADK$ & $\triangle DCH$ មាន

$AK=AB=DC$

$CH=BC=AD$

$\widehat{DAK} = \widehat{DCH}$



$\Rightarrow \triangle ADK \cong \triangle DCH$ តេបានវិបាក $DK=DH$

b. ស្រាយថា $\triangle DKH \sim \triangle ABK$

តាង $[DK] \cap [AB] = \{E\}$

ដោយ $(AH) \parallel (DC) \Rightarrow \hat{CDH} = \hat{EHD}$

តែ $\hat{CDH} = \hat{AKE}$ ($\triangle ADK \cong \triangle DCH$)

តេបាន $\hat{AKE} = \hat{EHD}$

$\triangle AKE$ & $\triangle EDH$ មាន $\begin{cases} \hat{AKE} = \hat{EHD} \\ \hat{AEK} = \hat{DEH} \end{cases} \Rightarrow \hat{EAK} = \hat{EDH}$

តែ $\triangle AKB$ & $\triangle KDH$ ជាត្រីកោណសមបាត

$\Rightarrow \underline{\triangle DKH \sim \triangle ABK}$ ។

៦៤. ស្រាយថា $AC=ST$ ហើយបន្ទាយនៃ (AC) កែងនឹង (ST)

យើងមាន $\hat{DCB} + \hat{TCS} = 360^\circ - (\hat{DCT} + \hat{BCS})$
 $= 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ$

តែ $\hat{DCB} + \hat{ADC} = 180^\circ$

(មុំពីរជាប់ជ្រុងមួយនៃប្រលេឡូក្រាម)

$\Rightarrow \hat{ADC} = \hat{TCS}$


$\triangle ADC$ & $\triangle CTS$ មាន:

$AD = BC = CS; \hat{ADC} = \hat{TCS}; DC = CT$

$\Rightarrow \triangle ADC \cong \triangle CTS$ វិបាក $AC = ST$

តាង H ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (AC) & (ST)

យើងមាន $\hat{ACB} + \hat{HCS} = 180^\circ - \hat{BCS} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$



តែ $\widehat{ACB} = \widehat{DAC} = \widehat{CSH} \Rightarrow \widehat{CSH} + \widehat{HCS} = 90^\circ$

នាំអោយ $\widehat{CHS} = 90^\circ$

ដូចនេះ បន្ទាយ (AC) កែងនឹង (ST) ។

៦៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា BC កាត់តាមចំនុចនឹងមួយ

តាង H ជាចំណោលកែងនៃ O លើ (xy)

E ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (OH) និង (BC)

F ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (OA) និង (BC)

$\triangle OEF$ និង $\triangle HOA$ ជាត្រីកោណកែងមាន

$\angle O$ ជាមុំរួម នោះ $\triangle OEF \sim \triangle HOA$

នោះ $\frac{OE}{OA} = \frac{OF}{OH} \Leftrightarrow OE \cdot OH = OF \cdot OA$


$\triangle OCF$ និង $\triangle OCA$ ជាត្រីកោណកែងមាន $\angle COA$ ជាមុំរួម

នោះ $\triangle OCF \sim \triangle OCA$ វិញ $\frac{OC}{OA} = \frac{OF}{OC} \Leftrightarrow OA \cdot OF = OC^2 = r^2$

$\Rightarrow OE \cdot OH = r^2 = \text{ថេរ}$

ដោយ $[OH]$ ថេរ $\Rightarrow OE$ ថេរ ហើយ E នៅលើ $[OH]$

ដូចនេះ E ជាចំនុចនឹង $\Rightarrow (BC)$ កាត់តាមចំនុចនឹងមួយជានិច្ច ។



៦៦. ស្រាយថា $\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$

តាង O ជាចំនុចប្រសព្វរវាង AG ; BF ; CE ។

តាម A គូសបន្ទាត់ស្រប(BF)កាត់បន្ទាយ(CE)ត្រង់ I

តាម C គូសបន្ទាត់ស្រប(BF)កាត់បន្ទាយ(AG)ត្រង់ J

$$\text{យើងមាន } (OF) \parallel (IA) \Rightarrow \frac{CF}{FA} = \frac{CO}{OI}$$

$$\Delta OAI \sim \Delta JCO \quad ((JC) \parallel (IA))$$

$$\Rightarrow \frac{CO}{OI} = \frac{CJ}{JI}$$

$$\text{នោះ } \frac{CF}{FA} = \frac{JC}{AI}$$

$$\Delta EIA \sim \Delta EOB \quad ((OB) \parallel (IA))$$


$$\Rightarrow \frac{AE}{EB} = \frac{IA}{OB}$$

$$\Delta BOG \sim \Delta GJC \quad ((BO) \parallel (JC))$$

$$\Rightarrow \frac{BG}{GC} = \frac{OB}{JC}$$

$$\text{យើងបាន : } \frac{AE}{EB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CF}{FA} = \frac{IA}{OB} \cdot \frac{OB}{JC} \cdot \frac{CJ}{AI} = 1$$

$$\text{ដូចនេះ } \frac{AE}{EB} \cdot \frac{BG}{GC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1 \quad \checkmark$$



៦៧. ស្រាយថា $A_1; B_1; C_1$ រត់ត្រង់គ្នា

$$\text{យើងមាន : } (AA_1) \perp (A_1P); (B_1P) \perp (BB_1)$$

$$\Rightarrow A_1BB_1P \text{ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។}$$


$$\text{នោះ } \hat{ABC} + \hat{A_1PB_1} = 180^\circ$$

$$\text{តែ } \hat{ABC} + \hat{APC} = 180^\circ$$

$$\text{យើងបាន } \hat{A_1PB_1} = \hat{APC}$$

$$\Rightarrow \hat{A_1PA} = \hat{B_1PC} \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } (AA_1) \perp (A_1P); (AC_1) \perp (C_1P)$$



$\Rightarrow A_1PC_1A$ ជាតុកោណមាត្រក្នុងរង្វង់ ។

នោះ $A_1\hat{C}_1A = A\hat{P}A_1$ (2)

ហើយ $A_1\hat{B}P = A_1\hat{B}_1P$; $A_1\hat{B}P = A\hat{C}P$

$\Rightarrow A_1\hat{B}_1P = A\hat{C}P$ នោះ $B_1\hat{C}_1C = B_1\hat{P}C$ (3)

តាម (1);(2);(3) $\Rightarrow A_1\hat{C}_1A = B_1\hat{C}_1C$

ដូចនេះ $A_1;C_1;B_1$ រត់ត្រង់គ្នា ។

៦៨. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $Q\hat{N}M = M\hat{N}P$

យក I ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (AC) & (MN)

នោះ I ជាចំនុចកណ្តាល [AC]

តាម I គូសបន្ទាត់កែង [MN] ហើយកាត់ (QN) ត្រង់ K

គេបាន $KM = KN \Rightarrow \triangle KMN$ ជាត្រីកោណសមបាត

វិបាក $Q\hat{N}M = K\hat{M}N$ (1)

ដោយ M & N នៅកណ្តាល [AB] & [DC]


$\Rightarrow (MN) \parallel (BC) \Leftrightarrow \frac{QM}{MP} = \frac{QI}{IC}$

ម្យ៉ាងទៀត $(IK) \parallel (DC) \Rightarrow \frac{QI}{IC} = \frac{QK}{KN}$

$\Rightarrow \frac{QM}{MP} = \frac{QK}{KN}$; វិបាក $(MN) \parallel (PN)$

យើងទាញបាន $K\hat{M}N = M\hat{N}P$ (2)

តាម (1) & (2) ដូចនេះ $Q\hat{N}M = M\hat{N}P$ ។



៦៩. ស្រាយថា $PB = QC$

តាង $PB = x$, $QC = y$, $AP = r$ & $DQ = s$

យើងមាន $AB = CD \Rightarrow r + x = s + y$ (1)

$PU = PA = r$, $QV = DQ = s$

$PV = PB = x$, $QU = CQ = y$


នោះ $UV = PV - PU = x - r$

$UV = QU - DQ = y - s$

គេបាន $x - r = y - s$ (2)

តាម (1) & (2) $\Rightarrow x = y$

ដូចនេះ $PB = QC$ ។



៧០. ស្រាយថា $(XY) \parallel (BC)$

តាង U & V ជាចំនុចនៅលើ AB & AC ដែល $BU = \frac{2}{9}BA$, $CV = \frac{2}{9}CA$


គេបាន $\frac{BU}{CV} = \frac{BA}{CA} \Rightarrow (UV) \parallel (BC)$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $\frac{BU}{BR} = \frac{BU}{BA} \cdot \frac{BA}{BR} = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3} = \frac{PX}{PR}$
 $\Rightarrow (UX) \parallel (BC)$ (2)

ដូចគ្នាដែរ គេបាន $(YV) \parallel (BC)$ (3)

តាម (1), (2) & (3) $\Rightarrow X, Y$ នៅលើ (UV)

ដូចនេះ $(XY) \parallel (BC)$ ។



៧១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា: $IE \perp CD$ _____

តាង O ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។

តាមប្រព័ន្ធកូអរដោនេយើងបាន : $O(0,0)$; $A(0,a)$;

$B(-c,0)$; $C(c,0)$; $D\left(-\frac{c}{2}, \frac{a}{2}\right)$; $E\left(\frac{c}{6}, \frac{a}{2}\right)$

$\overrightarrow{AB}(-c,-a)$ ។

ដោយ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល C

នោះតាងផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅគឺ I (0,y)

គេបាន : $\overrightarrow{ID} = \left(-\frac{c}{2}, \frac{a}{2} - y\right)$


$ID \perp AB$ នាំអោយ $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\Rightarrow -\frac{c}{2}(-c) - a\left(\frac{a}{2} - y\right) = 0$

$\Rightarrow y = \frac{a^2 - c^2}{2a}$ ។ នាំអោយ $I\left(0, \frac{a^2 - c^2}{2a}\right)$

គេបាន : $\overrightarrow{IE}\left(\frac{c}{6}, \frac{c^2}{2a}\right)$ និង $\overrightarrow{DC}\left(\frac{3c}{2}, -\frac{a}{2}\right)$

នាំអោយ : $\overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{DC} = \frac{c}{6} \cdot \frac{3c}{2} - \frac{c^2}{2a} \cdot \frac{a}{2} = \frac{c^2}{4} - \frac{c^2}{4} = 0$ ។

ដូចនេះ $IE \perp DC$ ។




៧២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ MNPQ ជាការនោះ ABCD ក៏ជាការដែរ

តាង : $BM = AQ = DP = x$, $AB = a$

$MN = u$; $AM = a - x$; $\hat{PQD} = \alpha$ ។

តាម $\triangle AMQ$ យើងបាន :



$$u^2 = (a-x)^2 + x^2 - 2x(a-x)\cos A \quad (1)$$

កាលណា MNPQ ជាការេនោះ : $\hat{AQM} = 90^\circ - \alpha$ និង $MQ = PQ = PN = NM = u$

យើងបាន : $AM^2 = AQ^2 + QM^2 - 2AQ \cdot QM \cdot \cos \hat{AQM}$

$$\Leftrightarrow (a-x)^2 = u^2 + x^2 - 2ux \sin \alpha \quad (2)$$

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុសក្នុង ΔQDP យើងបាន : $\frac{x}{\sin \alpha} = \frac{u}{\sin D} \Rightarrow u \sin \alpha = x \sin D$

យកជំនួសក្នុង (2) យើងបាន : $(a-x)^2 = u^2 + x^2 - 2x^2 \sin D \quad (3)$

តាម (1) និង (2) នាំអោយ : $\cos A = \frac{x}{a-x}(1 - \sin D) \geq 0$ ។

ចតុកោណ ABCD ជាចតុកោណប៉ោងកាលណា : $0 < A \leq 90^\circ$ ។

ស្រាយដូចគ្នាដែរយើងបាន : $0 < B \leq 90^\circ$; $0 < C \leq 90^\circ$; $0 < D \leq 90^\circ$ ។

$\Rightarrow A + B + C + D \leq 360^\circ$ នាំអោយយើងបាន : $A = B = C = D = 90^\circ$ ។

ដូចនេះចតុកោណ ABCD ជាការេ ។

៧៣. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ $PM \perp CD$ នោះ $QM \perp AD$ ដែរ

តាង $\vec{MA} = \vec{a}$, $\vec{MB} = \vec{b}$ ។

យើងមាន $\Delta MAB \sim \Delta MDC$ នាំអោយ


$$\frac{MD}{MA} = \frac{MC}{MB} = k \Rightarrow MD = kMA, MC = kMB$$

ដូចនេះ $\vec{CM} = \frac{kb}{a} \vec{a}$, $\vec{MD} = \frac{-ka}{b} \vec{b}$

ចំពោះលក្ខខ័ណ្ឌ $a = MA$ និង $b = MB$ ។ តែដោយ

$$\vec{CM} + \vec{MD} = \vec{CD} \text{ នាំអោយ } \vec{CD} = \frac{k}{ab} (b^2 \vec{c} - a^2 \vec{b})$$

តាមសម្មតិកម្ម, $PM \perp CD$ នាំអោយ $\vec{CD} \cdot \vec{MP} = 0$, ហើយ $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MP}$



នាំអោយ $(\vec{a} + \vec{b})(b^2\vec{a} - a^2\vec{b}) = 0$ យើងបាន $\vec{a}\vec{b}(b^2 - a^2) = 0$ ។

+ បើ $b^2 - a^2 = 0$, ហើយ $a = b$ នោះ ABCD ជាឥតុកោណព្រួយសមបាត
ហើយជាឥតុកោណកែង ។

+ បើ $\vec{a}\vec{b} = 0$ នោះ $AC \perp CD$ នាំអោយយើងបាន :

$$\frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}) = \vec{OM}$$

$$\vec{QM} = \vec{OM} - \vec{OQ} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OD})$$

យើងបាន :

$$\vec{QM} \cdot \vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OD})(\vec{OD} - \vec{OA}) = \frac{1}{2}(OD^2 - OA^2) = 0$$

ដូចនេះ $QM \perp AD$ ។

៧៤. គណនា R ជាអនុគមន៍នៃ r_1 & r_2 _____

សន្មត $r_2 > r_1$

តាង S'_1 ជាចំនោលកែងនៃ S_1 លើ $[AB]$

$\Rightarrow AB S'_1 S_1$ ជាឥតុកោណកែង

$$(S'_1 \hat{A} D = A D S_1 = 90^\circ)$$


តាង S'_2 ជាចំនោលកែងនៃ S_2 លើ $[AB]$

$\Rightarrow S'_2 S_2 B C$ ជាឥតុកោណកែង

$$(S'_2 \hat{B} C = B C S_2 = 90^\circ)$$

តាង H ជាចំនោលកែងនៃ S_1 លើ $[S_2 S'_2]$

$\Rightarrow S_2 S'_2 S'_1 S_1$ ជាឥតុកោណកែង $(S_1 \hat{S}'_1 S'_2 = S'_1 \hat{S}'_2 S_2 = 90^\circ)$



តាង P; Q; R ជាចំនុចប៉ះលើរង្វង់ក្នុងនៃរង្វង់ទាំងបី

យើងមាន $SS_1' = SA - S_1'A = SA - SD = R - r_1$

$$SS_2' = SB - S_2'B = SB - S_2'C = R - r_2$$

$$\Rightarrow S_1'S_2 + S_1S_2 = AB - AS_1' - BS_2' = 2R - (r_1 + r_2)$$

ក្នុង $\triangle SS_1S_1'$ មាន: $SS_1^2 = SS_1'^2 + S_1'S_1^2$

$$S_1'S_1 = \sqrt{SS_1^2 - SS_1'^2} = \sqrt{(R + r_1)^2 - (R - r_1)^2} = 2\sqrt{Rr_1}$$

ក្នុង $\triangle SS_2S_2'$ មាន: $S_2'S_2 = \sqrt{(R + r_2)^2 - (R - r_2)^2} = 2\sqrt{Rr_2}$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } S_2'S_2 = HS_2' + HS_2 = S_1'S_1 + HS_2 \Leftrightarrow 2\sqrt{Rr_2} = 2\sqrt{Rr_1} + HS_2$$

ក្នុង $\triangle S_1S_2H$ មាន:

$$\begin{aligned} HS_2 &= \sqrt{S_1S_2^2 - S_1H^2} = \sqrt{S_1S_2^2 - S_1'S_2'^2} = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - [2R - (r_1 + r_2)]^2} \\ &= \sqrt{4R(r_1 + r_2) - 4R^2} = 2\sqrt{R(r_1 + r_2 - R)} \end{aligned}$$

$$\text{នោះ } 2\sqrt{Rr_2} = 2\sqrt{Rr_1} + 2\sqrt{R(r_1 + r_2 - R)} \Leftrightarrow \sqrt{r_2} - \sqrt{r_1} = \sqrt{r_1 + r_2 - R}$$

$$\Rightarrow \underline{R = 2\sqrt{r_1r_2}} \quad \forall$$

៧៥. គណនា CD

តាង E ជាចំនុចប្រសព្វនៃបន្លាយ [BC] & [DA]


ក្នុង $\triangle ECD$ & $\triangle ABD$ មាន

$$\widehat{BAD} = \widehat{EDC}; \widehat{ABD} = \widehat{ECD}$$

$$\Rightarrow \triangle ECD \approx \triangle ABD \quad (1)$$

វិបាក $BE = BD \Rightarrow BED$ ជាត្រីកោណសមបាត

គេបាន $BE = BD = 10 \text{ cm}$



$$\text{តាម (1)} \Rightarrow \frac{AB}{DC} = \frac{BD}{EC} \Rightarrow DC = \frac{AB \cdot EC}{BD} = \frac{AB(BC + BE)}{BD}$$

$$\text{គេបាន } DC = \frac{8 \cdot (10 + 6)}{10} = \frac{64}{5} \text{ ។}$$

៧៦. បង្ហាញថា $AB + DB = BC$

មាន $AB = AC \Rightarrow ABC$ ជាត្រីកោណសមបាត

$$\Rightarrow \hat{A}CB = \hat{ABC} = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$$

$$\text{មាន } \hat{ABD} = \hat{DBC} = \frac{\hat{ABC}}{2} = 20^\circ$$

ក្នុង $\triangle ADB$ មាន:


$$\frac{\sin 60^\circ}{AB} = \frac{\sin 20^\circ}{AD} = \frac{\sin 100^\circ}{BD} \Leftrightarrow \frac{AB}{\sin 60^\circ} + \frac{AD}{\sin 20^\circ} + \frac{BD}{\sin 100^\circ} = \frac{AD + BD}{\sin 20^\circ + \sin 100^\circ}$$

$$\Leftrightarrow AB = \frac{\sin 60^\circ (AD + BD)}{2 \sin 60^\circ \cos 40^\circ} = \frac{AD + BD}{2 \cos 40^\circ}$$

$$\text{ក្នុង } \triangle ABC \text{ មាន: } \frac{BC}{\sin 100^\circ} = \frac{AB}{\sin 40^\circ} \Rightarrow AB = \frac{\sin 40^\circ BC}{\sin 100^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 40^\circ BC}{\sin 100^\circ} = \frac{AD + DB}{2 \cos 40^\circ} \Leftrightarrow BC = \frac{\sin 100^\circ (AD + DB)}{2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ} = \frac{\sin 100^\circ (AD + DB)}{\sin 80^\circ}$$

$$\text{គេបាន } \underline{BC = AD + DB} \quad (\sin 100^\circ = \sin 80^\circ) \text{ ។}$$




៧៧. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើ D ជាចំនុចកណ្តាល $[AB]$ នោះ $DM = DL$

តាង E ជាចំនុចកណ្តាល $[AP]$; F កណ្តាល

$[BP]$

ដោយ D កណ្តាល $[AB]$

គេបាន $[DE]$ & $[DF]$ ជាបាតមធ្យម $\triangle ABP$



$$\Rightarrow (DE) \parallel (BP); DE = \frac{1}{2} \cdot BP$$

$$(DF) \parallel (AP); DF = \frac{1}{2} \cdot AP$$

នាំអោយ DEPF ជាប្រលេឡូក្រាម; វិបាក $DE = FP; DF = EP; \hat{D}\hat{F}P = \hat{D}\hat{E}P$

$\Delta \perp PBL$ មាន F កណ្តាល [BP] $\Rightarrow PF = LF = DE; \hat{P}\hat{F}L = 2\hat{P}\hat{B}L$

$\Delta \perp PAM$ មាន E កណ្តាល [AP] $\Rightarrow ME = PE = DF; \hat{P}\hat{E}M = 2\hat{P}\hat{A}M$

ម្យ៉ាងទៀត $\hat{P}\hat{B}L = \hat{P}\hat{A}M \Rightarrow \hat{P}\hat{E}M = \hat{P}\hat{F}L$

$$\begin{array}{l} \hat{D}\hat{F}L = \hat{D}\hat{F}P + \hat{P}\hat{F}L \\ \hat{D}\hat{E}M = \hat{D}\hat{E}P + \hat{P}\hat{E}M \end{array} \Rightarrow \hat{D}\hat{F}L = \hat{D}\hat{E}M$$

ក្នុង ΔDFL & ΔDEM មាន $LF = DE; ME = DF; \hat{D}\hat{F}L = \hat{D}\hat{E}M$

នាំអោយ $\Delta DFL \cong \Delta DEM$; វិបាក $DL = DM$ ។

៧៨. ស្រាយថា $BM = AC$

ដោយ $CM = CB \Rightarrow \Delta CMN$ ជាត្រីកោណសមបាត

$$\hat{C}\hat{M}\hat{B} = \frac{180^\circ - \hat{A}\hat{C}\hat{B}}{2} = 40^\circ$$


$$\text{ក្នុង } \Delta ABC: \frac{\sin 30^\circ}{BC} = \frac{\sin 50^\circ}{AC} \Rightarrow BC = \frac{AC}{2 \sin 50^\circ}$$

$$\text{ក្នុង } \Delta MCN: \frac{\sin 40^\circ}{BC} = \frac{\sin 100^\circ}{BM} \Rightarrow BC = \frac{BM \cdot \sin 40^\circ}{\sin 100^\circ}$$

$$\text{តែបាន } \frac{AC}{2 \sin 50^\circ} = \frac{BM \cdot \sin 40^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{BM \cdot \sin 40^\circ}{2 \sin 50^\circ \cos 50^\circ}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{BM \cdot \sin 40^\circ}{\cos 50^\circ} \quad \text{តែ } 50^\circ + 40^\circ = 90^\circ \Rightarrow \sin 40^\circ = \cos 50^\circ$$

ដូចនេះ $AC = BM$ ។



៧៩. គណនា $\hat{A}MC$

តាង HC ជាកំពស់ $\triangle ABC$; $(MB) \cap (CH) = \{N\}$

ដោយ [CH] ជាកំពស់នៃត្រីកោណសមបាត

$\Rightarrow$ [CH] ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ & ជាមេដ្យាទ័រ

តែបាន $NA=NB \Rightarrow \hat{N}AB = 30^\circ$

$\hat{M}AN = \hat{N}AB - \hat{B}AM = 30^\circ - 10^\circ = 20^\circ$

$\hat{N}MA = \hat{N}AB + \hat{A}BN = 40^\circ$

$\triangle AMN$ & $\triangle NCB$ មាន $\hat{N}MA = \hat{N}CB = 40^\circ$ $\left(\hat{N}CB = \frac{\hat{A}CB}{2} = 40^\circ \right)$

$\hat{N}AM = 20^\circ = \hat{N}BC$

$AN = NB$


$\Rightarrow \triangle AMN \cong \triangle NCB$

វិញ្ញាក $MN=NC \Rightarrow \triangle NMC$ ជាត្រីកោណសមបាត

$\triangle LNH B$ មាន $\hat{H}BN = 30^\circ \Rightarrow \hat{H}NB = 60^\circ$

នោះ $2\hat{N}MC = 60^\circ \Leftrightarrow \hat{N}MC = 30^\circ$

ដូចនេះ $\hat{A}MC = \hat{A}MN + \hat{N}MC = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$ ។



៨០. ស្រាយថា $p^2 + q^2 = c^2 + d^2 + 2ab$


តាង E; F ជាចំនោលកែងនៃ A,B លើ [DC]

$\Rightarrow AEFB$ ជាចតុកោណកែង; វិញ្ញាក $AB=EF=a$

យើងមាន $AC^2 = AE^2 + EC^2 = p^2$

$BD^2 = BF^2 + DF^2 = q^2$

$p^2 + q^2 = AE^2 + EC^2 + BF^2 + DF^2 = AD^2 - DE^2 + EC^2 + BC^2 - FC^2 + DF^2$



$$\begin{aligned}
&= c^2 + d^2 + EC^2 + DF^2 - DE^2 - FC^2 \\
&= c^2 + d^2 + EC^2 + (DC - FC)^2 - DE^2 - FC^2 \\
&= c^2 + d^2 + (a + FC)^2 + (b - FC)^2 - DE^2 - FC^2 \\
&= c^2 + d^2 + a^2 + b^2 + FC^2 + FC^2 + 2aFC - 2bFC - DE^2 - FC^2 \\
&= c^2 + d^2 + (a - b)^2 + 2ab + FC^2 - DE^2 - 2FC(b - a) \\
&= c^2 + d^2 + (DE + FC)^2 + FC^2 - DE^2 - 2FC(DE + FC) + 2ab \\
&= c^2 + d^2 + DE^2 + 2DE \cdot FC + FC^2 + FC^2 - DE^2 - 2FC \cdot DE - 2FC^2 + 2ab \\
&\text{តែងតែ } \underline{p^2 + q^2 = c^2 + d^2 + 2ab} \quad \forall
\end{aligned}$$

៨១. បញ្ជាក់ថា $PB=2PD$

យើងមាន $\hat{APB} = \hat{ACB}$ និង

$$\hat{ADP} = \hat{ACB} \quad (\text{ស.ក})$$

$$\Rightarrow \hat{APB} = \hat{ADP}$$

ក្នុង $\triangle APB$ & $\triangle APD$ មាន:


$\angle A$ ជាមុំរួម

$$\hat{APB} = \hat{ADP} \Rightarrow \triangle APB \sim \triangle APD$$

$$\text{វិធាក } \frac{AP}{AB} = \frac{PD}{PB} = \frac{AD}{AP} \Rightarrow AP^2 = AD \cdot AB = 4AD^2$$

$$\Rightarrow AP = 2AD \text{ នាំអោយ } \frac{PD}{PB} = \frac{AD}{2AD} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \underline{PB=2PD} \quad \forall$$



៨២. ស្រាយថា $PA = PB + PC$

តាង M; N ជាចំណុចលើជ្រុង [PA]

ដែល $CM = CP; BN = BP$ (1)

យើងមាន $\hat{C}PA = \hat{C}BA = 60^\circ$

$\hat{A}CB = \hat{A}PB = 60^\circ$ (2)

តាម (1) & (2) $\Rightarrow \triangle BPN \cong \triangle CMP$

ជាត្រីកោណសម័ង្ស

ម្យ៉ាងទៀត $\hat{M}CA = \hat{A}BC - \hat{M}CB = 60^\circ - \hat{M}CB$

$\hat{P}CB = \hat{P}CM - \hat{M}CB = 60^\circ - \hat{M}CB$

$\Rightarrow \hat{M}CA = \hat{P}CB$

តែ $\hat{P}CB = \hat{P}AB \Rightarrow \hat{P}AB = \hat{M}CA$


ធ្វើដូចគ្នាដែរ $\Rightarrow \hat{C}AM = \hat{N}BA$

$\triangle AMC$ & $\triangle ANB$ មាន $\hat{M}CA = \hat{N}AB; CA = AB; \hat{C}AM = \hat{N}BA$

$\Rightarrow \triangle AMC \cong \triangle ANB$ វិបាក $CM = AN$ (a)

តែ $AP = AN + NP; CM = PC; NP = PB$ (b)

(a) & (b) $\Rightarrow \underline{AP = PB + PC}$ ។



៨៣. ស្រាយថា PCD ជាត្រីកោណសម័ង្ស

តាង H; E ជាចំណោលកែងនៃ P លើ (AB) & (AD)

$\Rightarrow PE = AH; AE = PH$

តែ $\hat{P}AB = \hat{P}BA = 15^\circ$

$\Rightarrow$ PAB ជាត្រីកោណសមបាត

$$\text{វិញ្ញាក } AH = PE = \frac{AB}{2}$$

$\triangle APD$ & $\triangle PBC$ មាន $AP=PB$; $AD=BC$

$$\hat{DAP} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$$

$$\hat{CBP} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ \Rightarrow \triangle APD \cong \triangle PBC$$

វិញ្ញាក $PD=PC$ (1)


$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } \cot 15^\circ = \frac{AH}{PH} \Rightarrow PH = \tan 15^\circ \cdot AH = \frac{\sin 15^\circ}{2 \cos 15^\circ} \cdot AB$$

$$\begin{aligned} ED &= AD - AE = AB - \frac{\sin 15^\circ}{2 \cos 15^\circ} \cdot AB \\ &= AB \left(1 - \frac{\sin 15^\circ}{2 \cos 15^\circ} \right) \\ &= AB \left(1 - \frac{3 \sin^2 15^\circ}{2 \cos 15^\circ \sin 15^\circ} \right) \\ &= AB (1 - 2 \sin^2 15^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB \end{aligned}$$

$$\triangle PEB \text{ មាន } PD^2 = ED^2 + PE^2 = \frac{3AB^2}{4} + \frac{AB^2}{4} = AB^2$$

$$\Rightarrow PD=AB \text{ (2)}$$


តាម (1) & (2) $\Rightarrow$ PCD ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។



៨៤. គណនា FB

$\triangle AFC$ & $\triangle BCE$ មាន:

$$\left. \begin{array}{l} AF=BC=2 \\ AC=BE=4 \\ FC=CE \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle AFC \cong \triangle BCE$$



$$\text{វិបាក } \hat{FAB} = \hat{EBC}$$

$\triangle AFB$ & $\triangle BED$ ជាត្រីកោណសមបាតមាន $\hat{FAB} = \hat{EBC}$

នោះ $\triangle AFB \sim \triangle BED$ វិបាក $\frac{AB}{BD} = \frac{BF}{DE}$

$$\Rightarrow BF = \frac{AB \cdot DE}{BD} = \frac{2 \times 2}{4} = 1; \text{ ដូចនេះ } \underline{BF=1} \quad \forall$$

៨៥. គណនា $|ST|$

$$\text{យក } R > r$$

តាង H ជាចំនោលកែងពី $O \rightarrow (O'T)$


គេបាន OSTH ជាតួកោណកែង

$$\text{វិបាក } ST = OH$$

$$\triangle LOHO': OH = \sqrt{OO'^2 - O'H^2}$$

$$OH = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} = 2\sqrt{R'r}$$

$$\text{ដូចនេះ } \underline{ST = 2\sqrt{R'r}} \quad \forall$$




៨៦. គណនា $|AED|$

$$\text{យើងមាន } |AEB| = \frac{1}{2} \cdot EA \cdot EB \sin \alpha$$

$$|AED| = \frac{1}{2} \cdot EA \cdot ED \sin \beta$$

$$\text{ដោយ } \alpha + \beta = 180^\circ \Rightarrow \sin \alpha = \sin \beta$$

$$\frac{|AEB|}{|AED|} = \frac{EB}{ED} \Rightarrow |AED| = \frac{|AEB| \cdot ED}{EB} = 3 \cdot \frac{ED}{EB}$$



$$\text{ដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow \frac{|BEC|}{|CED|} = \frac{EB}{ED} \Rightarrow \frac{|CED|}{|BEC|} = \frac{ED}{EB}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{2|AED|} = \frac{ED}{EB} \Rightarrow |AED| = \frac{10}{|AED|} \cdot 3$$

$$\text{ដូចនេះ } |AED| = \sqrt{15} \quad \text{។}$$


៨៧. រកក្រលាផ្ទៃ $\triangle ABC$

$$\text{តាង } x = BC$$

$$\text{យើងមាន } S_{APB} = \frac{1}{2} S_{ABC} \Leftrightarrow \frac{S_{APB}}{S_{ABC}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ដោយ } \triangle APQ \sim \triangle ABC$$

$$\Rightarrow \frac{PQ^2}{x^2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow PQ = \frac{\sqrt{2}x}{2}$$



ដោយ $\triangle APQ$; $\triangle SCR$; $\triangle TUB$ មានជ្រុងទាំងបីស្របគ្នារៀងគ្នា

ហើយ $S_{APD} = S_{SCR} = S_{TUB}$ តែបាន $\triangle APQ \sim \triangle SCR \sim \triangle TUB$

$$\text{នោះ } PQ = CR$$

$$\text{ដោយ } RB + CR = BC \Rightarrow RB = BC - CR = x - \frac{\sqrt{2}x}{2} = \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} \right) \cdot x$$

$$\text{ដោយ } (RS) \parallel (AB); (PQ) \parallel (CB); (TU) \parallel (AC)$$

$$\Rightarrow PXUC; YQBR \text{ ជាប្រលេឡូក្រាម}$$

$$\text{តែ } CU = RB \text{ នោះ } PX = YQ = RB = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \cdot x$$

$$XY = PQ - 2PX = \frac{\sqrt{2}x}{2} - 2x + \sqrt{2}x = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2 \right) x$$

$$\frac{S_{XYZ}}{S_{ABC}} = \frac{XY^2}{BC^2} = \frac{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2\right)^2 x^2}{x^2} = \frac{17 - 12\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{តើបាន } S_{ABC} = 34 + 24\sqrt{2} \quad \forall$$


៨៨. គណនាក្រលាផ្ទៃនៃចតុកោណ PQRS

$$\text{យើងមាន : } S_{ABCD} = S_{ACD} + S_{ABC}$$

$$\text{តែ } S_{ACD} = 2S_{ADK} \quad ; \quad S_{ABC} = 2S_{CMB}$$

$$\text{នោះ } S_{ABCD} = 2(S_{ADK} + S_{CMB})$$

$$\Rightarrow S_{ADK} + S_{CMB} = \frac{S_{ABCD}}{2}$$



$$\text{ម្យ៉ាងទៀត : } S_{ADK} + S_{CMB} + S_{AMQP} + S_{SRCK} + S_{PQRS} = S_{ABCD}$$

$$\Leftrightarrow \frac{S_{ABCD}}{2} + S_{AMQP} + S_{SRCK} + S_{PQRS} = S_{ABCD}$$

$$\Leftrightarrow S_{PQRS} = \frac{S_{ABCD}}{2} - S_{AMQP} - S_{SRCK}$$

$$\Rightarrow S_{PQRS} = \frac{3000}{2} - 513 - 388 = 599$$

$$\text{ដូចនេះ } S_{PQRS} = 599 \quad \forall$$

៨៩. គណនា BC

$$\text{យើងមាន : } \hat{ABD} = \hat{ACD} = 60^\circ$$

នោះចតុកោណ ABCD ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

តាង (O;R) ជារង្វង់ដែល ABCD ចារឹកក្នុង

តាង I លើរង្វង់ដែលជាចំនុចប្រសព្វរវាង (BE) និង រង្វង់

$$\Rightarrow \widehat{ABI} = 30^\circ$$

យក I_1 ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (CF) និង រង្វង់

$$\text{នោះ } I_1\widehat{CD} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{ACI_1} = 30^\circ \quad (1)$$

$$\text{តែ } \widehat{ACI} = \widehat{ABI} = 30^\circ \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) នាំអោយ I_1 នៅលើ I ។

$$\text{តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស : } R = \frac{AD}{2\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 1$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត : } \widehat{IDF} = \widehat{IDA} + \widehat{ADF} = \widehat{ABI} + \frac{1}{2}\widehat{ADC} = 30^\circ + \frac{1}{2}\widehat{ADC}$$

$$\text{តែ } \widehat{IFD} = \widehat{FDC} + \widehat{FCD} = 30^\circ + \frac{1}{2}\widehat{ADC}$$

$$\text{នោះ } \widehat{IDF} = \widehat{IFD} \Rightarrow ID = IF$$


$$\Delta OID \text{ មាន } OI = ID ; \widehat{IOD} = 2\widehat{IBD} = 60^\circ$$

$$\text{នោះ } \Delta IOD \text{ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ; } ID = OD = 1 \text{ គេបាន } IF = 1 \text{ ។}$$

$$\text{ស្រាយដូចគ្នាដែរយើងបាន } IE = 1 \text{ ។}$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូសស៊ីនុសក្នុង ΔIFE

$$\cos \widehat{EIF} = \frac{IF^2 + IE^2 - EF^2}{2IE \cdot IF} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{EIF} = 60^\circ \Rightarrow BC = 1 \text{ ។}$$



៩០. ស្រាយថា $S_{CPRQ} = S_{ABR}$ _____

$$\text{តាង } AC = p ; BC = q \Rightarrow AB = \sqrt{p^2 + q^2}$$

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន : } \frac{BC}{BK} &= \frac{CP}{KL} \\ \Rightarrow CP &= \frac{BC \cdot KL}{BK} = \frac{q \cdot p}{p+q} \end{aligned}$$

$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow CQ = \frac{q \cdot p}{p+q}$$

$$\begin{aligned} S_{ANB} &= \frac{1}{2} AB \cdot BN \sin \hat{ABN} = \frac{1}{2} AB \cdot q \sin(90^\circ + \hat{ABC}) = \frac{1}{2} AB \cdot q \cos \hat{ABC} \\ &= \frac{1}{2} AB \cdot q \cdot \frac{q}{AB} = \frac{q^2}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow S_{ABL} = \frac{p^2}{2}$$

$$S_{APL} = \frac{1}{2} AL \cdot AP = \frac{1}{2} AL \cdot (AC - PC) = \frac{1}{2} p \cdot \left(p - \frac{pq}{p+q} \right) = \frac{1}{2} \frac{p^3}{p+q}$$

$$S_{QBN} = \frac{1}{2} BN \cdot BQ = \frac{1}{2} BN \cdot (BC - QC) = \frac{1}{2} q \cdot \left(q - \frac{pq}{p+q} \right) = \frac{1}{2} \frac{q^3}{p+q}$$


$$S_{ACQ} = \frac{1}{2} AC \cdot CQ = \frac{1}{2} p \cdot \frac{pq}{p+q} = \frac{1}{2} \frac{p^2 q}{p+q}$$

$$S_{PBC} = \frac{1}{2} CP \cdot CB = \frac{1}{2} \frac{pq^2}{p+q}$$

$$\text{តាង } S = S_{APR} + S_{RQB}$$

$$\begin{aligned} S_{RAB} &= \frac{1}{2} (S_{ALB} + S_{ABN} - S_{ALP} - S_{DBN} - S) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{p^2 + q^2}{2} - \frac{1}{2} \frac{p^3 + q^3}{p+q} - S \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{p^2 + q^2}{2} - \frac{p^2 + q^2}{2} + \frac{pq}{2} - S \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{pq}{2} - S \right) \end{aligned}$$

$$S_{CPRQ} = \frac{1}{2} (S_{CAQ} + S_{CBR} - S) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{pq^2 + p^2 q}{p+q} - S \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{pq}{2} - S \right)$$



ដូចនេះ $S_{CPRQ} = S_{RAB}$ ។

៩១. ស្រាយថា $\frac{AC}{AG} = \frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF}$ _____

តាង I ; J ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (I) នឹង (BC);(CD)

$\Delta AEG \sim \Delta GCJ$ ($\hat{J}\hat{G}\hat{C} = \hat{A}\hat{G}\hat{E}$; $\hat{E}\hat{A}\hat{G} = \hat{G}\hat{C}\hat{J}$)

$$\Rightarrow \frac{AC}{AG} = \frac{JE}{GE}$$

$$\Delta AGF \sim \Delta GIC \Rightarrow \frac{AC}{AG} = \frac{IF}{FG}$$


$$\text{គេបាន : } \frac{AC}{AG} = \frac{JE}{EG} = \frac{IF}{FG} = \frac{IE + IF}{EG + FG} = \frac{IE + IF}{EF} \quad (1)$$

$$\Delta AEF \sim \Delta EIB \Rightarrow \frac{AB}{BE} = \frac{IF}{FE}$$

$$\Delta AEF \sim \Delta FJD \Rightarrow \frac{AD}{AF} = \frac{JE}{EF}$$

$$\text{គេបាន : } \frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF} = \frac{IF + JE}{EF} \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) និង (2) } \Rightarrow \frac{AC}{AG} = \frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF} \quad \text{។}$$




៩២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{\sqrt{R_3}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}}$ _____

+ តាង E, H, F ជាចំនុចប៉ះនឹងបន្ទាត់

រវាងរង្វង់ទាំង ៣ ។

+ I, J ជាចំនោលកែងនៃ O_3 លើ

(O_1E) & (O_2F) ។



+K ជាដំនោលកែងនៃ O_2 លើ (O_1E)

+សន្មត $R_1 > R_2 > R_3$

គេបាន $O_1K = R_1 - R_2$

$$KO_2 = \sqrt{O_1O_2^2 - O_1K^2} = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 - (R_1 - R_2)^2} = 2\sqrt{R_1R_2}$$

$$\text{ក្នុង } \Delta \perp IO_1O_3: IO_3 = \sqrt{O_1O_3^2 - O_1I^2} = \sqrt{(R_1 + R_3)^2 - (R_1 - R_3)^2} = 2\sqrt{R_1R_3}$$

ក្នុង

$$\Delta \perp JO_3O_2: O_3J = \sqrt{O_2O_3^2 - O_2J^2} = \sqrt{(R_2 + R_3)^2 - (R_2 - R_3)^2} = 2\sqrt{R_2R_3}$$

ដោយ $O_3I = EH$; $O_3J = HF$; $EF = O_2K$

នោះ $O_3I + O_3J = KO_2$

$$\Leftrightarrow \sqrt{R_1R_3} + \sqrt{R_2R_3} = \sqrt{R_1R_2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{R_3}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}} \quad \forall$$

៩៣. គណនាតំលៃដែលអាចមានរបស់ AE

ឧបមាថា A, B, C, D, E ជាចំនុចបីតក្នុងតំរុយអរតូណូម៉ាល់ ហើយមានកូអរដោនេ

$$A(4a_1, 4a_2); B(4b_1, 4b_2); C(4c_1, 4c_2); D(4d_1, 4d_2); E(4e_1, 4e_2)$$

$$\Rightarrow F(2a_1 + 2b, 2a_2 + 2b_2); G(2b_1 + 2c_1, 2b_2 + 2c_2); H(2c_1 + 2d_1, 2c_2 + 2d_2)$$

$$\& I(2d_1 + 2e_1, 2d_2 + 2e_2)$$

$\Rightarrow$ កូអរដោនេនៃ X & Y គឺ:

$$X(a_1 + b_1 + c_1 + d_1, a_2 + b_2 + c_2 + d_2); Y(b_1 + c_1 + d_1 + e_1, b_2 + c_2 + d_2 + e_2)$$

$$\text{គេបាន } XY = \sqrt{(a_1 - e_1)^2 + (a_2 - e_2)^2}; AE = 4\sqrt{(a_1 - e_1)^2 + (a_2 - e_2)^2}$$

$$\Rightarrow AE = 4XY$$

ដោយ $1 \leq AE \leq 5$ ហើយ $XY \in \mathbb{N}^*$

$$\text{នោះ } XY = 1 \Rightarrow \underline{AE = 4} \quad \forall$$

៩៤. គណនា $\hat{ACB}$

តាង H ជាចំណោលកែងនៃ C លើ (AP)

តាមទ្រឹស្តីបទ sin ក្នុង $\triangle ABP$:


$$\frac{AP}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{3\sin 15^\circ}$$

$$\Rightarrow AP = \frac{\sin 45^\circ BC}{3\sin 15^\circ}$$

$\triangle CHP$ ជាត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស

$$\Rightarrow PH = \frac{PC}{2} = \frac{\frac{BC}{3}}{2} = \frac{BC}{6}$$

$$HC = \frac{PC\sqrt{3}}{2} = \frac{BC\sqrt{3}}{3} \quad (1)$$



ម្យ៉ាងទៀត $AH = AP - HP$

$$= \frac{\sin 45^\circ BC}{3\sin 15^\circ} - \frac{BC}{3} = \left(\frac{\sin 45^\circ}{\sin 15^\circ} - 1 \right) \frac{BC}{3}$$

$$= \left(\frac{\sin 45^\circ - \sin 15^\circ}{\sin 15^\circ} \right) \frac{BC}{3} = \frac{BC\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

តាម (1) & (2) នាំអោយ $AH = HC \Rightarrow \hat{HCA} = 45^\circ$

ដូចនេះ $\hat{ACB} = \hat{PCH} + \hat{HCA} = 75^\circ$ ។

៩៥. គណនា λ

យើងមាន $\frac{CN}{CE} = \frac{AM}{AC}$

ដោយ $CE = AC \Rightarrow CN = AM \Rightarrow EN = CM$

$\triangle END$ & $\triangle CMB$ មាន $\hat{E} = \hat{C}$, $ED = BC$, $EN = CM$

$\Rightarrow$ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នា $\Rightarrow \widehat{MBC} = \widehat{EDN}$

& $\widehat{END} = \widehat{BMC}$

តាង $\widehat{MBC} = \alpha$, $\widehat{BMC} = \beta$

នោះ $\widehat{DNC} = 180^\circ - \beta$, $\widehat{CNB} = 90^\circ - \alpha$

$$\alpha + \beta = 180^\circ - \widehat{MCB} = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

ម្យ៉ាងទៀត

$$\widehat{DNB} = \widehat{DNC} + \widehat{CNB} = (180^\circ - \beta) + (90^\circ - \alpha) = 120^\circ$$

យក I ជិតនៅលើរង្វង់ផ្ចិត C កា់ BC $\Rightarrow \widehat{BID} = 60^\circ$


ដោយ $\widehat{BID} + \widehat{BND} = 180^\circ \Rightarrow C, N, D, B$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ

$$\Rightarrow CN = BC = R$$

$$\text{ក្នុង } \triangle OCE : EC^2 = OE^2 + OC^2 - 2.OE.OC.\cos \widehat{EOC} =$$

$$= 2OE^2 - 2OE^2 \cos 120^\circ = 3OE^2 = 3R^2 \Rightarrow EC = \sqrt{3}R$$

$$\text{ដូចនេះ } \lambda = \frac{CN}{CE} = \frac{R}{\sqrt{3}R} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{។}$$



៩៦. គណនាប្រវែង AB

តាង G ជាជើងកំពស់គូសចេញពី D ទៅលើ JH


C ជាចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់គូសចេញពី B ហើយស្រប

ID នឹងបន្ទាត់គូសចេញពី A ហើយស្រប DG

E ជាចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាយ ID & AC

I ជាជើងកំពស់គូសចេញពី B លើ ID មាន G

ជាជើងកំពស់នៃ $\triangle DH$



$$\Rightarrow GH = \frac{KH}{2} = \frac{1}{2} \text{ \& } DG = \sqrt{DH^2 - GH^2} = \frac{\sqrt{15}}{2}$$

ក្នុង $\triangle JAH$ & $\triangle AHG$ មាន $\angle H$ ជាមុំរួម និង $\frac{AH}{JH} = \frac{GH}{AH} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \triangle JAH \sim \triangle AHG \text{ តែ } JAH \text{ ជាត្រីកោណសមបាត}$$

$$\Rightarrow \triangle AHG \text{ ជាត្រីកោណសមបាត} \Rightarrow GF=DE=1/4$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } \triangle ILB \cong \triangle AHF \Rightarrow IL=FH=1/4, IB=AF=\sqrt{AH^2 - FH^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$BC = IE = LD - IL + DE = LD - IL + GF = LD = 2$$

$$AC = CE + EF + AF = IB + DG + AF = 2AF + DG = 2 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} + \frac{\sqrt{15}}{2} = \sqrt{15}$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{BC^2 + CA^2} = \sqrt{19} \quad \checkmark$$

៩៧. ស្រាយថា $\hat{A}CD = \hat{B}CM$

ដោយចូល N ដែល $(BM) \parallel (CN)$ & $CN = BM$

$\Rightarrow BNCM$ & $ANCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

$$\Rightarrow \hat{C}DM = \hat{M}BC = \hat{B}CN$$

$\triangle ABN$ & $\triangle MDC$ មាន $AB = DM, BN = MC$

$$\text{\& } AN = DC$$


$$\Rightarrow \triangle ABN \cong \triangle MDC$$

$$\text{វិបាក } \hat{B}AN = \hat{C}DM \Rightarrow \hat{B}CN = \hat{C}DM$$

$\Rightarrow A, B, N, C$ នៅលើរង្វង់តែមួយ

$$\Rightarrow \hat{C}BN = \hat{C}AN$$

$$\text{តែ } \hat{C}BN = \hat{B}CM \text{ \& } \hat{C}AN = \hat{A}CD \Rightarrow \hat{A}CD = \hat{B}CM \quad \checkmark$$



៩៨. គណនាកាំនៃរង្វង់តូច

តារាង x ជារង្វាស់កំរង្វង់តូច

ដោយរង្វង់ធំប៉ះកន្លះរង្វង់ត្រង់ផ្ចិត C


$$\Rightarrow AC = 1$$

$$-AD = AC - DC = 1 - x$$

$$- AB = AF + FB = 1 + x$$

$$-DB^2 = CB^2 - DC^2$$

$$= (\text{CG} - \text{BG})^2 - x^2 = (2 - x)^2 - x^2 = 4 - 4x$$



ដោយ $\triangle ADB$ ជាត្រីកោណកែង

$$\Rightarrow AB^2 = AD^2 + DB^2 \Rightarrow (1+x)^2 = (1-x)^2 + 4 - 4x$$

$$\Rightarrow x = 1/2 \quad \forall$$

៩៩. ស្រាយថា $AE = EB + BC$

ដោយ B' នៅ (AB) ដែល $AB' = BC$

ក្នុង $\triangle ADB'$ & $\triangle DBC$ មាន $AB' = BC$, $AD = DC$ & $\hat{A} = \hat{C}$


$$\Rightarrow \triangle ADB' \cong \triangle DBC \text{ វិញ } DB = DB'$$

$\triangle DB'E$ & $\triangle DEB$ ជាត្រីកោណកែង មាន DE ជាជ្រុងរួម

ឆ្លង $DB = DB' \Rightarrow \triangle DB'E \cong \triangle DEB$ វិញក $EB = EB'$

ម្យ៉ាងទៀត $AE = AB' + EB' = BC + EB$

ដូចនេះ: $AE = EB + BC$ ។



១០០. រកតំលៃអប្បបរមានៃផលបូក: $S = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}$ _____

$$\widehat{AFE} - \widehat{ABE} = (180^\circ - \widehat{DFA}) + \frac{\widehat{ABC}}{2} = 180^\circ - \widehat{DAF} + \frac{\widehat{B}}{2}$$

$$\Rightarrow \widehat{ADC} = 180^\circ - 2\widehat{DAF} = 180^\circ - \widehat{B}$$

$$\Rightarrow 2\widehat{DFA} = 180^\circ - 180^\circ + \widehat{B}$$

$$\Rightarrow \widehat{DFA} = \widehat{DAF} = \frac{\widehat{B}}{2} \Rightarrow \widehat{AFE} + \widehat{ABE} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \text{ចតុកោណ } ABEF \text{ ចារឹកក្នុង} \Rightarrow \widehat{AFB} = \widehat{EAB} = \frac{\widehat{A}}{2}, \widehat{CBF} = \frac{\widehat{A}}{2}$$

$$\Rightarrow \triangle BCF \text{ ជាសមបាតកំពូល } C \Rightarrow CB = CF$$

$$\text{យើងបាន : } CD = CF + FD = BC + AD$$

ខ) គណនា $\frac{S_{ADE}}{S_{BCE}}$

ដោយពិនិត្យ E ស្ថិតនៅលើជ្រុង AD , AB , BC

$$\Rightarrow \frac{S_{ADE}}{S_{BCE}} = \frac{AD}{BC} = \frac{CD - BC}{BC} \Rightarrow \frac{S_{ADE}}{S_{BCE}} = \frac{CD}{BC} - 1 = k - 1$$

$$\text{ដូចនេះ } \frac{S_{ADE}}{S_{BCE}} = k - 1 \text{ ។}$$

១០២. ស្រាយថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

$$\text{ក្នុង } \triangle ABC: S = \frac{1}{2} ah_a = \frac{1}{2} bh_b = \frac{1}{2} ch_c$$

$$\text{នោះ } \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}; \frac{1}{h_b} = \frac{b}{2S}; \frac{1}{h_c} = \frac{c}{2S}$$

$$\text{តាម Heron: } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\text{នោះ } \frac{1}{\sqrt{p(p-a)}} = \frac{\sqrt{(p-b)(p-c)}}{S}; \frac{1}{\sqrt{p(p-b)}} = \frac{\sqrt{(p-a)(p-c)}}{S}$$

$$\frac{1}{\sqrt{p(p-c)}} = \frac{\sqrt{(p-b)(p-a)}}{S}$$

$$\text{នាំអោយ } \frac{a+b+c}{2S} = \frac{\sqrt{(p-a)(p-b)} + \sqrt{(p-b)(p-c)} + \sqrt{(p-c)(p-a)}}{S}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(a+b+c) = \sqrt{(p-a)(p-b)} + \sqrt{(p-b)(p-c)} + \sqrt{(p-c)(p-a)} \quad (1)$$

$$\text{តាម Cauchy: } p-b + p-c \geq 2\sqrt{(p-b)(p-c)}$$

$$\Leftrightarrow 2p - b - c \geq 2\sqrt{(p-b)(p-c)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a}{2} \geq \sqrt{(p-b)(p-c)} \\ \frac{b}{2} \geq \sqrt{(p-a)(p-c)} \\ \frac{c}{2} \geq \sqrt{(p-a)(p-b)} \end{array} \right\}$$

$$\text{គេបាន } \frac{1}{2}(a+b+c) \geq \sqrt{(p-a)(p-b)} + \sqrt{(p-b)(p-c)} + \sqrt{(p-c)(p-a)} \quad (2)$$

តាម (1); (2) គេបាន $a = b = c$


ដូចនេះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៣. ស្រាយថា D នៅចន្លោះ M & H

$$\text{យើងមាន : } BH^2 = AB^2 - AH^2$$

$$CH^2 = AC^2 - AH^2$$

$$\text{តែ } AB < AC \quad (\hat{B} > \hat{C})$$



$$\Rightarrow BH < CH \Leftrightarrow BH < \frac{BC}{2} = BM \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } \hat{BAH} = 90^\circ - \hat{CBA}$$

$$\hat{HAC} = 90^\circ - \hat{ACH}$$

$$\text{នោះ } \hat{BAH} < \hat{HAC} \quad (\hat{B} > \hat{C})$$

$$\Rightarrow \hat{BAH} < \frac{\hat{BAC}}{2} = \hat{BAD}$$

$$\text{គេបាន } BH < BD \quad (2)$$

$$[AD) \text{ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ } A \Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} < 1$$

$$\Rightarrow BD < DC \Leftrightarrow BD < \frac{BC}{2} = BM \quad (3)$$

តាម (1) ; (2) និង (3) នាំអោយ D នៅចន្លោះ H និង M ។

$$១០៤. \text{ ស្រាយថា } \frac{P'}{P} = \frac{r}{R}$$

តាង O ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle ABC$

H ជាជើងចំនោលកែងពី O លើ BC

យើងមាន $AF = AC \cos A$, $AE = AB \cos A$


$$\Rightarrow \frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$$

ហើយ $\angle A$ ជាមុំរួមរវាង $\triangle ABC$ & $\triangle AFE$

$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle AFE$$

$$\text{វិញ } \frac{FE}{BC} = \frac{AF}{AC} = \cos A \Rightarrow FE = BC \cos A$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } FD = AC \cos B, DE = AB \cos C$$



បរិមាត្រនៃ $\triangle EDF$ គឺ $P' = FE + FD + DE = BC \cos A + AC \cos B + DE \cos C$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } S_{OBC} = \frac{1}{2} OH \cdot BC = \frac{1}{2} R \cos A \cdot BC$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } S_{OAC} = \frac{1}{2} R \cos B \cdot AC, S_{OAB} = \frac{1}{2} R \cos C \cdot AB$$

$$\text{ដោយ } S_{ABC} = S_{OAC} + S_{OBC} + S_{OAB} \text{ \& } S_{ABC} = rP = \frac{1}{2} rP$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} rP = \frac{1}{2} R(\cos A \cdot BC + \cos B \cdot AC + \cos C \cdot AB)$$

$$\Leftrightarrow \underline{rP = RP' \Rightarrow \frac{P'}{P} = \frac{r}{R} \quad \forall}$$

១០៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

យើងមាន

$$\begin{aligned} 2(a^3 + b^3 + c^3) &= a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) \\ \Leftrightarrow 2(a^3 + b^3 + c^3) &= 2abc \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + 2abc \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} + 2abc \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &\quad + a^3 + b^3 + c^3 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 2abc(\cos A + \cos B + \cos C)$$

$$\text{យើងនឹងស្រាយថា } \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

$$\cos A + \cos B + \cos C - \frac{3}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \cos(A+B) - \frac{3}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \cos^2 \frac{A+B}{2} + 1 - \frac{3}{2}$$

$$= -2 \left[\cos^2 \frac{A+B}{2} - \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \frac{1}{4} \right]$$

$$= -2 \left[\left(\cos \frac{A+B}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{A-B}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{A-B}{2} \right] \\ \leq 0$$

$$\Rightarrow \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \leq 2abc, \frac{3}{2} = 3abc \quad (1)$$

$$\text{តាមវិសមភាព Cauchy} \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) គេបាន } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$\text{សមភាពកើតឡើងកាលណា } a = b = c$$

ដូចនេះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៦. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

$$\text{តាមសម្មតិកម្ម យើងបាន } (m_a + m_b + m_c)^2 = \frac{81R^2}{4} \quad (1)$$

យើងពិនិត្យ :

$$\begin{aligned} (m_a + m_b + m_c)^2 &= m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 + 2(m_a m_b + m_b m_c + m_c m_a) \\ &\leq 3(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) \\ &= 3 \left[\left(\frac{b^2}{2} + \frac{c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) + \left(\frac{c^2}{2} + \frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right) + \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) \right] \\ &= \frac{9}{4}(a^2 + b^2 + c^2) \\ &= 9R^2(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C) \quad (2) \end{aligned}$$

តាម (1) & (2) គេបាន:

$$9R^2(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C) \geq \frac{81R^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C \geq \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow 2 + 2 \cos A \cos B \cos C \geq \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos^2(A+B) + \cos(A+B)\cos(A-B) + \frac{1}{4} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\cos(A+B) + \frac{1}{2} \cos(A-B) \right]^2 + \frac{1}{4} \sin^2(A-B) \leq 0 \quad (*)$$

យើងឃើញថា (*) អាចកើតមានចំពោះសញ្ញា “=”

$$\text{គេបាន } m_a = m_b = m_c$$

ដូចនេះ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

១០៧. ស្រាយថា $(a-b)\cot\frac{C}{2} + (b-c)\cot\frac{A}{2} + (c-a)\cot\frac{B}{2} = 0$ _____

$$\text{យើងមាន } r = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\cos \frac{A}{2}} = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\sin\left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2}\right)} = \frac{a \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \cos \frac{B}{2}}$$

$$\Rightarrow a = r\left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}\right)$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ គេបាន } b = r\left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{C}{2}\right)$$

$$c = r\left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{A}{2}\right)$$

$$\bullet (a-b) = r\left(\cot \frac{B}{2} - \cot \frac{A}{2}\right)$$

$$\bullet (b-c) = r\left(\cot \frac{C}{2} - \cot \frac{B}{2}\right)$$

$$\bullet (c-a) = r \left(\cot \frac{A}{2} - \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$\text{គេបាន } (a-b) \cot \frac{C}{2} + (b-c) \cot \frac{A}{2} + (c-a) \cot \frac{B}{2} = 0 \quad \forall$$

១០៨. កំនត់ប្រភេទត្រីកោណ ABC

$$\text{a. } S = \frac{1}{4}(a+b-c)(a-b+c)$$

$$\text{យើងមាន } p-a = \frac{1}{2}(b+c-a)$$

$$p-b = \frac{1}{2}(c+a-b)$$

$$p-c = \frac{1}{2}(a+b-c)$$

តាមសម្មតិកម្ម គេបាន:

$$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{1}{4}(a+b-c)(a-b+c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{16}(a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c) = \frac{1}{16}(a+b-c)^2(a-b+c)^2$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c)(b+c-a) = (c+a-b)(a+b-c)$$

$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

នាំអោយ $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណកែង ។

$$\text{b. } S = \frac{\sqrt{3}}{36}(a+b+c)^2$$

តាមទ្រឹស្តីបទ Cauchy:

$$(p-a)(p-b)(p-c) \leq \left(\frac{p-a+p-b+p-c}{3} \right)^3$$

$$\Leftrightarrow (p-a)(p-b)(p-c) \leq \frac{p^3}{27}$$

$$\Leftrightarrow p(p-a)(p-b)(p-c) \leq \frac{p^4}{27}$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{1}{3\sqrt{3}} p^2 = \frac{\sqrt{3}}{36} (a+b+c)^2$$

សមភាពកើតឡើងកាលណា $p-a = p-b = p-c$

$\Rightarrow \underline{\triangle ABC}$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

១០៩. ស្រាយថា $OA' + OB' + OC' = R + r$ _____

តាង $OA' = \alpha$, $OB' = \beta$, $OC' = \gamma$

យើងមាន $S_{ABC} = S_{OAB} + S_{OBC} + S_{OAC}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}(a\alpha + b\beta + c\gamma)$$

$$\Rightarrow r = \frac{a\alpha + b\beta + c\gamma}{a+b+c} \quad (1)$$

ម្យ៉ាងទៀត $\cos A = \frac{\alpha}{R} \Rightarrow \alpha = R \cos A$ ហើយ $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$

$$\Rightarrow (b+c)\alpha = 2R^2 [\cos A (\sin B + \sin C)] = 2R^2 (\cos A \sin B + \cos A \sin C)$$


$$\text{ដូចគ្នាដែរគេបាន } (c+a)\beta = 2R^2 (\cos B \sin C + \cos B \sin A)$$

$$(a+b)\gamma = 2R^2 (\cos C \sin A + \cos C \sin B)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (b+c)\alpha + (c+a)\beta + (a+b)\gamma &= 2R^2 [\sin(A+B) + \sin(B+C) + \sin(A+C)] \\ &= 2R^2 (\sin A + \sin B + \sin C) \\ &= 2R^2 \left(\frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R = \frac{(b+c)\alpha + (c+a)\beta + (a+b)\gamma}{a+b+c} \quad (2)$$

យក (1) + (2) គេបាន $\underline{OA' + OB' + OC' = R + r}$ ។



១១០. បង្ហាញពីលំដាប់ $\frac{AP}{PD}, \frac{BP}{PE}, \frac{CP}{PF}$

យើងមាន : $\frac{AP}{PD} = \frac{AD - DP}{PD} = \frac{AD}{PD} - 1$

តែ $\frac{AD}{PD} = \frac{S_{ABC}}{S_{PBC}}$, ស្រាយដូចគ្នាដែរចំពោះ $\frac{CP}{PF}, \frac{BP}{PE}$

$$\Rightarrow \frac{AD}{PD} + \frac{CP}{PF} + \frac{BP}{PE} = \frac{S_{ABC}}{S_{PBC}} + \frac{S_{ABC}}{S_{PBA}} + \frac{S_{ABC}}{S_{APC}} - 3$$

$$= S_{ABC} \left(\frac{1}{S_{PBC}} + \frac{1}{S_{PBA}} + \frac{1}{S_{APC}} \right) - 3$$

$$= (S_{PBC} + S_{PBA} + S_{APC}) \left(\frac{1}{S_{PBC}} + \frac{1}{S_{PBA}} + \frac{1}{S_{APC}} \right) - 3 \geq 9 - 3 = 6$$

$$\Rightarrow \frac{AP}{PD} + \frac{CP}{PF} + \frac{BP}{PE} \geq 6 \Rightarrow \text{យ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម } \frac{AP}{PD}, \frac{CP}{PF}, \frac{BP}{PE}$$

មានតំលៃលើសពី 2 ។

ឧបមាថា $\frac{AP}{PD} > 2; \frac{CP}{PF} > 2 \Rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{PBC}} - 1 > 2 \Leftrightarrow S_{ABC} > 3S_{PBC}; S_{ABC} > 3S_{PBA}$


$$\Rightarrow 2S_{ABC} > 3(S_{PBC} + S_{PBA})$$

$$\Rightarrow 2S_{ABC} + 3S_{PAC} > 3(S_{PBC} + S_{PBA} + S_{APC})$$

$$\Rightarrow 2S_{ABC} + 3S_{PAC} > 3S_{ABC}$$

$$\Rightarrow 3S_{PAC} > S_{ABC} \Rightarrow 3 > \frac{S_{ABC}}{S_{PAC}} \Rightarrow 2 > -1 + \frac{S_{ABC}}{S_{PAC}} = \frac{BP}{PE}$$

ដូចនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានមួយក្នុងចំណោម $\frac{AP}{PD}, \frac{CP}{PF}, \frac{BP}{PE}$ មានតំលៃតូចជាង 2 ។



១១១. គណនាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់

តាង H ជាជើងចំនោលកែងពី C ទៅ AB

D ជាជើងចំនោលកែងពី O ទៅ BC

r ជាកាំរង្វង់ និង $\alpha = \hat{CAB}$


ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មាន $\alpha = \frac{\hat{COB}}{2} = \hat{DOB}$ (1)

$\triangle ODB$ ជាត្រីកោណកែងមាន

$$\sin \hat{DOB} = \frac{DB}{OB} = \frac{CB}{2OB} = \frac{5}{r} \quad (2)$$

$\triangle ACH$ ជាត្រីកោណកែងមាន $\sin \alpha = \frac{CH}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (3)

$$\text{តាម (1), (2) \& (3)} \Rightarrow \frac{5}{r} = \frac{2}{3} \Rightarrow r = \frac{15}{2}$$



១១២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា ABCD ជាឥតកោណចារឹកក្រៅរង្វង់


យក a, b, c, d, x, y, z, t ជាប្រវែងនៃ AB, BC,

CD, OA, OB, OC & OD រៀងគ្នា & $\alpha = \hat{BOC}$

$$\triangle OAB \text{ មាន } S = pr_1 \Rightarrow r_1 = \frac{S}{p} = \frac{xy \sin \hat{AOB}}{\frac{x+y+a}{2}}$$

តែ $\hat{AOB} = 180^\circ - \alpha$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{xy \sin \alpha}{\frac{x+y+a}{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{r_1} = \frac{x+y+a}{xy \sin \alpha}$$



$$\text{ស្រាយដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow \frac{1}{r_2} = \frac{y+z+b}{yz \sin \alpha}; \frac{1}{r_3} = \frac{z+t+c}{zt \sin \alpha}; \frac{1}{r_4} = \frac{x+t+d}{xt \sin \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y+a}{xy \sin \alpha} + \frac{z+t+c}{zt \sin \alpha} = \frac{y+z+b}{yz \sin \alpha} + \frac{x+t+d}{xt \sin \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{a}{xy} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} + \frac{c}{zt} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{b}{yz} + \frac{1}{x} + \frac{1}{t} + \frac{d}{xt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{xy} + \frac{c}{zt} = \frac{b}{yz} + \frac{d}{xt}$$

$$\Leftrightarrow azt + cyx = bxt + dyz$$

$$\Leftrightarrow (azt + cyx)^2 = (bxt + dyz)^2$$

$$\Leftrightarrow a^2z^2t^2 + c^2y^2x^2 + 2acxyzt = b^2x^2t^2 + d^2y^2z^2 + 2bdxyz$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + y^2 + 2xy \cos \alpha)z^2t^2 + (z^2 + t^2 + 2zt \cos \alpha)x^2y^2 + acxyzt \\ = (y^2 + z^2 - 2yz \cos \alpha)x^2t^2 + (x^2 + t^2 - 2xt \cos \alpha)y^2z^2 + 2bdxyz$$

$$\Leftrightarrow 2zt \cos \alpha + 2xy \cos \alpha + 2ac = -2xt \cos \alpha - 2yz \cos \alpha + 2bd$$

$$\Leftrightarrow (c^2 - z^2 - t^2) + (a^2 - x^2 - y^2) + 2ac = (d^2 - x^2 - t^2) + (b^2 - y^2 - z^2) + 2bd$$

$$\Leftrightarrow (a + c)^2 = (b + d)^2$$

$$\Leftrightarrow a + c = b + d$$

ដូចនេះ ABCD ជាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ។

១១៣. ស្រាយថាតំលៃដែលផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងអន្តរកាលរបស់ត្រីកោណ

យើងបញ្ចូល ABC ទៅក្នុងតំលៃមានគល់ A ហើយ AB ស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស

កំណត់យក B(4x,0) & C(4y,4z)

ដោយ D, E, F ជាចំនុចកណ្តាល BC, CA, AB និង P, Q, R ជាចំនុចកណ្តាល

នៃមេដ្យាន AD, BE, CF គេបាន:

D(2x + 2y, 2z), E(2y, 2z), F(2x, 0), P(x + y, z), Q(2x + y, z) & R(x + 2y, z)

បណ្តាញនៃអង្កត់នីមួយៗគឺ

$$AQ^2 = (2x + y)^2 + z^2 = 4x^2 + 4xy + y^2 + z^2$$

$$AR^2 = (x + 2y)^2 + 4z^2 = x^2 + 4xy + 4y^2 + 4z^2$$

$$BP^2 = (3x - y)^2 + z^2 = 9x^2 - 6xy + y^2 + z^2$$

$$BR^2 = (3x - 2y)^2 + 4z^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2 + 4z^2$$

$$CP^2 = (x - 3y)^2 + 9z^2 = x^2 - 6xy + 9y^2 + 9z^2$$

$$CQ^2 = (2x - 3y)^2 + 9z^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2 + 9z^2$$

នោះផលបូកសរុបនៃបណ្តាអង្កត់ទាំងនោះគឺ $28(x^2 - xy + y^2 + z^2)$ (*)

ការប្រែប្រួលនៃ $\triangle ABC$ គឺ $AB^2 = 16x^2$, $CA^2 = 16x^2 + 16y^2$,

$$BC^2 = 16x^2 - 32xy + 16y^2 + 16z^2$$

$$\text{គេបាន } AB^2 + BC^2 + CA^2 = 32(x^2 - xy + y^2 + z^2) (**)$$

$$\Rightarrow \text{ផលធៀប } T = \frac{(*)}{(**)} = \frac{7}{8} \text{ ថេរ}$$

ដូចនេះតំលៃផលធៀប T មិនអាស្រ័យនឹងរូបរាងរបស់ត្រីកោណ ។

១១៤. បង្ហាញថាមានចំនុច S មួយនៅលើ PR ដែល PS & QS មានតំលៃគត់

តាង $PS = x$ និង $QS = y$ ($x, y \in \mathbb{N}^+$)

តាមទ្រឹស្តីបទ cosin ក្នុង $\triangle RPQ$ យើងបាន:

$$13^2 = 15^2 + 8^2 - 2 \cdot 15 \cdot 8 \cdot \cos \widehat{RPQ} \Rightarrow \cos \widehat{RPQ} = 0.5$$


$$\text{ពិនិត្យក្នុង } \triangle SPQ: y^2 = x^2 + 8^2 - 2 \cdot x \cdot 8 \cos \widehat{RPQ}$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{x^2 + 8x + 64} \quad (0 < x < 15)$$

យក $x = 1, 2, 3, \dots, 14$ ទៅជំនួសក្នុងសមីការ

គេបានគូដែលជាចំនួនគត់គឺ (3, 7), (5, 7) & (8, 8)

ដូចនេះមានចំនុច S ដែលស្ថិតនៅលើ PR ដែល PS & SQ មានប្រវែងគត់ ។



១១៥. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $MA + MB + MD = MC + ME$ _____

តាង R ជាកាំរង្វង់ (O) និង $2x(0 < x < \frac{\pi}{5})$ ជារង្វាស់មុំ ធ្នូ AM ។

តាមទ្រឹស្តីបទ sin គេបាន

$$MA = 2R \sin x;$$

$$MB = 2R \sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right);$$

$$MD = 2R \sin\left(\frac{2\pi}{5} + x\right);$$

$$MC = 2R \sin\left(\frac{2\pi}{5} - x\right);$$

$$ME = 2R \sin\left(\frac{\pi}{5} + x\right)$$

$$\begin{aligned} + MC + ME &= 2R \left[\sin\left(\frac{2\pi}{5} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{5} + x\right) \right] \\ &= 2R \sin \frac{3\pi}{10} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10} - x\right) = 4R \cos \frac{\pi}{5} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10} - x\right) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} + MA + MB + MD &= 2R \left[\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{5} + x\right) \right] \\ &= 2R \left[\sin x + 2 \sin \frac{3\pi}{10} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10} + x\right) \right] \\ &= 2R \left[\sin x + 2 \cos \frac{\pi}{5} \cos\left(\frac{\pi}{10} + x\right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{បើ } MA + MB + MD = MC + ME$$

$$\Leftrightarrow \sin x + 2 \cos \frac{\pi}{5} \cos\left(\frac{\pi}{10} + x\right) = 2 \cos \frac{\pi}{5} \cos\left(\frac{\pi}{10} - x\right)$$

$$\Leftrightarrow \sin x = 2 \cos \frac{\pi}{5} \left[\cos\left(\frac{\pi}{10} - x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{10} + x\right) \right]$$

$$\Leftrightarrow \sin x = 4 \cos \frac{\pi}{5} \cdot \sin \frac{\pi}{10} \cdot \sin x = 4 \cos \frac{\pi}{5} \cdot \cos \frac{2\pi}{5} \sin x \quad (*)$$



យើងធ្វើការគណនា $\cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{5}$

យើងមាន $\cos\left(\pi - \frac{2\pi}{5}\right) = \cos \frac{3\pi}{5}$

$$\Leftrightarrow -\cos \frac{2\pi}{5} = \cos \frac{3\pi}{5}$$

$$\Leftrightarrow 1 - 2\cos^2 \frac{\pi}{5} = 4\cos^3 \frac{\pi}{5} - 3\cos \frac{\pi}{5}$$

$$\Leftrightarrow 4\cos^3 \frac{\pi}{5} + 2\cos^2 \frac{\pi}{5} - 3\cos \frac{\pi}{5} - 1 = 0$$

$$\text{តាង } t = \cos \frac{\pi}{5}$$

$$\text{គេបាន } 4t^3 + 2t^2 - 3t - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t+1)(4t^2 - 2t - 1) = 0$$

ដោយ $t \neq -1$

$$\Rightarrow 4t^2 - 2t - 1 = 0$$

$$t_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{4}; t_2 = \frac{-\sqrt{5}+1}{4} < 0 \text{ មិនយក}$$

$$\text{គេបាន } \cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

$$\cos \frac{2\pi}{5} = 2\cos^2 \frac{\pi}{5} - 1 = 2 \cdot \frac{5+1+2\sqrt{5}}{16} - 1 = \frac{(\sqrt{5}-1)}{4}$$

$$\text{នោះ } \cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}$$

$$\text{តាម (*) គេបាន } \sin x = 4 \cdot \frac{1}{4} \sin x = \sin x \text{ ពិត}$$

$$\text{ដូចនេះ } \underline{MA + MB + MD = MC + ME} \text{ ។}$$

១១៦. ស្រាយថា $\widehat{QRP} = 90^\circ$ & $QR = RP$ _____

តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$ ក្នុង ΔAQC :

$$AQ = \frac{b}{2\sin 105^\circ} = \frac{b}{2\cos 15^\circ}$$

ដូចគ្នាដែរ $PB = \frac{a}{2\cos 15^\circ}$; $AR = RB = \frac{c}{2\cos 15^\circ}$

តាមទ្រឹស្តីបទ $\cos$:

$$RP^2 = \frac{PB^2 + RB^2 - 2PB \cdot RB \cdot \cos(B + 60^\circ)}{2PB \cdot RB} = \frac{a^2 + c^2 - 2accos(B + 60^\circ)}{4\cos^2 15^\circ}$$

$$RQ^2 = \frac{a^2 + c^2 - 2accos(B + 60^\circ)}{4\cos^2 15^\circ}$$

+ ស្រាយថា $RP = RQ$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2 + c^2 - 2accos(B + 60^\circ)}{4\cos^2 15^\circ} = \frac{a^2 + c^2 - 2accos(B + 60^\circ)}{4\cos^2 15^\circ}$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2accos(B + 60^\circ) = b^2 - 2bccos(A + 60^\circ)$$

$$\Leftrightarrow a^2 - accos B + \sqrt{3}acsin B = b^2 - bccos A + \sqrt{3}bcsin A$$

តាមទ្រឹស្តីបទចំនោល ក្នុង ΔABC :

$$b = c\cos A + a\cos C \Leftrightarrow b - c\cos A = a\cos C \Leftrightarrow b^2 - bccos A = abcos C$$

$$a = c\cos B + b\cos C \Leftrightarrow a - c\cos B = b\cos C \Leftrightarrow a^2 - accos B = abcos C$$

តាមទ្រឹស្តីបទ $\sin$ ក្នុង ΔABC :


$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \sqrt{3}acsin B = \sqrt{3}bcsin A$$

$$\text{គេបាន } a^2 - accos B + \sqrt{3}acsin B = b^2 - bccos A + \sqrt{3}bcsin A \quad \text{ពិត ។}$$

នាំអោយ $RP = RQ$ ។

+ ស្រាយថា $\angle RQP = 90^\circ$ លុះត្រាតែ QRP ជាត្រីកោណកែង $\Rightarrow PQ^2 = 2RP^2$

$$\text{យើងមាន } AQ = \frac{AC}{2\cos 15^\circ}$$



$$\text{ដោយគណនា } \cos 15^\circ \text{ តាមរូបមន្ត } \cos \alpha = \sqrt{\frac{\cos 2\alpha + 1}{2}}$$

$$\Rightarrow \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \Rightarrow AQ = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})AC}{2}; BP = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})BC}{2};$$

$$QC = AQ\sqrt{2}; PC = BP\sqrt{2}; RA = RB = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})AB}{2}$$

តាមទ្រឹស្តីបទ sin:

$$\begin{aligned} + RQ^2 &= AR^2 + AQ^2 - 2AR \cdot AQ \cos(A + 60^\circ) \\ &= AB^2(2 - \sqrt{3}) + AC^2(2 - \sqrt{3}) - 2AB \cdot AC(2 - \sqrt{3}) \cdot \cos(A + 60^\circ) \\ &= (2 - \sqrt{3}) \left[AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \left(\frac{1}{2} \cos A - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A \right) \right] \\ &= \frac{(2 - \sqrt{3})}{2} [AB^2 + AC^2 + (AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A) + \sqrt{3}S] \\ &= \frac{2 - \sqrt{3}}{2} (a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{3}S) \end{aligned}$$

$$+ \text{ស្រាយដូចគ្នាដែរ} \Rightarrow PQ^2 = (2 - \sqrt{3})(a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{3}S)$$

$$\text{គេបាន } PQ^2 = 2RP^2$$

$$\text{នាំអោយ } \underline{Q\hat{R}P = 90^\circ} \quad \forall$$

១១៧. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}A$ _____

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត Heron: } A &= \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2}} \\ 4A &\leq \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \cdot \left[\frac{(a+b-c) + (a+c-b) + (b+c-a)}{3} \right]^3} \\ 4A &\leq \frac{(a+b+c)^2}{3\sqrt{3}} \quad (*) \end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

$$\leq a^2 + b^2 + c^2 + (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) + (a^2 + c^2)$$

$$\Rightarrow (a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

តាម (*) គេបាន $4A \leq \frac{(a+b+c)^2}{3\sqrt{3}} \leq \frac{3(a^2+b^2+c^2)}{3\sqrt{3}}$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}A \quad \forall$$

១១៨. បង្ហាញថាចំងាយរវាងផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរគឺ $\sqrt{R(R-2r)}$


តាង ABC ជាត្រីកោណសមបាតដែលមាន $AB = AC$ ។

O & I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ & ចារឹកក្នុង

$\triangle ABC$ ។ d ជាចំងាយរវាងផ្ចិតទាំង 2 ។

M ជាជើងកំពស់ពី A ទៅលើ BC ។

H ជាជើងកំពស់ពី A ទៅលើ AB ។



តាង $\alpha = \angle OAB \Rightarrow \sin \alpha = \frac{HI}{AI} = \frac{HI}{AO + OI} = \frac{r}{R + d} \quad (*)$

ម្យ៉ាងទៀត $\cos 2\alpha = \cos \angle BOM = \frac{OM}{OB} = \frac{OI + IM}{OB} = \frac{r + d}{R} \quad (**)$

យក (*), (**) ជំនួសចូលរួបមន្ត $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ រួចទាញជាផលគុណកត្តា

គេបាន $(d + R + r)[d^2 - R(R - 2r)] = 0$

ដោយ $(d + R + r) > 0 \Rightarrow d^2 - R(R - 2r) = 0 \Leftrightarrow d = \sqrt{R(R - 2r)}$


ដូចនេះចំងាយរវាងផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរគឺ $\sqrt{R(R - 2r)}$ ។ ១១៩.

គណនាផលបូកសរុបរវាងក្រលាផ្ទៃរង្វង់ទាំង 4

តាង r_1, r_2, r_3, r_4

ជាប្រវែងការងូងចារឹកក្នុងត្រីកោណទាំង 4 និង S

ជាក្រលាផ្ទៃនៃ



$\triangle ABC$ ។ យើងបាន:

$$r_1 = \frac{S}{p} \text{ \& } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

បណ្តាបន្ទាត់ប៉ះទាំង៣ ស្របនឹងជ្រុងទាំង៣នៃ $\triangle ABC$

$\Rightarrow$ ត្រីកោណទាំង៣ ដូចនឹង $\triangle ABC$ ដែលយើងទាញបាន:

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{h_2}{h_a}; \frac{r_3}{r_1} = \frac{h_3}{h_b}; \frac{r_4}{r_1} = \frac{h_4}{h_c}$$

ដែល $h_i (i = 2, 3, 4)$ ជាកំពស់ដែលគូសចេញពីកំពូល A, B, C នៃត្រីកោណតូចទាំង៣ ។

ចំងាយរវាងជ្រុងនៃត្រីកោណតូចទាំង៣ទៅនឹងជ្រុងឈមនៃ $\triangle ABC$ គឺ $2r_1$ ។

នាំអោយ $h_2 = h_a - 2r_1; h_3 = h_b - 2r_1; h_4 = h_c - 2r_1$

ក្នុង $\triangle ABC$ មាន $h_a = \frac{2S}{a}; h_b = \frac{2S}{b}; h_c = \frac{2S}{c}$

$$\text{នោះ } \frac{r_2}{r_1} = \frac{h_a - 2r_1}{h_a} = 1 - \frac{2r_1}{h_a} \Rightarrow r_2 = r_1 - \frac{2r_1^2}{h_a} = \frac{S}{p} - \frac{2.S^2.a}{p^2.2S} = \frac{S(p-a)}{p^2}$$

$$\text{ធ្វើដូចគ្នាដែរ គេបាន } r_3 = \frac{S(p-b)}{p^2}; r_4 = \frac{S(p-c)}{p^2}$$

តាង A ជាផលបូកក្រលាផ្ទៃសរុបនៃរង្វង់ទាំង ៤

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= \pi(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2) \\ &= \pi \left[\frac{S^2}{p^2} + \frac{S^2(p-a)^2}{p^4} + \frac{S^2(p-b)^2}{p^4} + \frac{S^2(p-c)^2}{p^4} \right] \\ &= \pi \frac{S^2}{p^4} [p^2 + (p-a)^2 + (p-b)^2 + (p-c)^2] \\ A &= \frac{\pi(a^2 + b^2 + c^2)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}{(a+b+c)^3} \quad \text{។} \end{aligned}$$

០១. ក្នុង $\triangle ABC$ មាន $AB = AC$ ។ រង្វង់មួយប៉ះខាងក្នុងនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅនៃត្រីកោណ និងប៉ះនឹងជ្រុង AB, AC ត្រង់ P & Q រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថាចំនុចកណ្តាលនៃ PQ ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ ។

០២. គេអោយ A ជាចំនុចមួយក្នុងចំណោមចំនុចប្រសព្វពីរនៃរង្វង់ពីរដែលមិនប៉ុនគ្នា (C_1) & (C_2) ។ បន្ទាត់មួយក្នុងចំណោមបន្ទាត់ដែលប៉ះទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរប៉ះរង្វង់ (C_1) ត្រង់ P_1 និង (C_2) ត្រង់ P_2 ខណៈដែលបន្ទាត់មួយទៀតប៉ះ (C_1) ត្រង់ Q_1 និង (C_2) ត្រង់ Q_2 ។ គេអោយ M_1 ជាចំនុចកណ្តាលនៃ P_1Q_1 និង M_2 ជាចំនុចកណ្តាលនៃ P_2Q_2 ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $O_1\hat{A}O_2 = M_1\hat{A}M_2$ ។

០៣. រង្វង់ផ្ចិត O កាត់តាមកំពូល A & C នៃត្រីកោណ ABC និង កាត់ជ្រុង AB & AC ត្រង់ K & N រៀងគ្នា ។ រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC និង KBN កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំនុច B & M ផ្សេងគ្នា ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\angle OMB$ ជាមុំកែង ។

០៤. គេអោយ $ABCD$ ជាចតុកោណប៉ោងដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ៖

a. $AB = AD + BC$

b. មានចំនុច P ក្នុងចតុកោណដែលមានចម្ងាយ h ពី CD ដែល

$$AP = h + AD \text{ \& \& } BP = h + BC$$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{AD}} + \frac{1}{\sqrt{BC}}$ ។

០៥. អង្កត់ធ្នូដែលមានប្រវែង $\sqrt{3}$ ចែករង្វង់ដែលមានកាំជាកតាជាពីរតំបន់ ។
កំនត់ចតុកោណកែងដែលមានក្រលាផ្ទៃបំផុតដែលអាចចារឹកក្នុងតំបន់តូច ។
០៦. អង្កត់ធ្នូ AB & CD នៃរង្វង់មួយកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច E ដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់ ។ គេអោយ M
ជា ចំនុចនៅលើអង្កត់ EB ។ បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ E ទៅនឹងរង្វង់ដែលកាត់តាម D, E, M កាត់
បន្ទាត់ BC & AC ត្រង់ F & G រៀងគ្នា ។ គណនា $\frac{EG}{EF}$ ជាអនុគមន៍ $t = \frac{AM}{AB}$ ។
០៧. គេអោយ I ជាផ្ចិតត្រីកោណ ABC ។ រង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ ប៉ះជ្រុង BC, CA & AB
ត្រង់ K, L, & M រៀងគ្នា ។ បន្ទាត់កាត់តាម B ហើយស្រប MK កាត់ LM & LK
ត្រង់ R & S រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $\angle RIS$ ជាមុំស្រួច ។
០៨. បន្ទាត់ AB ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ CAMN & NMBD ។ M នៅលើ CD
ហើយស្ថិតនៅចន្លោះ C & D និង CD ស្របនឹង AB ។ អង្កត់ធ្នូ NA & CM
កាត់គ្នាត្រង់ P ហើយអង្កត់ធ្នូ NB & MD កាត់គ្នាត្រង់ Q ។ បន្លាយ CA & DB
កាត់គ្នាត្រង់ E ។ ស្រាយថា $PE = QE$ ។
០៩. គេអោយ ABC ជាត្រីកោណដែលមាន $\hat{BAC} = 40^\circ$ & $\hat{ABC} = 60^\circ$ ។ D & E ជា
ចំនុចនៅលើ AC & AB ដែល $\hat{CBD} = 40^\circ$ & $\hat{BCE} = 70^\circ$ ។ BD កាត់ CE ត្រង់ F ។
បង្ហាញថាបន្ទាត់ AF កែងនឹង បន្ទាត់ BC ។
១០. គេអោយចតុកោណកែង ABCD ដែលមាន $\hat{CBD} = 2\hat{ADB}$, $\hat{ABD} = 2\hat{CDB}$ និង
 $AB=CB$ ។ បង្ហាញថា $AD = CD$ ។

១១. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ C ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃ $\angle BAC$ & $\angle ABC$ កាត់ BC & CA ត្រង់ P & Q រៀងគ្នា។ ចំនុច M & N ជាជើងចំនោលកែងពី P & Q ទៅលើ AB ។ គណនា $\angle MCN$ ។
១២. គេអោយចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់កាំ r ។ អង្កត់ទ្រូង AC & BD កាត់គ្នាត្រង់ E ។ បង្ហាញថាបើ $AC \perp BD$ នោះ $EA^2 + EB^2 + EC^2 + ED^2 = 4r^2$ ។
១៣. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណប៉ោង $ABCD$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ ផ្ចិតនៃ $\triangle AOD$ & $\triangle BOC$ គឺ P & Q ។ អវត្ថុសង់នៃ $\triangle AOB$ & $\triangle COD$ គឺ R & S ។ បង្ហាញថា $PQ \perp RS$ ។
១៤. ត្រីកោណ ABC មានអវត្ថុសង់ H ។ ជើងចំនោលកែងនៃ H លើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុង និងក្រៅនៃ $\angle BAC$ គឺ P & Q ។ បង្ហាញថា PQ កាត់តាមចំនុចកណ្តាលនៃ BC ។
១៥. P, Q & R ជាចំនុចនៅលើ ជ្រុង BA, CA & AB រៀងគ្នានៃ $\triangle ABC$ ។ បង្ហាញថា ត្រីកោណដែលមានកំពូលជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅ $\triangle AQR, \triangle BRP$ & $\triangle CPQ$ ដូចនឹង $\triangle ABC$ ។
១៦. គេអោយ $\triangle ABC$ ដែលមាន $AB = AC$ & O ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ ។ D ជាចំនុចកណ្តាល AB និង E ជាទីប្រជុំទំងន់នៃ $\triangle ACD$ ។ បង្ហាញថា $OE \perp CD$ ។
១៧. ចតុកោណប៉ោង $PQRS$ មានក្រលាផ្ទៃ A ។ O ជាចំនុចមួយនៅក្នុង $PQRS$ ។ ស្រាយថា បើ $2A^2 = OP^2 + OQ^2 + OR^2 + OS^2$ នោះ $PQRS$ ជាការេដែលមាន O ជាផ្ចិត ។
១៨. ចូររកគ្រប់ $\triangle ABC$ ដែល $AB + AC = 2$ & $AD + BD = \sqrt{5}$ ។ AD ជាកំពស់គូសចេញពី A កាត់ BC ត្រង់ D ។

១៩. ជ្រុង BC, CA & AB នៃត្រីកោណប៉ែនីងរង្វង់ត្រង់ X, Y & Z ។ ស្រាយថាផ្ចិតនៃរង្វង់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃ BC និង ចំណុចកណ្តាលនៃ BC AX ។
២០. កំនត់ប្រវែងនៃជ្រុង $\triangle ABC$ ដែលប្រវែងនៃកំពស់នីមួយៗគឺ 3, 4, 6 ។