

លីម សុវណ្ណវិចិត្រ

ក្របខណ្ឌហត្ថកិច្ចសិទ្ធិ

កម្រិតវិទ្យាល័យ

ភាគ ២- ព័ជគណិត វិភាគ

ផ្សាយលើកទី៨

មីនា ២០១០

blank

លីម សុវណ្ណវិចិត្រ

ក្រុមហ៊ុនហាត់គណិតវិទ្យា

កម្រិតវិទ្យាល័យ

ភាគ ២- ពីជគណិត វិភាគ

ផ្សាយលើកទី៨

មីនា ២០១០

ភាគ១ - ទ្រឹស្តីនៃចំណុច

ភាគ២ - ពិជគណិត វិភាគ

ផ្សាយលើកទី១ : គណិតវិទ្យាអូឡាំពិក -វិសមភាព ២០០៨

ផ្សាយលើកទី២ : កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យា -ពិជគណិត វិភាគ កក្កដា២០០៩

ផ្សាយលើកទី៣ : កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យា -ពិជគណិត វិភាគ សីហា ២០០៩

ផ្សាយលើកទី៤ : កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា -ពិជគណិត វិភាគ មីនា ២០១០

ដោយ លីម សុវណ្ណារិចិត្រ

ទំនាក់ទំនង

- វិបសាយ

<http://www.dahlina.com/>

- អ៊ីមែល

lsvichet@yahoo.com

សម្គាល់

$x \in [a; b]$ មានន័យថា $a \leq x \leq b$

$x \in (a; b)$ មានន័យថា $a < x < b$

$x \in [a; b)$ មានន័យថា $a \leq x < b$

$$\binom{n}{m} = C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$\mathbb{N}$ សំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិ ដែលមានទាំងលេខសូន្យ $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{N}^*$ សំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនសូន្យ $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{Z}$ សំណុំចំនួនគត់ $\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{Z}^*$ សំណុំចំនួនគត់មិនសូន្យ $\mathbb{Z}^* = \{\dots; -3; -2; -1; 1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{Z}^+$ សំណុំចំនួនគត់វិជ្ជមានរឺសូន្យ $\mathbb{Z}^+ = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{R}$ សំណុំចំនួនពិត

$\mathbb{R}^+$ សំណុំចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន $\mathbb{R}^+ = \{x | x \geq 0\}$

សញ្ញាបូក

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + \dots + x_1 x_n + x_2 x_3 + x_2 x_4 + \dots + x_2 x_n + \dots + x_{n-1} x_n$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 5} x_i x_j = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_1 x_5 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_2 x_5 + x_3 x_4 + x_3 x_5 + x_4 x_5$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 3} \frac{x_i}{x_i + x_j} = \frac{x_1}{x_1 + x_2} + \frac{x_1}{x_1 + x_3} + \frac{x_2}{x_2 + x_3}$$

$$\sum_{1 \leq i \neq j \leq 3} x_i x_j = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_1 + x_2 x_3 + x_3 x_1 + x_3 x_2 = 2(x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3)$$

និយមន័យ: ផលបូកស៊ីមេទ្រី និង ស៊ីគ្លីច

តាង $P(x, y, z)$ ជាអនុគមន៍មានបីអថេរ x, y, z ។ តាង

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyclic}} P(x, y, z) &= P(x, y, z) + P(y, z, x) + P(z, x, y) \\ \sum_{\text{sym}} P(x, y, z) &= P(x, y, z) + P(x, z, y) + P(y, x, z) \\ &\quad + P(y, z, x) + P(z, x, y) + P(z, y, x)\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyclic}} x^3 y &= \sum_{\text{cyclic}} x^3 y z^0 = x^3 y z^0 + y^3 z x^0 + z^3 x y^0 \\ &= x^3 y + y^3 z + z^3 x \\ \sum_{\text{sym}} x^3 &= \sum_{\text{sym}} x^3 y^0 z^0 = x^3 y^0 z^0 + x^3 z^0 y^0 + y^3 x^0 z^0 + y^3 z^0 x^0 + z^3 x^0 y^0 + z^3 y^0 x^0 \\ &= 2(x^3 + y^3 + z^3) \\ \sum_{\text{sym}} x^3 y^2 z &= x^3 y^2 z + x^3 z^2 y + y^3 x^2 z + y^3 z^2 x + z^3 x^2 y + z^3 y^2 x \\ \sum_{\text{sym}} x^2 y &= \sum_{\text{sym}} x^2 y^1 z^0 = x^2 y^1 z^0 + x^2 z^1 y^0 + y^2 x^1 z^0 + y^2 z^1 x^0 + z^2 x^1 y^0 + z^2 y^1 x^0 \\ &= x^2 y + x^2 z + y^2 x + y^2 z + z^2 x + z^2 y \\ \sum_{\text{sym}} xyz &= xyz + xzy + yxz + yzx + zxy + zyx = 6xyz\end{aligned}$$

កន្សោមមួយមានលក្ខណៈឆ្លុះ រឺ ស៊ីមេទ្រី

កន្សោមមួយ មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី បើយើងផ្លាស់អញ្ជាតណាមួយនឹងអញ្ជាតណាមួយផ្សេងទៀត
កន្សោមនោះនៅដដែល។ ឧទាហរណ៍ $P = x + y + z$, $(x, y, z) \in \mathbb{R}$ មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីធៀបនឹង
 x, y, z ដោយសារបើយើងជំនួស x ដោយ y និង y ដោយ x វិញ វានៅដដែល។ បើយើងជំនួស x
ដោយ z និង z ដោយ x វិញ វានៅដដែល។ បើយើងជំនួស y ដោយ z និង z ដោយ y វិញ វានៅ
ដដែល។

ពហុធា $P = x^3 + y^3 + z$ មិនមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីទេ ព្រោះ បើយើងជំនួស z ដោយ x និង x ដោយ z យើងទាញបាន $P' = z^3 + y^3 + x \neq x^3 + y^3 + z$ ។

ចំពោះកន្សោមស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $x \geq y \geq z$ រឺ $x \leq y \leq z$ បាន បើទោះជាគេមិនប្រាប់បែបនេះក៏ដោយ រឺមួយជាទូទៅ x, y, z មិនចាំបាច់ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌបែបនេះក៏ដោយ លើកលែងតែមានសម្មតិកម្មមកស្រាប់ផ្សេងពីនេះ។ ហេតុអ្វីក៏យើងអាចសន្មតបានបែបនេះ?។ ព្រោះ x អាចដើរតួជំនួស y, z បាន y អាចដើរតួជំនួស x, z បាន និង z អាចដើរតួជំនួស x, y បាន។ បើមានមួយក្នុងចំនួនទាំងបីធំជាងគេ យើងតាងវាដោយ x_1 ចំនួនធំបន្ទាប់ដោយ y_1 និងតូចជាងគេដោយ z_1 ។ ដូច្នេះ $x_1 \geq y_1 \geq z_1$ ។ ដូច្នេះកន្សោមស៊ីមេទ្រី ដូចជា $P = x + y + z = x_1 + y_1 + z_1$ ។ ដូច្នេះកន្សោម P នៅតែដដែលគ្រាន់តែថែមសន្ទស្សន៍ 1 ពីក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ។

អនុគមន៍ផត-អនុគមន៍ប៉ោង

អនុគមន៍មួយផតចន្លោះចំណុច A និង B បើ ខ្សែកោងអនុគមន៍នោះប៊ីតនៅក្រោមបន្ទាត់ភ្ជាប់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ប៊ីតនៅចន្លោះ A និង B ។ វាប៉ោងបើវានៅខាងលើ។




* អនុគមន៍ f មួយ ដែលកំណត់លើ $I \in \mathbb{R}$ ហៅថា ផត បើ ចំពោះគ្រប់ $\lambda \in [0; 1]$ និង គ្រប់ $x, y \in I$ គេមាន


$$f[\lambda x + (1 - \lambda)y] \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

* អនុគមន៍មួយផតលើ $[a, b]$ បើ $f''(x) > 0, \forall x \in [a, b]$

* បើ f ផតចន្លោះ A, B នោះ តម្លៃធំបំផុតរបស់ f បើមិននៅត្រង់ A គឺនៅត្រង់ $B : f_{\max} = \max(f_A, f_B)$

* បើ f ប៉ោងចន្លោះ A, B នោះ តម្លៃតូចបំផុតរបស់ f បើមិននៅត្រង់ A គឺនៅត្រង់ $B : f_{\min} = \min(f_A, f_B)$





មាតិកា

ផ្នែកទី១ លំហាត់

១. អនុគមន៍ងាយ	1
គណនា.....	1
សមភាព.....	1
សមីការ.....	2
ប្រព័ន្ធសមីការ.....	7
វិសមភាព.....	14
វិសមីការ	34
ប្រព័ន្ធវិសមីការ.....	37
២. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត.....	39
គណនា.....	39
សមភាព.....	40
សមីការ.....	40
ប្រព័ន្ធសមីការ.....	44
វិសមភាព.....	46
វិសមីការ	46
ប្រព័ន្ធវិសមីការ.....	50
៣. ត្រីកោណមាត្រ.....	53
គណនា.....	53
សមភាព.....	54
សមីការ.....	57
ប្រព័ន្ធសមីការ.....	64

វិសមភាព	65
វិសមីការ	66
ប្រព័ន្ធវិសមីការ	67
៤. ពហុធា	69
៥. សមីការអនុគមន៍	71
ផ្នែកទី២ ចម្លើយ	
១. អនុគមន៍ងាយ	73
គណនា	73
សមភាព	75
សមីការ	76
ប្រព័ន្ធសមីការ	85
វិសមភាព	94
វិសមីការ	166
ប្រព័ន្ធវិសមីការ	169
២. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត	171
គណនា	171
សមភាព	172
សមីការ	172
ប្រព័ន្ធសមីការ	174
វិសមភាព	174
វិសមីការ	175
ប្រព័ន្ធវិសមីការ	177
៣. ត្រីកោណមាត្រ	179
គណនា	179
សមភាព	183

សមីការ.....	185
ប្រព័ន្ធសមីការ.....	193
វិសមភាព.....	195
វិសមីការ.....	201
ប្រព័ន្ធវិសមីការ.....	202
៤. ពហុធា.....	203
៥. សមីការអនុគមន៍.....	207

១. អនុគមន៍ជ័យ

I. គណនា

1. គណនា $a^4 + b^4 + c^4$ ដោយដឹងថា $a + b + c = 0$ និង $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ ។

គណនា

2.
$$S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2}, n \in \mathbb{N}$$

3.
$$S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3, n \in \mathbb{N}$$

4. តាង $S = (2+1)(2^2+1)(2^4+1) \dots (2^{1024}+1) + 1$ ។ ចូរគណនា $S^{1/1024}$ ។

5. (កាលករណ៍ ១៩៦៩)

គណនា $1.1! + 2.2! + 3.3! + \dots + (n-1).(n-1)! + n.n!$

ដែល $n! = n.(n-1) \dots 3.2.1$ ។

6. គណនា

$$S = \frac{1}{1!1999!} + \frac{1}{3!1997!} + \dots + \frac{1}{1997!3!} + \frac{1}{1999!1!}$$

7. គេអោយចំនួនពិត u, v, s, t ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$u + v + s + t = u^7 + v^7 + s^7 + t^7 = 0$$

ចូរគណនា $P = t(t+u)(t+v)(t+s)$

II. សមភាព

ចូរបង្ហាញថា

8.
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, n \in \mathbb{N}$$

9.
$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}, n \in \mathbb{N}$$

10. ចូរបង្ហាញថា បើ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ នោះ

- $1.2 + 2.5 + \dots + n(3n - 1) = n^2(n + 1)$
11. ចូរបង្ហាញថា បើ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ នោះ
- $$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(4n^2 - 1)}{3}$$
12. តាង a, b, c ជាចំនួនពិត ខុសពី -1 និង 1 ដែល $a + b + c = abc$ ។ ចូរបង្ហាញថា
- $$\frac{a}{1 - a^2} + \frac{b}{1 - b^2} + \frac{c}{1 - c^2} = \frac{4abc}{(1 - a^2)(1 - b^2)(1 - c^2)}$$
13. (កាលករណ៍ ១៩៦៩)
- ចូរបង្ហាញថា បើ $a_1/b_1 = a_2/b_2 = a_3/b_3$ និង $p_1; p_2; p_3$ មិនសូន្យទាំងអស់ព្រមគ្នា នោះ
- $$\left(\frac{a_1}{b_1}\right)^n = \frac{p_1 a_1^n + p_2 a_2^n + p_3 a_3^n}{p_1 b_1^n + p_2 b_2^n + p_3 b_3^n}$$
- ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន n ។

III. សមីការ

ដោះស្រាយសមីការ

14. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$
15. $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$
16. $x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = 0$
17. $x^3 + x^2 - 3 = 0$
18. $6x^3 + 7x^2 - 1 = 0$
19. $2x^3 + x^2 + 5x - 3 = 0$
20. $2x^4 - 5x^2 + 2 = 0$
21. $x^4 - 2x^2 - 3 = 0$
22. $(x - 1)^4 + (x + 1)^4 = 16$
23. $(2x - 3)^4 + (2x - 5)^4 = 2$
24. $\frac{1}{2x^2 - x + 1} + \frac{3}{2x^2 - x + 3} = \frac{10}{2x^2 - x + 7}$

25. $(x - a)x(x + a)(x + 2a) = 3a^4$
26. $(6x + 5)^2(3x + 2)(x + 1) = 35$
27. $x^2 + \frac{4}{x^2} - 8\left(x - \frac{2}{x}\right) - 4 = 0$
28. $4x^4 + 6x^3 - 10x^2 - 9x + 9 = 0$
29. $\frac{(x + 1)^5}{x^5 + 1} = \frac{81}{11}$
30. $(x^2 - 6x - 9)^2 = x^3 - 4x^2 - 9x$
31. $x^2 + \frac{25x^2}{(x + 5)^2} = 11$
32. $(x^2 - 16)(x - 3)^2 + 9x^2 = 0$
33. $x^4 + 4x - 1 = 0$
34. $x^4 - 4x^3 - 1 = 0$
35. $x^4 - 2x^2 - 400x = 9999$
36. $(x^3 - 2x) - (x^2 + 2)a - 2a^2x = 0$
37. $(x^2 - a)^2 - 6x^2 + 4x + 2a = 0$
38. ដោះស្រាយសមីការ $x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 37x - 14 = 0$ ដោយដឹងថាអង្គខាងឆ្វេងអាចដាក់ជាផលគុណដែលមានមេគុណជាចំនួនគត់បាន។
39. សមីការ $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ ដែល a, b, c ជាចំនួនគត់ មានរឹសសនិទានមួយ តាងដោយ x_1 ។ ចូរបង្ហាញថា x_1 ជាចំនួនគត់ និងថា c ចែកដាច់នឹង x_1 ។
40. សមីការ $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ដែល a, b, c, d ជាចំនួនគត់ មានរឹសសនិទានមួយ តាងដោយ x_1 ។ ចូរបង្ហាញថា x_1 ជាចំនួនគត់ និងថា d ចែកដាច់នឹង x_1 ។
41. សន្មតថា x_1, x_2, x_3 ជារឹសនៃសមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា $x_1 + x_2 + x_3 = -b/a, x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = c/a, x_1x_2x_3 = -d/a$ ។
42. គេអោយសមីការ $x^3 + px + q = 0$ ។ ចូរគណនាផលបូកការេនៃរឹសរបស់វា។
- 43*. ដោះស្រាយសមីការ $x^3 + 3x - 3 = 0$ ។
ចូររករឹសសនិទាននៃសមីការ
44. $x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 2x + 15 = 0$

$$45. \quad x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 4x + 12 = 0$$

$$46. \quad x^4 + x^3 - 5x - 5 = 0$$

$$47. \quad x^4 + x^3 - 1 = 0$$

$$48. \quad 6x^4 - x^3 + 5x^2 - x - 1 = 0$$

ដោះស្រាយសមីការ

$$49. \quad \sqrt{x+10} + \sqrt{x-2} = 6$$

$$50. \quad \sqrt{x} - \sqrt{x+3} = 1$$

$$51. \quad \sqrt{15-x} + \sqrt{3-x} = 6$$

$$52. \quad \sqrt{\frac{20+x}{x}} + \sqrt{\frac{20-x}{x}} = \sqrt{6}$$

$$53. \quad \sqrt{|x|+1} - \sqrt{|x|} = a$$

$$54. \quad \sqrt{x^2+5x+3} - \sqrt{x^2+5x-2} = 1$$

$$55. \quad \sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$$

$$56. \quad \sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = 5$$

$$57. \quad \sqrt{2x-3} + \sqrt{4x+1} = 4$$

$$58. \quad \sqrt{x+4} + \sqrt{2x+6} = 7$$

$$59. \quad \sqrt{2x-4} - \sqrt{x+5} = 1$$

$$60. \quad \sqrt{5x+7} - \sqrt{2x+3} = \sqrt{3x+4}$$

$$61. \quad \sqrt{x^2+x+4} + \sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{2x^2+2x+9}$$

$$62. \quad \sqrt{x^2-9x+24} - \sqrt{6x^2-59x+149} = |5-x|$$

$$63. \quad x + 12\sqrt{x} - 64 = 0$$

$$64. \quad \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} = x-8$$

$$65. \quad (x-3)^2 + 3x - 22 = \sqrt{x^2-3x+7}$$

$$66. \quad 2x^2 + 3x - 5\sqrt{2x^2+3x+9} + 3 = 0$$

$$67. \quad x\sqrt{x^2+15} - 2 = \sqrt{x} \sqrt[4]{x^2+15}$$

68. $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{3}{2}$
69. $\sqrt{\frac{x+a}{x-a}} + 2\sqrt{\frac{x-a}{x+a}} = 3$
70. $\sqrt{2-x} + \frac{4}{\sqrt{2-x}+3} = 2$
71. $4x^2 + 12x\sqrt{1+x} = 27(1+x)$
72. $\sqrt{7-x} + \sqrt{x-3} = a$
- 73*. $\sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x} = 2$
74. $\sqrt{x^2 + ax - 2a} = x + 1$
75. $\sqrt{2x-1} - x + a = 0$
76. $\sqrt{a^2 - x\sqrt{x^2 + a^2}} = a - x$
77. $\sqrt{x - \sqrt{x-a}} = a$
78. $\sqrt{x + \sqrt{a^2 + 2a - 3}} + \sqrt{x + a + \sqrt{2 - 2a + 2a^2 - a^3}} = a\sqrt{1-x}$
79. $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 0$
80. $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$
81. $(x+y-a)^2 + (y-1)^2 + (x+3)^2 = 0$
- 82*. (ឡូគី ១៩៩៨)
 តាង $\{a_n\}$ ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត កំណត់ដោយ $a_1 = t$ និង $a_{n+1} = 4a_n(1-a_n)$ ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ ។ តើតំលៃរបស់ t ខុសគ្នាចំនួនប៉ុន្មាន ដែល $a_{1998} = 0$?
- 83*. (MOSP ២០០១)
 ចូរកំណត់គ្រប់ត្រីធាតុនៃចំនួនពិត (a, b, c) ដែល
 $a^2 - 2b^2 = 1, 2b^2 - 3c^2 = 1$ និង $ab + bc + ca = 1$
- 84*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៣)
 ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x$ ដែល p ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងជាចំនួនពិត។

85*. (អន្តរជាតិឡុងដ៍លីស ១៩៦៧)

គេអោយសមីការ

$$x^5 + 5\lambda x^4 - x^3 + (\lambda\alpha - 4)x^2 - (8\lambda + 3)x + \lambda\alpha - 2 = 0$$

ក) ចូរកំណត់ α ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសដែលមិនអាស្រ័យនឹង λ តែមួយគត់។

ខ) ចូរកំណត់ α ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសដែលមិនអាស្រ័យនឹង λ តែពីរគត់។

86*. (អន្តរជាតិ ១៩៥៩)

ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក) $\sqrt{x + \sqrt{2x - 1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x - 1}} = \sqrt{2}$

ខ) $\sqrt{x + \sqrt{2x - 1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x - 1}} = 1$

គ) $\sqrt{x + \sqrt{2x - 1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x - 1}} = 2$

87*. ដោះស្រាយសមីការ

$$\sqrt{x + 3 - 4\sqrt{x - 1}} + \sqrt{x + 8 - 6\sqrt{x - 1}} = 1$$

88*. ដោះស្រាយសមីការ

$$\sqrt{x + 2\sqrt{x + 2\sqrt{x + 2\sqrt{x + \dots + 2\sqrt{x + 2\sqrt{3x}}}}} = x$$

(មានរ៉ឺឌីកាល់ចំនួន n ដង)

89. ដោះស្រាយសមីការ

$$\sqrt{x - 3 - 2\sqrt{x - 4}} + \sqrt{x - 4\sqrt{x - 4}} = a,$$

90. ដោះស្រាយសមីការ $(a - x)^5 + (x - b)^5 = (a - b)^5$; $a \neq b$ ។

91. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមចំពោះ $x \geq -1$

$$2x^2 + 4x = \sqrt{\frac{x + 3}{2}}$$

92. គេអោយសមីការ $x^2 - 3x + 1 = m\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$ (*) ដែលក្នុងនោះ m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង x ជាអញ្ចាត។

ក) ដោះស្រាយសមីការករណី $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ខ) ចូរកំណត់តំលៃ m ដើម្បីអោយ សមីការ(*) មានរឹសចំនួនមួយ។

93. ដោះស្រាយសមីការ

$$\sqrt[3]{7x+1} - \sqrt[3]{x^2-x-8} + \sqrt[3]{x^2-8x-1} = 2$$

94. ដោះស្រាយសមីការ

$$\frac{\sqrt{1+x^3}}{x^2+2} = \frac{2}{5}$$

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

95.
$$\begin{cases} x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 5y - 4 = 0 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

96.
$$\begin{cases} 2xy - y^2 + 5x + 20 = 0 \\ 3x + 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

97.
$$\begin{cases} x^2 - 4y^2 = 200 \\ x + 2y = 100 \end{cases}$$

98.
$$\begin{cases} x^2 + 9y^2 + 6xy - 6x - 18y - 40 = 0 \\ x + 30 = 2y \end{cases}$$

99.
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

100.
$$\begin{cases} x - y = 5 \\ xy = -4 \end{cases}$$

101.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

102.
$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 17 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

103.
$$\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 13 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$$

104.
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

105.
$$\begin{cases} x^5 + y^5 = 275 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

106.
$$\begin{cases} x^3 - y^3 = 63 \\ xy = 4 \end{cases}$$

107.
$$\begin{cases} x + y + xy = -11 \\ x^2 + y^2 + xy = 13 \end{cases}$$

108.
$$\begin{cases} x^2y - xy^2 = 30 \\ x + xy - y = 13 \end{cases}$$

109.
$$\begin{cases} (x+0,2)^2 + (y+0,3)^2 = 1 \\ x + y = 0,9 \end{cases}$$

110.
$$\begin{cases} x + y + \frac{x}{y} = \frac{1}{2} \\ \frac{(x+y)x}{y} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$
111.
$$\begin{cases} x^3y + x^3y^2 + 2x^2y^2 + x^2y^3 + xy^3 = 30 \\ x^2y + xy + x + y + xy^2 = 11 \end{cases}$$
112.
$$\begin{cases} 2x^2 + xy - 45y^2 = 0 \\ 2x + 9y^2 = 4 \end{cases}$$
113.
$$\begin{cases} x^2 - 5xy = 16 \\ 2xy + y^2 = 3 \end{cases}$$
114.
$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + 3xy = 12 \\ (x+y)^2 - \frac{1}{2}y^2 = 7 \end{cases}$$
115.
$$\begin{cases} x^3 + xy^2 = 10 \\ x^2y - y^3 = -3 \end{cases}$$
116.
$$\begin{cases} 10x^2 + 5y^2 - 2xy - 38x - 6y + 41 = 0 \\ 3x^2 - 2y^2 + 5xy - 17x - 6y + 20 = 0 \end{cases}$$
117.
$$\begin{cases} y^2(x^2 - 3) + xy + 1 = 0 \\ y^2(3x^2 - 6) + xy + 2 = 0 \end{cases}$$
118.
$$\begin{cases} \frac{x}{y}(x+y-2) = \frac{2}{3} \\ \frac{y}{x}(x+y-1) = 9 \end{cases}$$
119.
$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{y}{3} = 3 \\ \frac{x}{2} + \frac{3}{y} = \frac{3}{2} \end{cases}$$
120.
$$\begin{cases} y^2 - |xy| + 2 = 0 \\ 8 - x^2 = (x+2y)^2 \end{cases}$$
121.
$$\begin{cases} |xy - 2| = 6 - x^2 \\ 2 + 3y^2 = 2xy \end{cases}$$
122.
$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 3x - 4y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \end{cases}$$
123.
$$\begin{cases} 2u + v + w = 6 \\ 3u + 2v + w = 9 \\ 3u^3 + 2v^3 + w^3 = 27 \end{cases}$$
124.
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ xy + yz + zx = -5 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 12 \end{cases}$$
125.
$$\begin{cases} xy + x + y = 7 \\ yz + y + z = -3 \\ xz + x + z = -5 \end{cases}$$
126.
$$\begin{cases} x^2 - yz = 14 \\ y^2 - xz = 28 \\ z^2 - xy = -14 \end{cases}$$
127.
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 3 \\ y^2 + yz + z^2 = 7 \\ z^2 + zx + x^2 = 19 \end{cases}$$

$$128. \begin{cases} xy + xz = 8 \\ yz + xy = 9 \\ xz + yz = -7 \end{cases}$$

$$129. \begin{cases} \frac{5xy}{x+y} = 1 \\ \frac{7yz}{y+z} = 1 \\ 6xz = x+z \end{cases}$$

$$130. \begin{cases} 4xy + y^2 + 2z^2 = -3 \\ 4xz + x^2 + 2z^2 = 1 \\ 8yz + y^2 + 2z^2 = 1 \end{cases} \quad 131. \begin{cases} y^3 = 9x^2 - 27x + 27 \\ z^3 = 9y^2 - 27y + 27 \\ x^3 = 9z^2 - 27z + 27 \end{cases}$$

$$132. \begin{cases} \frac{7}{\sqrt{x-7}} - \frac{4}{\sqrt{y+6}} = \frac{5}{3} \\ \frac{5}{\sqrt{x-7}} + \frac{3}{\sqrt{y+6}} = \frac{13}{6} \end{cases}$$

$$133. \begin{cases} \frac{4}{\sqrt{x+y} - \sqrt{x-y}} - \frac{1}{\sqrt[4]{x-y} - \sqrt[4]{x+y}} = 1 \\ \frac{2}{\sqrt{x+y} - \sqrt{x-y}} + \frac{4}{\sqrt[4]{x-y} - \sqrt[4]{x+y}} = \frac{9}{4} \end{cases}$$

$$134. \begin{cases} \sqrt{\frac{x+y}{2x-1}} + 4\sqrt{\frac{2x-1}{x+y}} = 5 \\ x = y + 1 \end{cases}$$

$$135. \begin{cases} \sqrt{\frac{x-y}{x+y}} + \sqrt{\frac{x+y}{x-y}} = \frac{10}{3} \\ xy - 2x - 2y = 2 \end{cases}$$

$$136. \begin{cases} x + y + \sqrt{\frac{x+y}{x-y}} = \frac{12}{x-y} \\ xy = 15 \end{cases}$$

$$137. \begin{cases} y\sqrt{x^2 + y^2} - 2ay - 3 = 0 \\ x\sqrt{x^2 + y^2} = 2ax \end{cases}$$

$$138. \begin{cases} x + y = 2 \\ xy - z^2 = 1 \end{cases}$$

139. ចូរកំនត់តំលៃ a ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានរឹសតែមួយគត់

$$\begin{cases} \sqrt{y} = \frac{1}{\sqrt{x}} \\ y = ax + 1 \end{cases}$$

140*. គេអោយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{4}{5}y + \frac{5}{6}z = 61 \\ x + y + z = 79 \end{cases}$$

ក) ចូរគណនាផលបូក $\frac{2}{5}y + \frac{z}{2}$; ខ) ក្នុងចំណោមរឹសជាចំនួនគត់ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធ ចូរកំនត់រឹសដែលមានតំលៃ x ធំបំផុត។

141*. (អន្តរជាតិ ១៩៦១)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x^2 + y^2 + z^2 = b^2 \\ xy = z^2 \end{cases}$$

ដែល a និង b ជាចំនួនពិតដែលគេអោយ។ ចូរកំនត់លក្ខខណ្ឌលើ a និង b ដើម្បីអោយចំលើយវិជ្ជមាននិងមានតំលៃខុសគ្នា។

142*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៣)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x_5 + x_2 = yx_1 \\ x_1 + x_3 = yx_2 \\ x_2 + x_4 = yx_3 \\ x_3 + x_5 = yx_4 \\ x_4 + x_1 = yx_5 \end{cases}$$

ដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ y ជាចំនួនពិត។

143*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៥)

គេអោយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$

ដែលមានមេគុណផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម

ក) a_{11}, a_{22}, a_{33} ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន

ខ) មេគុណផ្សេងទៀតអវិជ្ជមានទាំងអស់

គ) សមីការនិមួយៗមានផលបូកមេគុណវិជ្ជមាន។

ចូរបង្ហាញថា $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ជាចំណុចតែមួយគត់របស់ប្រព័ន្ធ។

144*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៥)

ចូរកំណត់ចំនួនពិត x_1, x_2, x_3, x_4 ដែល

$$\begin{cases} x_1 + x_2 x_3 x_4 = 2 \\ x_2 + x_1 x_3 x_4 = 2 \\ x_3 + x_1 x_2 x_4 = 2 \\ x_4 + x_1 x_2 x_3 = 2 \end{cases}$$

145*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៦)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} |a_1 - a_2|x_2 + |a_1 - a_3|x_3 + |a_1 - a_4|x_4 = 1 \\ |a_2 - a_1|x_1 + |a_2 - a_3|x_3 + |a_2 - a_4|x_4 = 1 \\ |a_3 - a_1|x_1 + |a_3 - a_2|x_3 + |a_3 - a_4|x_4 = 1 \\ |a_4 - a_1|x_1 + |a_4 - a_2|x_3 + |a_4 - a_3|x_3 = 1 \end{cases}$$

ដែល a_1, a_2, a_3 និង a_4 ជាចំនួនពិតខុសគ្នាពីរៗ។

146*. (អន្តរជាតិ ឡង្គើលីស ១៩៦៧)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x^2 + x - 1 = y \\ y^2 + y - 1 = z \\ z^2 + z - 1 = x \end{cases}$$

147. (អន្តរជាតិ ឡង្គើលីស ១៩៦៧)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} |x + y| + |1 - x| = 6 \\ |x + y + 1| + |1 - y| = 4 \end{cases}$$

148*. (អន្តរជាតិ ឡង្គើលីស ១៩៦៧)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = a^2 \\ \dots \dots \\ x_1^n + x_2^n + \cdots + x_n^n = a^n \end{cases}$$

149. (អន្តរជាតិ ឡង់ស៊ីស ១៩៦៧)

តើក្នុងករណីណា ដែលប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} x + y + mz = a \\ x + my + z = b \\ mx + y + z = c \end{cases}$$

មានចំណុច? ចូរកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលចំណុចតែមួយគត់របស់ប្រព័ន្ធខាងលើ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត។

150*. (អន្តរជាតិ ១៩៦៧)

គេអោយស្វ៊ីត (c_n) :

$$\begin{aligned} c_1 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_8 \\ c_2 &= a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_8^2 \\ &\dots \dots \dots \\ c_n &= a_1^n + a_2^n + \cdots + a_8^n \end{aligned}$$

ដែល $a_1, a_2, \dots, a_8$ ជាចំនួនពិត ដែលមិនសូន្យទាំងអស់គ្នា។ ដោយដឹងថា ក្នុងចំណោម (c_n)

មានចំនួនដែលស្មើសូន្យច្រើនរាប់មិនអស់ ចូរកំណត់តំលៃរបស់ n ដើម្បីអោយ $c_n = 0$ ។

151*. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x^2 = 2x - y \\ y^2 = 2y - z \\ z^2 = 2z - t \\ t^2 = 2t - x \end{cases}$$

152*. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x_1^2 + ax_1 + \left(\frac{a-1}{2}\right)^2 = x_2 \\ x_2^2 + ax_2 + \left(\frac{a-1}{2}\right)^2 = x_3 \\ \dots \dots \dots \\ x_{1000}^2 + ax_{1000} + \left(\frac{a-1}{2}\right)^2 = x_1 \end{cases}$$

ដែល a ជាចំនួនពិត។

153*. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ 2x_n - 5x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

ដែល n ជាចំនួនគត់ ≥ 3 ។

154*. តាង (x, y, z) ជាចំលើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x = y(4 - y) \\ y = z(4 - z) \\ z = x(4 - x) \end{cases}$$

ចូរកំណត់តំលៃរបស់ផលបូក $S = x + y + z$ ។

155. (ការណាជា ១៩៧០)

ដោះស្រាយសមីការ

$$\begin{cases} x + yz = 2 \\ y + zx = 2 \\ z + xy = 2 \end{cases}$$

156. (អន្តរជាតិ ១៩៦៨)

គេអោយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = y \\ ay^2 + by + c = z \\ az^3 + bz + c = x \end{cases}$$

ដែលក្នុងនោះ $a \neq 0$ ។ តាង $\Delta = (b - 1)^2 - 4ac$ ។ ចូរបង្ហាញថាបើ $\Delta < 0$ នោះប្រព័ន្ធសមីការគ្មានរឹស។

157. ចូរកំណត់ $a \in \mathbb{R}$ ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} x^3 - ay^3 = \frac{1}{2}(a + 1)^2 \\ x^3 + ax^2y + xy^2 = 1 \end{cases}$$

មានរឹសផ្ទៀងផ្ទាត់ $x + y = 0$

158. ដោះស្រាយសមីការ

$$\begin{cases} (2 - x)(3x - 2z) = 3 - z & (1) \\ y^3 + 3y^2 = x^2 - 3x + 2 & (2) \\ y^2 + z^2 = 6z & (3) \\ z \leq 3 & (4) \end{cases}$$

159. គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ដោះស្រាយសមីការ

$$\begin{cases} \frac{a}{x} - \frac{b}{z} = c - zx \\ \frac{b}{y} - \frac{c}{x} = a - xy \\ \frac{c}{z} - \frac{a}{y} = b - yz \end{cases}$$

160. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} 2x + x^2y = y \\ 2y + y^2z = z \\ 2z + z^2x = x \end{cases}$$

V. វិសមភាព

ចូរបង្ហាញថា

161. $\frac{1}{10\sqrt{2}} < \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} < \frac{1}{10}$

162. $\frac{2^{100}}{10\sqrt{2}} < \binom{100}{50} < \frac{2^{100}}{10}$

163. $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}, n \in \mathbb{N}$

164. $\frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} < \frac{1}{12}$

165. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n > 1$ វិសមភាពខាងក្រោមពិត

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} > \frac{13}{24}$$

166. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n វិសមភាពខាងក្រោមពិត

$$2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$$

167. តើមួយណាធំជាង $(1,000001)^{1,000,000}$ រឺ 2 ។

168. តើមួយណាធំជាង $1\,000^{1\,000}$ រឺ 1001^{999} ។

169. (កាលណាជា ១៩៦៩)

តើមួយណាធំជាង $\sqrt{c+1} - \sqrt{c}$ រឺ $\sqrt{c} - \sqrt{c-1}$ ចំពោះ $c \geq 1$ ។

170. ផលគុណនៃចំនួនពិតវិជ្ជមានចំនួន n មានតំលៃស្មើមួយ។ ចូរបង្ហាញថាផលបូករបស់វា មិនមានតំលៃតូចជាង n ទេ។

171. សន្មតថា $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ($n \in \mathbb{N}$) ជាចំនួនពិតមានសញ្ញាដូចគ្នា មានតំលៃធំជាង -1 ។ ចូរបង្ហាញថា $(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \dots + x_n$ ។

172. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n > 6$ វិសមភាពខាងក្រោមពិត

$$\left(\frac{n}{2}\right)^n > n! > \left(\frac{n}{3}\right)^n$$

173. គេអោយ $f(x) = ax^2 + 1998x + c$ ដែល $a, c \in \mathbb{Z}; |a| < 2000; |c| < 2000$ ហើយ f មានរឹសពីរផ្សេងគ្នាគឺ x_1, x_2 ។ ចូរបង្ហាញថា $|x_1 - x_2| \geq 1/998$ ។

174. គេអោយចំនួនពិតវិជ្ជមាន a, b, x, y ផ្ទៀងផ្ទាត់

$$a + b = 1; ax + by = 2; ax^2 + by^2 = 3$$

ចូរបង្ហាញថា $4 < ax^3 + by^3 < 4,5$

175. គណនាតំលៃតូចបំផុតនៃ

$$S = |x| + \left| \frac{2x-1}{x+3} \right|$$

176. ចូរកំនត់ a, b, c ដើម្បីអោយ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $|f(x)| \leq 1$ ចំពោះគ្រប់ $x \in [-1; 1]$ និងដែល $K = \frac{8}{3}a^2 + 2b^2$ មានតំលៃធំបំផុត។

177. គេអោយចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន $a_1; a_2; a_3; a_4; a_5$ ដែល $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1$ ។

ចូរបង្ហាញថា

$$\min_{i \neq j} (a_i - a_j)^2 \leq \frac{1}{100}; \quad \min_{i \neq j} |a_i^2 - a_j^2| \leq \frac{1}{36}$$

178. តាង a, b, c ជាអង្គស្រង់នៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2$$

ចំណាំ

បើជួបលក្ខខណ្ឌ a, b, c ជាអង្គស្រង់ត្រីកោណ ចូរសាកល្បងតាង

$$a = x + y, b = y + z, c = z + x$$

179. គេអោយ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 < 4(ab + bc + ca)$$

180. តាង a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$(2a^2 + 2b^2 - c^2)(2b^2 + 2c^2 - a^2)(2c^2 + 2a^2 - b^2) \leq (2a^2 + bc)(2b^2 + ca)(2c^2 + ab)$$

181. ដោយដឹងថា $f(x) = ax^2 + bx + c \geq 0; \forall x \in \mathbb{R}; a < b$ ។ ចូរកំនត់ $\min F$ ដែល

$$F = \frac{a+b+c}{b-a}$$

182. (អន្តរជាតិ ១៩៦១)

តាង a, b និង c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ដែលមានក្រលាផ្ទៃ S ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}$$

តើពេលណាយើងមានសមភាព?

183. (អន្តរជាតិ ឡុងដ៍ ១៩៦៧)

ចូរបង្ហាញថា គ្រប់គូរីចទ័រ f និង g ស្ថិតក្នុងប្លង់ វិសមភាព

$$af^2 + bfg + cg^2 \geq 0$$

ពិត បើនិងមានតែបើ លក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់៖ $a \geq 0; c \geq 0; 4ac \geq b^2$ ។

184. គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 2$ និង ចំនួនពិត $a_1; a_2; \dots; a_n$ ដែល $\sum_{i=1}^n a_i = 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sum_{i < j} |a_i - a_j| \geq \frac{n}{2} \sum_{i=1}^n |a_i|$$

185. (អន្តរជាតិ ២០០០)

គេឱ្យ $a, b, c > 0$ ដែល $abc = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right) \left(b - 1 + \frac{1}{c}\right) \left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1$$

186. (ហ្វីដូ ១៩៩៦)

តាង a និង b ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ដែល $a + b = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a^2}{a+1} + \frac{b^2}{b+1} \geq \frac{1}{3}$$

187. (ប្រឡងស្តីបទ)

ចូរបង្ហាញថា

ក) ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a, b គេមាន $a^2 + b^2 \geq 2ab$ និង $4ab \leq (a + b)^2$ ។

ស្មើគ្នា បើ $a = b$ និង ប្រាសមកវិញ។

ខ) ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x > 0$ គេមាន $x + 1/x \geq 2$ ។ វាស្មើគ្នា បើ $x = 1$ និង ប្រាសមកវិញ។

188. (កាលាដា ១៩៧១)

តាង x និង y ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ដែល $x + y = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right) \geq 9$$

189. គេអោយ២ចំនួនពិត a, b មិនសូន្យ។ ចូរកំណត់តំលៃតូចបំផុតនៃ

$$\frac{a^6}{b^6} + \frac{a^4}{b^4} + \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^6}{a^6} + \frac{b^4}{a^4} + \frac{b^2}{a^2}$$

190. (រុស្ស៊ី ១៩៩៥)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x, y > 0$

$$\frac{x}{x^4 + y^2} + \frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{xy}$$

191. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x, y គេមាន

$$x^2 + y^2 + 1 > x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}$$

192. គេឱ្យ $x, y, z > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y}$$

193. ចូរបង្ហាញថា បើ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងរបស់ត្រីកោណមួយ នោះគេមាន

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$$

194. គេឱ្យចំនួនពិតវិជ្ជមាន x, y, z ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x^2 - z^2}{y + z} + \frac{y^2 - x^2}{z + x} + \frac{z^2 - y^2}{x + y} \geq 0$$

ចូរកំណត់ករណីសមភាព។

195. (អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ១៩៩៦)

គេឱ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sqrt{a + b - c} + \sqrt{b + c - a} + \sqrt{c + a - b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

196. (អាមេរិច ១៩៩៧)

គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} + \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} + \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \leq \frac{1}{abc}$$

197. (អន្តរជាតិសតលីស ១៩៩៦)

គេអោយ $a, b, c > 0$ ដែល $abc = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq 1$$

198. (វិសមភាពកូស៊ីស្វាត)

ចូរបង្ហាញថា គ្រប់ចំនួនពិត $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ គេមាន

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា បើ វ៉ិចទ័រ $(a_1, \dots, a_n)$ និង $(b_1, \dots, b_n)$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា ។

សំគាល់

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត អ្នកខ្លះហៅថាវិសមភាពស្វាត វិសមភាពកូស៊ី រឺក៏ វិសមភាពកូស៊ី-ប៊ុន្យាកូវស៊ី-ស្វាត (គឺហៅតាមឈ្មោះ អ្នកគូស្តាំង ល្វីសកូស៊ី(Augustin Louis Cauchy), វ៉ិចទ័រយ៉ាកូលេវិច ប៊ុន្យាកូវស៊ី (Viktor Yakovlevich Bunyakovsky, គណិតវិទូរុស្ស៊ី, ១៨០៤-១៨៨៩)និង ហែរម៉ាន អាម៉ានឌុស ស្វាត(Hermann Amandus Schwarz, គណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់, ១៨៤៣-១៩២១))។

199. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ គេមាន

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2$$

200. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $a, b, c > 0$ គេមាន

$$\frac{(a + 2b + 3c)^2}{a^2 + 2b^2 + 3c^2} \leq 6$$

201. គេអោយចំនួនពិត a, b, c វិជ្ជមានដាច់ខាត ដែល $a + b + c = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{100}{3}$$

202. (អាមេរិច ១៩៧៨)

គេឱ្យចំនួនពិត a, b, c, d, e ដែល

$$\begin{cases} a + b + c + d + e = 8 \\ a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 = 16 \end{cases}$$

ចូរកំណត់តម្លៃធំបំផុតរបស់ e ។

203. (អូស្ត្រាលី ១៩៩៣)

គេឱ្យចំនួនគត់ $n > 1$, ចំនួនពិត $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ និង $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ។

ចូរបង្ហាញថា

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{s}{s - a_i} &\geq \frac{n^2}{n - 1} \\ \sum_{i=1}^n \frac{s - a_i}{a_i} &\geq n(n - 1) \\ \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s - a_i} &\geq \frac{n}{n - 1} \end{aligned}$$

204. (ចិន ១៩៨៧ ១៩៨៨)

ក) គេអោយ $a_1, a_2, a_3 > 0$ ដែល $(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2 > 2(a_1^4 + a_2^4 + a_3^4)$ ។ ចូរបង្ហាញថា a_1, a_2, a_3 ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។

ខ) គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 3$ និង $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ដែល

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^2 > (n - 1)(a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4)$$

ចូរបង្ហាញថា គ្រប់ i, j, k ខុសគ្នាពីរៗ ចំនួន a_i, a_j, a_k ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។

205. គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ។ តាង $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ និង $S_2 = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{S_2 - a_1^2}{S_1 - a_1} + \frac{S_2 - a_2^2}{S_1 - a_2} + \dots + \frac{S_2 - a_n^2}{S_1 - a_n} \geq S_1$$

206. (សិង្ហបុរី ២០០០)

គេអោយ $a, b, c, d > 0$ ដែល $a^2 + b^2 = (c^2 + d^2)^3$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{c^3}{a} + \frac{d^3}{b} \geq 1$$

207. គេអោយ $x, y, z > 1$ ដែល $1/x + 1/y + 1/z = 2$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sqrt{x + y + z} \geq \sqrt{x - 1} + \sqrt{y - 1} + \sqrt{z - 1}$$

208. (ឥណ្ឌា ២០០១)

គេអោយ $x, y, z > 0$ ដែល $xyz \geq xy + yz + zx$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$xyz \geq 3(x + y + z)$$

209. គេអោយ a, b, c ដែល $a + b + c = abc$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\max(a, b, c) \geq \sqrt{3}$$

ចំណាំ

បើជួបលក្ខខណ្ឌ $a, b, c > 0$ និង $a + b + c = abc$ ចូរតាង

$$a = \tan x, b = \tan y, c = \tan z$$

ដូច្នេះ x, y, z អាចចាត់ទុកជាមុំក្នុងរូបសម្រួតបាន មានន័យថា $x, y, z \in [0, \frac{\pi}{2})$ និង
 $x + y + z = \pi$ ។

210. (អង្គរជាតិ ១៩៩៩)

គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 2$ ។

ក) ចូរកំណត់ចំនួនថេរ C តូចបំផុត ដែលចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$; គេមាន

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^4$$

ខ) ចំពោះចំនួនថេរ C នេះ ចូរកំណត់ករណីសមភាព។

211. គេអោយចំនួនពិត x, y, z, t ដែល

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1 \end{cases}$$

ចូរគណនាតំលៃធំបំផុតនិងតូចបំផុតនៃ $P = xy + yz + zt + tx$ ។

212. (អង្គរជាតិសតលីស ២០០១)

តាង $x_1, x_2, \dots, x_n$ ជាចំនួនពិត។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x_1}{1 + x_1^2} + \frac{x_2}{1 + x_1^2 + x_2^2} + \dots + \frac{x_n}{1 + x_1^2 + \dots + x_n^2} < \sqrt{n}$$

213. (អៀរ៉ង់ ១៩៩៨)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $x, y, z > 1$ ដែល $1/x + 1/y + 1/z = 2$ គេមាន

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$$

214. (វិសមភាពតំរៀប)

គេអោយ $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ និង $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត កើនពីរ។

តាង σ ជាចំលាស់នៃ $\{1, 2, \dots, n\}$ ។

ចូរបង្ហាញថា ផលបូក $S_\sigma = \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)}$ មានតំលៃធំបំផុត ពេល $\sigma(i) = i$ និង តូចបំផុត ពេល $\sigma(i) = n - i + 1$ ចំពោះគ្រប់ i ។

មានន័យថា S_σ មានតំលៃធំបំផុតពេល ស្វ៊ីតទាំង២រៀបតាមលំដាប់ដូចគ្នា ហើយ តូចបំផុតបើ រៀបតាមលំដាប់ផ្ទុយគ្នា។

215. (អន្តរជាតិ ១៩៧៥)

គេអោយចំនួនពិត $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n$ និង $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$ ។ តាង

$(z_1, z_2, \dots, z_n)$ ជាចំលាស់នៃ $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2$$

216. ចូរគណនាតំលៃតូចបំផុតរបស់

$$f(x) = \frac{\sin^3 x}{\cos x} + \frac{\cos^3 x}{\sin x}$$

ចំពោះ $x \in (0, \pi/2)$ ។

217. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $a, b, c \geq 0$ គេមាន

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a \geq 3abc$$

218. (អន្តរជាតិ ១៩៧៨)

គេអោយ $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនសូន្យ ហើយមានតួខុសគ្នាពីរៗ។

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ គេមាន

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

219. (ចិន ១៩៨៤/១៩៨៥)

គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a_1^2}{a_2} + \frac{a_2^2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{a_n} + \frac{a_n^2}{a_1} \geq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

220. គេអោយចំនួនមិនអវិជ្ជមាន p, q, x, y, z ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x^{2000}}{py + qz} + \frac{y^{2000}}{pz + qx} + \frac{z^{2000}}{px + qy} \geq \frac{x^{1999} + y^{1999} + z^{1999}}{p + q}$$

221. (វិសមភាព Chebyshev)

ចំពោះគ្រប់ស្ថិតកើននៃចំនួនពិតពីរ តាងដោយ $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ និង $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ គេមាន

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n} \leq \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{n}$$

ផ្ទុយទៅវិញ បើ $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n$ នោះ

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n} \geq \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{n}$$



Pafnuty Lvovich Chebyshev

គណិតវិទូរុស្ស៊ី, ១៨២១–១៨៩៤

222. (វិសមភាពណែសប៊ីត)

គេអោយ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

223. គេអោយ $a, b, c, d \geq 0$ ដែល $ab + bc + cd + da = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$$

224. គេអោយ $a, b, c > 0$ និង $n \in \mathbb{N}^*$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}}{2}$$

225. គេអោយ $x, y, z > 0$ ដែល $xyz = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4}$$

226.** (វិសមភាពមធ្យមនព្វន្ឋ-មធ្យមធរណីមាត្រ មន-មន វិសមភាពកូស៊ី)

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន $a_1, a_2, \dots, a_n$ វិស្វន្យ គេមាន

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

ដោយសមភាពកើតមាន ទាល់តែ និងមានតែ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ តែប៉ុណ្ណោះ។

227. (អន្តរជាតិ ១៩៦៤)

តាង a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc$$

228. (អន្តរជាតិ ឡង្គឺលីស ១៩៦៧)

ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{6} \geq (n!)^{\frac{2}{n}}$$

(n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន) ហើយបង្ហាញថាសមភាពអាចតែក្នុងករណី $n = 1$ មួយតែប៉ុណ្ណោះ។

229. (អន្តរជាតិ ឡង្គឺលីស ១៩៦៧)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន វិសមភាពខាងក្រោមពិត

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{a^8 + b^8 + c^8}{a^3 b^3 c^3}$$

230. (អន្តរជាតិ ឡង្គឺលីស ១៩៦៧)

ចូរស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាព

$$x_1 x_2 \dots x_k (x_1^{n-1} + x_2^{n-1} + \dots + x_k^{n-1}) \leq x_1^{n+k-1} + x_2^{n+k-1} + \dots + x_k^{n+k-1}$$

ដែល $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, k$), $k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ ។

231. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ គេមាន

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2$$

232.** (ស្ទីក្រ ២០០០)

គេអោយ $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ ដែល $xyz = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z \geq 2(xy + yz + zx)$$

233. (ស្ទីក្រ ១៩៦២)

គេអោយ $a, b, c, d > 0$ ដែល $abcd = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd \geq 10$$

234. គេអោយ $a, b, c \geq 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$(a + b + c)^3 \geq a^3 + b^3 + c^3 + 24abc$$

235. គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$abc \geq (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$$

236. គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$ ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\prod_{k=1}^n a_k (1 - a_k) \leq \frac{(n-1)^n}{n^{2n}}$$

237. (អូឡីម៉ាដ ២០០០)

គេអោយចំនួនពិត a, b ដែល $a \neq 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^2 + b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{b}{a} \geq \sqrt{3}$$

238. ចំពោះ $n \in \mathbb{N}^*$ តាង

$$U_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n ; V_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

ចូរបង្ហាញថា ស្វ៊ីត (U_n) ជាស្វ៊ីតកើន ហើយស្វ៊ីត (V_n) ជាស្វ៊ីតចុះ។

239.** (ស្ទីក្រ ១៩៦៩)

គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 3$ និង $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_1} + \frac{a_n}{a_1 + a_2} > \frac{n}{4}$$

240. (ចិន ១៩៨៩/១៩៩០)

គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ដែល $a_1 a_2 \dots a_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា
 $(2 + a_1)(2 + a_2) \dots (2 + a_n) \geq 3^n$

241.** តាង a និង b ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} \geq \frac{2}{\sqrt{1+ab}}$$

បើ (1) $0 < a, b \leq 1$ រឺក៏ (1) $ab \geq 3$ ។

242. គេអោយ $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} > 0$ ដែល

$$\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \dots + \frac{1}{1+x_{n+1}} = 1$$

ចូរបង្ហាញថា $x_1 x_2 \dots x_{n+1} \geq n^{n+1}$ ។

243. គេអោយចំនួនគត់ $n > 1, x_1 x_2 \dots x_n \in \mathbb{R}^{+*}$ និង $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$ ។ តាង $s = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ ។ ចូរកំនត់ចំនួនថេរ $C(n)$ ធំបំផុត ដែល

$$\sum_{j=1}^n \frac{a_j(s-x_j)}{x_j} \geq C(n) \left[\prod_{j=1}^n a_j \right]^{\frac{1}{n}}$$

244. គេអោយ $x, y, z > 0$ ដែល $x + y + z = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 + \frac{1}{z}\right) \geq 64$$

245.* (រូម៉ានី ១៩៩៧)

គេអោយ ចំនួនគត់ $n \geq 2$ និង $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ដែល $x_1 x_2 \dots x_n = 1$ ។
 ចូរគណនាតំលៃតូចបំផុតរបស់

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_i^9 + x_j^9}{x_i^6 + x_i^3 x_j^3 + x_j^6}$$

246.* គេអោយ $a, b, c, d \geq 0$ ដែល $a + b + c + d = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$abc + bcd + cda + dab \leq \frac{1}{27} + \frac{176}{27} abcd$$

247.* គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{n^{n-3}} \frac{1}{a_1 a_2 \dots a_n} \geq n^2(n-1) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$$

248. គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n < 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a_1 a_2 \dots a_n (1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n)}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \dots (1 - a_n)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}$$

249. (អាមេរិចសតលីស ២០០២)

ចូរគណនាតំលៃធំបំផុតរបស់ $S = (1 - x_1)(1 - y_1) + (1 - x_2)(1 - y_2)$

បើ $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 = c^2$ ។

250. (អន្តរជាតិ ១៩៩៥)

តាង abc ជាចំនួនវិជ្ជមាន ដែល $abc = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$

251. (អន្តរជាតិ ២០០១)

តាង a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1$$

252. តាង a, b, c ជាចំនួនពិត។ ចូរបង្ហាញថា

$$(ab + bc + ca - 1)^2 \leq (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$$

253. (អន្តរជាតិ ១៩៨២)

តាង x, y, z ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ដែល $x + y + z = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$0 \leq xy + yz + zx - 2xyz \leq \frac{7}{27}$$

254. គេអោយចំនួនពិតវិជ្ជមាន x, y, z ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right) \left(1 + \frac{y}{z}\right) \left(1 + \frac{z}{x}\right) \geq 2 \left(1 + \frac{x+y+z}{\sqrt[3]{xyz}}\right)$$

255. គេអោយចំនួនពិតបួនផ្សេងគ្នា a, b, c, d ដែល

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} = 4; \quad ac = bd$$

ចូរគណនាតំលៃធំបំផុតនៃ

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} + \frac{c}{a} + \frac{d}{b}$$

256. គេអោយ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយមានបរិមាត្រ ស្មើ 2 ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{52}{27} \leq a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 2$$

257. ចំពោះគ្រប់ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sqrt{(a^2b + b^2c + c^2a)(ab^2 + bc^2 + ca^2)} \geq abc + \sqrt[3]{(a^3 + abc)(b^3 + abc)(c^3 + abc)}$$

258. 1) ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនសនិទានវិជ្ជមាន p, q ដែល $p + q = 1$ គេមាន

$$pa + qb \geq a^p b^q; \forall a, b > 0$$

2) ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន p, q ដែល $p + q = 1$ គេមាន

$$px + qy \geq x^p y^q; \forall x, y > 0$$

3) (វិសមភាពមន-មេដូដៅ)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ គេមាន

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \geq x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}; \forall x_1, x_2, \dots, x_n > 0$$

4) (វិសមភាព Hölder)

គេអោយ $p, q \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $1/p + 1/q = 1$ និង បណ្តាចំនួនពិត $a_1, a_2, \dots, a_n$ និង

$b_1, b_2, \dots, b_n$ ចូរបង្ហាញថា

$$|a_1 b_1| + |a_2 b_2| + \dots + |a_n b_n|$$

$$\leq (|a_1|^p + |a_2|^p + \dots + |a_n|^p)^{\frac{1}{p}} \times (|b_1|^q + |b_2|^q + \dots + |b_n|^q)^{\frac{1}{q}}$$

ដែលអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា នូវត្រាតែ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}(a_1^p, a_2^p, \dots, a_n^p)$ និង វ៉ិចទ័រ $\vec{v}(b_1^q, b_2^q, \dots, b_n^q)$

កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា ហើយ បណ្តា $a_i b_i$ សុទ្ធតែវិជ្ជមានវិស្សទាំងអស់ វិប៊ីមិនអញ្ចឹង សុទ្ធតែអវិជ្ជមានវិស្សទាំងអស់។

259. គេអោយ $a, b \geq 0$ និង $p, q > 1$ ដែល $1/p + 1/q = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$$

260. (ប្លូឡូញ ១៩៩៥)

គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 1$ ចូរកំនត់តំលៃតូចបំផុតរបស់ផលបូក

$$x_1 + \frac{x_2^2}{2} + \dots + \frac{x_n^n}{n}$$

ដែល $x_1, x_2, \dots, x_n$ ជាចំនួនពិត ដែល $1/x_1 + 1/x_2 + \dots + 1/x_n = n$ ។

261. (វិសមភាព Minkowski)

តាង $p \in [1; +\infty)$ ហើយ $a_1, a_2, \dots, a_n$ និង $b_1, b_2, \dots, b_n$ ជាចំនួនពិត។ ចូរបង្ហាញថា

$$(|a_1 + b_1|^p + |a_2 + b_2|^p + \dots + |a_n + b_n|^p)^{\frac{1}{p}} \leq (|a_1|^p + |a_2|^p + \dots + |a_n|^p)^{\frac{1}{p}} + (|b_1|^p + |b_2|^p + \dots + |b_n|^p)^{\frac{1}{p}}$$

ដែលអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា លុះត្រាតែ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ និង វ៉ិចទ័រ $\vec{v}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា ហើយមានទិសដៅដូចគ្នា។

262. គេអោយ $x, y, z > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{4}{3}} + (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}(x + z)^{\frac{2}{3}}} + \frac{y^{\frac{4}{3}}}{y^{\frac{4}{3}} + (y^2 + z^2)^{\frac{1}{3}}(y + x)^{\frac{2}{3}}} + \frac{z^{\frac{4}{3}}}{z^{\frac{4}{3}} + (z^2 + x^2)^{\frac{1}{3}}(z + y)^{\frac{2}{3}}} \leq 1$$

263. គេអោយចំនួនពិត a, b, c, d ។ ចូរកំណត់តំលៃតូចបំផុតរបស់

$$S = \sqrt{(a+1)^2 + 2(b-2)^2 + (c+3)^2} + \sqrt{(b+1)^2 + 2(c-2)^2 + (d+3)^2} \\ + \sqrt{(c+1)^2 + 2(d-2)^2 + (a+3)^2} \\ + \sqrt{(d+1)^2 + 2(a-2)^2 + (b+3)^2}$$

264. តាង x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន

1) ចូរបង្ហាញថា បើ $x + y + z = xyz$ នោះ

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

2) ចូរបង្ហាញថា បើ $0 < x, y, z < 1$ និង $xy + yz + zx = 1$ នោះ

$$\frac{x}{1-x^2} + \frac{y}{1-y^2} + \frac{z}{1-z^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

265. (ប៊ែលាវុស ១៩៩៩)

គេអោយស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតពីរ $x_1, x_2, \dots$ និង $y_1, y_2, \dots$ កំណត់ដោយ

$$x_1 = y_1 = \sqrt{3}; x_{n+1} = x_n + \sqrt{1 + x_n^2}; y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + \sqrt{1 + y_n^2}}$$

ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា $2 < x_n y_n < 3$ ចំពោះគ្រប់ $n > 1$ ។

266. តាង $x_1, x_2, \dots, x_n$ ជាចំនួនពិតខុសគ្នាចំនួន n បីតភ្ជុងចន្លោះ $[-1; 1]$ ដែល $n \geq 2$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_n} \geq 2^{n-2}$$

ដែល $t_i = \prod_{j \neq i} |x_j - x_i|$ ។

267. យើងយកចំនួនពិតបួននៅក្នុងចន្លោះ $\left[\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}\right]$ ដោយមិនបាច់រើស។ ចូរបង្ហាញថា ត្រូវតែមានពីរក្នុងចំណោមនោះ តាងដោយ a និង b ដែល

$$|a\sqrt{4-b^2} - b\sqrt{4-a^2}| \leq 2$$

268. (វិសមភាពយីនស៊ីន)

តាង $n \geq 1$ ជាចំនួនគត់ ហើយ f ជាអនុគមន៍ផុត លើដែន I ។ ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់

ចំនួនពិត $l_1, l_2, \dots, l_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $l_1 + l_2 + \dots + l_n = 1$ គេមាន

$$f(l_1x_1 + l_2x_2 + \dots + l_nx_n) \leq l_1f(x_1) + l_2f(x_2) + \dots + l_nf(x_n);$$

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I$$

ហើយ បើ f ផុតដាច់ខាត នោះកន្សោមខាងលើក្លាយជាសមភាព ពេល $x_1 = x_2 = \dots = x_n$

ករណី f ជាអនុគមន៍ហ្គ័ររ៉ូន :

$$f(l_1x_1 + l_2x_2 + \dots + l_nx_n) \geq l_1f(x_1) + l_2f(x_2) + \dots + l_nf(x_n);$$

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I$$

យ៉ូហាន យីនស៊ីន

(Johan Jensen)



ឈ្មោះពេញ យ៉ូហាន លុយឌ្វីក វីលាម វ៉ាល់ដឺមែរ យីនស៊ីន

(Johan Ludwig William Valdemar Jensen)

(ឧសភា ១៨៥៩ - កុម្ភៈ ១៩២៥) គណិតវិទូ និង វិស្វករជាតិដាណឺម៉ាក។ គេស្គាល់

គាត់ដោយសារវិសមភាពយីនស៊ីន។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩១៥ គាត់បានបង្ហាញថា រូបមន្ត

វិសមភាពរបស់គាត់អាចប្រើបានលើ វិភាគកុំផ្លិច។

269. (កូរ៉េ ១៩៩៨)

គេអោយ $a, b, c > 0$ ដែល $a + b + c = abc$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \leq \frac{3}{2}$$

270. ចូរកំនត់ចំនួនថេរ M តូចបំផុត ដែលចំពោះគ្រប់ $a, b > 0$ គេមាន

$$a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}} \leq M(a+b)^{\frac{1}{3}}$$

271. គេអោយ $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x_1}{\sqrt{1-x_1}} + \frac{x_2}{\sqrt{1-x_2}} + \dots + \frac{x_n}{\sqrt{1-x_n}} \geq \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$

272. (អូឡីមព័ទ្ធភាសិត ២០០០)

គេអោយ $a, b > 0$ និង $n \in \mathbb{Z}$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2^{n+1}$$

273. (អន្តរជាតិ ២០០១)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $l \geq 8$ និង $a, b, c > 0$ គេមាន

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + \lambda bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + \lambda ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + \lambda ab}} \geq \frac{3}{\sqrt{1 + \lambda}}$$

274. គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 1$ តាង $\alpha, t \in [1; +\infty)$ និង $\beta \in \mathbb{R}^{+*}$ ។

តាង $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^n \left(a_i^\alpha + \frac{1}{a_i^\beta} \right)^t \geq n \left(\frac{1}{n^\alpha} + n^\beta \right)^t$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែនិងនាំអោយ $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1/n$ ។

275. (អន្តរជាតិសតលីស ១៩៩៨)

គេអោយ $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \dots + \frac{1}{x_n + 1} \geq \frac{n}{1 + (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}}}$$

276. (អាមេរិច ១៩៨០)

គេអោយ $a, b, c \in [0; 1]$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c+1} + \frac{b}{c+a+1} + \frac{c}{a+b+1} + (1-a)(1-b)(1-c) \leq 1$$

277. (អាមេរិច ១៩៧៧)

គេអោយ $0 < p \leq a, b, c, d, e \leq q$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$(a+b+c+d+e) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} \right) \leq 25 + 6 \left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}} \right)^2$$

278. (អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ២០០៤)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $a, b, c > 0$

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq 9(ab + bc + ca)$$

279. (អន្តរជាតិ ១៩៨៣)

តាង a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$$

280. ជិយមជ័យ- គេអោយ ចំនួនគត់ $n \geq 2$ បណ្តាចំនួនពិតវិជ្ជមាន $a_1, a_2, \dots, a_n$ និង បណ្តាចំនួនពិតវិជ្ជមាន $l_1, l_2, \dots, l_n$ ដែល $\sum_{i=1}^n l_i = 1$ ។ យើងកំណត់អនុគមន៍ M លើ $\mathbb{R}^*$ ដោយ

$$M(a) = \left[\sum_{i=1}^n l_i a_i^\alpha \right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

គេហៅ $M(\alpha)$ ថា មធ្យមលំដាប់ α នៃបណ្តាចំនួន a_i ផ្សំនឹងមេគុណ l_i ។

ទ្រឹស្តីបទ វិសមភាពមធ្យមលំដាប់ α

គេអោយ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ មិនស្មើគ្នាទាំងអស់ និង $l_1, l_2, \dots, l_n > 0$ ដែល $l_1 + l_2 +$

$\dots + l_n = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា អនុគមន៍ $M(\alpha)$ កើនដាច់ខាតលើ $\mathbb{R}$ មានន័យថា

ចំពោះគ្រប់ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ និង $\alpha < \beta$ គេមាន $M(\alpha) \leq M(\beta)$ ដោយអង្គទាំងពីរស្មើ

គ្នា ទាល់តែនិងនាំអោយ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ ។

281. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ គេមាន

$$\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq M(-1) \leq M(0) \leq M(1) \leq M(2) \leq \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

$$\leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$$

ហើយសមភាពកើតមាន ពេល $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ ។

282. (អៀរដ៍ ១៩៩៨)

គេអោយ $x_1, x_2, x_3, x_4 > 0$ ដែល $x_1 x_2 x_3 x_4 = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^4 x_i^3 \geq \max \left\{ \sum_{i=1}^4 x_i; \sum_{i=1}^4 \frac{1}{x_i} \right\}$$

283. គេអោយ $x, y, z \geq 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$8(x^3 + y^3 + z^3)^2 \geq 9(x^2 + yz)(y^2 + zx)(z^2 + xy)$$

284. គេអោយចំនួនគត់ $n > 1$ និង $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ដែល $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$

ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{x_1}{\sqrt{1-x_1}} + \frac{x_2}{\sqrt{1-x_2}} + \dots + \frac{x_n}{\sqrt{1-x_n}} \geq \frac{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \dots + \sqrt{x_n}}{\sqrt{n-1}}$$

285. (ឡូកី ១៩៩៧)

គេអោយចំនួនគត់ $n \geq 2$ ។ ចូរគណនាតំលៃតូចបំផុតនៃ

$$\frac{x_1^5}{x_2 + x_3 + \dots + x_n} + \frac{x_2^5}{x_1 + x_3 + \dots + x_n} + \dots + \frac{x_n^5}{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}}$$

ដែល $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ហើយ $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ ។

286. (វិសមភាព Schur)

តាង x, y, z ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $r > 0$ យើងមាន

$$x^r(x-y)(x-z) + y^r(y-z)(y-x) + z^r(z-x)(z-y) \geq 0$$

រឺ

$$\sum_{\text{cyclic}} x^r(x-y)(x-z) \geq 0$$

287. 1) គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a) \\ \geq 2[(ab)^{3/2} + (bc)^{3/2} + (ca)^{3/2}]$$

2) តាង $t \in (0; 3]$ ។ ចំពោះគ្រប់ $a, b, c \geq 0$ ចូរបង្ហាញថា

$$(3-t) + t(abc)^{2/t} + a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(ab+bc+ca)$$

3) បង្ហាញថា

$$\frac{5}{2} + \frac{1}{2}(abc)^4 + a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(ab+bc+ca) \\ 2 + (abc)^2 + a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(ab+bc+ca) \\ 1 + 2abc + a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(ab+bc+ca)$$

288. គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

1)
$$\frac{b+c}{a^2+bc} + \frac{c+a}{b^2+ca} + \frac{a+b}{c^2+ab} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

2)
$$\frac{a^2+bc}{b+c} + \frac{b^2+ca}{c+a} + \frac{c^2+ab}{a+b} \geq a+b+c$$

289. 1) តាង a_1, a_2, b_1, b_2 ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ដែល $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ និង $\max(a_1, a_2) \geq \max(b_1, b_2)$ ។ តាង x និង y ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា

$$x^{a_1}y^{a_2} + x^{a_2}y^{a_1} \geq x^{b_1}y^{b_2} + x^{b_2}y^{b_1}$$

2) (វិសមភាព Muirhead)

តាង $a_1; a_2; a_3; b_1; b_2; b_3$ ជាចំនួនពិត ដែល

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq 0; b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq 0; \\ a_1 \geq b_1; a_1 + a_2 \geq b_1 + b_2; \\ a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3$$

ករណីនេះ គេថាស្វ៊ីត $(a_1; a_2; a_3)$ ល្បីល្បាញជាងស្វ៊ីត $(b_1; b_2; b_3)$ ។

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន $x; y; z$ គេមាន

$$\sum_{\text{sym}} x^{a_1}y^{a_2}z^{a_3} \geq \sum_{\text{sym}} x^{b_1}y^{b_2}z^{b_3}$$

290. គេអោយ a, b, c ជាចំនួនវិជ្ជមាន ដែល $abc = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{a+b+1} + \frac{1}{b+c+1} + \frac{1}{c+a+1} \leq 1$$

291. គេអោយ $a, b, c, d > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{3}{2}(a^3 + b^3 + c^3 + d^3) \geq ab\sqrt{cd} + ac\sqrt{bd} + ad\sqrt{bc} + bc\sqrt{da} + bd\sqrt{ca} + cd\sqrt{ab}$$

292. (អៀវ៉ង់ ១៩៩៦)

តាង $x; y; z$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។ ចូរបង្ហាញថា

$$(xy + yz + zx) \left(\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(y+z)^2} + \frac{1}{(z+x)^2} \right) \geq \frac{9}{4}$$

293. តាង $x; y; z$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ដែល $xy + yz + zx = 1$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq \frac{5}{2}$$

294. (អន្តរជាតិសតលីស ១៩៩០)

ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a, b, c យើងមាន

$$(a^2 + ab + b^2)(b^2 + bc + c^2)(c^2 + ca + a^2) \geq (ab + bc + ca)^3$$

295. (អៀវ៉ង់ ១៩៩៦)

គេអោយ $x, y, z > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$(xy + yz + zx) \left(\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(y+z)^2} + \frac{1}{(z+x)^2} \right) \geq \frac{9}{4}$$

296. (ជប៉ុន ១៩៩៧)

គេអោយ $a, b, c > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2 + a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2 + b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2 + c^2} \geq \frac{3}{5}$$

VI. វិសមីការ

ដោះស្រាយវិសមីការ

297. $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 > 0$

298. $x^3 + 4x^2 + 5x + 2 \leq 0$

299. $2x^3 - 3x^2 + 7x - 3 > 0$

300. $x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2 \geq 0$

301. $x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 6x + 5 < 0$

302. $3x^4 - 10x^2 + 3 > 0$

303. $3x^2(x-4)^2 < 32 - 5(x-2)^2$

304. $(x^2 - x)^2 + (x^2 - x) + 2 \geq 0$
305. $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) < 48$
306. $(x + 1)^4 > 2(1 + x^4)$
307. $x^4 - x^3 - 10x^2 + 2x + 4 < 0$
308. $\frac{1}{x} < \frac{2}{x - 2}$
309. $\frac{x + 4}{x - 2} < \frac{2}{x + 1}$
310. $\frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x - 2}$
311. $\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} + \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3} > 2x - \frac{1}{4x - 8}$
312. $\frac{x^3 - 2x^2 + 5x + 2}{x^2 + 3x + 2} \geq 1$
313. $\frac{1}{x + 5} + \frac{1}{x - 7} + \frac{1}{x - 5} + \frac{1}{x + 7} > 0$
314. $\frac{1}{x^2 + x} \leq \frac{1}{2x^2 + 2x + 3}$
315. $\frac{1}{x - 1} - \frac{4}{x - 2} + \frac{4}{x - 3} - \frac{1}{x - 4} < \frac{1}{30}$
316. $\frac{4x - 17}{x - 4} + \frac{10x - 13}{2x - 3} > \frac{8x - 30}{2x - 7} + \frac{5x - 4}{x - 1}$
317. $x^2 + \frac{x^2}{(x + 1)^2} < \frac{5}{4}$
318. $x^2 + \frac{4x^2}{(x - 2)^2} \leq 5$
319. $\frac{(x + 1)^4}{x(x^2 + 1)} > \frac{128}{15}$
320. $x^3 - \frac{1}{x^3} \geq 4\left(x - \frac{1}{x}\right)$
321. $\frac{x + 6}{x - 6} \left(\frac{x - 4}{x + 4}\right)^2 + \frac{x - 6}{x + 6} \left(\frac{x + 9}{x - 9}\right)^2 < \frac{2x^2 + 72}{x^2 - 36}$
322. $|x^3 - x| \leq x$
323. $\frac{4}{|x + 1| - 2} \geq |x - 1|$

324. $(x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$ 325. $\sqrt{\frac{x-2}{1-2x}} > -1$
326. $\sqrt{4-x^2} + \frac{|x|}{x} \geq 0$ 327. $(1-a)\sqrt{2x+1} < 1$
328. $\sqrt{x+1} > \sqrt{3-x}$ 329. $\sqrt{x+2} \geq \sqrt{x-a}$
330. $\sqrt{24-10x} > 3-4x$ 331. $x > \sqrt{1-x}$
332. $x > \sqrt{24-5x}$ 333. $\sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{3}{4}} < \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$
334. $\sqrt{4-\sqrt{1-x}} - \sqrt{2-x} > 0$
335. $\sqrt{x^2+x-12} < x$ 336. $1 - \sqrt{13+3x^2} \leq 2x$
337. $\sqrt{x^2+x} > 1-2x$ 338. $4-x < \sqrt{x^2-2x}$
339. $\sqrt{x+3} > \sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}$
340. $\frac{x-2}{\sqrt{2x-3}-1} < 4$ 341. $\frac{2-\sqrt{x+3}}{x-1} > -\frac{1}{3}$
342. $\sqrt{x+2} - \sqrt{5x} > 4x-2$ 343. $\sqrt{x+1} + 1 < 4x^2 + \sqrt{3x}$
344. $\frac{\sqrt{24+2x-x^2}}{x} < 1$
345. $2\left(x + \sqrt{x^2+4x+3}\right) < 3(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+3} - 2)$
346. ចូរបង្ហាញថាពហុធា $P(x) = x^8 - x^5 + x^2 - x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ។
347. សន្មតថា $P(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_{m-1}x + a_m$ និង $Q(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_{n-1}x + b_n, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, Q(x) \not\equiv 0$ ។ ចូរបង្ហាញថាវិសមភាព $P(x)/Q(x) > 0$ និង $P(x)Q(x) > 0$ សមមូលគ្នា។

348. ដោយដឹងថា $f(-1) < 1, f(1) > -1, f(3) < -4$ ដែល $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$
ចូរកំណត់សញ្ញារបស់ a ។

349. (អន្តរជាតិ ១៩៦០)

ដោះស្រាយវិសមីការ

$$\frac{4x^2}{(1 - \sqrt{1 + 2x})^2} < 2x + 9$$

350. (អន្តរជាតិ ១៩៦២)

ដោះស្រាយវិសមីការ

$$\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$$

351. ដោះស្រាយវិសមីការ

$$\sqrt{9x^2 + 16} \geq 2\sqrt{2x+4} + 4\sqrt{2-x}$$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

352*. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

$$\begin{cases} x + y \leq 2, \\ x + y \geq 1, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

ដែលក្នុងនោះ $z = 2x + 3y$ មានតំលៃធំបំផុត។

353. ចូរកំណត់វិសមភាពជាតិរបស់ប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} x = y + 2 \\ xy \leq 17 \\ \frac{y+1}{x+2} < \frac{1}{2} \end{cases}$$

354. ចូរកំណត់តំលៃរបស់ a ដែលសំនុំ

$$\{(x; y) | x^2 + y^2 + 2x \leq 1\} \cap \{(x; y) | x - y + a \geq 0\}$$

មានចំនុចតែមួយគត់។ ចូរកំណត់ចំនុចនោះ។

355. ចូរកំណត់ $(x; y)$ ដែល

$$\begin{cases} x^2 - 2xy + 12 = 0 \\ x^2 + 4y^2 \leq 60 \\ x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

356. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

$$\begin{cases} \sqrt{4-3x} \geq x \\ \sqrt{x} + \sqrt{x-1} < 5 \end{cases}$$

357. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

$$\begin{cases} x^3 + x^2(13-y-z) + x(2y+2z-2yz-26) + 5yz-7y-7z+30=0 & (1) \\ x^3 + x^2(17-y-z) - x(2y+2z+2yz-26) - 3yz+y+z-2=0 & (2) \\ x^2-11x+28 \leq 0 & (3) \end{cases}$$

358. ចូរកំណត់ a ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធខាងក្រោមមានរឹស

$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 7y^2 \geq \frac{1-a}{a+1} \\ 3x^2 + 10xy - 5y^2 \leq -2 \end{cases}$$

២. អនុគមន៍

អ៊ីចស្ប៉ូណង់ស្យែល- លោការីត

I. គណនា

គណនា

$$359. \quad 25^{\log_5 3} \qquad 360. \quad e^{\ln \ln 3} \qquad 361. \quad \ln ab - \ln|b|$$

$$362. \quad \log_a b^2 + \log_{a^2} b^4 \qquad 363. \quad 2^{\frac{1}{\log_3 2}}$$

$$364. \quad \frac{\log_2 25}{\log_2 5} \qquad 365. \quad \log_3 5 \cdot \log_4 9 \cdot \log_5 2$$

$$366. \quad \sqrt{\log_{0,5}^2 4} \qquad 367. \quad a^{\sqrt{\log_a b}} - b^{\sqrt{\log_b a}}$$

$$368. \text{ ផ្លូវគណនា } \log_{30} 8 \text{ បើ } \log_{30} 3 = c, \log_{30} 5 = d \text{ ។}$$

$$369. \text{ ផ្លូវគណនា } \log_9 40 \text{ បើ } \log 15 = c, \log_{20} 50 = d \text{ ។}$$

$$370. \text{ ផ្លូវគណនា } \log(0,175)^4 \text{ បើ } \log 196 = c, \log 56 = d \text{ ។}$$

$$371. \text{ គណនា}$$

$$\frac{\log_2 24}{\log_{96} 2} - \frac{\log_2 192}{\log_{12} 2}$$

II. សមភាព

372. ចូរបង្ហាញថា បើ $a = \log_{12} 18, b = \log_{24} 54$ នោះ $ab + 5(a - b) = 1$ ។

III. សមីការ

ដោះស្រាយសមីការ

373. $4^{x+1,5} + 9^x = 6^{x+1}$

374. $25^{2x-x^2+1} + 9^{2x-x^2+1} = 34.15^{2x-x^2}$

375. $2^{2x^2} + 2^{x^2+2x+2} = 2^{5+4x}$

376. $\left(\sqrt{5\sqrt{2}-7}\right)^x + 6\left(\sqrt{5\sqrt{2}+7}\right)^x = 7$

377. $3^{2x^2} - 2.3^{x^2+x+6} + 3^{2(x+6)} = 0$

378. $x^2.2^{\sqrt{2x+1}-1} + 2^x = 2^{\sqrt{2x+1}+1} + x^2.2^{x-2}$

379. $4^{\log_{64}(x-3)+\log_2 5} = 50$

380. $x^{\log_x(1-x)^2} = 9$

381. $\log_3(x^2 + 4x + 12) = 2$

382. $\log_3 x + \log_9 x + \log_{27} x = 5,5$

383. $\log_2(3-x) + \log_2(1-x) = 3$

384. $\log(x-3) + \log(x+6) = \log 2 + \log 5$

385. $\log(x-4) + \log(x+3) = \log(5x+4)$

386. $\ln(x^3 + 1) - 0,5 \ln(x^2 + 2x + 1) = \ln 3$

387. $\log_5(x-2) + 2 \log_5(x^3 - 2) + \log_5(x-2)^{-1} = 4$

388. $2 \log_3(x-2) + \log_3(x-4)^2 = 0$

389. $\log_2(x+2)^2 + \log_2(x+10)^2 = 4 \log_2 3$

390. $\log_2 \frac{x-2}{x-1} - 1 = \log_2 \frac{3x-7}{3x-1}$

391. $2 \log_2 \frac{x-7}{x-1} + \log_2 \frac{x-1}{x+1} = 1$
392. $\log_3(5x-2) - 2 \log_3 \sqrt{3x+1} = 1 - \log_3 4$
393. $\log(3x-2) - 2 = \frac{1}{2} \log(x+2) - \log 50$
394. $\log^2 \left(1 + \frac{4}{x}\right) + \log^2 \left(1 - \frac{4}{x+4}\right) = 2 \log^2 \left(\frac{2}{x-1} - 1\right)$
395. $\log_2 x^4 + \log_a x^2 = 1$
396. $\log_2(x-1) - \log_{\sqrt{2}} \sqrt{x+3} = \log_8(x-a)^3 + \log_{1/2}(x-3)$
397. $\log_2(6x^2 + 25x) = 1 + \log_2(ax + 4a - 2)$
398. $\log_3 x \log_4 x \log_5 x = \log_3 x \log_4 x + \log_4 x \log_5 x + \log_5 x \log_3 x$
399. $\left(\log_3 \frac{3}{x}\right) \log_2 x - \log_3 \frac{x^3}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} + \log_2 \sqrt{x}$
400. $\log(10x^2) \log x = 1$
401. $\frac{\log_2 x - 1}{\log_2 \frac{x}{2}} = 2 \log_2 \sqrt{x} + 3 - \log_2^2 x$
402. $2 \log_9 x + 9 \log_x 3 = 10$
403. $\log_x(125x) \log_{25}^2 x = 1$
404. $\log_x \sqrt{5} + \log_x 5x = \frac{9}{4} + \log_x^2 \sqrt{5}$
405. $\log(\log x) + \log(\log x^3 - 2) = 0$
406. $\log_{3x+7}(9 + 12x + 4x^2) = 4 - \log_{2x+3}(6x^2 + 23x + 21)$
407. $\log^2(4-x) + \log(4-x) \log\left(x + \frac{1}{2}\right) - 2 \log^2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$
408. $(x^2 \log_x 27) \log_9 x = x + 4$

409. $\log_x 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0$
410. $\log_{0,5x} x^2 - 14 \log_{16x} x^3 + 40 \log_{4x} \sqrt{x} = 0$
411. $4 \log_{\frac{x}{2}} \sqrt{x} + 2 \log_{4x} x^2 = 3 \log_{2x} x^3$
412. $\log_{3x} \left(\frac{3}{x}\right) + \log_3^2 x = 1$
413. $(\log_{1/\sqrt{1+x}} 10) \log(x^2 - 3x + 2) = (\log(x - 3)) \log_{1/\sqrt{1+x}} 10 - 2$
414. $\frac{\log_x(2a - x)}{\log_x 2} + \frac{\log_a x}{\log_a 2} = \frac{1}{\log_{a^2-1} 2}$
415. $\frac{\log_{a^2\sqrt{x}} a}{\log_{2x} a} + (\log_{ax} a) \log_{\frac{1}{a}} 2x = 0$
416. $\sqrt{1 + \log_{0,04} x} + \sqrt{3 + \log_{0,2} x} = 1$
417. $\sqrt{2 - \log_x 9} = -\frac{\sqrt{12}}{\log_3 x}$
418. $\log_x(x^2 + 1) = \sqrt{\log_{\sqrt{x}}(x^2(1 + x^2)) + 4}$
419. $\sqrt{\log_2 x} - 0,5 = \log_2 \sqrt{x}$
420. $\log(3^x - 2^{4-x}) = 2 + \frac{1}{4} \log 16 - \frac{x}{2} \log 4$
421. $\log_3 \left(\log_9 x + \frac{1}{2} + 9^x \right) = 2x$
422. $\log_3 \left(3^{x^2-13x+28} + \frac{2}{9} \right) = \log_5 0,2$
423. $\log 2 + \log(4^{x-2} + 9) = 1 + \log(2^{x-2} + 1)$
424. $\log(6.5^x + 25.20^x) = x + \log 5$
425. $\log_{\sqrt{5}}(4^x - 6) - \log_5(2^x - 2)^2 = 2$

426. $x(1 - \log 5) = \log(4^x - 12)$
427. $\log_2(4^x + 1) = x + \log_2(2^{x+3} - 6)$
428. $\log_3(9^x + 9) = x - \log_{\frac{1}{3}}(28 - 2.3^x)$
429. $\log_2\left(\frac{8}{2^x} - 1\right) = x - 2$
430. $\log_{1/3}\left(2\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1\right) = \log_{1/3}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^x - 4\right)$
431. $(x + 1)^{\log(x+1)} = 100(x + 1)$
432. $x^{\frac{\log x + 5}{3}} = 10^{5 + \log x}$
433. $3^{\log x} = 54 - x^{\log 3}$
434. $\log_2(9 - 2^x) = 10^{\log(3-x)}$
435. $|x - 1|^{\log^2 x - \log x^2} = |x - 1|^3$
436. $(3^{x^2-7, 2x+3, 9} - 9\sqrt{3}) \log(7 - x) = 0$
437. $3.2^{\log_x(3x-2)} + 2.3^{\log_x(3x-2)} = 5.6^{\log_{x^2}(3x-2)}$
438. $|1 - \log_{1/5} x| + 2 = |3 - \log_{1/5} x|$
439. $\log_4(6 + \sqrt{x} - |\sqrt{x} - 2|) = \frac{1}{2} + \log_2|\sqrt{x} - |\sqrt{x} - 2||$
440. $5^x + 12^x = 13^x$
441. $3^x + 4^x + 5^x = 6^x$
442. $2^x = 1 - x$
443. $\log_2(4 - x) = x - 3$

444. ដោយដឹងថា $x = 9$ ជាវិសម្មយនៃសមីការ

$$\log_{\pi}(x^2 + 15a^2) - \log_{\pi}(a - 2) = \log_{\pi} \frac{8ax}{a - 2}$$

ចូរកំណត់វិសម្សងទៀតនៃសមីការនេះ។

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$445. \quad \begin{cases} \log_{a^2} x - \log_{a^4} y = 3 \\ \log_{a^6} x + \log_{a^8} y = 4 \end{cases}$$

$$446. \quad \begin{cases} 2^{x+y-1} + 2^{x-y+1} = 3 \\ \frac{1}{7} \cdot 3^{x \log_3 2 + y \log_3 2 - 2} + 3^{x \log_3 2 - y \log_3 2 - 2} = \frac{1}{7} \end{cases}$$

$$447. \quad \begin{cases} 10^{1+\log(x+y)} = 50 \\ \log(x-y) + \log(x+y) = 2 - \log 5 \end{cases}$$

$$448. \quad \begin{cases} x^{\log_x 2} = \log_3(x+y) \\ x^2 + y^2 = 65 \end{cases}$$

$$449. \quad \begin{cases} \log_2(x+y) - \log_3(x-y) = 1 \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$$

$$450. \quad \begin{cases} (3y^2 + 1) \log_3 x = 1 \\ x^{2y^2+10} = 27 \end{cases}$$

$$451. \quad \begin{cases} 4^{-y} \log_2 x = 4 \\ \log_2 x + 2^{-2y} = 4 \end{cases}$$

$$452. \quad \begin{cases} y + \log x = 1 \\ x^y = 0,01 \end{cases}$$

$$453. \quad \begin{cases} x^{\log y} = 2 \\ xy = 20 \end{cases}$$

454.
$$\begin{cases} 2^x \cdot 8^{-y} = 2\sqrt{2} \\ \log_9 \frac{1}{x} + 0,5 = \frac{1}{2} \log_3 9y \end{cases}$$
455.
$$\begin{cases} (\log_a(xy) - 2) \left(\log_a \frac{4}{9} \right)^{-1} = -1 \\ x + y = 5a \end{cases}$$
456.
$$\begin{cases} 2(\log_y x + \log_x y) = 5 \\ xy = 8 \end{cases}$$
457.
$$\begin{cases} \log_x y + \log_y x = 2,5 \\ x + y = a^2 + a \end{cases}$$
458.
$$\begin{cases} \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} = 28 \\ \log_9 x - \log_{\frac{1}{9}} y = 1,5 \end{cases}$$
459.
$$\begin{cases} \log_2 y = \log_4(xy - 2) \\ \log_9 x^2 + \log_3(x - y) = 1 \end{cases}$$
460.
$$\begin{cases} 2^{x^2+y} = 4^{\frac{y^2+x}{2}} \\ \sqrt{xy} = 2 \end{cases}$$
461.
$$\begin{cases} 4^{\frac{x}{y}-3y/x} = 16 \\ \sqrt{x} - \sqrt{2y} = \sqrt{12} - \sqrt{8} \end{cases}$$
462.
$$\begin{cases} x + y = 4 + \sqrt{y^2 + 2} \\ \log x - 2 \log 2 = \log(1 + 0,5y) \end{cases}$$
463.
$$\begin{cases} \log_3(\log_2 x) + \log_{1/3}(\log_{1/2} y) = 1 \\ xy^2 = 4 \end{cases}$$
464.
$$\begin{cases} \frac{1}{3} \sqrt[y]{9} = 9^{\frac{x}{2y}} \\ \frac{x + 3y}{x} = \frac{2x}{y} - 4 \end{cases}$$

V. វិសមភាព

465. តើមួយណាធំជាង រវាង 2^{300} និង 3^{200} ?

466. ចូរបង្ហាញថា

$$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $n > 1$ ។

467. ដោយមិនប្រើតារាង ចូរបង្ហាញថា $\log_4 9 > \log_9 25$ ។

468. គេអោយ $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ។ ចូរបង្ហាញថា

$$x_1^{x_1} \cdot x_2^{x_2} \dots x_n^{x_n} \geq (x_1 \cdot x_2 \dots x_n)^{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}}$$

469. (អាមេរិច សតិលីស្ស១៩៩៩)

គេអោយ $x, y, z > 1$ ចូរបង្ហាញថា

$$x^{x^2+2yz} y^{y^2+2zx} z^{z^2+2xy} \geq (xyz)^{xy+yz+zx}$$

VI. វិសមីការ

ដោះស្រាយវិសមីការ

470. $\log_{1/5}(2x^2 + 5x + 1) < 0$

471. $\log_{1/3}(x^2 + 2x) > 0$

472. $\log_{1/2}(x^2 - 4x + 6) < -2$

473. $\log_{1/3} \frac{3x-1}{x+2} < 1$

474. $\log_{0,25} \frac{35 - x^2}{x} \geq -\frac{1}{2}$

475. $\log_5(2x - 4) < \log_5(x + 3)$

476. $\log_{0,1}(x^2 + x - 2) > \log_{0,1}(x + 3)$

477. $\log \sqrt{x^2 - 3x + 4} - \log \sqrt{x + 1} > 0$

478. $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_2(2-x)$

479. $\log_{1/2} \frac{x^2 + 6x + 9}{2(x + 1)} < -\log_2(x + 1)$
480. $\log(x - 2) + \log(27 - x) < 2$
481. $\log(x - 1) + \log(x - 2) < \log(x + 2)$
482. $\log_2(2 - x) + \log_{1/2}(x - 1) > \log_{\sqrt{2}} 3$
483. $\log_{1/5}(2x + 5) - \log_{1/5}(16 - x^2) \leq 1$
484. $\log_2 \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \log_{1/2} \left(1 + \frac{x}{4}\right) \geq 1$
485. $\log_7 x - \log_7(2x - 5) \leq \log_7 2 - \log_7(x - 3)$
486. $\log_{1/3}(x - 1) + \log_{1/3}(x + 1) + \log_{\sqrt{3}}(5 - x) < 1$
487. $\log_2 x^2 + \log_2(x - 1)^2 > 2$
488. $\log^2 x + 3 \log x - 4 \geq 0$
489. $\frac{1 - \log_4 x}{1 + \log_2 x} \leq \frac{1}{2}$
490. $\log_{1/3} x > \log_x 3 - \frac{5}{2}$
491. $(\log_2 x)^4 - \left(\log_{1/2} \frac{x^5}{4}\right)^2 - 20 \log_2 x + 148 < 0$
492. $(2 \log_3^2 x - 3 \log_3 x - 8)(2 \log_3^2 x - 3 \log_3 x - 6) \geq 3$
493. $(\log_2^2 x + 3 \log_2 x + 1)(\log_2^2 x + 3 \log_2 x - 3) < 5$
494. $(1, 25)^{1 - (\log_2 x)^2} < (0, 64)^{2 + \log_{\sqrt{2}} x}$
495. $2^{2x+1} - 21 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} + 2 \geq 0$
496. $0,1^{x+1} < 0,8 + 2 \cdot 10^x$

497. $2^x + 2^{-x} < 3$
498. $3^{4-3x} - 35.3^{3x-2} + 6 \geq 0$
499. $\frac{6}{2^x - 1} < 2^x$
500. $3^{\log x + 2} < 3^{\log x^2 + 5} - 2$
501. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log x^2} + 2 > 3.2^{-\log(-x)}$
502. $\log_2(4^x - 5.2^x + 2) > 2$
503. $\log_{1/\sqrt{5}}(6^{x+1} - 36^x) \geq -2$
504. $\log_{\sqrt{2}}(5^x - 1) \log_{\sqrt{2}} \frac{2\sqrt{2}}{5^x - 1} > 2$
505. $\log(1 + 2^{x+1}) > \frac{(x \log 2) \log 4}{\log 8} + \log 3$
506. $\sqrt{\log_2 \frac{3-2x}{1-x}} < 1$
507. $\sqrt{\log_3(9x-3)} \leq \log_3\left(x - \frac{1}{3}\right)$
508. $\sqrt{9^x + 3^x - 2} \geq 9 - 3^x$
509. $\log_{1/3}(\log_4(x^2 - 5)) > 0$
510. $0,3^{\log_1 \log_2 \frac{3x+6}{x^2+2}} > 1$
511. $\log_{4/3}(\sqrt{x+3} - x) > 0$

512. $\log_{1/2}(\sqrt{5-x} - x + 1) > -3$
513. $x^{\log_2 x - 2} > \frac{x}{4}$
514. $x^{(\log x)^2 - 3 \log x + 1} > 1000$
515. $\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} \geq 2$
516. $\log_a(x-1) + \log_a x > 2$
517. $\frac{1}{5 - \log_a x} + \frac{2}{1 + \log_a x} < 1, 0 < a < 1$
518. $\frac{3 \log_a x + 6}{\log_a^2 x + 2} > 1$
519. $\log_a(1 - 8a^{-x}) \geq 2(1 - x)$
520. $\log_{x-3}(x-1) < 2$
521. $\log_x(x+2) > 2$
522. $\log_{2x}(x^2 - 5x + 6) < 1$
523. $\log_{x+3}(x^2 - x) < 1$
524. $\log_{3x+5}(9x^2 + 8x + 2) > 2$
525. $\log_{2x+4}(x^2 + 1) \leq 1$
526. $\log_x \frac{15}{1-2x} < -2$
527. $\log_{x^2}(3-2x) > 1$

528. $\log_{x^2+3x}(x+3) < 1$
529. $\log_{\frac{2}{3}|x-2|} 2^{1-x^2} \geq 0$
530. $\log_{\log_2(\frac{1}{2}x)}(x^2 - 10x + 22) > 0$
531. $|x|^{x^2-x-2} < 1$
532. $\left| \log_2 \frac{x}{6} \right|^{x^2-18x+56} > 1$
533. $\frac{\log_5(x^2+3)}{4x^2-16x} < 0$
534. $-\frac{\log_{0,3}(x-1)}{\sqrt{2x-x^2+8}} \geq 0$
535. $\frac{\log_{0,5} x + 2}{\sqrt{2x-1}} > 0$
536. $\frac{3x^2-2x-1}{\log_3(x-1)} < 0$
537. $25 \cdot 2^x - 10^x + 5^x > 25$
538. $\log_5 x + \log_x \frac{x}{3} > \frac{(\log_5 x)(2 - \log_3 x)}{\log_3 x}$
539. $\frac{1}{\log_4 \frac{x+1}{x+2}} \leq \frac{1}{\log_4(x+3)}$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

$$540. \quad \begin{cases} \frac{\sqrt{(x-8)(2-x)}}{\log_{0,3}\left(\frac{10}{7}(\log_2 5 - 1)\right)} \geq 0 \\ 2^{x-3} - 31 > 0 \end{cases}$$

$$541. \quad \begin{cases} \frac{\sqrt{\log_2^2 x - 3 \log_2 x + 2}}{\log_5\left(\frac{1}{3}(\log_3 5 - 1)\right)} \geq 0 \\ x - \sqrt{x} - 2 \geq 0 \end{cases}$$

$$542. \quad \begin{cases} \left(\frac{1}{81}\right)^{8+\log_a x} > \left(\frac{1}{3}\right)^{\log_a^2 x} \\ 0 < x < 1 \end{cases}$$

ក. ត្រីកោណមាត្រ

I. គណនា

543. ដោយដឹងថា $\sin \alpha + \cos \alpha = a$ គណនា ក) $|\sin \alpha - \cos \alpha|$; ខ) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$

544. ដោយដឹងថា $\tan \alpha + \cot \alpha = p$ គណនា ក) $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$; ខ) $\tan^3 \alpha + \cot^3 \alpha$

545. គណនា $\sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$ បើ $\tan \alpha = -\frac{3}{4}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ ។

546. គណនា $\cos(70^\circ + \alpha)$ បើ $\sin(40^\circ + \alpha) = b, 0 < \alpha < 45^\circ$ ។

547. គណនា $\sin(\alpha + \beta - \gamma)$ បើ $\sin \alpha = \frac{12}{13}, \cos \beta = \frac{8}{17}; \sin \gamma = \frac{4}{5}; 0 < \alpha, \beta, \gamma < \frac{\pi}{2}$ ។

548. គណនា $\sin 3\alpha, \cos 3\alpha, \tan 3\alpha$ បើ $\cot \alpha = 4/3, \pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$ ។

គណនា

549.
$$\frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha}$$

550.
$$\frac{\cos 4\alpha - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha + \sin 4\alpha}$$

551.
$$\frac{\sin \alpha - 3 \sin 2\alpha + \sin 3\alpha}{\cos \alpha - 3 \cos 2\alpha + \cos 3\alpha}$$

552.
$$\frac{2(\sin 2\alpha + 2 \cos^2 \alpha - 1)}{\cos \alpha - \sin \alpha - \cos 3\alpha + \sin 3\alpha}$$

553.
$$\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$$

554.
$$\cos 0 + \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7} + \dots + \cos \frac{6\pi}{7}$$

555. អោយ $\sin \alpha + \cos \alpha = 1, 4, 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ ។ គណនា $\tan \frac{\alpha}{2}$ ។

556. ប៉ូស្តូមីជ្វីមាន α, β, γ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនង

$$\tan \frac{\beta}{2} = \frac{1}{3} \cot \frac{\alpha}{2}, \cot \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2} \left(3 \tan \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\alpha}{2} \right)$$

គណនា $\alpha + \beta + \gamma$ ។

គណនាដោយមិនប្រើតារាង

557. $\cos 292^{\circ}30'$

558. $\operatorname{cosec} 10^{\circ} - \sqrt{3} \sec 10^{\circ}$

559. $\frac{2 \cos 40^{\circ} - \cos 20^{\circ}}{\sin 20^{\circ}}$

560. $-2\sqrt{2} \sin 10^{\circ} \left(2 \sin 35^{\circ} - \frac{\sec 5^{\circ}}{2} - \frac{\cos 40^{\circ}}{\sin 5^{\circ}} \right)$

561. $\cos^2 73^{\circ} + \cos^2 47^{\circ} + \cos 73^{\circ} \cos 47^{\circ}$

562. $\sin 6^{\circ} - \sin 42^{\circ} - \sin 66^{\circ} + \sin 78^{\circ}$

563. $\frac{\cos^2 33^{\circ} - \cos^2 57^{\circ}}{\sin 21^{\circ} - \cos 21^{\circ}}$

564. $6 \cos 40^{\circ} - 8 \cos^3 40^{\circ}$

565. $\tan^6 20^{\circ} - 33 \tan^4 20^{\circ} + 27 \tan^2 20^{\circ} - 3$

566. $\cot^2 36^{\circ} \cot^2 72^{\circ}$

567. គណនា

$$A = \tan^6 \frac{\pi}{18} + \tan^6 \frac{5\pi}{18} + \tan^6 \frac{7\pi}{18}$$

568. គណនា

$$P = \left(1 - 4 \cos^2 \frac{\pi}{1999} \right) \left(1 - 4 \cos^2 \frac{2\pi}{1999} \right) \left(1 - 4 \cos^2 \frac{3\pi}{1999} \right) \dots \left(1 - 4 \cos^2 \frac{999\pi}{1999} \right)$$

II. សមភាព

បង្ហាញសមភាព

569. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1$

570. $\frac{\sin^2 \alpha - \tan^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - \cot^2 \alpha} = \tan^6 \alpha$

571. អោយ α, β, γ ជាមុំនៃត្រីកោណ។ ចូរបង្ហាញថា $\sin \alpha \sin \beta - \cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta$ ។

បង្ហាញសមភាព

572. $(\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$

573. $1 - \sin \alpha = 2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right)$

574. $\frac{1 - 2 \sin^2 \alpha}{2 \cot\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)} = 1$
575. $\frac{1 - 2 \sin^2 \beta}{1 + \sin 2\beta} = \frac{1 - \tan \beta}{1 + \tan \beta}$
576. $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$
577. $\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \tan 2\alpha + \sec 2\alpha$
578. $\frac{\sin^4 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha - \cos^4 \alpha}{\tan 2\alpha - 1} = \cos 2\alpha$
579. $\frac{\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)}{1 - \tan^2 \alpha \cot^2 \beta} = -\cos^2 \alpha \sin^2 \beta$
580. $3 - 4 \cos 2\alpha + \cos 4\alpha = 8 \sin^4 \alpha$
581. $\cos^4 \alpha = \frac{1}{8} \cos 4\alpha + \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \frac{3}{8}$
582. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos^2 2\alpha)$
583. $4(\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha) = 1 + 3 \cos^2 2\alpha$
584. $8\left(\sin^8 \frac{\alpha}{2} + \cos^8 \frac{\alpha}{2}\right) = 1 + 6 \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha$

បង្ហាញសមភាព

585. $\frac{2 \sin \alpha + \sin 4\alpha}{2(\cos \alpha + \cos 3\alpha)} = \tan 2\alpha \cos \alpha$
586. $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha + \sin 2\alpha = \sqrt{2} \cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$

$$587. \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) + \cos^2 \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) = \frac{3}{2}$$

$$588. \quad \sin^2 \alpha + \cos \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) = \frac{1}{4}$$

$$589. \quad \log_{1/3} [\cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2(\alpha - \beta) - \cos 2\alpha \cos 2\beta] = 0$$

$$590. \quad \frac{\cot^2 2\alpha - 1}{2 \cot 2\alpha} - \cos 8\alpha \cot 4\alpha = \sin 8\alpha$$

$$591. \quad 16 \sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = 1$$

$$592. \quad \sin^2 \alpha \cos^4 \alpha = \frac{1}{16} + \frac{1}{32} \cos 2\alpha - \frac{1}{16} \cos 4\alpha - \frac{1}{32} \cos 6\alpha$$

$$593. \quad \sin 9\alpha + 3 \sin 7\alpha + 3 \sin 5\alpha + \sin 3\alpha = 8 \sin 6\alpha \cos^3 \alpha$$

$$594. \quad \tan(\alpha - \beta) + \tan(\beta - \gamma) + \tan(\gamma - \alpha) = \tan(\alpha - \beta) \tan(\beta - \gamma) \tan(\gamma - \alpha)$$

$$595. \quad \sqrt{1 + \sin \alpha} - \sqrt{1 - \sin \alpha} = 2 \sin \frac{\alpha}{2}; 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$596. \quad \text{ចូរបង្ហាញថា}$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}} = 2 \cos \frac{p}{2^n + 1}$$

(ក្នុងនោះមានបួស n ដង) ចំពោះ $n \in \mathbb{N}$ ។

$$597. \quad \text{គេអោយ ចំនួនគត់វិជ្ជមាន } n \text{ ។ ចូរបង្ហាញថា មានពហុធា } T_n \text{ មួយ ដែល } \cos nx = T_n(\cos x) \text{ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត } x \text{ ។ ពហុធា } T_n \text{ នេះ គេហៅថា ពហុធា Tchebychev។}$$

$$598. \quad \text{គេអោយចំនួនពិត } x \text{ ផ្ទៀងផ្ទាត់}$$

$$(3 + 2\sqrt{2})^x = (\sqrt{2} - 1)^x + 3$$

$$\text{ចូរបង្ហាញថា } (\sqrt{2} + 1)^x = 2 \cos \frac{\pi}{9}$$

$$599. \quad \text{ចូរបង្ហាញថា}$$

$$\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} = \frac{7}{4}$$

III. សមីការ

ដោះស្រាយសមីការ

600. $\cos(1,5\pi + x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi) \cos x$

601. $2 \sin x \cos x + \sqrt{3} - 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$

602. $\sin 2x = (\cos x - \sin x)^2$ 603. $\tan^3 3x - 2 \sin^3 3x = 0$

604. $2 \tan x \cos x + 1 = 2 \cos x + \tan x$

605. $\sin x + \cos^2 x = 1/4$ 606. $3 \cos x = 2 \sin^2 x$

607. $6 \cos^2 x + 13 \sin x = 12$ 608. $3 \cos^2 x - 4 \cos x - \sin^2 x - 2 = 0$

609. $\cos^4 \frac{x}{5} + \sin^2 \frac{x}{5} = 1$ 610. $\sin x - \frac{|2 \cos x - 1|}{2 \cos x - 1} \sin^2 x = \sin^2 x$

611. $\tan^2 x - 4 \tan x + 3 = 0$ 612. $2 \tan x - 2 \cot x = 3$

613. $\frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} = 4 \tan x$ 614. $\frac{1}{\sin^2 x} = \cot x + 3$

615. $2 \cos x (\cos x - \sqrt{8} \tan x) = 5$

616. $\left(\cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{6}\right) (\sec x + \tan x) = \sin \frac{\pi}{4} \cos x$

617. $\log_2(3 \sin x) - \log_2 \cos x - \log_2(1 - \tan x) - \log_2(1 + \tan x) = 1$

618. $\sin^4 2x + \cos^4 2x = \sin 2x \cos 2x$

619. $\sin^4 x + \cos^4 x - 2 \sin 2x + \frac{3}{4} \sin^2 2x = 0$

620. $\sin^4 x + \cos^4 x + \sin 2x + a = 0$

621. $\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{2}{\sin x \cos x} - 4 = 0$

622. $\tan 5x + 2 \sin 10x = 5 \sin 5x$

623. $\cos 2x - 3 \sin x + 2 = 0$

624. $\cos(10x + 12) + 4\sqrt{2} \sin(5x + 6) = 4$

625. $6 \sin^2 x + 2 \sin^2 2x = 5$

626. $\cos^3 x + \cos^2 x - 4 \cos^2 \frac{x}{2} = 0$
627. $4 \cos x (2 - 3 \sin^2 x) = -(1 + \cos 2x)$
628. $\tan^3 x - 1 + \frac{1}{\cos^2 x} - 3 \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 3$
629. $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0$
630. $\sin x = 5 \cos x$ 631. $\sin x - \cos x = 0$
632. $\sin x + \cos x = 0$ 633. $|\sin x| = \sin x + 2 \cos x$
634. $\cos^2 x - 4 \sin x \cos x = 0$
635. $\sin x + \sin 2x = \cos x + 2 \cos^2 x$
636. $\sin 2x - \sin^2 x = 2 \sin x - 4 \cos x$
637. $\tan x + \sin(\pi + x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$
638. $(1 + \sin 2x)(\cos x - \sin x) = \cos x + \sin x$
639. $3(\cos x - \sin x) = 1 + \cos 2x - \sin 2x$
640. $\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0$
641. $2 \cos^2 x + 3 \sin 2x - 8 \sin^2 x = 0$
642. $3 \sin^2 x + 5 \cos^2 x - 2 \cos 2x - 4 \sin 2x = 0$
643. $2 \sin^2 x - 5 \sin x \cos x - 8 \cos^2 x = -2$
644. $\frac{1}{\cos x} = 4 \sin x + 6 \cos x$ 645. $\sin^3 x + 4 \cos^3 x = 0$
646. $\sin^2 x (1 + \tan x) = 3 \sin x (\cos x - \sin x) + 3$
647. $\sin^4 x + \sin^3 x \cos x + \sin^2 x \cos^2 x + \sin x \cos^3 x + \cos^4 x = 1$
648. $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 649. $\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$

650. $\sin 5x = \sqrt{3}(1 + \cos 5x)$ 651. $\cos x + \sin x = 1$
652. $\sin x + \cos x \cot \frac{x}{2} = -\sqrt{3}$ 653. $\sin|x| \tan 5x = \cos x$
654. $(\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x)^2 - 5 = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$
655. $\cos 6x + \tan^2 x + \cos 6x \tan^2 x = 1$
656. $\frac{\tan 2x + \tan x}{1 - \tan 2x \tan x} = -1$ 657. $\frac{\tan 3x - \tan 2x}{1 + \tan 3x \tan 2x} = 1$
658. $2 \tan 3x - 3 \tan 2x = \tan^2 2x \tan 3x$
659. $\cot x + \cot 15^\circ + \cot(x + 25^\circ) = \cot 15^\circ \cot x \cot(x + 25^\circ)$
660. $\sin x + \tan \frac{x}{2} = 0$ 661. $1 + \cos x + \tan \frac{x}{2} = 0$
662. $\tan 2x + \cot x = 4 \sin 2x$ 663. $15 \cot \frac{x}{2} + 130 \sin x = \frac{53}{3} \tan \frac{x}{2}$
664. $\frac{59}{4} \cos x + 6 \sin x \tan \frac{x}{2} = 4 \tan x \cot \frac{x}{2}$
665. $2 \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \sin^2 x - \tan x$
666. $\cos 3x = -2 \cos x$ 667. $\cos 9x - 2 \cos 6x = 2$
668. $\cos 4x = \cos^2 3x$ 669. $3 \sin \frac{x}{3} = \sin x$
670. $\sin 6x + 2 = 2 \cos 4x$ 671. $\sin \frac{3}{2}x + 3 \sin x = 3 \sin \frac{x}{2}$
672. $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}x\right) = 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$
673. $3 \cos x + 3 \sin x + \sin 3x - \cos 3x = 0$
674. $a \cos x + b \sin x = c, a^2 + b^2 \neq 0$
675. $\sin x + \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$ 676. $\sin 4x - \sin 2x = 0$

677. $\sin^2 x - \cos^2 x = \cos \frac{x}{2}$ 678. $\cos 2x - \cos 6x = 0$
679. $\cos(3x - 4\pi) = \sin(\pi - x)$ 680. $\sin \pi x^2 = \sin \pi(x^2 + 2x)$
681. $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
682. $1 + \sin 2x = (\sin 3x - \cos 3x)^2$ 683. $\cos 5x + \cos 7x = \cos(\pi + 6x)$
684. $\frac{\cos x - \cos 3x}{2\sqrt{3} \sin^2 x}$ 685. $\sin x + \sin 3x + 4 \cos^3 x = 0$
686. $\cos x - \cos 2x = \sin 3x$ 687. $\sin x + 2 \sin 2x = -\sin 3x$
688. $\frac{\sin x + \sin 2x}{\sin 3x} = -1$ 689. $\sqrt{2} \sin 10x + \sin 2x = \cos 2x$
690. $\cot x \sin 2x - \cos 2x = 1$
691. $\tan 2x \cos 3x + \sin 3x + \sqrt{2} \sin 5x = 0$
692. $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 3 \sin\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{8}\right) + \sqrt{3} \cos\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{8}\right)$
693. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$
694. $\cos 9x - \cos 7x + \cos 3x - \cos x = 0$
695. $\cos 5x - \sin 5x = \sin 7x - \cos 7x$
696. $\sin 7x + \cos^2 2x = \sin^2 2x + \sin x$
697. $\cos 2x - \sin 3x - \cos 8x = \sin 10x - \cos 5x$
698. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 1 + \cos x + \cos 2x$
699. $5 \sin x + 6 \sin 2x + 5 \sin 3x + \sin 4x = 0$
700. $\operatorname{cosec} x - \operatorname{cosec} 2x = \operatorname{cosec} 4x$

701. $\tan 3x - \tan x = 0$ 702. $\tan x + \tan 2x - \tan 3x = 0$
703. $\cos 3x \cos 6x$
 $= \cos 4x \cos 7x$ 704. $\sin 2x \sin 6x = \cos x \cos 3x$
705. $\cos 3x \sin 7x$
 $= \cos 2x \sin 8x$ 706. $\sin 5x \cos 3x = \sin 6x \sin 2x$
707. $\sin\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$
708. $\sin^2 x + \sin^2 2x = \sin^2 3x$
709. $\cos^2 x + \cos^2 2x \cos^2 3x + \cos^2 4x = 2$
710. $\sin 7x + \sin 9x = 2 \left[\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + 2x\right) \right]$
711. $\sin^2 2x + \sin^2 x = \frac{9}{16}$
712. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \frac{1}{2} \cot \frac{x}{2}$
713. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = -0,5$
714. $\sin^3 x \cos 3x + \cos^3 x \sin 3x + 0,375 = 0$
715. $\cos^3 x \cos 3x + \sin^3 x \sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{4}$
716. $\sin x \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \frac{1}{8}$
717. $8 \cos x \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + 1 = 0$
718. $\tan x \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \tan\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$
719. $\sin 3x = 4 \sin x \cos 2x$ 720. $\sin 3x \cos x = 1,5 \tan x$
721. $\tan x \cot 3x = 4$ 722. $6 \tan x + \frac{5}{\tan 3x} = \tan 2x$
723. $\sin x \cos x \sin 3x - \cos 3x \sin^2 x = 6 \cot x$

724. $2 \sin 3x \sin x + (3\sqrt{2} - 1) \cos 2x = 3$
725. $2 \cos 4x + 5 \cos 2x - 1 = 2 \sin^2 x$
726. $2 + \cos 4x = 5 \cos 2x + 8 \sin^6 x$
727. $\tan^2 x + \cos 4x = 0$
728. $\tan x + \cot x - \cos 4x = 3$
729. $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$
730. $\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} = 4 \sin\left(x + \frac{5\pi}{4}\right)$
731. $1 + \tan x = 2\sqrt{2} \sin x$
732. $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \sin x \cos x)$
733. $\sin x + \sin^2 x + \cos^3 x = 0$
734. $\sin \frac{\sqrt{x}}{2} + \cos \frac{\sqrt{x}}{2} = \sqrt{2} \sin \sqrt{x}$
735. $\sin^2 x + 2 \tan^2 x + \frac{4}{\sqrt{3}} \tan x - \sin x + \frac{11}{12} = 0$
736. $8 \cos x + 6 \sin x - \cos 2x - 7 = 0$
737. $\sin^4 x + \sin^4\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + \cos^4 x = 0,5 \sin^2 2x$
738. $\left(\cos \frac{x}{4} - 2 \sin x\right) \sin x + \left(1 + \sin \frac{x}{4} - 2 \cos x\right) \cos x = 0$
739. $3 \sin 3x = \cos 4x - \sin 9x - \cos 10x$

740. $\tan x + \frac{1}{9} \cot x = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1} - 1$
741. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2 + \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x}$
742. $\sqrt{2 \cos 2x + 2} = \frac{3}{\sqrt{1 + 4 \cos 2x}}$
743. $\sqrt{\sin x} + \sqrt[4]{2} \cos x = 0$
744. $\sin x + \sqrt{\cos x} = 0$
745. $2 \cos x = \sqrt{2 + 2 \sin 2x}$
746. $\sqrt{\cos^2 x - \cos^2 3x} = \sin 2x$
747. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{0,5 + \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}$
748. $\sqrt{1 + 4 \sin x \cos x} = \cos x - \sin x$
749. $\sqrt{\cos 2x - \sin 4x} = \sin x - \cos x$
750. $\sqrt{\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}} = \sin x + \cos x$
751. $4 \sin 3x + 3 = \sqrt{2 \sin 3x + 2}$
752. $\sqrt{13 - 18 \tan x} = 6 \tan x - 3$
753. $\sqrt{1 + 8 \sin 2x \cos^2 2x} = 2 \sin(3x + \pi/4)$
754. $2\sqrt{3 \sin x} = \frac{3 \tan x}{2\sqrt{\sin x} - 1} - \sqrt{3}$
755. $\sqrt{\sqrt{3} \cos x + \sin x - 2} + \sqrt{\cot 3x + \sin^2 x - \frac{1}{4}} = \sin \frac{3x}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$756. \quad \log_5 \tan x = (\log_5 4) \log_4 (3 \sin x)$$

$$757. \quad \log_9 \sin 2x = \log_3 \sqrt{\frac{\sin x}{5}}$$

$$758. \quad 2^{\cos 2x} = 3 \cdot 2^{\cos^2 x} - 4$$

$$759. \quad \cot 2^x = \tan 2^x + 2 \tan 2^{x+1}$$

$$760. \quad x^{3 \sin 2x+2} = \sqrt{x}$$

$$761. \quad \text{តើសមីការ } 1 + \cos 2x + \sin 2x = 0 \text{ និងសមីការ}$$

$$1 + \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} + \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = 0$$

ដូចគ្នាដែររឺទេ?

$$762. \quad \text{ចូរកំនត់តំលៃ } p \text{ ដើម្បីអោយសមីការ } \sqrt{p} \cos x - 2 \sin x = \sqrt{2} + \sqrt{2-p} \text{ មានចំណើយ។}$$

$$763. \quad \text{ចូរកំនត់តំលៃ } a, b \text{ ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមពិតចំពោះគ្រប់ } x$$

$$a(\cos x - 1) + b^2 = \cos(ax + b^2) - 1$$

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$764. \quad \begin{cases} x - y = 6,5\pi \\ 3 \cos^2 x - 12 \cos y = -4 \end{cases}$$

$$765. \quad \begin{cases} x + y = \frac{2}{3}\pi \\ \frac{\sin x}{\sin y} = 2 \end{cases}$$

$$766. \quad \begin{cases} x + y = \pi/4 \\ \cos x + \cos y = a \end{cases}$$

$$767. \quad \begin{cases} \sin 3x \cos 2y = 2^a - \cos 3x \sin 2y \\ \cos(x - y) = 0,5 \end{cases}$$

$$768. \quad \begin{cases} \sin x \sin y = \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{4} \end{cases}$$

769.
$$\begin{cases} \tan x + \tan y = 2 \\ \cos x \cos y = 0,5 \end{cases}$$
770.
$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{4} \\ 3 \tan x = \tan y \end{cases}$$
771.
$$\begin{cases} \tan x - 2 \sin y = -2 \\ 5 \tan x + 2 \sin y = -4 \end{cases}$$
772.
$$\begin{cases} 4 \sin y - 6\sqrt{2} \cos x = 5 + 4 \cos^2 y \\ \cos 2x = 0 \end{cases}$$
773.
$$\begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \cos y = \frac{a+3}{3} \\ \sin x \cos y = -\frac{a}{3} \end{cases}$$
774.
$$\begin{cases} \frac{1}{\cos x} - \tan y = 2a + 2 \\ \tan y + (a^2 + 2a) \cos x = 0 \end{cases}$$
775.
$$\begin{cases} \sin^2(-2x) - (3 - \sqrt{2}) \tan 5y = (3\sqrt{2} - 1)/2 \\ (3 - \sqrt{2}) \sin(-2x) + \tan^2 5y = (3\sqrt{2} - 1)/2 \end{cases}$$
776. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ
- $$\begin{cases} \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z = m^2 \\ \tan^3 x + \tan^3 y + \tan^3 z = m^3 \end{cases}$$

V. វិសមភាព

777. ចូរបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$ គេមាន
- $$\tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) + \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) > 1$$
778. គេអោយត្រីកោណមិនកែង ABC ។ ចូរបង្ហាញថា
- $$3 \tan^2 A \tan^2 B \tan^2 C - 5(\tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C) \leq 9 + \tan^2 B \tan^2 C + \tan^2 C \tan^2 A$$
779. ចូរបង្ហាញថា
- $$\frac{1 - \sin \frac{\pi}{14}}{2 \sin \frac{\pi}{14}} > \sqrt{3 \cos \frac{\pi}{7}}$$
780. គេអោយ $2n$ ចំនួនពិត $x_1; x_2; \dots; x_{2n} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ ចូរកំណត់លំដាប់ផុតនៃ $n \in \mathbb{N}^*$ ដែល

$$Y = \left(\sum_{i=1}^{2n} \sin x_i \right) \left(\sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{\sin x_i} \right) = 1800$$

781. គណនាតំលៃធំបំផុតនៃ

$$T = \tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4}$$

ដែល A, B, C ជាមុំបីនៃត្រីកោណមួយ។

782. តាង n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ និងចំនួនពិត x ដែល $0 < (n+1)x < \pi/2$ ចូរបង្ហាញថា

$$(1 - \cos^n x)(1 + \cos^n x) < \tan nx \sin x$$

783. គេអោយ A, B, C ជាមុំក្នុងនៃត្រីកោណមួយ។ ចូរបង្ហាញថា

$$27 \left(\tan \frac{A}{2} \tan^2 \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan^2 \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan^2 \frac{A}{2} \right) < 4 \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

784. តាង A, B, C ជាមុំនៃត្រីកោណ ABC ។ គណនាតំលៃធំបំផុតនៃ $\sin C$ បើ

$$\frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = m, \quad m > \frac{1}{2}$$

785. គេអោយ អនុគមន៍ $f(x)$ ដែល $f(\tan 2x) = \tan^4 x + \cot^4 x$ ។ ចូរបង្ហាញថា $f(\sin x) +$

$f(\cos x) \geq 196$ ។

786. គេអោយត្រីកោណ ABC មាន $A > B > C$ ។ គណនាតំលៃតូចបំផុតនៃ

$$y = \sqrt{\frac{x - \sin A}{x - \sin C}} + \sqrt{\frac{x - \sin B}{x - \sin C}} - 1$$

VI. វិសមីការ

ដោះស្រាយវិសមីការ

787. $2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x - 3 > 0$

788. $\cos 2x + 5 \cos x + 3 \geq 0$

789. $\tan^2 x + (2 - \sqrt{3}) \tan x - 2\sqrt{3} < 0$

790. $\cot^2 x + \cot x \geq 0$

791. $2(\sqrt{2} - 1) \sin x - 2 \cos 2x + 2 - \sqrt{2} < 0$

792. $\cos \pi x + \sin \left(\pi x - \frac{\pi}{4} \right) > 0$

793. $\cos^3 x \sin 3x + \cos 3x \sin^3 x < \frac{3}{8}$
794. $\cos x \cos 2x \cos 3x \leq 0$
795. $\sin^4 \frac{x}{3} + \cos^4 \frac{x}{3} > \frac{1}{2}$
796. $\sin^6 x + \cos^6 x > \frac{5}{8}$
797. $8\sin^6 x - \cos^6 x > 0$
798. $\tan x \tan 3x < -1$
799. $3 \sin 2x - 1 > \sin x + \cos x$
800. $\sin 2x > \sqrt{2} \sin^2 x + (2 - \sqrt{2}) \cos^2 x, 0 < x < 2\pi$
801. $|\sin x| > \cos^2 x$
802. $\sqrt{5 - 2 \sin x} \geq 6 \sin x - 1$
803. $1 - \cos x < \tan x - \sin x$
804. $9^{1+\sin^2 \pi x} + 30.9^{\cos^2 \pi x} \leq 117$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

805. ចូរកំនត់ m ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធមានរឹសតែមួយគត់

$$\begin{cases} (4 - 6m) \sin^3 x + 3(2m - 1) \sin x + 2(m - 2) \sin^2 x \cdot \cos x - (4m - 3) \cos x = 0 \\ 0 \leq x \leq \pi/4 \end{cases}$$

៤. តប្បដាន

I. គណនា

806. កំនត់ពហុធា $P(x)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$P(u^2 - v^2) = P(u + v) \cdot P(u - v)$$

ចំពោះគ្រប់ $u, v \in \mathbb{R}$ ។

807. កំនត់ពហុធា $P(x)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$P(x + 1) = P(x) + 2x + 1$$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

808. កំនត់ពហុធា $P(x)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$P((x + 1)^2) = P(x^2) + 2x + 1$$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

809. (កាលករណ៍ ១៩៧០)

គេអោយពហុធា

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

ដែលមានមេគុណ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ជាចំនួនគត់ ហើយដោយដឹងថាមានចំនួនគត់បួនផ្សេងគ្នា a, b, c និង d ដែល

$$f(a) = f(b) = f(c) = f(d) = 5$$

ចូរបង្ហាញថា គ្មានចំនួនគត់ k មួយដែល $f(k) = 8$ ។

810. គេអោយពហុធាដឺក្រេទី $n \geq 1$ មានមេគុណមិនអវិជ្ជមាន និង $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{+*}$ ។

ចូរបង្ហាញថា

$$\left[P\left(\frac{x_2}{x_1}\right)\right]^2 + \left[P\left(\frac{x_3}{x_2}\right)\right]^2 + \cdots + \left[P\left(\frac{x_n}{x_{n-1}}\right)\right]^2 + \left[P\left(\frac{x_1}{x_n}\right)\right]^2 \geq n[P(1)]^2$$

៥. សមីការអនុគមន៍

I. គណនា

811. ចូរកំណត់គ្រប់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$\begin{aligned}f(f(x) + 1) &= 1 - x \\f(f(x)) &= x\end{aligned}$$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

812. គេអោយអនុគមន៍ $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

a) $f(1) = 2$

b) ចំពោះគ្រប់ $n > 1$

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$$

ចូរកំណត់ $f(n)$ ។

813. គេអោយចំនួនគត់វិជ្ជមាន n ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$$f(xf(y)) = x^n f(f(y))$$

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}$ ។

814. គេអោយថេរចំនួនពិតបី a, b, c ដែលមិនសូន្យទាំងបីព្រមគ្នា។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ដែល

$$af(x^2 + yz) + bf(y^2 + zx) + cf(z^2 + xy) = 0$$

ចំពោះគ្រប់ $x, y, z \in \mathbb{R}$ ។

815. ចូរកំណត់លក្ខខណ្ឌលើចំនួនវិជ្ជមាន p, q ដើម្បីអោយគេអាចរកបាននូវអនុគមន៍ $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ ដែល

$$f(xf(y)) = x^p y^q$$

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}^+$ ។

816. ចូរកំណត់គ្រប់អនុគមន៍ $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ដែល

$$\begin{aligned}f(m + 19) &\geq f(m) + 19 \\f(m + 99) &\leq f(m) + 99\end{aligned}$$

ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{Z}$ ។

817. ចូរកំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$$xf(x+y) + yf(y-x) = f^2(x) + f^2(y)$$

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}$ ។

818. ចូរកំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

1) $f(1) = 1$

2) $f(x+y)[f(x) - f(y)] = f(x-y)[f(x) + f(y)]$

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{Z}$ ។

819. (ការណាដា ១៩៦៩)

តាង f ជាអនុគមន៍មួយដែលមានលក្ខណៈដូចតទៅនេះ

a) $f(n)$ មានន័យចំពោះគ្រប់ ចំនួនគត់វិជ្ជមាន n ;

b) $f(n)$ ជាចំនួនគត់;

c) $f(2) = 2$;

d) $f(mn) = f(m)f(n)$ ចំពោះគ្រប់ m និង n ;

e) $f(m) > f(n)$ ចំពោះគ្រប់ $m > n$ ។

ចូរបង្ហាញថា $f(n) = n$ ។

820. គេអោយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$$0 < 2f^2(xy) \leq f(x)f(y^3) + f(x^3)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$
$$f(1999) > 0$$

ចូរបង្ហាញថា $f(2000) > 0$ ។

១. អនុគមន៍ជ័យ

I. គណនា

1. $1/2$. ▲ យើងមាន

$$: a^2 + b^2 + c^2 = 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = 1 - c^2$$

$$: a + b + c = 0 \Leftrightarrow a + b = -c \Rightarrow (a + b)^2 = c^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2ab = c^2;$$

$$\Rightarrow 1 - c^2 + 2ab = c^2 \Rightarrow ab = \frac{2c^2 - 1}{2}$$

$$: a^4 + b^4 + c^4 = (a^2 + b^2)^2 + c^4 - 2(ab)^2 = (1 - c^2)^2 + c^4 - 2\left(\frac{2c^2 - 1}{2}\right)^2 = c^4 - 2c^2 + 1 - 2c^4 + 2c^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ ។}$$

2. $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$.

3. $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ▲ យើងមាន

$$(1 + 1)^4 = 2^4 = 1^4 + 4 \cdot 1^3 \cdot 1 + 6 \cdot 1^2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 1^3 + 1^4$$

$$(2 + 1)^4 = 3^4 = 2^4 + 4 \cdot 2^3 \cdot 1 + 6 \cdot 2^2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 2 \cdot 1^3 + 1^4$$

$$(n + 1)^4 = n^4 + 4 \cdot n^3 \cdot 1 + 6 \cdot n^2 \cdot 1^2 + 4 \cdot n \cdot 1^3 + 1^4$$

ប្រកសមភាពទាំងអស់នេះធ្វើជា យើងទាញបានផលបូកដែលចង់បាន។

4.4 ▲ គុណ S នឹង $(2 - 1)$ យើងទាញបាន

$$S = (2 - 1)(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1) \dots (2^{1024} + 1) + 1$$

$$= (2^2 - 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1) \dots (2^{1024} + 1) + 1$$

$$= (2^4 - 1)(2^4 + 1) \dots (2^{1024} + 1) + 1$$

$\vdots$

$$= (2^{1024} - 1)(2^{1024} + 1) + 1$$

$$= 2^{2048} - 1 + 1 = 2^{2048}$$

$$\text{ដូច្នេះ } S^{1/1024} = 4 \text{ ។}$$

5. $(n + 1)! - 1$ ▲ យើងមាន $k \cdot k! = (k + 1)! - k!$ ចំពោះ $k = 1, 2, 3 \dots$ ។ ដូច្នេះ

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + (n - 1) \cdot (n - 1)! + n \cdot n!$$

$$= (2! - 1!) + (3! - 2!) + (4! - 3!) + \dots + (n! - (n - 1)!) + ((n + 1)! - n!)$$

$$= (n+1)! - 1$$

6. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} S \cdot 2000! &= \binom{2000}{1} + \binom{2000}{3} + \cdots + \binom{2000}{1997} + \binom{2000}{1999} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2000} \binom{2000}{i} = \frac{1}{2} (1+1)^{2000} = 2^{1999} \\ S &= \frac{2^{1999}}{2000!} \end{aligned}$$

រំលឹក៖ រូបមន្តទ្វេធាញ្ចវត្ថុ

$$(a+b)^n = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

7.0 ▲ សន្មតថា u, v, s, t ជាវិសមនៃពហុធា

$$f(x) = x^4 - ax^3 + bx^2 - cx + d$$

តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ែត យើងទាញបាន

$$u+v+s+t=a; uv+vs+st+tu+us+vt=b; uvs+vst+stu=c, uvst=d$$

ដោយ $u+v+s+t=0$ នោះ $a=0$ ។ ដូច្នេះ $f(x) = x^4 + bx^2 - cx + d$ ។ តាង

$$S_n = u^n + v^n + s^n + t^n$$

យើងមាន

$$S_1 = u+v+s+t=0;$$

$$S_2 = u^2 + v^2 + s^2 + t^2 = (u+v+s+t)^2 - 2(uv+vs+st+tu+us+vt) = -2b$$

ដើម្បីគណនា S_3 យើងពិនិត្យករណីខាងក្រោម។

- ករណី u, v, s, t សុទ្ធតែខុសពីសូន្យទាំងអស់។ ដូច្នេះ

$$u^3 + bu - c + \frac{d}{u} = 0; \quad v^3 + bv - c + \frac{d}{v} = 0$$

$$s^3 + bs - c + \frac{d}{s} = 0; \quad t^3 + bt - c + \frac{d}{t} = 0$$

$$\Rightarrow S_3 + bS_1 - 4c + d \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right) = 0$$

$$\Rightarrow S_3 - 4c + d \frac{c}{d} = 0$$

$$\Rightarrow S_3 = 3c$$

- ករណីក្នុងចំណោម u, v, s, t មានមួយស្មើសូន្យ។ សន្មតថាជា u ។ ដូច្នេះ $d=0$ ហើយ

$$f(x) = x^4 + bx^2 - cx = x(x^3 + bx - c)$$

ដូច្នេះ v, s, t ជាវិសមនៃសមីការ $x^3 + bx - c = 0$ ។ ដូច្នេះ

$$v^3 + bv - c = 0; s^3 + bs - c = 0; t^3 + bt - c = 0$$

$$\Rightarrow S_3 + b(u + v + s + t) - 3c = 0;$$

$$\Rightarrow S_3 = 3c$$

ក្នុងករណីទាំងពីរ យើងមាន $S_3 = 3c$ ។

យើងមាន

$$u^4 + bu^2 - cu + d = 0; v^4 + bv^2 - cv + d = 0;$$

$$s^4 + bs^2 - cs + d = 0; t^4 + bt^2 - ct + d = 0$$

$$\Rightarrow S_4 + bS_2 - cS_1 + d = 0$$

$$\Rightarrow S_4 = 2b^2 - 4d$$

យើងមាន $x^4 + bx^2 - cx + d = 0$ ដោយគុណអង្គទាំងពីរនឹង x^n យើងទាញបាន

$$x^{n+4} + bx^{n+2} - cx^{n+1} + dx^n = 0$$

$$\Rightarrow S_{n+4} + bS_{n+2} - cS_{n+1} + dS_n = 0$$

យើងទាញបាន

$$S_5 = -bS_3 + cS_2 + dS_1 = -5bc$$

$$S_7 = -bS_5 + cS_4 - dS_3 = 7c(b^2 - d)$$

ដោយ $S_7 = 0$ នោះ $c = 0$ រឺ $b^2 = d$ ។

- ករណី $b^2 = d$ យើងទាញបាន

$$0 \leq S_4 = 2b^2 - 4d = -2b^2 \leq 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow d = 0$$

$$\Rightarrow S_4 = 0 \Rightarrow u = v = s = t = 0 \Rightarrow P = 0$$

- ករណី $c = 0$ នោះ u, v, s, t ជាសំនុំឫសនៃសមីការ $x^4 + bx^2 + d = 0$ ដូច្នេះវាត្រូវតែ
 $t = -u$ រឺ $t = -v$ រឺ $t = -s$ ។ ដូច្នេះ $P = 0$ ។

II. សមភាព

8.▲ ចំពោះ $n = 1$ យើងទាញបាន $1^2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$ ពិត។ សន្មតថាពិតដល់ k មានន័យថា $1^2 + 2^2 + \dots +$

$k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ ។ យើងទាញបាន $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} +$

$(k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+1+1)(2(k+1)+1)}{6}$ ។ ដូច្នេះតាមវិធានដោយកំនើន យើងទាញបានសមមភាពពិត

ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

9.● ស្រាយបញ្ជាក់តាមកំនើន។

10.● ស្រាយបញ្ជាក់តាមកំនើន។

11.● ស្រាយបញ្ជាក់តាមកំនើន។

12.▲ តាង $a = \tan x, b = \tan y, c = \tan z$ ដែល $x, y, z \neq \frac{k\pi}{4}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ k ។

លក្ខខណ្ឌ $a + b + c = abc$ ក្លាយជា $\tan(x + y + z) = 0$ ។ យើងមាន

$$\tan(2x + 2y + 2z) = \frac{2 \tan(x + y + z)}{1 - \tan^2(x + y + z)} = 0$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} \tan 2x + \tan 2y + \tan 2z &= \tan 2x \tan 2y \tan 2z \\ \Rightarrow \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} + \frac{2 \tan y}{1 - \tan^2 y} + \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z} \\ &= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \frac{2 \tan y}{1 - \tan^2 y} \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z} \end{aligned}$$

ដូច្នេះសមភាពពិត។

13.▲ តាង $k = a_1/b_1 = a_2/b_2 = a_3/b_3$ នោះ

$$\begin{aligned} p_1 a_1^n + p_2 a_2^n + p_3 a_3^n &= k^n (p_1 b_1^n + p_2 b_2^n + p_3 b_3^n) \\ &= \left(\frac{a_1}{b_1}\right)^n (p_1 b_1^n + p_2 b_2^n + p_3 b_3^n) \end{aligned}$$

នាំអោយសមភាពពិត។

III. សមីការ

14. $\{-2; -1; 1\}$. 15. $\{-3; 2\}$. 16. $\{3\}$. 17. $\{1\}$. 18. $\{-1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\}$. 19. $\{\frac{1}{2}\}$. 20.

$\{-\sqrt{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \sqrt{2}\}$. ● តាង $x^2 = y$ ។ 21. $\{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$. 22. $\{-1; 1\}$.

23. $\{2\}$. ▲ តាង $2x - 3 = y + c$ និង $2x - 5 = y - c$ ។ យើងទាញបាន $c = 1$ ។ ជំនួសចូល
សមីការ យើងទាញបាន $(y + 1)^4 + (y - 1)^4 = 2$ សមមូលនឹង $y^4 + 6y^2 = 0$ ។ យើងទាញបាន
 $y = 0$ នាំអោយ $x = 2$ ។

24. $\{-\frac{1}{2}; 1\}$. 25. $\{-\frac{a(\sqrt{13}+1)}{2}; \frac{a(\sqrt{13}-1)}{2}/a \in \mathbb{R}\}$. ● តាង $x^2 + ax = y$ ។ 26. $\{-\frac{\sqrt{21}+5}{6}; \frac{\sqrt{21}-5}{6}\}$

27. $\{-\sqrt{2}; 4 - \sqrt{18}; \sqrt{2}; 4 + \sqrt{18}\}$. ● តាង $x - \frac{2}{x} = y$ ។ សមីការសមមូលនឹង $y^2 - 8y = 0$ ។

28. $\{-\frac{3}{2}; -\frac{\sqrt{7}+1}{4}; \frac{\sqrt{7}-1}{4}; 1\}$. ● ចែកអង្គទាំងពីរនឹង x^2 បន្ទាប់មកតាង $2x - \frac{3}{x} = y$ ។ 29. $\{\frac{1}{2}; 2\}$

30. $\{-1; 9; \frac{5-\sqrt{61}}{2}; \frac{5+\sqrt{61}}{2}\}$. ● ចែកអង្គទាំងពីរនឹង x^2 បន្ទាប់មកតាង $x - \frac{9}{x} = y$ ។

31. $\{\frac{1-\sqrt{21}}{2}; \frac{1+\sqrt{21}}{2}\}$. ● ដកអង្គទាំងពីរនឹង $\frac{10x^2}{x+5}$ យើងទាញបាន $\left(\frac{x^2}{x+5}\right)^2 + 10\frac{x^2}{x+5} - 11 = 0$ ។

32. $\{-\sqrt{7} - 1; \sqrt{7} - 1\}$. ● បង្រួមសមីការជាមុន $\left(\frac{x^2}{x-3}\right)^2 - 6\frac{x^2}{x-3} - 16 = 0$ ។

33. $\{-\frac{\sqrt{2\sqrt{2}-1}+1}{\sqrt{2}}; \frac{\sqrt{2\sqrt{2}-1}-1}{\sqrt{2}}\}$. ● បង្រួមសមីការជា $(x^2 + 1)^2 - 2(x - 1)^2 = 0$ ។

34. $\{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2\sqrt{2}-1}+1}; \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2\sqrt{2}-1}-1}\}$. ● តាង $x = 1/y$ ។

35. $\{-9; 11\}$. ● ឬក៏ $4x^2 + 400x + 1$ ទៅអង្គទាំងពីរនៃសមីការ។

36. $\{-a; a - \sqrt{a^2 + 2}; a + \sqrt{a^2 + 2} | a \in \mathbb{R}\}$. ▲ យើងទាញរក a យើងទាញបាន $a = \frac{x^2 - 2}{2x}$ រឺ $a = -x$ ។ ទាញរក x យើងទាញបានចំណេះដឹង។

37. $\{-1 - \sqrt{3 + a}; -1 + \sqrt{3 + a}\}$ ចំពោះ $a \in [-3; -1)$; $\{-1 - \sqrt{3 + a}; -1 + \sqrt{3 + a}; -1 - \sqrt{1 + a}; -1 + \sqrt{1 + a}\}$ ចំពោះ $a \in [-1; \infty)$; គ្មានរឺសចំពោះ $a \in (-\infty; -3)$. ▲ ដោះស្រាយរក a ដោយសន្មតថា x ជាធាតុនៃម៉ូឌុលៈ $a^2 - 2(x^2 - 1)a + x^4 - 6x^2 + 4x = 0$; យើងទាញបាន $a = x^2 + 2x - 2$ រឺ $a = x^2 - 2x$ ។

38. $\left\{\frac{-1-\sqrt{29}}{2}; \frac{5-\sqrt{17}}{2}; \frac{-1+\sqrt{29}}{2}; \frac{5+\sqrt{17}}{2}\right\}$. ▲ យើងសរសេរអង្គខាងស្វ្វែងនៃសមីការជា $(x^2 + ax + c)(x^2 + bx + d) = 0$

ដូច្នេះ

$x^4 + (a+b)x^3 + (ab+c+d)x^2 + (bc+ad)x + cd \equiv x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 37x - 14$
យើងទាញបាន

$$\begin{cases} a + b = -4 \\ ab + c + d = -10 \\ bc + ad = 37 \\ cd = -14 \end{cases}$$

ដោយដឹងថា a, b, c, d ជាចំនួនគត់ នោះ ពីសមីការចុងក្រោយគេ យើងទាញបាន $(c; d) = \{(-1; 14); (1; -14); (-2; 7); (2; -7)\}$ ។ យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឃើញថា $(c; d) = (2; -7)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់។ យើងទាញបាន $a = -5; b = 1$ ។ ដូច្នេះសមីការសមមូលនឹង $x^2 - 5x + 2 = 0$ រឺ $x^2 + x - 7 = 0$ ។

39. ▲ សន្មតថា $x_1 = p/q$ ដែល $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$ និង p និង q ជាចំនួនបឋមនឹងគ្នា។ ដូច្នេះ

$\frac{p^3}{q^3} + a\frac{p^2}{q^2} + b\frac{p}{q} + c = 0$ សមមូលនឹង $p(p^2 + apq + bq^2) = -cq^3$ ។ អង្គខាងស្តាំនៃសមភាពនេះចែកជាចំនឹង q ។ អង្គខាងស្វ្វែងចែកជាចំនឹង q នាំអោយនិងមានតែ $q \equiv 1$ តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះ $p^2 + apq + bq^2$ ចែកមិនជាចំនឹង q ។ ដូច្នេះសមភាពមានរាង $p(p^2 + ap + b) = -c$ យើងទាញបាន c ជាពហុគុណនៃ $p = x_1$ ។

40. ● ប្រើស្រាយបញ្ជាក់ដូចសំណួរទី 39. ។

41. ● ប្រើសមភាព $ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$.

42. $-2p$.

43. $\left\{ \sqrt[3]{\frac{\sqrt{13}+3}{2}} - \sqrt[3]{\frac{\sqrt{13}-3}{2}} \right\}$ ● តាង $x = y - 1/y$ ។ សមីការទៅជា $y^3 - \frac{1}{y^3} - 3\left(y - \frac{1}{y}\right) + 3\left(y - \frac{1}{y}\right) - 3 = 0$ រឺ $y^3 - \frac{1}{y^3} - 3 = 0$ ។ តាង $y^3 = t$ យើងទាញបាន $t^2 - 3t - 1 = 0$ ។

44. $\{-5; -1; 1; 3\}$. 45. $\{2; 6\}$. 46. $\{-1\}$.

47. គ្មានរឹសសនិទាន

48. $\{-\frac{1}{3}; 1/2\}$.

49. $\{6\}$. ▲ គុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\sqrt{x+10} - \sqrt{x-2} \neq 0$ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} \sqrt{x+10} + \sqrt{x-2} = 6 \\ \sqrt{x+10} - \sqrt{x-2} = 2 \end{cases}$$

ឬក៏អង្គទាំងពីរចូលគ្នា យើងទាញបាន $x = 6$ ។

50. សមីការគ្មានរឹស។ 51. $\{-1\}$. 52. $\{12\}$. 53. $\left\{-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{a} - a\right)^2; \frac{1}{4}\left(\frac{1}{a} - a\right)^2\right\}$ ចំពោះ $a \in (0; 1]$

ហើយគ្មានរឹសចំពោះតំលៃ a ផ្សេងទៀត។ 54. $\{-6; 1\}$. 55. $\{-1; 3\}$. 56. $\{3\}$. 57. $\{2\}$ 58. $\{5\}$.

59. $\{20\}$. 60. $\{-4/3\}$. 61. $\{-1; 0\}$. 62. $\{5\}$. 63. $\{16\}$. 64. $\{9\}$. 65. $\{-3; 6\}$. ● តាង

$y = \sqrt{x^2 - 3x + 7}$ ។ 66. $\{-9/2; 3\}$. 67. $\{1\}$. ● តាង $y = \sqrt{x} \sqrt[4]{x^2 + 15}$ ។ 68. $\{5/3\}$.

69. $\{5a/3\}$ ចំពោះ $a \neq 0$; $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ចំពោះ $a = 0$ ។ 70. $\{1\}$. 71. $\left\{3; 9\frac{9-\sqrt{97}}{8}\right\}$.

72. $\left\{5 \pm a\sqrt{8 - \frac{a^2}{2}}\right\}$ ចំពោះ $a \in [2; 2\sqrt{2}]$; គ្មានរឹសចំពោះតំលៃ a ផ្សេងពីនេះ។ ▲ តាង

$u = \sqrt{7-x}, v = \sqrt{x-3}$ ។ យើងមានប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} u + v = a \\ 7 - x + x - 3 = u^2 + v^2 = 4, (u \geq 0, v \geq 0) \end{cases}$$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការនេះ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} u_1 = \frac{a + \sqrt{8 - a^2}}{2} \\ v_1 = \frac{a - \sqrt{8 - a^2}}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} u_2 = \frac{a - \sqrt{8 - a^2}}{2} \\ v_2 = \frac{a + \sqrt{8 - a^2}}{2} \end{cases}$$

73. $\{3\}$. ▲ តាង $\sqrt[4]{x-2} = u \geq 0, \sqrt[4]{4-x} = v \geq 0$ យើងទាញបានប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} u + v = 2 \\ u^4 + v^4 = 2 \end{cases}$$

លើកសមីការទីមួយជាស្វ័យគុណ៤ និងប្រើសមីការទី២ យើងទាញបាន $uv(2(u+v)^2 - uv) = 7$
ហើយដោយ $u+v=2$ យើងទាញបាន $(uv)^2 - 8(uv) + 7 = 0$ ។ ដូច្នេះ $(uv)_1 = 1; (uv)_2 =$
 7 ។ ដូច្នេះយើងទាញបានប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} u+v=2 \\ uv=1 \end{cases} \quad \begin{cases} u+v=2 \\ uv=7 \end{cases}$$

ប្រព័ន្ធសមីការទីមួយមានរឹស $u=v=1$ ។ ត្រូវនឹង $x=3$ ។ ប្រព័ន្ធទី២គ្មានរឹស។

74. $\left\{\frac{2a+1}{a-2}\right\}$ ចំពោះ $a \in (-\infty; 3] \cup (2; \infty)$; $\emptyset$ ចំពោះ $a \in \left(\frac{1}{3}; 2\right]$.

75. $\{a+1+\sqrt{2a}; a+1-\sqrt{2a}\}$ ចំពោះ $a \in [0; 1/2]$, $\{a+1+\sqrt{2a}\}$ ចំពោះ $a \in \left(\frac{1}{2}; \infty\right)$, $\emptyset$
ចំពោះ $a \in (-\infty; 0)$.

76. $(-\infty; 0)$ ចំពោះ $a=0$, $\{0; 3a/4\}$ ចំពោះ $a \in (0; \infty)$, $\emptyset$ ចំពោះ $a \in (-\infty; 0)$.

77. $\{a^2+a; a^2-a+1\}$ ចំពោះ $a \in [0; 1]$, $\{a^2+a\}$ ចំពោះ $a \in (1; \infty)$, $\emptyset$ ចំពោះ $a \in$
 $(-\infty; 0)$.

78. $\{0\}$ ចំពោះ $a=1$, $\emptyset$ ចំពោះ $a \neq 1$. 79. $\{(1; -5)\}$. 80. $\{(1; -3)\}$. 81. $\{(-3; 1)\}$ ចំពោះ
 $a \in \{-2\}$; $\emptyset$ ចំពោះ $a \notin \{-2\}$.

82. ▲ តាង $f(x) = 4x(1-x) = 1 - (2x-1)^2$ ។ យើងឃើញថា បើ $0 \leq f(x) \leq 1$ នោះ
 $0 \leq x \leq 1$ ។ ដូច្នេះ បើ $a_{1998} = 0$ នោះ ត្រូវតែ $0 \leq t \leq 1$ ។ អ៊ីល្លូវ យើងយក $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ដែល
 $\sin \theta = \sqrt{t}$ ។ យើងសង្កេតឃើញថា ចំពោះគ្រប់ $\phi \in \mathbb{R}$ យើងមាន

$$f(\sin^2 \phi) = 4 \sin^2 \phi (1 - \sin^2 \phi) = 4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi = \sin^2 2\phi$$

ដោយ $a_1 = \sin^2 \theta$ នោះ យើងទាញបាន

$$a_2 = \sin^2 2\theta, a_3 = \sin^2 4\theta, \dots, a_{1998} = \sin^2 2^{1997} \theta$$

ដូច្នេះ $a_{1998} = 0$ ទាល់តែនិងនាំអោយ $\sin^2 2^{1997} \theta = 0$ ។ មានន័យថា $\theta = \frac{k\pi}{2^{1997}}$ ចំពោះចំនួនគត់ k
ខ្លះ ហើយ តំលៃរបស់ t ដែល $a_{1998} = 0$ ស្មើនឹង $\sin^2(k\pi/2^{1997})$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះយើង
មានតំលៃរបស់ t បែបនេះ ចំនួន $2^{1996} + 1$ គឺមានតំលៃ $\sin^2(k\pi/2^{1997})$ ចំពោះ $k =$
 $0, 1, 2, \dots, 2^{1996}$ ។

83. ▲ ដោយ $a^2 - 2b^2 = 1$ នោះ $a \neq 0$ ។ ដោយ $2b^2 - 3c^2 = 1$ នោះ $b \neq 0$ ។ បើ $c = 0$
នោះ $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ និង $a = \sqrt{2}$ ។ $(a, b, c) = (\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$ ជាចំលើយមួយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការ។ យើង
នឹងបង្ហាញថា គ្មានចំលើយណាផ្សេងទៀតទេ។

យើងសន្មតថា មានចំនួនពិត (a, b, c) ដោយ $abc \neq 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ។ យើងឃើញថា បើ
 (a, b, c) ជាចំលើយ នោះ $(-a, -b, -c)$ ក៏ជាចំលើយដែរ។ ដូច្នេះត្រូវតែមានចំនួនវិជ្ជមានពីរក្នុង

ចំពោះ (a, b, c) គឺ $(-a, -b, c)$ ។ សន្មតថា a, b វិជ្ជមាន។ តាង $a = \cot A, b = \cot B$ និង $c = \cot C$ ដែល $0 < A, B < \frac{\pi}{2}, 0 < C < \pi$ ។ ដោយ $ab + bc + ca = 1$ នោះ

$$\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$$

$$\cot C = \frac{1 - \cot A \cot B}{\cot A + \cot B} = -\cot(A + B) = \cot(\pi - A - B)$$

$$A + B + C = \pi$$

ដូច្នេះ A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណ។ យើងមាន

$$a^2 + 1 = 2(b^2 + 1) = 3(c^2 + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin^2 A} = \frac{2}{\sin^2 B} = \frac{3}{\sin^2 C}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{\sin C}$$

តាមច្បាប់ស៊ីនុស យើងទាញបានថា ជ្រុងឈមនឹងមុំ A, B, C មានរង្វាស់ $k, k\sqrt{2}, k\sqrt{3}$ រៀងគ្នា ចំពោះចំនួនពិតវិជ្ជមាន k ខ្លះ។ ដូច្នេះត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ C នាំអោយ $c = \cot C = 0$ ផ្ទុយពីសន្មតដែល $c \neq 0$ ។ ដូច្នេះការសន្មតរបស់យើងខុស ហើយ $(a, b, c) = (\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$ ជាចំណុចតែមួយគត់របស់ប្រព័ន្ធ។

84. $\left\{ \frac{4-p}{2\sqrt{4-2p}} \right\}$ ចំពោះ $\frac{4}{3} \leq p \leq 2$. ▲ យើងមាន $x \geq 0$ ។ លើកអង្គទាំងពីរជាការយើងទាញបាន

$$5x^2 - p - 4 + 4\sqrt{(x^2 - 1)(x^2 - p)} = x^2$$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{(x^2 - 1)(x^2 - p)} = (p + 4) - 4x^2$$

បើ $4x^2 \leq p + 4$ យើងលើកអង្គទាំងពីរនៃសមីការជាការម្តងទៀត យើងទាញបាន

$$-16(p + 1)x^2 + 16p = -8(p + 4)x^2 + (p + 4)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{(4 - p)^2}{4(4 - 2p)}$$

មានន័យថា $x = \frac{4-p}{2\sqrt{4-2p}}$ ។ ដើម្បីអោយតំលៃនេះជាចំណុចនៃសមីការទាល់តែ $p \leq 2$ និង

$$\frac{(4-p)^2}{4-2p} = 4x^2 \leq p + 4 \text{ សមមូលនឹង } \frac{4}{3} \leq p \leq 2 \text{ ។ ក្រៅពីនេះសមីការគ្មានចំណុច។}$$

85.▲ យើងសរសេរសមីការដែលអោយជាភាគ

$$x^5 - x^3 - 4x^2 - 3x - 2 + \lambda(5x^4 + \alpha x^2 - 8x + \alpha) = 0$$

រឺសរសេរសមីការនេះមិនអាស្រ័យនឹង λ នាំអោយនិងបើ វាជាវិសមីការរបស់សមីការ

$$x^5 - x^3 - 4x^2 - 3x - 2 = 0 \text{ និង } 5x^4 + \alpha x^2 - 8x + \alpha = 0$$

សមីការទីមួយសមមូលនឹង $(x - 2)(x^2 + x + 1)^2 = 0$ ហើយមានរឹសផ្សេងគ្នាចំនួនបី

$$x_1 = 2; x_{2,3} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \text{ ។}$$

ក) ចំពោះ $\alpha = -\frac{64}{5}$ យើងមាន $x_1 = 2$ ជាវិសមីការតែមួយគត់ ដែលមិនអាស្រ័យនឹង λ ។

១) ចំពោះ $\alpha = -3$ យើងមានសមីការដែលមិនអាស្រ័យនឹង λ គឺ $x_1 = \omega$ និង $x_2 = \omega^2$ ។

86.▲ លក្ខខណ្ឌ $2x - 1 \geq 0, \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$ និង $x \geq \sqrt{2x-1} \Rightarrow (x-1)^2 \geq 0$ ពិតជាជានិច្ច។ យើង

មាន $\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = c \Leftrightarrow c^2 = 2x + 2|x-1| = \begin{cases} 2, & 1/2 \leq x \leq 1 \\ 4x-2, & x \geq 1 \end{cases}$

ក) $c^2 = 2$ ។ សមីការមានរឹស $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ ។

ខ) $c^2 = 1$ ។ សមីការគ្មានរឹស។

គ) $c^2 = 4$ ។ សមីការទៅជា $4x - 2 = 4, \Rightarrow x = 3/2$ ។

87. {[5; 10]} ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} x + 3 - 4\sqrt{x-1} &= x - 1 - 4\sqrt{x-1} + 4 = (\sqrt{x-1})^2 - 4\sqrt{x-1} + 4 = (\sqrt{x-1} - 2)^2 \\ x + 8 - 6\sqrt{x-1} &= x - 1 - 6\sqrt{x-1} + 9 = (\sqrt{x-1} - 3)^2 \end{aligned}$$

ដូច្នេះសមីការទៅជា

$$\begin{aligned} \sqrt{(\sqrt{x-1}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-3)^2} &= 1 \\ \Rightarrow |\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| &= 1 \end{aligned}$$

បើ $\sqrt{x-1} \geq 3$ នោះ

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} - 2 + \sqrt{x-1} - 3 &= 1 \\ \Rightarrow x &= 10 \end{aligned}$$

បើ $\sqrt{x-1} - 2 \geq 0$ និង $\sqrt{x-1} - 3 \leq 0 \Rightarrow 5 \leq x \leq 10$ នោះ

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} - 2 - \sqrt{x-1} + 3 &= 1 \\ \Rightarrow 1 &= 1 \end{aligned}$$

បើ $\sqrt{x-1} - 2 \leq 0 \Rightarrow x \leq 5$ នោះ

$$-\sqrt{x-1} + 2 - \sqrt{x-1} + 3 = 1 \Rightarrow x = 5$$

88.{0; 3}▲ តាង

$$3x = x + 2x = y_1^2$$

$$x + 2y_1 = y_2^2$$

$$x + 2y_2 = y_3^2$$

... ..

$$x + 2y_{n-2} = y_{n-1}^2$$

$$x + 2y_{n-1} = y_n^2$$

ដែល $y_1, y_2, \dots, y_n$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។ សមីការដែលអោយមានរាង

$$y_n = x$$

យើងនឹងបង្ហាញថា $y_1 = x$ ។ សន្មតថា $x > y_1$ ។ ដូច្នេះ $y_1 > y_2 > \dots > y_n$ ។ មានន័យថា បើ $x > y_1$ នោះ $x > y_n$ ផ្ទុយពីសមីការ $x = y_n$ ។ ដូចគ្នាចំពោះករណី $x < y_1$ ។ ដូច្នេះ $x = y_1$ ។
ដោយ $y_1^2 = 3x$ នោះ $3x = x^2$ យើងទាញបាន $x = 0; x = 3$ ។

89. ▲ សមីការសមមូលនឹង

$$|\sqrt{x-4}-1|+|\sqrt{x-4}-2|=a$$

តាង $y = \sqrt{x-4} \geq 0$ ។ សមីការទៅជា $|y-1|+|y-2|=a$ ។ បើ $a = 0$ នោះ $y = 1$ និង $y = 2$ មិនអាច។ ដូច្នេះ $a > 0$ ។

បើ $0 \leq y < 1$ នោះ $1-y+2-y=a; \Rightarrow y = \frac{3-a}{2}$ ។ ដោយ $0 \leq y = \frac{3-a}{2} < 1$ នោះ

$1 < a \leq 3$ ។ យើងទាញបាន $x = 4 + \left(\frac{3-a}{2}\right)^2$ ។

បើ $1 \leq y \leq 2$ នោះ $y-1-y+2=a; \Rightarrow a = 1$ ។ $1 \leq y \leq 2$ ត្រូវនឹង $5 \leq x \leq 8$ ។

បើ $y > 2$ នោះ $y-1+y-2=a; \Rightarrow y = \frac{a+3}{2}$ ។ $y > 2 \Rightarrow a > 1$ ។ យើងទាញបាន

$$x = 4 + \left(\frac{a+3}{2}\right)^2$$

ជាសរុប

បើ $a < 1$ សមីការគ្មានរឹស។

បើ $a = 1$ សមីការមានរឹស $5 \leq x \leq 8$ ។

បើ $1 < a \leq 3$ សមីការមានរឹស $x = 4 + \left(\frac{3-a}{2}\right)^2$ រឺ $x = 4 + \left(\frac{a+3}{2}\right)^2$ ។

បើ $a > 3$ សមីការមានរឹស $x = 4 + \left(\frac{a+3}{2}\right)^2$ ។

90. ▲ តាង $u = a - x; v = x - b$ ។ ដូច្នេះ $u^5 + v^5 = (a - b)^5; u + v = a - b$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} u^5 + v^5 &= (u + v)\{(u + v)^2 - 2uv\}^2 - uv(u + v)^2 + u^2v^2 \\ &\Leftrightarrow (a - b)^5 = (a - b)\{(a - b)^2 - 2uv\}^2 - uv(a - b)^2 + u^2v^2 \\ &\Leftrightarrow (a - b)^4 = (a - b)^4 + 5u^2v^2 - 5uv(a - b)^2 \\ &\Leftrightarrow 5(uv)^2 - 5uv(a - b)^2 = 0 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $uv = 0$ រឺ $uv = a - b$ ។

ករណី $uv = 0$ នោះ $u = 0$ រឺ $v = 0$ ។ បើ $u = 0$ នោះ $x = a$ ។ បើ $v = 0$ នោះ $x = b$ ។

ករណី $uv = a - b$ នោះ យើងមាន

$$\begin{cases} u + v = a - b \\ uv = a - b \end{cases}$$

(u, v) ជារឹសនៃសមីការ $t^2 - (a - b)t + (a - b) = 0$ គ្មានរឹស។

ដូច្នេះសមីការមានរឹសពីរ គឺ $x_1 = a; x_2 = b$ ។

91. ▲ តាង

$$y = \sqrt{\frac{x+3}{2}} - 1 \Rightarrow y \geq 0; y+1 = \sqrt{\frac{x+3}{2}}$$

$$\Rightarrow 2y^2 + 4y + 2 = x + 3$$

$$\Rightarrow x = 2y^2 + 4y - 1$$

ដូច្នេះ ចំពោះ $x \geq -1$ យើងទាញបានថា អនុគមន៍ $y = 2x^2 + 4x - 1$ ជាអនុគមន៍ប្រាស

នៃអនុគមន៍ $y = \sqrt{\frac{x+3}{2}} - 1$ ម្យ៉ាងវិញទៀត អនុគមន៍ $y = 2x^2 + 4x - 1$ កើនលើ $(-1; \infty)$

(អនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លុះគ្នាជ្រៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$) ដូច្នេះ

$$2x^2 + 4x - 1 = \sqrt{\frac{x+3}{2}} - 1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 4x - 1 = x$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4}$$

92. ▲ យើងមាន

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > 0$$

$$x^2 - 3x + 1 = 2(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1)$$

តាង $t = \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}}$ ។ សមីការទៅជា

$$2t^2 - mt - 1 = 0 \quad (1)$$

ពី $t = \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}}$ យើងទាញបាន

$$t^2(x^2 + x + 1) = x^2 - x + 1$$

$$(t^2 - 1)x^2 + (t^2 + 1)x + t^2 - 1 = 0 \quad (2)$$

$$\Delta = (t^2 + 1)^2 - 4(t^2 - 1)^2$$

$$= (3 - t^2)(3t^2 - 1) \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} \leq t \leq \sqrt{3}$$

ក) ករណី $m = -\sqrt{3}/3$

ពី(១) យើងទាញបាន

$$t_1 = -\frac{3}{2\sqrt{3}}; t_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

យើងយក $t = 1/\sqrt{3}$ ។ ពី(២) យើងទាញបាន $x = 1$ ។

១) ក្នុងសមីការ(១) យើងមាន $\Delta = m^2 + 8 > 0$ ដូច្នេះ(១)មានរឹសពីរ $t_1; t_2$ ។ ដោយ $t_1 t_2 = -\frac{1}{2} < 0$ នោះ $t_1 < 0 < t_2$ ។ មានតែរឹស t_2 មួយគត់ ដែលអាចអោយសមីការ(២) មានរឹស ព្រោះ

$\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t \leq \sqrt{3}$ ។ សមីការ(*) មានរឹសតែមួយគត់ បើ សមីការ(២)មានរឹសតែមួយគត់ដែរ។

បើ $t = 1$ នោះ (១)នាំអោយ $m = 1$ ហើយ (២) នាំអោយ $x = 0$ ។

បើ $t^2 - 1 \neq 0$ នោះ $\Delta = (3 - t^2)(3t^2 - 1) = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}; t_2 = \sqrt{3}$ ។

បើ $t = \frac{\sqrt{3}}{3}; (1) \Rightarrow m = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = 1$

បើ $t = \sqrt{3}; (1) \Rightarrow m = \frac{5\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = 1$

ដូច្នេះ $m = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{5\sqrt{3}}{3} \right\}$ ។

93. ▲ តាង $y = \sqrt[3]{7x+1}; z = -\sqrt[3]{x^2-x-8}; t = \sqrt[3]{x^2-8x-1}$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} y + z + t &= 2 \\ \Rightarrow (y + z + t)^3 &= 8 \quad (1) \end{aligned}$$

យើងមាន

$$y^3 + z^3 + t^3 = (7x+1) - (x^2-x-8) + (x^2-8x-1) = 8 \quad (2)$$

ពី(១)និង(២) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} (y + z + t)^3 - (y^3 + z^3 + t^3) &= 3(y+z)(z+t)(t+y) = 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} y+z=0 \\ z+t=0 \\ t+y=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y=-z \\ z=-t \\ t=-y \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{7x+1} &= \sqrt[3]{x^2-x-8} &\Leftrightarrow 7x+1 &= x^2-x-8 \\ &&\Leftrightarrow x &= -1; x = 9 \\ \sqrt[3]{x^2-x-8} &= \sqrt[3]{x^2-8x-1} &\Leftrightarrow x^2-x-8 &= x^2-8x-1 \\ &&\Leftrightarrow x &= 1 \\ \sqrt[3]{7x+1} &= -\sqrt[3]{x^2-8x-1} &\Leftrightarrow 7x+1 &= -(x^2-8x-1) \\ &\Leftrightarrow x=0; x=1 \end{aligned}$$

94. ▲ តាង $u = \sqrt{x+1} \geq 0; v = \sqrt{x^2-x+1} > 0$ ។ សមីការសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} 5uv &= 2(v^2 + v^2) \Leftrightarrow 5\frac{u}{v} = 2\left(\frac{u}{v}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{u}{v} = 2 \\ \frac{u}{v} = \frac{1}{2} \end{cases} \\ \frac{u}{v} &= 2 \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = 2\sqrt{x^2-x+1} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ 4x^2 - 5x + 3 = 0 : \text{គ្មានរឹស} \end{cases}$$

$$\frac{u}{v} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x+1} = \sqrt{x^2-x+1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2} \end{cases}$$

សមីការមានរឹសពីរ $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}$ ។

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

95. $\left\{\left(-\frac{4}{9}; 20/9\right); (2; 1)\right\}$. 96. $\left\{(-1; 3); \left(\frac{71}{21}; -25/7\right)\right\}$. 97. $\{(51; 24, 5)\}$.

98. $\{(-19, 6; 5, 2); (-14; 8)\}$. ● ដាក់អន្តរាងឆ្លេងនៃសមីការទីមួយជាអន្តរាង $(x + 3y)^2 - 6(x + 3y) - 40$ ហើយតាង $x + 3y = t$ ។

99. $\{(2; 3); (3; 2)\}$. 100. $\{(4; -1); (1; -4)\}$. 101. $\{(1; 3); (3; 1)\}$. 102. $\{(1; 2); (2; 1)\}$

103. $\left\{\left(-\frac{1}{2}; -1/3\right); (1/3; 1/2)\right\}$. 104. $\{(-1; 2); (2; -1)\}$ 105. $\{(3; 2); (2; 3)\}$

106. $\{(-1; -4); (4; 1)\}$. 107. $\{(-3; 4); (4; -3)\}$. 108. $\{(5 + \sqrt{28}; -5 + \sqrt{28}); (5 - \sqrt{28}; -5 - \sqrt{28}); (5; 2); (-2; -5)\}$. 109. $\{(0, 6; 0, 3); (0, 4; 0, 5)\}$.

110. $\left\{(-1; 2); \left(-\frac{1}{4}; -\frac{1}{4}\right)\right\}$

111. $\left\{(2; 1); (1; 2); \left(\frac{5+\sqrt{21}}{2}; \frac{5-\sqrt{21}}{2}\right); \left(\frac{5-\sqrt{21}}{2}; \frac{5+\sqrt{21}}{2}\right)\right\}$. ● តាង $x + y = u, xy = v$ បន្ទាប់មក $-u + v = z$ និង $uv = t$ ។

112. $\left\{\left(-\frac{25+5\sqrt{61}}{9}; \frac{5+\sqrt{61}}{9}\right); \left(\frac{-25+5\sqrt{61}}{9}; \frac{5-\sqrt{61}}{9}\right); (-6; -4/3); (3/2; 1/3)\right\}$. ● តាង $x = yt$.

113. $\{(-1; 3); (1; -3); (16/\sqrt{11}; 1/\sqrt{11}); (-16/\sqrt{11}; -1/\sqrt{11})\}$.

114. $\{(1; 2); (-1; -2); (\sqrt{2}; \sqrt{2}); (-\sqrt{2}; -\sqrt{2})\}$.

115. $\left\{\left(\frac{2+\sqrt{19}}{\sqrt[3]{14+4\sqrt{19}}}; -\frac{3}{\sqrt[3]{14+4\sqrt{19}}}\right); \left(\frac{-2+\sqrt{19}}{\sqrt[3]{-14+4\sqrt{19}}}; \frac{3}{\sqrt[3]{-14+4\sqrt{19}}}\right); (2; -1)\right\}$.

116. $\{(2; 1)\}$. ▲ គុណសមីការទីពីរនឹង 2 រួចបូកចូលសមីការទីមួយ បន្ទាប់មកគុណសមីការទីពីរដដែលនឹង -2 រួចបូកចូលសមីការទីមួយចាស់ យើងទាញបានប្រព័ន្ធថ្មី

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 16x^2 + 8xy + y^2 - 72x - 18y + 81 = 0 \\ 4x^2 - 12xy + 9y^2 - 4x + 6y + 1 = 0 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} (4x + y)^2 - 18(4x + y) + 81 = 0 \\ (2x - 3y)^2 - 2(2x - 3y) + 1 = 0 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + y = 9 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

117. $\{(0; 1/\sqrt{3}); (0; -1/\sqrt{3}); (1; 1); (-1; -1)\}$. 118. $\{(\frac{2}{7}; -9/7); (1; 3)\}$.

119. $\{(2; 6); (1; 3)\}$. 120. $\{(2\sqrt{2}; -\sqrt{2}); (-2\sqrt{2}; \sqrt{2})\}$.

121. $\{(\sqrt{6}; \sqrt{6}/3); (-\sqrt{6}; -\sqrt{6}/3)\}$

122. $\{(2; 1; -1); (31/15; 17/15; -2/3)\}$. 123. $\{(1; 2; 2); (2; 1; 1)\}$

124. $\{(3; -2; 1); (-2; 3; 1); (\frac{3+\sqrt{17}}{2}; \frac{3-\sqrt{17}}{2}; -1); (\frac{3-\sqrt{17}}{2}; \frac{3+\sqrt{17}}{2}; -1)\}$.

125. $\{(3; 1; -2); (-5; -3; 0)\}$. 126. $\{(3; 5; -1); (-3; -5; 1)\}$

127. $\{(2; -1; 3); (-2; 1; -3); (-\frac{7}{\sqrt{13}}; \frac{5}{\sqrt{13}}; -\frac{11}{\sqrt{13}}); (\frac{7}{\sqrt{13}}; -\frac{5}{\sqrt{13}}; \frac{11}{\sqrt{13}})\}$.

128. $\{(-4; -3; 1); (4; 3; -1)\}$. 129. $\{(1/2; 1/3; 1/4)\}$.

130. $\{(-1; 1; 0); (1; -1; 0)\}$. 131. $\{(3; 3; 3)\}$.

132. $\{(16; 30)\}$. 133. $\{(41; 40)\}$. 134. $\{(c; c-1) | c \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}\}$.

135. $\{(-\frac{1}{2}; -\frac{2}{5}); (5; 4)\}$.

136. $\{(\sqrt{\frac{3\sqrt{109}+9}{2}}; \sqrt{\frac{3\sqrt{109}-9}{2}}); (-5; -3)\}$. 137. $\{(0; a + \sqrt{a^2 + 3})\}$ ចំពោះ $a \in (-\infty; \sqrt{3})$; $\{(0; a + \sqrt{a^2 + 3}); (0; -a - \sqrt{a^2 - 3}); (0; -a + \sqrt{a^2 - 3})\}$ ចំពោះ $a \in [\sqrt{3}; \infty)$ ។

138. $\{(1; 1; 0)\}$. ▲ សមីការទីមួយ យើងទាញបាន $x = 2 - y$ ។ ជំនួសចូលសមីការទីពីរ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} & 2y - y^2 - z^2 = 1 \\ \Rightarrow & z^2 + (y-1)^2 = 0 \\ \Rightarrow & z = 0; y = 1 \end{aligned}$$

139. $\{-\frac{1}{4}\} \cup [0; \infty)$.

140. ក) 25. ▲ គុណសមីការទីមួយនឹង α និងសមីការទីពីរនឹង β ដែល $\alpha\beta \neq 0$ បន្ទាប់មកបូកចូលគ្នា យើងទាញបាន៖

$$\left(\frac{2\alpha}{3} + \beta\right)x + \left(\frac{4\alpha}{5} + \beta\right)y + \left(\frac{5\alpha}{6} + \beta\right)z = 61\alpha + 79\beta$$

យើងយក $\frac{2\alpha}{3} + \beta = 0; \frac{4\alpha}{5} + \beta = \frac{2}{5}; \frac{5\alpha}{6} + \beta = \frac{1}{2}$ ។ យើងទាញបាន $\alpha = 3, \beta = -2$ ។ ដូច្នេះ $\frac{2}{5}y + \frac{z}{2} = 61\alpha + 79\beta = 15$ ។

ខ) $\{(27; 10; 42)\}$. ▲ ដោយសារ x, y, z ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ នោះ $x = 3k; y = 5l; z = 6m$

ដែល $k; l; m \in \mathbb{N}$ ។ ប្រព័ន្ធសមីការសមមូលនឹង

$$\begin{cases} 4l + 5m = 61 - 2k \\ 5l + 6m = 79 - 3k \end{cases}$$

យើងទាញបាន $l = 29 - 3k$ និង $m = 2k - 11$ ។ ដោយ $k; l; m \in \mathbb{N}$ នោះ

$$\begin{cases} k > 0 \\ 29 - 3k > 0 \\ 2k - 11 > 0 \end{cases}$$

យើងទាញបាន $k = 9$ ។

141.▲ ចំពោះ $a = 0$ យើងទាញបាន $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ ។ ចំពោះ $a \neq 0$ យើងទាញបាន

$(x, y, z) \in \{(t_1, t_2, z_0); (t_2, t_1, z_0)\}$ ដែល

$$z_0 = \frac{a^2 - b^2}{2a}; t_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(3a^2 - b^2)(3b^2 - a^2)}}{4a}$$

ដើម្បីអោយចំលើយវិជ្ជមាននិងខុសគ្នា លក្ខខណ្ឌចាំបាច់នឹងគ្រប់គ្រាន់គឺ $3b^2 > a^2 > b^2$ និង $a > 0$ ។

142.▲ ប្រកសមីការទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន $2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) =$

$y(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$ ។ បើ $y = 2$ នោះយើងទាញបាន $x_1 - x_2 = x_2 - x_3 = \dots = x_5 -$

x_1 ដូច្នេះ $x_1 = x_2 = \dots = x_5$ ជាចំលើយរបស់ប្រព័ន្ធ។ បើ $y \neq 2$ នោះ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 +$

$x_5 = 0$ ។ ប្រកសមីការទីបីខាងដើមចូលគ្នា យើងទាញបាន $x_2 = y(x_1 + x_2 + x_3)$ ។ដោយ

$x_1 + x_3 = yx_2$ នោះ $x_2 = (y^2 + y)x_2 \Rightarrow (y^2 + y - 1)x_2 = 0$ ។ បើ $y^2 + y - 1 \neq 0$ នោះ

$x_2 = 0$ ដូចគ្នាយើងទាញបាន $x_1 = x_2 = \dots = x_5 = 0$ ។ បើ $y^2 + y - 1 = 0$ នោះ ប្រកសមីការទី

មួយនិងទីពីរ យើងទាញបាន $x_5 + x_2 + x_1 + x_3 = yx_1 + yx_2 \Rightarrow x_3 + x_5 = yx_1 + yx_2 -$

$x_2 - x_1 \Rightarrow x_3 + x_5 = -y^2x_2 - y^2x_1 \Rightarrow x_3 + x_5 = -y(x_1 + x_3) - y(x_5 + x_2) \Rightarrow x_3 +$

$x_5 = yx_4$ ។ ដូចគ្នា យើងទាញបានសមីការទី៥។ មានន័យថា សមីការទី៤និងទី៥ អាស្រ័យលើនៃអ៊ែរ

និងសមីការបីខាងលើ។ យក $x_1 = u; x_5 = v$ ។ យើងទាញបាន $x_2 = yu - v; x_3 = y^2u - yv -$

$u; x_4 = y^3u - y^2v - 2yu + v$ ។

143.▲ សន្មតថា (x_1, x_2, x_3) ជាចំលើយរបស់ប្រព័ន្ធ។ យើងអាចសន្មតថា $|x_1| \geq |x_2| \geq |x_3|$ ។

សន្មតថា $|x_1| > 0$ ។ ពីសមីការទីមួយ យើងទាញបាន

$$0 = |x_1| \cdot \left| a_{11} + a_{12} \frac{x_2}{x_1} + a_{13} \frac{x_3}{x_1} \right| \geq |x_1| \cdot (a_{11} - |a_{12}| - |a_{13}|) > 0$$

មិនអាច។ ដូច្នេះ $|x_1| = 0$ នាំអោយ $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ។

144.▲ បើមានចំនួនណាមួយស្មើសូន្យ ឧបមាថា $x_1 = 0$ នោះ $x_1 + x_2x_3x_4 = 2 \Rightarrow x_2x_3x_4 = 2$; $x_2 + x_1x_3x_4 = 2 \Rightarrow x_2 = 2$; ...; $x_3 = x_4 = 2$ មិនអាច។ ដូច្នេះគ្មានចំនួនណាមួយអាចស្មើសូន្យបានទេ។ តាង $x_1x_2x_3x_4 = p$ ។ សម្មតិកម្មសមមូលនឹង $x_i + \frac{p}{x_i} = 2, i = 1, 2, 3, 4$ ។ សមីការ $x + \frac{p}{x} = 2$ មានរឹសយ៉ាងច្រើនចំនួនពីរតាងដោយ y និង z ។ ដូច្នេះ x_i នីមួយៗអាចស្មើ y រឺស្មើ z ។ យើងមានបីករណី៖

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = y \text{ ។ ដូច្នេះ } y + y^3 = 2 \text{ នាំអោយ } y = 1 \text{ ។}$$

$$x_1 = x_2 = x_3 = y, x_4 = z \text{ ។ ដូច្នេះ } z + y^3 = y + y^2z = 2 \text{ ។ យើងទាញបាន}$$

$$(y; z) = \{(-1; 3); (1; 2)\}$$

$$x_1 = x_2 = y, x_3 = x_4 = z \text{ ។ ករណីនេះយើងទាញបាន } y = z = 1 \text{ ។}$$

ដូច្នេះរឹស $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ គឺ $\{(1; 1; 1; 1); (-1; -1; -1; 3)\}$ និងចំលាស់របស់វា។

145.▲ តាង $L_1 = |a_1 - a_2|x_2 + |a_1 - a_3|x_3 + |a_1 - a_4|x_4$ និងដូចគ្នាចំពោះ L_2, L_3 និង L_4 ។

សន្មតថា $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$ ។ នៅក្នុងករណីនេះ

$$\begin{aligned} 2|a_1 - a_2||a_2 - a_3|x_2 &= |a_3 - a_2|L_1 - |a_1 - a_3|L_2 + |a_1 - a_2|L_3 \\ &= |a_3 - a_2| - |a_1 - a_3| + |a_1 - a_2| = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2|a_2 - a_3||a_3 - a_4|x_3 &= |a_4 - a_3|L_2 - |a_2 - a_4|L_3 + |a_2 - a_3|L_4 \\ &= |a_4 - a_3| - |a_2 - a_4| + |a_2 - a_3| = 0 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ យើងទាញបាន $x_2 = x_3 = 0$ ហើយនាំអោយ $x_1 = x_4 = 1/|a_1 - a_4|$ ។ រឹសនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធសមីការដែលអោយ។ ចំលើយផ្សេងទៀតជាចំលាស់នៃចំលើយមួយនេះ។

146.▲ បើមួយក្នុងចំណោម x, y, z ស្មើ 1 រឺ -1 នោះ $(-1, -1, -1)$ និង $(1, 1, 1)$ ។ ប្រព័ន្ធគ្មានចំលើយផ្សេងពីនេះទេ។ តាង $f(t) = t^2 + t - 1$ ។ បើក្នុងចំណោម x, y, z មានមួយធំជាង 1 សន្មតថា $x > 1$ យើងមាន $x < f(x) = y < f(y) = y < f(y) = z < f(z) = x$ មិនអាច។ ដូច្នេះ $x, y, z \leq 1$ ។

ឥលូវសន្មតថា មានមួយក្នុងចំណោម x, y, z សន្មតថា x មានតំលៃតូចជាង -1 ។ ដោយ $\min f = -\frac{5}{4}$

នោះ យើងមាន $x = f(z) \in \left[-\frac{5}{4}; -1\right)$ ។ ដោយ $f\left(\left[-\frac{5}{4}; -1\right)\right) = (-1; -11/16) \subseteq (-1; 0)$

និង $f((-1; 0)) = \left[-\frac{5}{4}; -1\right)$ ដូច្នេះ $y = f(x) \in (-1; 0), z = f(y) \in \left[-\frac{5}{4}; -1\right)$ និង

$x = f(z) \in (-1, 0)$ ផ្ទុយពីការសន្មត។ ដូច្នេះ $-1 \leq x, y, z \leq 1$ ។

បើ $-1 < x, y, z < 1$ នោះ $x > f(x) = y > f(y) = z > f(z) = x$ មិនអាច។

$$147.(-2; -1); \left(-\frac{14}{3}; \frac{13}{3}\right).$$

148.▲ តាង $S_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$ និង តាង $\sigma_k, k = 1, 2, \dots, n$ ជាពហុធាស៊ីមេទ្រីបធម៌ទី k នៃ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ។ ពហុធាស៊ីមេទ្រីបធម៌ទី k ជា $\sigma_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$ ដែល $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \in \{1, 2, \dots, n\}$ ។ ឧទាហរណ៍ $\sigma_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$; $\sigma_2(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1$; $\sigma_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$ ។

ប្រព័ន្ធសមីការដែលអោយ $S_k = a^k, k = 1, 2, \dots, n$ ។ តាមរូបមន្តញូតុន យើងទាញបាន

$$k\sigma_k = S_1\sigma_{k-1} - S_2\sigma_{k-2} + \dots + (-1)^k S_{k-1}\sigma_1 + (-1)^{k-1} S_k, k = 1, 2, \dots, n$$

$$\sigma_1 = a$$

$$k\sigma_2 = S_1\sigma_1 + (-1)^1 S_2 = a \cdot a - a^2 = 0, \sigma_2 = 0$$

...

$$\Rightarrow \sigma_1 = a; \sigma_k = 0 \text{ ចំពោះ } k = 2, \dots, n$$

តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ែត $x_1, x_2, \dots, x_n$ ជាឫសនៃពហុធា $x^n - ax^{n-1}$ មានន័យថា ឫសទាំងនោះស្មើនឹង $a, 0, \dots, 0$ និងចំលាស់ទាំងអស់។

149.▲ បើ $m \notin \{-2; 1\}$ នោះប្រព័ន្ធមានឫសតែមួយគត់

$$x = \frac{b+a-(1+m)c}{(2+m)(1-m)}; y = \frac{a+c-(1+m)b}{(2+m)(1-m)}; z = \frac{b+c-(1+m)a}{(2+m)(1-m)}$$

ចំនួន x, y, z ជាស្មើតន្ត្រី បើនិងមានតែបើ a, b, c ជាស្មើតន្ត្រីដែរ។

បើ $m = 1$ នោះប្រព័ន្ធមានចំលើយ បើនិងមានតែបើ $a = b = c$ ។ ករណី $m = -2$ ប្រព័ន្ធមាន

ចំលើយ បើនិងមានតែបើ $a + b + c = 0$ ។ នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ប្រព័ន្ធមានចំលើយច្រើនរាប់មិនអស់។

150.▲ យើងមាន $c_n > 0$ ចំពោះគ្រប់ n គួរ ដូច្នេះ $c_n = 0$ អាចបានតែចំពោះ n សេសតែ

ប៉ុណ្ណោះ។ សន្មតថា $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_8$ ហើយថា $a_1 \leq 0 \leq a_8$ ។

បើ $|a_1| < |a_8|$ នោះមាន n_0 ដែលចំពោះគ្រប់ចំនួនសេស $n > n_0$ យើងមាន $7|a_1|^n < a_8^n$ ។ ដូច្នេះ

$$a_1^n + a_2^n + \dots + a_8^n > 7a_1^n + a_8^n > 0$$

ផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែលថា $c_n = 0$ ចំពោះតំលៃ n ច្រើនរាប់មិនអស់។ ដូចគ្នាករណី $|a_1| > |a_8|$ ក៏មិនអាចដែរ។ យើងទាញបាន $a_1 = -a_8$ ។ តាមរបៀបដូច

គ្នា យើងទាញបាន $a_2 = -a_7; a_3 = -a_6$ និង $a_4 = -a_5$ ។ ហើយ $c_n = 0$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនសេស n ។

151.▲ តាង $X = 1 - x; Y = 1 - y; Z = 1 - z; T = 1 - t$ ។ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} X^2 = Y \\ Y^2 = Z \\ Z^2 = T \\ T^2 = X \end{cases}$$

យើងទាញបាន $X^4 = Y^2 = Z \Rightarrow X^8 = Z^2 = T \Rightarrow X^{16} = T^2 = X \Rightarrow X(X^{15} - 1) = 0$ ។

យើងទាញបាន

$$- X = 0; \Rightarrow Y = Z = T = 0 \Rightarrow x = y = z = t = 1$$

$$- X = 1; \Rightarrow Y = Z = T = 1 \Rightarrow x = y = z = t = 0$$

152.▲ ប្រកសមីការទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន

$$0 = \sum_{i=1}^{1000} \left(x_i^2 + 2 \left(\frac{a-1}{2} \right) x_i + \left(\frac{a-1}{2} \right)^2 \right) = \sum_{i=1}^{1000} \left(x_i + \frac{a-1}{2} \right)^2$$

យើងទាញបាន $x_1 = x_2 = \dots = x_{1000} = \frac{a-1}{2}$ ។

153.▲ តាង $t_1 = x_1 - x_2; t_2 = x_2 - x_3; \dots; t_n = x_n - x_1$ ។ ប្រព័ន្ធសមីការសមមូលនឹង

$$\begin{cases} 2t_1 = 3t_2 \\ 2t_2 = 3t_3 \\ \dots \dots \\ 2t_n = 3t_1 \end{cases}$$

គុណអង្គនឹងអង្គនៃសមីការ យើងទាញបាន $2^n t_1 t_2 \dots t_n = 3^n t_1 t_2 \dots t_n \Rightarrow t_1 t_2 \dots t_n = 0$ ។ ដូច្នេះ

ត្រូវមាន t_i មួយដែលស្មើសូន្យ ។ ហើយដោយ $2t_i = 3t_{i+1}$ នោះ យើងទាញបាន $t_1 = t_2 = \dots =$

$t_n = 0$ ហើយ $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ។

154.▲ យើងមាន $3S = x^2 + y^2 + z^2 \geq 0 \Rightarrow S = x + y + z \geq 0$ ។ ដូច្នេះក្នុងចំណោម x, y, z

ត្រូវតែមានមួយជាចំនួនមិនអវិជ្ជមាន។ សន្មតថា $x \geq 0$ ។ យើងទាញបាន

$$y(4 - y) = x \geq 0 \Rightarrow 0 \leq y \leq 4$$

ដូចគ្នាយើងទាញបាន $0 \leq x, y, z \leq 4$ ។ តាង $x = 4 \sin^2 \alpha$ ដែល $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ ។ យើងទាញបាន

$z = 4 \sin^2 2\alpha; y = 4 \sin^2 4\alpha$ ។ ហើយ $x = 4 \sin^2 8\alpha$ ។ ដូច្នេះ

$$4 \sin^2 8\alpha = 4 \sin^2 \alpha \Rightarrow \cos 16\alpha = \cos 2\alpha$$

នាំអោយ

$$1) 16\alpha = 2\alpha + 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{k\pi}{7} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

$$0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow k = \{0; 1; 2; 3\}$$

$$- k = 0$$

$$x = y = 0; \Rightarrow S = 0$$

$$-k = 1; 2; 3$$

$$\Rightarrow S = 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} \right) = 7$$

$$2) 16\alpha = -2\alpha + 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{k\pi}{9} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

$$0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow k = \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

$$- k = 0$$

$$x = y = 0; \Rightarrow S = 0$$

$$- k = 1; 2; 4$$

$$\Rightarrow S = 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{9} + \sin^2 \frac{2\pi}{9} + \sin^2 \frac{4\pi}{9} \right) = 6$$

$$- k = 3$$

$$\Rightarrow S = 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{3} + \sin^2 \frac{2\pi}{3} + \sin^2 \frac{4\pi}{3} \right) = 9$$

155. $\{(1; 1; 1); (-2; -2; -2)\}$ ▲ យកសមីការទីមួយដកសមីការទីពីរ សមីការទីពីរដកសមីការទីបី យើងទាញបាន

$$(x - y)(1 - z) = 0; \quad (1)$$

$$(y - z)(1 - x) = 0 \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow x = y \text{ រឺ } z = 1$$

$$(2) \Rightarrow y = z \text{ រឺ } x = 1$$

យើងទាញបានបួនករណី

$$(x = y = z); (x = y; x = 1); (z = 1; y = z); (z = 1; x = 1)$$

ករណីទាំងបួននេះ ត្រូវនឹង $x = y = z = 1$ រឺ $x = y = z = -2$ ។

156. ▲ យើងសិក្សាករណី $a > 0$ ព្រោះ $a \neq 0$ ។ ករណី $a < 0$ គុណអង្គសមីការនឹងសញ្ញាដក។ យកសមីការទាំងបីនៃប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន

$$[ax^2 + (b - 1)x + c] + [ay^2 + (b - 1)y + c] + [az^2 + (b - 1)z + c] = 0$$

តាង $f(t) = at^2 + (b - 1)t + c$ ។ យើងមាន

$$f(x) + f(y) + f(z) = 0 \quad (*)$$

បើ $\Delta = (b - 1)^2 - 4ac < 0$ នោះ $f(t) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $t \in \mathbb{R}$ ព្រោះ $a > 0$ ។ ដូច្នេះ

$$f(x) + f(y) + f(z) > 0$$

ផ្ទុយពីសមីការ(*)។

157. ▲ ជំនួស $y = -x$ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} x^3 + ax^3 = \frac{1}{2}(a + 1)^2 & (1) \\ 2x^3 - ax^3 = 1 & (2) \end{cases}$$

សមីការទី២ យើងទាញបាន $x \neq 0$ ។ យកសមីការទាំងពីរចូលគ្នា យើងទាញបាន

$$3x^3 = \frac{1}{2}(a+1)^2 + 1 > 0; \Rightarrow x > 0$$

យកសមីការទី១ចែកនឹងសមីការទី២ យើងទាញបាន

$$\frac{a+1}{2-a} = \frac{1}{2}(a+1)^2 \Rightarrow a = 0; -1; 1$$

ចំពោះ $a = 0$ យើងមាន

$$\begin{cases} x^3 = \frac{1}{2} \\ x^3 + xy^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \\ y = \pm \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \end{cases}$$

រីសដែលផ្ទៀងផ្ទាត់គឺ $x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}; y = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ។

ចំពោះ $a = -1$ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 0 \\ x^3 - x^2y + xy^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt[3]{3}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \end{cases}$$

ចំពោះ $a = 1$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^3 - y^3 = 2 \\ x^3 + x^2y + xy^2 = 1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x^3 - y^3 = 2 \\ 2x^3 + 2x^2y + 2xy^2 = 2 \end{cases} \\ &\Rightarrow x^3 + 2x^2y + 2xy^2 + y^3 = 0 \\ &\Rightarrow (x+y)(x^2 - xy + y^2) + 2xy(x+y) = 0 \\ &\Rightarrow (x+y)(x^2 + xy + y^2) = 0 \\ &\Rightarrow x+y = 0 \\ &\Rightarrow x = 1; y = -1 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $a = \{-1; 0; 1\}$ ប្រព័ន្ធមានរីសផ្ទៀងផ្ទាត់ លក្ខខណ្ឌ។

158. ▲ ប្រព័ន្ធសមមូលនឹង

$$\begin{cases} 3x^2 - 2(3+z)x + 3z + 3 = 0(1) \\ y^3 + 3y^2 = x^2 - 3x + 2 & (2) \\ y^2 = -z^2 + 6z & (3) \\ z \leq 3 & (4) \end{cases}$$

សមីការ(១) មានរីស បើ $\Delta' = (3+z)^2 - 3(3z+3) \geq 0 \Rightarrow z \leq 0; z \geq 3$ (៥)។ សមីការទី៣

មានរីសបើ $-z^2 + 6z \geq 0 \Rightarrow 0 \leq z \leq 6$ (៦)។ ពី(៤) (៥)(៦)យើងទាញបាន $z = 0; z = 3$ ។

បើ $z = 0$ នោះ តាម(៣) យើងទាញបាន $y = 0$; និងពី(២) យើងទាញបាន $x = 1; x = 2$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់តាម(១) យើងទាញបាន $x = 1$ ។

បើ $z = 3$ នោះ តាម(៣) យើងទាញបាន $y = \pm 3$ ។ ពី(១) យើងទាញបាន $x = 2$ ។ ចំពោះ $x = 2$ ផ្ទៀងផ្ទាត់តាម(២) យើងទាញបាន $y = -3$ ។ ដូច្នេះ

$$(x; y; z) = \{(1; 0; 0); (2; -3; 3)\}$$

159. ▲ គុណសមីការទីមួយទីពីរនិងទីបី នឹង c, a, b រៀងគ្នា យើងទាញបាន

$$\begin{cases} \frac{ac}{x} - \frac{bc}{z} = c^2 - czx \\ \frac{ab}{y} - \frac{ac}{x} = a^2 - axy \\ \frac{bc}{z} - \frac{ab}{y} = b^2 - byz \end{cases}$$

បូកសមីការទាំងបីបញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន

$$a^2 + b^2 + c^2 = axy + bzy + cxz \quad (1)$$

បំបាត់ភាគបែងនៃប្រព័ន្ធដើម

$$\begin{cases} az - bx = cxz - z^2x^2 \\ bx - cy = axy - x^2y^2 \\ cy - az = bzy - y^2z^2 \end{cases}$$

បូកបញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន

$$x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = axy + bzy + cxz \quad (2)$$

បូក(១)នឹង(២) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 + x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = 2(axy + bzy + cxz) \\ \Rightarrow & (xy - a)^2 + (zy - b)^2 + (xz - c)^2 = 0 \\ \Rightarrow & \begin{cases} xy = a \\ zy = b \\ xz = c \end{cases} \\ \Rightarrow & (x; y; z) = \left\{ \left(\sqrt{\frac{ac}{b}}; \sqrt{\frac{ab}{c}}; \sqrt{\frac{bc}{a}} \right); \left(-\sqrt{\frac{ac}{b}}; -\sqrt{\frac{ab}{c}}; -\sqrt{\frac{bc}{a}} \right) \right\} \end{aligned}$$

160. ▲ ប្រព័ន្ធមានរឹសងាយ $(0; 0; 0)$ ។ បើ $x = \pm 1$ នោះ $\pm 2 + y = y$ មិនអាច។ ដូចគ្នាយើងទាញបាន $x \neq \pm 1; y \neq \pm 1; z \neq \pm 1$ ។ យើងមាន

$$\begin{cases} 2x + x^2y = y \\ 2y + y^2z = z \\ 2z + z^2x = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2x}{1-x^2} & (4) \\ z = \frac{2y}{1-y^2} & (5) \\ x = \frac{2z}{1-z^2} & (6) \end{cases}$$

តាង $x = \tan \alpha \neq \pm 1 \Rightarrow \alpha \neq \pm \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ ។ ពី(៤) យើងទាញបាន $y = \tan 2\alpha$ និងពី(៥) យើងទាញបាន $z = \tan 4\alpha$ ហើយជាចុងក្រោយ $x = \tan 8\alpha = \tan \alpha$ ។ ដូច្នេះ

$$8\alpha = \alpha + n\pi \Rightarrow \alpha = n\frac{\pi}{7}; (n \in \mathbb{Z})$$

ដូច្នេះប្រព័ន្ធមានរឹស $(x; y; z) = \left\{ \left(\tan n\frac{\pi}{7}; \tan n\frac{2\pi}{7}; \tan n\frac{4\pi}{7} \right) | n \in \mathbb{Z} \right\}$

V. វិសមភាព

161. ▲ តាង $A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{99}{100}; B = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots \frac{98}{99}$ ។ ដោយ

$$\frac{2}{3} > \frac{1}{2}; \frac{4}{5} > \frac{3}{4}; \frac{6}{7} > \frac{5}{6}; \dots; \frac{98}{99} > \frac{97}{98}; 1 > \frac{99}{100}$$

នោះ $B > A$ ។ យើងមាន

$$AB = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \right) \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} \right) \dots \left(\frac{98}{99} \cdot \frac{99}{100} \right) = \frac{1}{100}$$

ដូច្នេះ $A^2 < AB = \frac{1}{100} \Rightarrow A < \frac{1}{10}$ ។

បន្ទាប់មកទៀត

$$B < 2A = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8} \dots \frac{99}{100}$$

ព្រោះ $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}; \frac{4}{5} < \frac{5}{6}; \frac{6}{7} < \frac{7}{8}; \dots; \frac{98}{99} < \frac{99}{100}$ ។ ដូច្នេះ

$$A \cdot 2A > AB = \frac{1}{100} \Rightarrow A > \frac{1}{10\sqrt{2}}$$

162. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^{100}} C_{100}^{50} &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 100}{2^{50}(1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 50) \cdot 2^{50}(1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 50)} \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 100}{(2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 100)(2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 100)} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 99}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 100} \end{aligned}$$

ហើយតាមសំនួរ**161**. យើងទាញបានវិសមភាពពិត។

163. ▲ ជំហ្វូងយើងនឹងបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$ យើងមាន

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

ចំពោះ $n = 1$ យើងមាន $\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 1 + 1}}$ ។ បន្ទាប់មកទៀតសន្មតថាពិតដល់ n មានន័យថា

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

យើងគុណអង្គសង្ខេបនៃវិសមភាពនេះនឹង $\frac{2n+1}{2n+2}$ យើងទាញបាន

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \leq \frac{2n+1}{(2n+2)\sqrt{3n+1}}$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} \left[\frac{2n+1}{(2n+2)\sqrt{3n+1}} \right]^2 &= \frac{(2n+1)^2}{12n^3 + 28n^2 + 20n + 4} \\ &= \frac{(2n+1)^2}{(12n^3 + 28n^2 + 19n + 4) + n} \\ &= \frac{(2n+1)^2}{(2n+1)^2(3n+4) + n} < \frac{1}{3n+4} \\ &\Rightarrow \frac{2n+1}{(2n+2)\sqrt{3n+1}} < \frac{1}{\sqrt{3n+4}} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} < \frac{1}{\sqrt{3n+4}} \end{aligned}$$

164. ▲ អនុវត្តន៍វិសមភាពក្នុងសំនួរទី **163.** ចំពោះ $n = 50$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} &< \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2 \times 50 - 1}{2 \times 50} &< \frac{1}{\sqrt{3 \times 50 + 1}} \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} &< \frac{1}{\sqrt{151}} = \frac{1}{12,288} < \frac{1}{12} \end{aligned}$$

ពិត។

165. ● ស្រាយបញ្ជាក់តាមកំនើន។

166. ▲ ជាជំហ្លួង យើងនឹងបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $k \leq n$ យើងមាន

$$1 + \frac{k}{n} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k < 1 + \frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}$$

ចំពោះ $k = 1$ វិសមភាពពិត។ សន្មតថាវិសមភាពពិតចំពោះតំលៃ k ណាមួយ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 + \frac{k+1}{n} + \frac{k}{n^2} > 1 + \frac{k+1}{n} \end{aligned}$$

ពិត (មិនប៉ាន់បាច់ទាល់តែ $k \leq n$ ទេ)។

យើងមាន

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \left(1 + \frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 + \frac{k+1}{n} + \frac{k^2 + 2k + 1}{n^2} - \frac{k+1}{n^2} + \frac{k^2}{n^3} \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{k+1}{n} + \frac{(k+1)^2}{n^2} - \frac{n(k+1) - k^2}{n^3}$$

$$< 1 + \frac{k+1}{n} + \frac{(k+1)^2}{n^2}$$

ព្រោះ $n(k+1) > k^2$ បើ $n \geq k$ ។ ដូច្នេះដោយយក $k = n$ យើងទាញបាន

$$2 = 1 + \frac{1}{n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + \frac{n}{n} + \frac{n^2}{n^2} = 3$$

167. ▲ តាមសំនួរ **166.** យើងទាញបាន

$$(1,000\,001)^{1\,000\,000} = \left(1 + \frac{1}{1\,000\,000}\right)^{1\,000\,000} > 2$$

168. ▲ យើងមាន

$$\frac{1001^{999}}{1000^{1000}} = \left(\frac{1001}{1000}\right)^{1000} \cdot \frac{1}{1001} = \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} \cdot \frac{1}{1001}$$

$$< \frac{3.1}{1001} < 1$$

(តាមសំនួរ **166.**) ។ ដូច្នេះ $1000^{1\,000} > 1001^{999}$ ។

169. ▲ យើងមាន

$$\sqrt{c+1} - \sqrt{c} < \sqrt{c} - \sqrt{c-1}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{c+1} - \sqrt{c-1} < 2\sqrt{c}$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{c+1} - \sqrt{c-1})^2 < 4c$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{c^2 - 1} < c$$

ពិត។

170. ▲ តាងចំនួនពិតទាំងនោះដោយ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ដែល $x_1 x_2 \dots x_n = 1$ ។ យើងត្រូវបង្ហាញថា $x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n$ ។ ចំពោះ $n = 1$ វិសមភាពពិត។ សន្មតថាពិតចំពោះ $n = k$ មានន័យថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x_1, x_2, \dots, x_k$ ដែល $x_1 x_2 \dots x_k = 1$ យើងមាន $x_1 + x_2 + \dots + x_k \geq k$ ។ ចំពោះ $n = k + 1$ បើ $x_1 = x_2 = \dots = x_{k+1} = 1$ នោះ $x_1 + x_2 + \dots + x_{k+1} \geq k + 1$ វិសមភាពពិត។ ករណីផ្សេងពីនេះ ដោយសារ ផលគុណនៃចំនួនទាំងនេះមានតំលៃស្មើមួយ ហើយចំនួនទាំងនេះមិនមានតំលៃស្មើមួយដូចគ្នាទាំងអស់ ដូច្នេះមានចំនួនខ្លះតូចជាងមួយចំនួនខ្លះធំជាងមួយ។ សន្មត $x_1 < 1, x_{k+1} > 1$ ។ តាង $y_1 = x_1 x_{k+1}$ ។ យើងមាន $y_1 x_2 \dots x_k = 1$ ដូច្នេះ $y_1 + x_2 + \dots + x_k \geq k$ ។ យើងមាន

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{k+1} = (y_1 + x_2 + \dots + x_k) - y_1 + x_1 + x_{k+1}$$

$$\geq k - y_1 + x_1 + x_{k+1} = (k + 1) - 1 - x_1 x_{k+1} + x_1 + x_{k+1}$$

$$= k + 1 + (x_{k+1} - 1)(1 - x_1) > k + 1$$

វិសមភាពពិតដល់ $k + 1$ ។

171. ▲ ស្រាយបញ្ជាក់តាមកំនើន។ ចំពោះ $n = 1$ វិសមភាពពិត។ សន្មតថាពិតចំពោះ $n = k$ មានន័យថា $(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_k) \geq 1 + x_1 + x_2 + \dots + x_k$ ។ គុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹង $(1 + x_{k+1})$ យើងទាញបាន $(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_k)(1 + x_{k+1}) \geq (1 + x_1 + x_2 + \dots + x_k)(1 + x_{k+1})$ ។ យើងមាន $(1 + x_1 + x_2 + \dots + x_k)(1 + x_{k+1}) \geq (1 + x_1 + x_2 + \dots + x_k) + x_{k+1} \Leftrightarrow (x_1 + x_2 + \dots + x_k)x_{k+1} \geq 0$ ពិតព្រោះ $x_1, x_2, \dots, x_{k+1}$ មានសញ្ញាដូចគ្នា។ ដូច្នេះ $(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_k)(1 + x_{k+1}) \geq (1 + x_1 + x_2 + \dots + x_k) + x_{k+1}$ ។

172. ▲ ចំពោះ $n = 6$ យើងមាន $2^6 = 64 < 6! = 720 < 3^6 = 729$

សន្មតថាវិសមភាពពិតចំពោះ ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n មួយ។ យើងនឹងបង្ហាញថា ពិតចំពោះ $n + 1$ ដែរ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{2}\right)^n &> n! > \left(\frac{n}{3}\right)^n \\ \Rightarrow (n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n &> (n+1)! > (n+1) \left(\frac{n}{3}\right)^n \end{aligned}$$

ដូច្នេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1} > (n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n \text{ និង } \left(\frac{n}{3}\right)^n (n+1) > \left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1}$$

ជាការស្រេច។ វិសមភាពទាំងពីរសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{2}\right)^n} &> n+1 > \frac{\left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{3}\right)^n} \\ \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{2}\right)^n}{\left(\frac{n}{2}\right)^n} &> 1 > \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{3}\right)^n}{\left(\frac{n}{3}\right)^n} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &> 1 > \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ \Leftrightarrow 2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &< 3 \end{aligned}$$

ពិត តាមសំនួរ **166.** ។

173. ▲ យើងមាន $\Delta' = 999^2 - ac > 0$; $\Delta' \in \mathbb{Z}$ ព្រោះ $a, c \in \mathbb{Z}$ និង $|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{\Delta'}}{|a|}$ ។

បើ $\Delta' \geq 2$ នោះ

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{\Delta'}}{|a|} > \frac{2\sqrt{\Delta'}}{2000} \geq \frac{2\sqrt{2}}{2000} > \frac{1}{998}$$

បើ $\Delta' = 1$ នោះ $ac = 999^2 - 1 = 998.1000 = 2^4 \cdot 5^3 \cdot 449$ ។ យើងមាន $2^2 \cdot 5^3 \cdot 449 = 1996 < 2000$ ជាតួចែកមួយនៃ $2^4 \cdot 5^3 \cdot 449 = ac \Rightarrow$ តួចែកធំបំផុតនៃ $ac = 2^4 \cdot 5^3 \cdot 449$ ហើយដែលតូចជាង 2000 ស្មើនឹង 1996 ។ ដូច្នេះ $a \leq 1996$ (ហេតុអ្វីបានយកតួចែកតូចជាង 2000 ? ព្រោះ $|a| < 2000, |c| < 2000$)។ យើងទាញបាន

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{\Delta'}}{|a|} = \frac{2}{|a|} \geq \frac{1}{998}$$

174. ▲ លក្ខខណ្ឌដែលអោយ នាំអោយ $x \neq y$ និង

$$a = \frac{y-2}{y-x}; b = \frac{2-x}{y-x}$$

ជំនួសចូលលក្ខខណ្ឌទីបី យើងទាញបាន

$$3 = ax^2 + by^2 = \frac{(y-2)x^2}{y-x} + \frac{(2-x)y^2}{y-x} = 2(x+y) - xy \quad (1)$$

តាង $C = ax^3 + by^3 > 0$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} C &= \frac{y-2}{y-x}x^3 + \frac{2-x}{y-x}y^3 \\ &= -xy(x+y) + 2(x^2 + xy + y^2) \\ &= -xy(x+y) + 2(x+y)^2 - 2xy \\ &= (x+y)[-xy + 2(x+y)] - 2xy \\ &= 3(x+y) - 2xy; \quad \text{តាម (1)} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\begin{cases} 2(x+y) - xy = 3 \\ 3(x+y) - 2xy = C \end{cases}$$

យើងទាញបាន $x+y = 6-C; xy = 9-2C$ ។

យើងមាន $(x+y)^2 > 4xy \Rightarrow (6-C)^2 > 4(9-2C) \Rightarrow C > 4$ ។

យើងមាន $xy > 0 \Rightarrow 9-2C > 0; \Rightarrow C < 4,5$ ។

175. ▲ ● ករណី $x < -3$ នោះ

$$S = |x| + \left| \frac{2x-1}{x+3} \right| > |x| > 3$$

● ករណី $-3 < x < 0$

ករណីនេះ $\frac{2x-1}{x+3} < 0$ ដូច្នេះ

$$S \geq \frac{2x-1}{x+3} = -2 + \frac{7}{x+3} > -2 + \frac{7}{3} = \frac{1}{3}$$

● ករណី $x > 1/2$

យើងមាន

$$S = |x| + \left| \frac{2x-1}{x+3} \right| \geq |x| > \frac{1}{2}$$

● ករណី $0 \leq x \leq 1/2$

ករណីនេះយើងមាន $S \geq 1/3$ ព្រោះ

$$\begin{aligned} S &= x - \frac{2x-1}{x+3} = \frac{x^2+x+1}{x+3} \\ S &\geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{x^2+x+1}{x+3} \geq \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow 3x^2+3x+3 \geq x+3 \Leftrightarrow x \geq 0 \end{aligned}$$

ពិតៗសញ្ញាស្មើកើតមាន ពេល $x = 0$ ។

ដូច្នេះ $\min S = 1/3$ ពេល $x = 0$ ។

176. ▲ សន្មតថា $a \geq 0$ ។ បើ $a < 0$ នោះគុណពហុធា $f(x)$ នឹង (-1) យើងទាញបានពហុធាដែលមេគុណវិជ្ជមាន ហើយនៅតែផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មដែល។ យើងសន្មតផងដែរថា $b \geq 0$ ។ បើ $b < 0$ នោះយើងយក $f(-x)$ ព្រោះសម្មតិកម្មស៊ីមេទ្រីជៀបនឹង x ។

ជំនួស $x = 0; x = \pm 1$ ចូល $f(x)$ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} -1 \leq c \leq 1 & (1) \\ -1 \leq a+b+c \leq 1 & (2) \\ -1 \leq a-b+c \leq 1 & (3) \end{cases}$$

(2) និង (3) នាំអោយ

$$\begin{cases} -1-c \leq a+b \leq 1-c \\ -1-c \leq a-b \leq 1+c \end{cases}$$

ដោយ $a \geq 0; b \geq 0; |c| \leq 1$ នោះ

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 0 \leq a+b \leq 2 \\ -2 \leq a-b \leq 2 \end{cases} \\ \Rightarrow &\begin{cases} a^2+2ab+b^2 \leq 4 \\ a^2-2ab+b^2 \leq 4 \end{cases} \\ \Rightarrow &a^2+b^2 \leq 4 \quad (4) \end{aligned}$$

យើងមាន

$$K = \frac{8}{3}(a^2+b^2) - \frac{2}{3}b^2 \leq \frac{8}{3}(a^2+b^2) \leq \frac{8}{3} \cdot 4 = \frac{32}{3}$$

K មានតំលៃធំបំផុតពេល $b = 0; a^2 + b^2 = 4 \Rightarrow b = 0; a = \pm 2$ ។

បើ $b = 0; a = 2; (2) \Rightarrow c = -1$ ។

បើ $b = 0; a = -2; (2) \Rightarrow c = 1$ ។

ដូច្នេះ $(a, b, c) = \{(2; 0; -1); (-2; 0; 1)\}$ ។

177. ▲ សន្មតថា $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5$ ។ សន្មតថា $\min_{i \neq j} (a_i - a_j)^2 > \frac{1}{100}$ នោះ

$$\begin{aligned}
a_2 - a_1 &> \frac{1}{10} \Rightarrow a_2 > \frac{1}{10} \\
a_3 - a_2 &> \frac{1}{10} \Rightarrow a_3 > \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} \\
a_4 - a_3 &> \frac{1}{10} \Rightarrow a_4 > \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{3}{10} \\
a_5 - a_4 &> \frac{1}{10} \Rightarrow a_5 > \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} \\
\Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 &> \frac{1+2+3+4}{10} = 1
\end{aligned}$$

មិនត្រឹមត្រូវ។

សន្មតថា $\min_{i \neq j} |a_i^2 - a_j^2| > \frac{1}{36}$ នោះ

$$\begin{aligned}
a_2^2 - a_1^2 &> \frac{1}{36} \Rightarrow a_2 > \frac{1}{6} \\
a_3^2 - a_2^2 &> \frac{1}{36} \Rightarrow a_3 > \frac{\sqrt{2}}{6} \\
a_4^2 - a_3^2 &> \frac{1}{36} \Rightarrow a_4 > \frac{\sqrt{3}}{6} \\
a_5^2 - a_4^2 &> \frac{1}{36} \Rightarrow a_5 > \frac{\sqrt{4}}{6} \\
\Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 &> \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}}{10} > 1
\end{aligned}$$

មិនត្រឹមត្រូវ។

178. ▲ ❶ ដំនោះស្រាយទី១

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= \frac{2a}{(b+c) + (b+c)} + \frac{2b}{(c+a) + (c+a)} + \frac{2c}{(a+b) + (a+b)} \\
&< \frac{2a}{a + (b+c)} + \frac{2b}{b + (c+a)} + \frac{2c}{c + (a+b)} = 2
\end{aligned}$$

❷ ដំនោះស្រាយទី២

តាង $a = x + y; b = y + z; c = z + x$ ។

$$a + b > c \Leftrightarrow x + y + y + z > z + x \Rightarrow y > 0$$

$$a + c > b \Leftrightarrow x + y + z + x > y + z \Rightarrow x > 0$$

$$b + c > a \Leftrightarrow y + z + z + x > x + y \Rightarrow z > 0$$

ដូច្នេះ យើងបំប្លែង លក្ខខណ្ឌ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងត្រីកោណមក $x, y, z > 0$ ។

យើងមាន

$$\frac{x+y}{y+z+z+x} + \frac{y+z}{z+x+x+y} + \frac{z+x}{x+y+y+z} < \frac{x+y}{y+z+x} + \frac{y+z}{z+x+y} + \frac{z+x}{x+y+z} = 2$$

ពិត។

179. ▲ តាង $a = x + y; b = y + z; c = z + x$ នោះ $x; y; z > 0$ ។

វិសមភាពខាងឆ្វេងសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} & (a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ca) \\ \Leftrightarrow & 4(x + y + z)^2 \geq 3[(x + y)(y + z) + (y + z)(z + x) + (z + x)(x + y)] \\ \Leftrightarrow & x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2] \geq 0 \end{aligned}$$

ពិត។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នាពេល $x = y = z$ មានន័យថា $a = b = c$ ។

ដូចគ្នាវិសមភាពខាងស្តាំសមមូលនឹង $xy + yz + zx > 0$ ពិត ព្រោះ $x, y, z > 0$ ។

180. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 > 2ab \\ a + b > c & \Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab > c^2 \\ \Rightarrow & a^2 + b^2 + (a^2 + b^2) > a^2 + b^2 + 2ab > c^2 \\ \Rightarrow & 2a^2 + 2b^2 - c^2 > 0 \end{aligned}$$

ដូចគ្នាយើងទាញបាន

$$\begin{aligned} 2b^2 + 2c^2 - a^2 & > 0 \\ 2c^2 + 2a^2 - b^2 & > 0 \end{aligned}$$

យើងនឹងបង្ហាញថា

$$(2a^2 + 2b^2 - c^2)(2c^2 + 2a^2 - b^2) \leq (2a^2 + bc)^2$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} & (2a^2 + bc)^2 - (2a^2 + 2b^2 - c^2)(2c^2 + 2a^2 - b^2) \\ & = 4a^2bc - 2a^2(b^2 + c^2) - 4b^2c^2 + 2b^4 + 2c^4 \\ & = 2(b^2 - c^2)^2 - 2a^2(b - c)^2 \\ & = 2(b - c)^2(b + c + a)(b + c - a) \geq 0 \end{aligned}$$

ដូចគ្នាយើងទាញបាន

$$\begin{aligned} 0 & < (2a^2 + 2b^2 - c^2)(2c^2 + 2a^2 - b^2) \leq (2a^2 + bc)^2 \\ 0 & < (2b^2 + 2c^2 - a^2)(2a^2 + 2b^2 - c^2) \leq (2b^2 + ac)^2 \\ 0 & < (2c^2 + 2a^2 - b^2)(2b^2 + 2c^2 - a^2) \leq (2c^2 + ab)^2 \end{aligned}$$

គុណអង្គនឹងអង្គយើងទាញបានវិសមភាព។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នាពេល $a = b = c$ ។

181. ▲ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} a \geq 0; b^2 - 4ac \leq 0 & \Rightarrow b^2 \leq 4ac = 4.2a.\frac{c}{2} \leq \left(2a + \frac{c}{2}\right)^2 \\ \Rightarrow & 2b \leq 4a + c \\ \Rightarrow & 2b - 4a \leq c \\ \Rightarrow & 3b - 3a \leq a + b + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{a+b+c}{b-a} \geq 3 \\ &\Rightarrow \min F = 3 \end{aligned}$$

182. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} S &= bc \sin \frac{\alpha}{2} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ \frac{\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha}{2} &= \cos(\alpha - 60^\circ) \end{aligned}$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &\geq 4S\sqrt{3} \Leftrightarrow b^2 + c^2 \geq bc(\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha) \\ &\Leftrightarrow (b-c)^2 + 2bc(1 - \cos(\alpha - 60^\circ)) \geq 0 \end{aligned}$$

យើងមានសមភាពទាល់តែ $b = c$ និង $\alpha = 60^\circ$ មានន័យថា ត្រីកោណជាត្រីកោណសម័ង្ស។

183. ▲ សន្មតថា $a \geq 0; c \geq 0; 4ac \geq b^2$ ។ បើ $a = 0$ នោះ $b = 0$ ហើយវិសមភាពទៅជា $cg^2 \geq 0$ ។ បើ $a > 0$ នោះ

$$af^2 + bfg + cg^2 = a\left(f + \frac{b}{2a}g\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}g^2 \geq 0$$

ឥឡូវយើងសន្មតថា $af^2 + bfg + cg^2 \geq 0$ ចំពោះគ្រប់គូរចំនួន f, g ។ ជំនួស f ដោយ tg ($t \in \mathbb{R}$)

យើងទាញបាន $(at^2 + bt + c)g^2 \geq 0$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត t ដូច្នេះនាំអោយ $a \geq 0, c \geq 0, 4ac \geq b^2$ ។

184. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} -a_i &= \sum_{j=1; j \neq i}^n a_j \\ n|a_i| &= |(n-1)a_i - (-a_i)| = \left| \sum_{j=1; j \neq i}^n (a_i - a_j) \right| \\ &= \left| \sum_{i \neq j} (a_i - a_j) \right| \leq \sum_{i \neq j} |a_i - a_j| \\ \Rightarrow n \sum_{i=1}^n |a_i| &\leq 2 \sum_{i < j} |a_i - a_j| \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ វិសមភាពពិត។

ចំពោះ $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = x$ និង $a_n = -(n-1)x$ យើងទាញបានអង្គទាំង២ស្មើគ្នា។ ដូច្នេះ វិសមភាពជាវិសមភាពតូចជាងឬស្មើ។

185. ▲ ❶ ដំណោះស្រាយទី១

ជាដំបូងយើងសន្មតថា កត្តានិមួយៗនៃអង្គខាងស្តាំរបស់វិសមភាពមានតម្លៃវិជ្ជមានឬសូន្យ។
យើងមាន

$$\begin{aligned} b - 1 + \frac{1}{c} &= b \left(1 - \frac{1}{b} + \frac{1}{bc} \right) = b \left(1 - \frac{1}{b} + a \right) \\ \Rightarrow \left(a - 1 + \frac{1}{b} \right) \left(b - 1 + \frac{1}{c} \right) &= b \left[a - \left(1 - \frac{1}{b} \right) \right] \left[a + \left(1 - \frac{1}{b} \right) \right] \\ &= b \left[a^2 - \left(1 - \frac{1}{b} \right)^2 \right] \\ &\leq ba^2 \end{aligned}$$

ដូចគ្នា យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \left(b - 1 + \frac{1}{c} \right) \left(c - 1 + \frac{1}{a} \right) &\leq cb^2 \\ \left(a - 1 + \frac{1}{b} \right) \left(c - 1 + \frac{1}{a} \right) &\leq ac^2 \\ \Rightarrow \left[\left(a - 1 + \frac{1}{b} \right) \left(b - 1 + \frac{1}{c} \right) \left(c - 1 + \frac{1}{a} \right) \right]^2 &\leq (abc)^2 = 1 \end{aligned}$$

ពិត។

ករណីមានកត្តាណាមួយអវិជ្ជមាន ឧទាហរណ៍ $a - 1 + \frac{1}{b} < 0$ នោះ $a < 1$ ហើយ $b > 1$ ។ ក្នុងករណីនេះ $b - 1 + \frac{1}{c} > 0$ និង $c - 1 + \frac{1}{a} > 0$ ។ ដូច្នេះបើមានកត្តាណាមួយអវិជ្ជមាន នោះ មានតែកត្តាមួយនោះប៉ុណ្ណោះ ដែលអវិជ្ជមាន ដូច្នេះផលគុណនៃកត្តាទាំងបីនេះអវិជ្ជមាន ដូច្នេះតូចជាង១។

❷ ដំណោះស្រាយទី២

វិសមភាពដែលឱ្យសមមូលនឹង

$$\left(a - (abc)^{\frac{1}{3}} + \frac{(abc)^{\frac{2}{3}}}{b} \right) \left(b - (abc)^{\frac{1}{3}} + \frac{(abc)^{\frac{2}{3}}}{c} \right) \left(c - (abc)^{\frac{1}{3}} + \frac{(abc)^{\frac{2}{3}}}{a} \right) \leq abc$$

ជំនួស $a = x^3; b = y^3; c = z^3$ ដែល $x, y, z > 0$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \left(x^3 - xyz + \frac{(xyz)^2}{y^3} \right) \left(y^3 - xyz + \frac{(xyz)^2}{z^3} \right) \left(z^3 - xyz + \frac{(xyz)^2}{x^3} \right) &\leq x^3 y^3 z^3 \\ \Leftrightarrow (x^2 y - y^2 z + z^2 x)(y^2 z - z^2 x + x^2 y)(z^2 x - x^2 y + y^2 z) &\leq x^3 y^3 z^3 \\ \Leftrightarrow 3x^3 y^3 z^3 + \sum_{cyclic} x^6 y^3 &\geq \sum_{cyclic} x^4 y^4 z + \sum_{cyclic} x^5 y^2 z^2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 3(x^2y)(y^2z)(z^2x) + \sum_{cyclic} (x^2y)^3 \geq \sum_{sym} (x^2y)^2(y^2z)$$

តាង $u = x^2y; v = y^2z; w = z^2x$ ។ យើងមាន $u, v, w > 0$

$$\Rightarrow 3uvw + \sum_{cyclic} u^3 \geq \sum_{sym} u^2v$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyclic} u(u-v)(u-w) \geq 0$$

ពិត តាមវិសមភាព Schur ។

186.▲ ដោយប្រើលក្ខខណ្ឌ $a + b = 1$ យើងបំប្លែងវិសមភាពដែលអោយទៅជាវិសមភាពអូម៉ូសែន

$$\frac{1}{3} \leq \frac{a^2}{(a+b)(a+(a+b))} + \frac{b^2}{(a+b)(b+(a+b))} \Leftrightarrow a^2b + ab^2 \leq a^3 + b^3$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2(a+b) \geq 0$$

ពិត។ សមភាពកើតមាន ពេល $a = b = 1/2$ ។

187.

188. ▲ ដោយ $0 < x < 1$ នោះវិសមភាពដែលឱ្យអាចសរសេរជា

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{1-x}\right) \geq 9$$

$$(x+1)(1-x+1) \geq 9x(1-x)$$

$$2+x-x^2 \geq 9x-9x^2$$

$$(2x-1)^2 \geq 0$$

ពិត។

189. ▲ យើងមាន

$$\frac{a^6}{b^6} + \frac{a^4}{b^4} + \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^6}{a^6} + \frac{b^4}{a^4} + \frac{b^2}{a^2} = \left(\frac{a^6}{b^6} + \frac{b^6}{a^6}\right) + \left(\frac{a^4}{b^4} + \frac{b^4}{a^4}\right) + \left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2}\right)$$

$$\geq 2 + 2 + 2 = 6$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $a = b$ ។

190. ▲ យើងមាន

$$\frac{x}{x^4+y^2} + \frac{y}{x^2+y^4} \leq \frac{x}{2\sqrt{x^4y^2}} + \frac{y}{2\sqrt{x^2y^4}}$$

$$\leq \frac{x}{2x^2y} + \frac{y}{2xy^2} = \frac{1}{xy}$$

191. ▲ យើងមាន

$$0 \leq (x - \sqrt{y^2 + 1})^2 + (y - \sqrt{x^2 + 1})^2 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + 1 \geq x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា បើ

$$\begin{cases} x = \sqrt{y^2 + 1} \\ y = \sqrt{x^2 + 1} \end{cases}$$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = x^2 + y^2 + 2$ មិនអាច។ ដូច្នេះអង្គទី១ធំជាងអង្គទី២ជាច្រើន មានន័យថា

$$x^2 + y^2 + 1 > x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}$$

192. ▲ យើងមាន

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 - 2\frac{x}{z} + \left(\frac{y}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{z}\right)^2 - 2\frac{y}{x} + \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{x}\right)^2 - 2\frac{z}{y} + \left(\frac{x}{y}\right)^2 \geq 0 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{z} - \frac{z}{x}\right)^2 + \left(\frac{z}{x} - \frac{x}{y}\right)^2 \geq 0$$

ពិតជាជិត្យ។ អង្គទាំង២ស្មើគ្នា មានតែ $x = y = z$ ។

193. ▲ តាង $a = x + y, b = y + z, c = z + x$ នោះ $x, y, z > 0$ ។

វិសមភាពសមមូលនឹង

$$(x + 2y + z)(x + y + 2z)(2x + y + z) \geq 64xyz$$

យើងមាន

$$x + 2y + z = (x + y) + (y + z) \\ \geq 2\sqrt{xy} + 2\sqrt{yz} \\ \geq 4(xy^2z)^{1/4}$$

ដូចគ្នា

$$x + y + 2z \geq 4(xy^2z)^{1/4} \\ 2x + y + z \geq 4(x^2yz)^{1/4}$$

ដូច្នេះ

$$(x + 2y + z)(x + y + 2z)(2x + y + z) \geq 64(xy^2z \cdot xyz^2 \cdot x^2yz)^{1/4} = 64xyz$$

ពិត។

194. ▲ តាង $a = x + y; b = y + z; c = z + x$ នោះ $a; b; c > 0$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - z^2}{y + z} + \frac{y^2 - x^2}{z + x} + \frac{zx^2 - y^2}{x + y} &= \frac{(a - b)c}{b} + \frac{(b - c)a}{c} + \frac{(c - a)b}{a} \\ &= \frac{ac}{b} + \frac{ba}{c} + \frac{bc}{a} - a - b - c\end{aligned}$$

តែថា

$$\frac{1}{2}\left(\frac{ac}{b} + \frac{ba}{c}\right) = a \frac{b^2 + c^2}{2bc} \geq a$$

ទៅជាស្មើគ្នា ទាល់តែ $b = c$ ។ ដូចគ្នាដែរ

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\left(\frac{ac}{b} + \frac{bc}{a}\right) &\geq c \\ \frac{1}{2}\left(\frac{ba}{c} + \frac{bc}{a}\right) &\geq b\end{aligned}$$

ប្រកអង្គនៃវិសមភាពទាំងនេះបញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន $\frac{ac}{b} + \frac{ba}{c} + \frac{bc}{a} - a - b - c \geq 0$ ។ ដូច្នេះ វិសមភាពពិត។ សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $a = b = c$ មានន័យថា $x = y = z$ ។

195. ▲ តាង $x = a + b - c, y = b + c - a, z = c + a - b$ ។

ដូច្នេះ $x, y, z > 0$ និង $a = \frac{x+z}{2}, b = \frac{y+x}{2}, c = \frac{z+y}{2}$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned}2(x + y) &= (x + y) + (x + y) \geq x + y + 2\sqrt{xy} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \\ \Rightarrow \sqrt{x} + \sqrt{y} &\leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{x + y}\end{aligned}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា បើ $x = y$ ។

ដូច្នេះ

$$\sqrt{a + b - c} + \sqrt{b + c - a} = \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{x + y} = 2\sqrt{b}$$

ដូចគ្នា

$$\begin{aligned}\sqrt{b + c - a} + \sqrt{c + a - b} &\leq 2\sqrt{c} \\ \sqrt{c + a - b} + \sqrt{a + b - c} &\leq 2\sqrt{a}\end{aligned}$$

ប្រកអង្គនឹងអង្គនៃវិសមភាព យើងទាញបានវិសមភាពពិត។

សមភាពកើតមាន លុះត្រាតែ $x = y = z$ មានន័យថា $a = b = c$ ។

196. ▲ ❶ ដំណោះស្រាយទី១

យើងមាន $(a - b)(a^2 - b^2) \geq 0 \Rightarrow a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$ ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ និងមានតែ $a = b$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} &\leq \frac{1}{ab(a+b) + abc} = \frac{c}{abc(a+b+c)} \\ \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} &\leq \frac{a}{abc(a+b+c)} \\ \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} &\leq \frac{b}{abc(a+b+c)}\end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} + \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} + \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \leq \frac{c + b + a}{abc(a+b+c)} = \frac{1}{abc}$$

២ ដំណោះស្រាយទី២

វិសមភាពនេះសមមូលនឹង

$$\begin{aligned}\sum_{sym} (a^3 + b^3 + abc)(b^3 + c^3 + abc)abc \\ &\leq 2(a^3 + b^3 + abc)(b^3 + c^3 + abc)(c^3 + a^3 + abc) \\ \Leftrightarrow \sum_{sym} (a^7bc + 3a^4b^4c + 4a^5b^2c^2 + a^3b^3c^3) \\ &\leq \sum_{sym} (a^3b^3c^3 + 2a^6b^3 + 3a^4b^4c + a^7bc + 2a^5b^2c^2) \\ \Leftrightarrow \sum_{sym} (2a^6b^3 - 2a^5b^2c^2) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{sym} a^6b^3c^0 &\geq \sum_{sym} a^5b^2c^2\end{aligned}$$

ពិតជាវិសមភាព Muirhead ព្រោះ $(6; 3; 0)$ លុបលើ $(5; 2; 2)$ ។ ស្អិត $(6; 3; 0)$ លុបលើ $(5; 2; 2)$

ព្រោះ $6 > 5; 6 + 3 = 9 > 5 + 2 = 7; 6 + 3 + 0 = 5 + 2 + 2$ ។

197. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}a^5 + b^5 &= (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) \\ &= (a+b)[(a-b)(a^3 - b^3) + a^2b^2] \\ &\geq (a+b)a^2b^2\end{aligned}$$

ព្រោះ $(a-b)(a^3 - b^3) \geq 0$ ។

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} &\leq \frac{ab}{(a+b)a^2b^2 + ab} \\ &= \frac{1}{ab(a+b) + 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{ab(a+b) + abc} \\
&= \frac{1}{ab(a+b+c)} \\
&= \frac{c}{a+b+c}
\end{aligned}$$

តាមរបៀបដូចគ្នា ចំពោះតួផ្សេងទៀត។ យើងទាញបាន

$$\frac{ab}{a^5+b^5+ab} + \frac{bc}{b^5+c^5+bc} + \frac{ca}{c^5+a^5+ca} \leq \frac{c}{a+b+c} + \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{a+b+c} = 1$$

សមភាពកើតមានពេល $a = b = c$ ។

198.▲ តាង

$$\begin{aligned}
A &= \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \\
B &= \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \\
A - B &= \sum_{i=1}^n a_i^2 b_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i^2 b_j^2 - \left[\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i b_i a_j b_j \right] \\
&= \sum_{i \neq j} a_i^2 b_j^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i b_i a_j b_j \\
&= \left[\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i^2 b_j^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_j^2 b_i^2 \right] - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i b_i a_j b_j \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i b_i a_j b_j) \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq 0
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ សំណើពិត។

199.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_i}} \right)^2 = n^2$$

200.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ីស្វាត

$$(a + b + b + c + c + c)^2 \leq (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)(a^2 + b^2 + b^2 + c^2 + c^2 + c^2)$$

$$\Rightarrow \frac{(a+2b+3c)^2}{a^2+2b^2+3c^2} \leq 6$$

201.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត

$$\begin{aligned} &\Rightarrow 3 \left[\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \right] \geq \left[\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right) + \left(c + \frac{1}{c}\right) \right]^2 \\ &= \left(a + b + c + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \right)^2 = \left(1 + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \right)^2 \\ &\geq \left(1 + \frac{3}{(abc)^{\frac{1}{3}}} \right)^2 \quad \text{តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត} \\ &\geq \left(1 + \frac{9}{a+b+c} \right)^2 \quad \text{តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត} \\ &= (1+9)^2 = 100 \\ &\Rightarrow \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{100}{3} \end{aligned}$$

202.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត-ស្កាត

$$(a+b+c+d)^2 \leq (1+1+1+1)(a^2+b^2+c^2+d^2) = 4(a^2+b^2+c^2+d^2)$$

$$\Rightarrow (8-e)^2 \leq 4(16-e^2)$$

$$\Rightarrow e(5e-16) \leq 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq e \leq \frac{16}{5}$$

ដើម្បីឱ្យ $e = 16/5$ លក្ខខណ្ឌគឺ $a = b = c = d$ និង $a + b + c + d = 24/5 \Rightarrow a = b = c = d = 6/5$ ។

203.▲ ❶ តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត-ស្កាត យើងមាន

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{s} \right) \geq n^2$$

យើងមាន

$$\sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{s} = \sum_{i=1}^n 1 - \frac{1}{s} \sum_{i=1}^n a_i = n - 1 \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \right) \geq \frac{n^2}{n-1} \quad \text{ពិត។}$$

❷ ម្យ៉ាងវិញទៀត

$$\sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{a_i} = -n + \sum_{i=1}^n \frac{s}{a_i} \quad (*)$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{a_i}\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s}\right) \geq n^2$$

ដោយ

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i/s\right) = 1 \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{a_i}\right) \geq n^2 ; (*) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{a_i} \geq -n + n^2 = n(n-1)$$

ពិត។

❸ យើងមាន

$$\left(\sum_{i=1}^n 1\right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \geq \frac{s^2}{n}$$

តែថា

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n [a_i(s-a_i)]\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s-a_i}\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = s^2 \\ \Rightarrow & \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s-a_i}\right) \geq \frac{s^2}{(\sum_{i=1}^n [a_i(s-a_i)])} = \frac{s^2}{s \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n a_i^2} \\ & \geq \frac{s^2}{s^2 - \frac{s^2}{n}} = \frac{n}{n-1} \end{aligned}$$

ពិត។

204.▲ ក) សំនួរនេះគ្មានលក្ខណៈពិសេសណាមួយដំបូងជាប់ $a_1; a_2; a_3$ ទេ មានន័យថា បើយើងផ្លាស់ a_1 ទៅ a_2 ; a_2 ទៅ a_1 ។ល។នោះសម្មតិកម្មនៅដដែលគ្មានប្រែប្រួល។ តាមលក្ខណៈនេះ យើងអាចសន្មតថា $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ ។ ដូច្នេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា $a_1 + a_2 > a_3$ ទៅបានហើយ។ យើងមាន

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2 > 2(a_1^4 + a_2^4 + a_3^4)$$

$$\Leftrightarrow (a_1 + a_2 + a_3)(a_1 + a_2 - a_3)(-a_1 + a_2 + a_3)(a_1 - a_2 + a_3) > 0$$

កត្តានិមួយៗសុទ្ធតែវិជ្ជមាន លើកលែងតែ $(a_1 + a_2 - a_3)$ ដែលមិនទាន់ដឹង។ តែ ផលគុណរបស់កត្តាទាំងអស់វិជ្ជមាន ដូច្នេះ $(a_1 + a_2 - a_3)$ ត្រូវតែវិជ្ជមាន។

ខ) ករណី $n = 3$ បានស្រាយបញ្ជាក់រួចក្នុងសំនួរក)។ យើងសន្មតថា $n \geq 4$ ។

តាមដូចរៀបរាប់ក្នុងសំណួរក) យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា $a_1; a_2; a_3$ ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយ។

តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត

$$\begin{aligned} (n-1)(a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4) &< (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^2 \\ &= \left(\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{2} + \frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{2} + \sum_{k=4}^n a_k^2 \right)^2 \\ &\leq (n-1) \left(\frac{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2}{4} + \frac{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2}{4} + \sum_{k=4}^n a_k^4 \right) \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow 2(a_1^4 + a_2^4 + a_3^4) < (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2$ ហើយតាម សំណួរ ក) យើងទាញបានថាសំនើពិត។

205.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត ចំពោះគ្រប់ i យើងមាន

$$\begin{aligned} S_2 - a_i^2 &= a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{i-1}^2 + a_{i+1}^2 + \dots + a_n^2 \\ &\geq \frac{1}{n-1} (a_1 + a_2 + \dots + a_{i-1} + a_{i+1} + \dots + a_n)^2 = \frac{1}{n-1} (S_1 - a_i)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{S_2 - a_i^2}{S_1 - a_i} &\geq \frac{1}{n-1} (S_1 - a_i) \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{S_2 - a_i^2}{S_1 - a_i} &\geq \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (S_1 - a_k) = S_1 \end{aligned}$$

206.▲ តាង $E = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^+ / a^2 + b^2 = (c^2 + d^2)^3\}$ និង f ជាអនុគមន៍ កំនត់លើ E ដោយ

$$f(a, b, c, d) = \frac{c^3}{a} + \frac{d^3}{b} - 1$$

យើងឃើញថា ចំពោះ $\forall \lambda \in \mathbb{R}^+ : (a, b, c, d) \in E$ និង $f(a, b, c, d) \geq 0$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 = (c^2 + d^2)^3 &\Leftrightarrow (\lambda^3 a)^2 + (\lambda^3 b)^2 = [(\lambda c)^2 + (\lambda d)^2]^3 \\ &\Leftrightarrow a_1^3 + b_1^3 = (c_1^2 + d_1^2)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(a, b, c, d) &= \frac{c^3}{a} + \frac{d^3}{b} - 1 = \frac{(\lambda c)^3}{\lambda^3 a} + \frac{(\lambda d)^3}{\lambda^3 b} - 1 = f(\lambda^3 a, \lambda^3 b, \lambda c, \lambda d) \\ &= f(a_1, b_1, c_1, d_1) \end{aligned}$$

នោះ $(a_1 = \lambda^3 a, b_1 = \lambda^3 b, c_1 = \lambda c, d_1 = \lambda d) \in E$ និង

$f(a, b, c, d) \geq 0 \Leftrightarrow f(a_1, b_1, c_1, d_1) \geq 0$ ។ លក្ខណៈខាងលើនេះពិតចំពោះ $\forall \lambda \in \mathbb{R}^+$ ដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសយក λ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_1^2 + b_1^2 = 1$ ។ តែយើងអាចជំនួសសំនេរ a_1, b_1, c_1, d_1

ដោយ a, b, c, d ដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់។ ដូច្នេះ មានន័យថាយើងអាចយក $(a, b, c, d) \in E$ និង $a^2 + b^2 = 1$ ដោយមិនធ្វើអោយបាត់ភាពទូទៅឡើយ។ ដូច្នេះ $c^2 + d^2 = 1$ ។

តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត នាំអោយ

$$\left(\frac{c^3}{a} + \frac{d^3}{b}\right)(ac + bd) \geq (c^2 + d^2)^2 = 1$$

តែយើងមាន

$$\begin{aligned} ac + bd &\leq \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2 + d^2}{2} = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = 1 \\ \Rightarrow \frac{c^3}{a} + \frac{d^3}{b} &\geq \frac{1}{ac + bd} \geq 1 \end{aligned}$$

207.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត

$$\begin{aligned} (\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1})^2 &\leq (x+y+z) \left(\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z} \right) \\ \Leftrightarrow \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1} &\leq \sqrt{x+y+z} \sqrt{\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z}} \end{aligned}$$

យើងមាន

$$\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z} = 3 - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = 1$$

ដូច្នេះ

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1} \leq \sqrt{x+y+z} \sqrt{\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z}} = \sqrt{x+y+z}$$

វិសមភាពពិត។

យើងមានសមភាព លុះត្រាតែ

$$\frac{x-1}{x^2} = \frac{z-1}{z^2} = \frac{z-1}{z^2}; \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \Rightarrow x = y = z = \frac{3}{2}$$

208.▲ តាង $a = 1/x; b = 1/y; c = 1/z$ ។ លក្ខខណ្ឌ

$$xyz \geq xy + yz + zx \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq 1 \Rightarrow a + b + c \leq 1$$

វិសមភាព

$$xyz \geq 3(x+y+z) \Leftrightarrow ab + bc + ca \leq \frac{1}{3}$$

យើងមាន

$$1 \geq (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

ហើយតាមវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត យើងមាន

$$ab + bc + ca \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{b^2 + c^2 + a^2} \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

ដូច្នេះ នាំអោយ $1 \geq 3(ab + bc + ca)$ ពិត។

209.▲ តាង $a = \tan x; b = \tan y; c = \tan z$ នោះ x, y, z ជាមុំនៃត្រីកោណស្រួច។ ដូច្នេះ វិសមភាពសមមូលនឹង $\max(\tan x, \tan y, \tan z) \geq \sqrt{3}$ ។ តែថា មានមុំមួយរបស់ត្រីកោណ ឧទាហរណ៍ x ដែលធំជាងរឺស្មើ $\pi/3$ (បើ តូចជាង $\pi/3$ ទាំងអស់គ្នា នោះ ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ មានតំលៃតូចជាង π)។ ដោយអនុគមន៍ $\tan$ កើនលើ $[0, \pi/2)$ នោះ $\tan x \geq \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ ។

210.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^4 &= [(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) + (2x_1x_2 + 2x_1x_3 + \dots)]^2 \\ &\geq 4(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(2x_1x_2 + 2x_1x_3 + \dots) \quad (\text{វិសមភាពកូស៊ី}) \quad (1) \\ &= 8(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \left(\sum_{i < j} x_i x_j \right) \\ &= 8 \sum_{i < j} [x_i x_j (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)] \\ &\geq 8 \sum_{i < j} [x_i x_j (x_i^2 + x_j^2)] \quad (2) \end{aligned}$$

យើងមានសមភាព (2) ទាល់តែនិងមានតែ មានយ៉ាងហោចណាស់ x_i ចំនួន $(n-2)$ ដែលស្មើសូន្យ។ ឧទាហរណ៍ $x_3 = \dots = x_n = 0$ ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ យើងមានសមភាព(1) ទាល់តែនិងមានតែ $2x_1x_2 = x_1^2 + x_2^2$ មានន័យថា $x_1 = x_2$ ។ ដូច្នេះ $C = 1/8$ ដោយអង្កត់ទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែនិងមានតែ មានយ៉ាងហោចណាស់ x_i ចំនួន $(n-2)$ ត្រូវ ដែលស្មើសូន្យ ហើយត្រូវទៀតស្មើគ្នា។

211.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} P^2 &= (xy + yz + zt + tx)^2 \leq (x^2 + y^2 + z^2 + t^2)(y^2 + z^2 + t^2 + x^2) = 1 \\ \text{ដូច្នេះ } -1 &\leq P \leq 1 \quad \text{។} \\ \text{បើ } x &= z = \frac{1}{2}; y = t = -\frac{1}{2} \text{ នោះ } x + y + z + t = 0; x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1 \quad \text{។ ហើយ} \\ P &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \text{។ ដូច្នេះ } P_{\min} = -1 \quad \text{។} \end{aligned}$$

យើងមាន $P = (x+z)(y+t) = -(y+t)^2 \leq 0$ ។ បើ $x = y = 1/2; z = t = -1/2$ នោះ

$P = 0$ ។ ដូច្នេះ $P_{\max} = 0$ ។

ជាសរុប $P_{\min} = -1$ ឧទាហរណ៍ត្រង់ $x = z = 1/2; y = t = -1/2$ ។

$P_{\max} = 0$ ឧទាហរណ៍ត្រង់ $x = y = 1/2; z = t = -1/2$ ។

212.▲ យើងតាង $x_1 = \tan \alpha_1, x_2 = \sec \alpha_1 \tan \alpha_2$ និង

$$x_k = \sec \alpha_1 \sec \alpha_2 \dots \sec \alpha_{k-1} \tan \alpha_k$$

ដោយ $-\frac{\pi}{2} < \alpha_k < \frac{\pi}{2}, 1 \leq k \leq n$ ។ យើងគួរកត់សំគាល់ថាការជំនួសនេះព្រោះលំដាប់របស់ $\tan \alpha$ គឺ $(-\infty, \infty)$ និង $\sec \alpha$ ខុសពីសូន្យជានិច្ច។ ដូច្នេះតួទី k របស់អង្គខាងស្តាំនៃវិសមភាពស្មើនឹង

$$\frac{\sec \alpha_1 \dots \sec \alpha_{k-1} \tan \alpha_k}{1 + \tan^2 \alpha_1 + \dots + \sec^2 \alpha_1 \dots \sec^2 \alpha_{n-1} \tan^2 \alpha_n} \\ = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \dots \cos \alpha_k \sin \alpha_k$$

ដូច្នេះវិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\cos \alpha_1 \sin \alpha_1 + \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 + \dots + \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \dots \cos \alpha_n \sin \alpha_n < \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow c_1 s_1 + c_1 c_2 s_2 + \dots + c_1 c_2 \dots c_n s_n < \sqrt{n}$$

ដែល $c_i = \cos \alpha_i$ និង $s_i = \sin \alpha_i$ ចំពោះ $1 \leq i \leq n$ ។ ចំពោះ $2 \leq i \leq n$ ដោយសារ

$$c_i^2 + s_i^2 = \cos^2 \alpha_i + \sin^2 \alpha_i = 1 \text{ យើងទាញបានថា}$$

$$\Rightarrow s_1^2 + c_1^2 s_2^2 + \dots + c_1^2 c_2^2 \dots c_{n-2}^2 s_{n-1}^2 + c_1^2 s_2^2 \dots c_{n-1}^2 = 1 \quad (*)$$

តាម(*) និងតាមវិសមភាពកូស៊ីន្យូស្ត យើងទាញបាន

$$c_1 s_1 + c_1 c_2 s_2 + \dots + c_1 c_2 \dots c_n s_n \\ \leq \sqrt{s_1^2 + c_1^2 s_2^2 + \dots + c_1^2 c_2^2 \dots c_{n-2}^2 s_{n-1}^2 + c_1^2 c_2^2 \dots c_{n-1}^2} \cdot \sqrt{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_{n-1}^2 + c_n^2 s_n^2} \\ = \sqrt{c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_{n-1}^2 + c_n^2 s_n^2} \\ = \sqrt{\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 + \dots + \cos^2 \alpha_{n-1} + \cos^2 \alpha_n \sin^2 \alpha_n} \leq \sqrt{n}$$

វិសមភាពចុងក្រោយ ក្លាយជាសមភាព នៅពេលដែល

$$\cos \alpha_1 = \cos \alpha_2 = \dots = \cos \alpha_{n-1} = \cos \alpha_n \sin \alpha_n = 1$$

សមភាពនេះមិនអាចទេ ព្រោះ $\cos \alpha_n \sin \alpha_n = \frac{1}{2} \sin 2\alpha_n < 1$ ។ ដូច្នេះ យើងមានវិសមភាព

ជាច្រើន។

213.▲ តាង $a = 1/x, b = 1/y, c = 1/z$ នោះ $a, b, c \in (0; 1)$ និង $a + b + c = 2$ ។

វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\begin{aligned}
& \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \geq \sqrt{\frac{1-a}{a}} + \sqrt{\frac{1-b}{b}} + \sqrt{\frac{1-c}{c}} \\
\Leftrightarrow & \sqrt{\frac{1}{2}(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)} \geq \sqrt{\frac{\frac{a+b+c}{2} - a}{a}} + \sqrt{\frac{\frac{a+b+c}{2} - b}{b}} + \sqrt{\frac{\frac{a+b+c}{2} - c}{c}} \\
\Leftrightarrow & \sqrt{(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)} \geq \sqrt{\frac{b+c-a}{a}} + \sqrt{\frac{c+a-b}{b}} + \sqrt{\frac{a+b-c}{c}} \\
\Leftrightarrow & [(b+c-a) + (c+a-b) + (a+b-c)] \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \\
& \geq \left(\sqrt{\frac{b+c-a}{a}} + \sqrt{\frac{c+a-b}{b}} + \sqrt{\frac{a+b-c}{c}} \right)^2
\end{aligned}$$

ពិត តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត។

214.▲ ដោយចំនួនចំលាស់នៃលំដាប់ $b_1, b_2, \dots, b_n$ មានចំនួនកំនត់ (ទាំងអស់មាន $n!$ របៀប) នោះមានមួយបែបដែល S មានតំលៃធំបំផុត (ដូចគ្នា តូចបំផុត)។ តាង $i < j$ ជាសន្ទស្សន៍ពីរ, តាង σ ជាចំលាស់នៃ $\{1, 2, \dots, n\}$ ហើយសន្មតថា $\sigma(i) > \sigma(j)$ ។ ដូច្នេះ $b_{\sigma(j)} \geq b_{\sigma(i)}$ ព្រោះស្ទីត (b_k) កើន។ តាង σ' ជាចំលាស់នៃ $\{1, 2, \dots, n\}$ ដែលដូចគ្នានឹង σ ដែរ តែខុសត្រង់ i, j ដែល $\sigma'(j) = \sigma(i)$ និង $\sigma'(i) = \sigma(j)$ ។ ដូច្នេះ

$$S_{\sigma'} - S_{\sigma} = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)})$$

– បើ $a_i < a_j$ និង $b_{\sigma(j)} < b_{\sigma(i)}$ នោះ $S_{\sigma'} > S_{\sigma}$ មានន័យថា S_{σ} មិនមែនធំបំផុតទេ

– បើ $a_i = a_j$ រឺ $b_{\sigma(j)} = b_{\sigma(i)}$ នោះ $S_{\sigma'} = S_{\sigma}$

ដូច្នេះ ជំនួស σ ដោយ σ' ផលបូកមិនថយចុះទេ រឺក៏អាចធំជាងមុន។

បើ $\sigma(1) \neq 1$ ឧទាហរណ៍ $\sigma = \{3; 1; 2; \dots; n\}; \sigma(1) = 3; \sigma(2) = 1$ ។ យើងមានចំលាស់ σ' មួយដែល $\sigma'(1) = 1$ ឧទាហរណ៍ $\sigma' = \{1; 3; 2; \dots; n\}; \sigma'(1) = 1; \sigma'(2) = 3$ ដែលតួទាំងអស់ដូចគ្នានឹង σ លើកលែងតែតួទីមួយនិងទីពីរចេញ។ តាមលក្ខណៈខាងលើ យើងទាញបាន $S_{\sigma} \leq S_{\sigma'}$ ។ មានន័យថា រៀប $\sigma = \{3; 1; 2; \dots; n\}$ ជា $\sigma = \{1; 3; 2; \dots; n\}$ យើងទាញបាន S_{σ} ធំជាងមុន។ មានន័យថាផលបូក

$$a_1 b_3 + a_2 b_1 + a_3 b_2 + \dots + a_n b_n \leq a_1 b_1 + a_2 b_3 + a_3 b_2 + \dots + a_n b_n$$

បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្តើម ឆ្លាស់សន្ទស្សន៍ចាប់ពីទី២ទៅ ឧទាហរណ៍ $\sigma = \{1; 3; 2; \dots; n\}$ ។
 យើងមាន $\sigma(2) = 3, \sigma(3) = 2$ ។ យើងមានចំលាស់ σ' មួយដែល $\sigma'(2) = 2$ ឧទាហរណ៍
 $\sigma' = \{1; 2; 3; \dots; n\}; \sigma'(2) = 2; \sigma'(3) = 3$ ដែលត្រូវទាំងអស់ដូចគ្នា នឹង σ លើកលែងតែតួទីពីរនិង
 ទីបីចេញ។ តាមលក្ខណៈខាងលើ យើងទាញបាន $S_\sigma \leq S_{\sigma'}$ ។ មានន័យថា រៀប
 $\sigma = \{1; 3; 2; \dots; n\}$ ជា $\sigma = \{1; 2; 3; \dots; n\}$ យើងទាញបាន S_σ ធំជាងមុន។ មានន័យថាផលបូក
 $a_1b_1 + a_2b_3 + a_3b_2 + \dots + a_nb_n \leq a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \dots + a_nb_n$
 ដូចគ្នា ចំពោះ $i = 3, \dots, n-1$ យើងទាញបាន $\sigma'(i) = i$ ដែលពេលនោះផលបូកមានតំលៃធំ ។
 ដូច្នេះផលបូកមានតំលៃធំបំផុត ពេល $\sigma(i) = i$ ។
 ស្រាយបញ្ជាក់ដូចគ្នាករណីតូចបំផុត។

215.▲ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_iy_i + y_i^2) &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_iz_i + z_i^2) \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (-2x_iy_i + y_i^2) &\leq \sum_{i=1}^n (-2x_iz_i + z_i^2) \end{aligned}$$

ដោយ $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2$ នោះវិសមភាពសមមូលនឹង

$$\sum_{i=1}^n x_iy_i \geq \sum_{i=1}^n x_iz_i$$

វិសមភាពក្រោយនេះពិត តាមវិសមភាពតំរៀប។

216.▲ មាន $x \in (0, \pi/2)$ ។ តាង $a_1 = \sin^3 x; a_2 = \cos^3 x$ និង $b_1 = 1/\cos x; b_2 = 1/\sin x$ ។ យើងឃើញថា បើ $a_1 \leq a_2$ នោះ $b_1 \leq b_2$ ហើយ បើ $a_1 \geq a_2$ នោះ $b_1 \geq b_2$ ។ ដូច្នេះ
 តាមវិសមភាពតំរៀប

$f(x) = a_1b_1 + a_2b_2 \geq a_1b_2 + a_2b_1 = \sin^3 x \frac{1}{\sin x} + \cos^3 x \frac{1}{\cos x} = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងដឹងថា $f(\pi/4) = 1,0$ ដូច្នេះ តំលៃតូចបំផុតរបស់ f គឺស្មើ 1 ។

217.▲ ដោយវិសមភាពនេះគ្មានលក្ខណៈពិសេសចំពោះតំរៀប a, b, c យើងអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c$ ។ ដូច្នេះ $a^2 \geq b^2 \geq c^2$ និង $ab \geq ac \geq bc$ ។ តាមវិសមភាពតំរៀប យើងទាញបាន

$$a^3 + b^3 + c^3 = a^2a + b^2b + c^2c \geq a^2b + b^2c + c^2a$$

$$a^2b + b^2c + c^2a = (ab)a + (ac)c + (bc)b \geq (ab)c + (ac)b + (bc)a = 3abc$$

218.▲ គេអោយ $n \geq 1$ ។ តាមវិសមភាពតំរៀប យើងមាន $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2}$ មានតំលៃតូចបំផុត ពេល $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ ។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះ $(a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n)$ ហើយ ដោយសារ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ដែលខុសគ្នាពីៗ នោះ យើងទាញបាន $a_i \geq i$ ចំពោះគ្រប់ i ។
ដូច្នេះ យើងទាញបាន

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

219.▲ ❶ របៀបទីមួយ

យើងរៀប a_i តាមលំដាប់មួយដែល $a_{k(1)} \leq a_{k(2)} \leq \dots \leq a_{k(n)}$ ។ ដូច្នេះ

$$\frac{1}{a_{k(1)}} \geq \frac{1}{a_{k(2)}} \geq \dots \geq \frac{1}{a_{k(n)}}$$

ដូច្នេះតាមវិសមភាពតំរៀប យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{a_1^2}{a_2} + \frac{a_2^2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{a_n} + \frac{a_n^2}{a_1} &= a_1^2 \frac{1}{a_2} + a_2^2 \frac{1}{a_3} + \dots + a_n^2 \frac{1}{a_1} \\ &\geq a_{k(1)}^2 \frac{1}{a_{k(1)}} + a_{k(2)}^2 \frac{1}{a_{k(2)}} + \dots + a_{k(n)}^2 \frac{1}{a_{k(n)}} \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \end{aligned}$$

❷ របៀបទីពីរ

ចំពោះគ្រប់ $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{a_i^2}{a_{i+1}} + a_{i+1} &\geq 2a_i \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{a_{i+1}} + \sum_{i=1}^n a_{i+1} &\geq 2 \sum_{i=1}^n a_i \end{aligned}$$

ដោយយក $a_{n+1} = a_1$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n a_{i+1} = \sum_{i=1}^n a_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{a_{i+1}} \geq \sum_{i=1}^n a_i$$

220.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
 & (x^{1999} + y^{1999} + z^{1999})^2 \\
 &= \left[\sqrt{x^{1998}(py + qz)} \cdot \sqrt{\frac{x^{2000}}{py + qz}} + \sqrt{y^{1998}(pz + qx)} \cdot \sqrt{\frac{y^{2000}}{pz + qx}} \right. \\
 &\quad \left. + \sqrt{z^{1998}(px + qy)} \cdot \sqrt{\frac{z^{2000}}{px + qy}} \right]^2 \\
 &\leq [x^{1998}(py + qz) + y^{1998}(pz + qx) + z^{1998}(px + qy)] \cdot \left[\frac{x^{2000}}{py + qz} + \frac{y^{2000}}{pz + qx} + \frac{z^{2000}}{px + qy} \right] \\
 &= [p(x^{1998}y + y^{1998}z + z^{1998}x) + q(x^{1998}z + y^{1998}x + z^{1998}y)] \left[\frac{x^{2000}}{py + qz} + \frac{y^{2000}}{pz + qx} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{z^{2000}}{px + qy} \right] \quad (1)
 \end{aligned}$$

យើងមាន

$$x^{1998}y + y^{1998}z + z^{1998}x \leq x^{1999} + y^{1999} + z^{1999} \quad (2)$$

ព្រោះតាមវិសមភាពតំរៀប និងដោយសារ(២)មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីធៀបនឹង x, y, z ដែលយើងអាចសន្មតថា $x \leq y \leq z$ បាន នោះ

$$\begin{aligned}
 a_1 &= x^{1998} \leq a_2 = y^{1998} \leq a_3 = z^{1998}; \\
 b_1 &= x \leq b_2 = y \leq b_3 = z
 \end{aligned}$$

នោះដោយយក $b_{\sigma(i)} = \{b_2; b_3; b_1\}$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned}
 S_{\sigma} &= \sum_{i=1}^3 a_i b_{\sigma(i)} = x^{1998}y + y^{1998}z + z^{1998}x \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\
 &= x^{1999} + y^{1999} + z^{1999}
 \end{aligned}$$

ពិត។ ដូច្នេះវិសមភាព(១)ទៅជា

$$\begin{aligned}
 & (x^{1999} + y^{1999} + z^{1999})^2 \\
 &\leq (p + q)(x^{1999} + y^{1999} + z^{1999}) \left[\frac{x^{2000}}{py + qz} + \frac{y^{2000}}{pz + qx} + \frac{z^{2000}}{px + qy} \right] \\
 &\Leftrightarrow \frac{x^{2000}}{py + qz} + \frac{y^{2000}}{pz + qx} + \frac{z^{2000}}{px + qy} \geq \frac{x^{1999} + y^{1999} + z^{1999}}{p + q}
 \end{aligned}$$

221.▲ តាមវិសមភាពតំរៀប យើងមាន

$$\begin{aligned}
 a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\
 a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &\geq a_1 b_2 + a_2 b_3 + \cdots + a_n b_1 \\
 &\dots \\
 a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &\geq a_1 b_n + a_2 b_1 + \cdots + a_n b_{n-1}
 \end{aligned}$$

ឬក៏អន្តរាគមន៍ យើងទាញបាន

$$n(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n) \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$$

$\Rightarrow$ វិសមភាពពិត។

ស្រាយបញ្ជាក់ដូចគ្នាករណីស្មើ (b_n) រៀបតាមលំដាប់ច្រាសមកវិញ។

222.▲ ❶ របៀបទី១

តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c$

$$\Rightarrow \frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{a+c} \leq \frac{1}{b+c}$$

តាមវិសមភាព Chebyshev យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= a \cdot \frac{1}{b+c} + b \cdot \frac{1}{c+a} + c \cdot \frac{1}{a+b} \\ &\geq \frac{1}{3}(a+b+c) \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right) \\ &= \frac{1}{6}[(b+c) + (c+a) + (a+b)] \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right) \\ &\geq \frac{1}{6} \cdot 3 \sqrt[3]{(b+c)(c+a)(a+b)} \cdot 3 \sqrt[3]{\frac{1}{b+c} \frac{1}{c+a} \frac{1}{a+b}} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

ពិត។

❷ របៀបទី២

តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c$

$$\Rightarrow \frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{a+c} \leq \frac{1}{b+c}$$

តាមវិសមភាពតំរៀប យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= a \cdot \frac{1}{b+c} + b \cdot \frac{1}{c+a} + c \cdot \frac{1}{a+b} \\ &\geq a \cdot \frac{1}{c+a} + b \cdot \frac{1}{a+b} + c \cdot \frac{1}{b+c} \end{aligned}$$

និង

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq a \cdot \frac{1}{a+b} + b \cdot \frac{1}{b+c} + c \cdot \frac{1}{a+c}$$

ឬក៏អន្តរាគមន៍ យើងទាញបាន

$$2\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \geq a \cdot \frac{1}{c+a} + b \cdot \frac{1}{a+b} + c \cdot \frac{1}{b+c} + a \cdot \frac{1}{a+b} + b \cdot \frac{1}{b+c} + c \cdot \frac{1}{a+c} = 3$$

$\Rightarrow$ វិសមភាពពិត។

223. ▲ តាង

$$S = \frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c}$$

$$x = b+c+d, y = c+d+a, z = d+a+b, t = a+b+c$$

$$x+y+z+t = 3(a+b+c+d)$$

ដោយផលបូក S មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីជៀបនឹង a, b, c, d (ឧទាហរណ៍ ជំនួស a ដោយ b និង b ដោយ a យើងទាញបាន S នៅដដែល) នោះ យើងអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c \geq d \Rightarrow a^n \geq b^n \geq c^n \geq d^n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ និង

$$\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z} \geq \frac{1}{t}$$

តាមវិសមភាពតំរៀប យើងមាន $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da = 1$ ។

តាមវិសមភាព Chebyshev យើងមាន

$$S = a^3 \frac{1}{x} + b^3 \frac{1}{y} + c^3 \frac{1}{z} + d^3 \frac{1}{t}$$

$$\geq \frac{1}{4} (a^3 + b^3 + c^3 + d^3) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right)$$

និង

$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 \geq \frac{1}{4} (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) (a + b + c + d)$$

$$\geq \frac{1}{4} (1) (a + b + c + d) = \frac{1}{4} (a + b + c + d)$$

$$\Rightarrow S \geq \frac{1}{16} (a + b + c + d) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right)$$

$$\geq \frac{1}{48} (x + y + z + t) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right) \geq \frac{1}{48} \cdot 4^4 \sqrt{xyzt} \cdot 4^4 \sqrt{\frac{1}{x} \frac{1}{y} \frac{1}{z} \frac{1}{t}} = \frac{1}{3}$$

224. ▲ តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c$ ។ ដូច្នេះ $a^n \geq b^n \geq c^n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ និង

$$\frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{a+c} \leq \frac{1}{b+c}$$

តាមវិសមភាពតំរៀប យើងមាន

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{a^n}{a+b} + \frac{b^n}{b+c} + \frac{c^n}{c+a}$$

និង

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{a^n}{c+a} + \frac{b^n}{a+b} + \frac{c^n}{b+c}$$

ឬក៏អង្គនិងអង្គ យើងទាញបាន

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{a^n+b^n}{a+b} + \frac{b^n+c^n}{b+c} + \frac{c^n+a^n}{c+a} \right)$$

តាមវិសមភាព Chebyshev

$$a^n + b^n \geq \frac{1}{2}(a^{n-1} + b^{n-1})(a+b) \Rightarrow \frac{a^n+b^n}{a+b} \geq \frac{1}{2}(a^{n-1} + b^{n-1})$$

ដូចគ្នា

$$\begin{aligned} \frac{b^n+c^n}{b+c} &\geq \frac{1}{2}(b^{n-1} + c^{n-1}) \\ \frac{c^n+a^n}{c+a} &\geq \frac{1}{2}(c^{n-1} + a^{n-1}) \\ \Rightarrow \frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} &\geq \frac{a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

225.▲ តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $x \leq y \leq z$ ។ ដូច្នេះ

$$\frac{1}{(1+y)(1+z)} \leq \frac{1}{(1+z)(1+x)} \leq \frac{1}{(1+x)(1+y)}$$

តាមវិសមភាព Chebyshev យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} &\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \\ &\geq \frac{x^3+y^3+z^3}{3} \left[\frac{1}{(1+y)(1+z)} + \frac{1}{(1+z)(1+x)} + \frac{1}{(1+x)(1+y)} \right] \\ &= \frac{x^3+y^3+z^3}{3} \frac{3+x+y+z}{(1+y)(1+z)(1+x)} \end{aligned}$$

តាង $(x+y+z)/3 = a$ ។ តាមវិសមភាព Chebyshev យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{x^3+y^3+z^3}{3} &\geq \frac{x^2+y^2+z^2}{3} \frac{x+y+z}{3} \geq \frac{x+y+z}{3} \cdot \frac{x+y+z}{3} \cdot \frac{x+y+z}{3} \\ &= \left(\frac{x+y+z}{3} \right)^3 = a^3 \end{aligned}$$

និង តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$3a = x+y+z \geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3$$

$$(1+y)(1+z)(1+x) \leq \left[\frac{(1+y) + (1+z) + (1+x)}{3} \right]^3 = (1+a)^3$$

ដូច្នេះ

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq a^3 \frac{6}{(1+a)^3}$$

ដូច្នេះ យើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\frac{6a^3}{(1+a)^3} \geq \frac{3}{4}$$

ដោយ $a^3 \geq 1$ នោះ

$$f(a) = \frac{6a^3}{(1+a)^3} = 6 \left[1 - \frac{1}{1+a} \right]^3$$

ជាអនុគមន៍កើនជាប់ខាតលើ $\mathbb{R}^+$ ។ យើងមាន

$$f(a^3) \geq f(1) = \frac{3}{4}$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិត។

226.▲ ❶ របៀបទីមួយ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត មិនអវិជ្ជមាន គេមាន

$$(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0 \Rightarrow \frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$$

ដូច្នេះ វិសមភាពខាងលើពិត ចំពោះ $n = 2$ ។ សន្មតថា វិសមភាពខាងលើពិត រហូតដល់

$n = 2^{k-1}, k > 2$ ។ ដូច្នេះ

$$\sqrt[2^{k-1}]{a_1 a_2 \dots a_{2^{k-1}}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2^{k-1}}}{2^{k-1}}$$

តាង

$$x_1 = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2^{k-1}}}{2^{k-1}}$$

$$x_2 = \frac{a_{2^{k-1}+1} + \dots + a_{2^k}}{2^{k-1}}$$

យើងមាន

$$\frac{x_1 + x_2}{2} \geq \sqrt{x_1 x_2}$$

$$\begin{aligned}
& \Rightarrow \frac{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2^{k-1}}}{2^{k-1}} + \frac{a_{2^{k-1}+1} + \dots + a_{2^k}}{2^{k-1}}}{2} \\
& \geq \sqrt{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2^{k-1}}}{2^{k-1}} \cdot \frac{a_{2^{k-1}+1} + \dots + a_{2^k}}{2^{k-1}}} \\
& \geq \sqrt{\frac{2^{k-1} \sqrt{a_1 a_2 \dots a_{2^{k-1}}} \cdot 2^{k-1} \sqrt{a_{2^{k-1}+1} \dots a_{2^k}}}{2^{2k-2}}} = \sqrt[2^k]{a_1 a_2 \dots a_{2^k}} \\
& \Rightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2^k}}{2^k} \geq \sqrt[2^k]{a_1 a_2 \dots a_{2^k}}
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ វិសមភាពពិតចំពោះ គ្រប់ $n = 2^k, k \geq 1$ ។ ឥឡូវវិសមភាពថា $2^{k-1} < n < 2^k$ ។ តាង

$$\begin{aligned}
y_1 &= a_1, y_2 = a_2, \dots, y_n = a_n \\
y_{n+1} &= y_{n+2} = \dots = y_{2^k} = A \\
A &= \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \\
G &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}
\end{aligned}$$

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_{2^k}}{2^k} &\geq \sqrt[2^k]{y_1 y_2 \dots y_{2^k}} \\
\Leftrightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + (2^k - n)A}{2^k} &\geq \sqrt[2^k]{a_1 a_2 \dots a_n \cdot A^{2^k - n}} \\
\Leftrightarrow \frac{nA + (2^k - n)A}{2^k} &\geq \sqrt[2^k]{G^n A^{2^k - n}} \\
\Leftrightarrow A &\geq G^{\frac{n}{2^k}} A^{1 - \frac{n}{2^k}} \\
\Leftrightarrow A^{\frac{n}{2^k}} &\geq G^{\frac{n}{2^k}} \\
\Leftrightarrow A &\geq G \\
\Leftrightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} &\geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}
\end{aligned}$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិតចំពោះគ្រប់ $n \geq 2$ ។

២ របៀបទីពីរ

អនុគមន៍ $f(x) = \ln x$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $\mathbb{R}^{+*}$ ។ តាមវិសមភាពយីនស៊ិន យើងទាញបាន

$$\begin{aligned}
& \ln \left(\frac{1}{n} a_1 + \frac{1}{n} a_2 + \dots + \frac{1}{n} a_n \right) \geq \frac{1}{n} \ln a_1 + \frac{1}{n} \ln a_2 + \dots + \frac{1}{n} \ln a_n = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \\
& \Rightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}
\end{aligned}$$

227.▲ តាង $a = x + y, b = y + z, c = z + x$ ($x, y, z > 0$) វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$6xyz \leq x^2y + xy^2 + y^2z + yz^2 + z^2x + zx^2$

វិសមភាពនេះពិត ដោយប្រើវិសមភាពមធ្យមនិម្មមធ្យមធរណីមាត្រ សំរាប់
 $x^2y, xy^2, x^2z, xz^2, y^2z, yz^2$ ។

228.▲ យើងមាន

$$(n!)^{2/n} = \left((1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n)^{\frac{1}{n}} \right)^2 \leq \left(\frac{1+2+\dots+n}{2} \right)^2 = \left(\frac{n+1}{2} \right)^2 \leq \frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{6}$$

229.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\begin{aligned} 8a^2b^3c^3 &\leq 2a^8 + 3b^8 + 3c^8 \\ 8a^3b^2c^3 &\leq 3a^8 + 2b^8 + 3c^8 \\ 8a^3b^3c^2 &\leq 3a^8 + 3b^8 + 2c^8 \end{aligned}$$

ប្រករវិសមភាពអស់នេះបញ្ចូលគ្នា ហើយចែកនឹង $3a^3b^3c^3$ យើងទាញបានវិសមភាពដែលចង់បាន។

230.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\begin{aligned} (n+k-1)x_1^n x_2 \dots x_k &\leq nx_1^{n+k-1} + x_2^{n+k-1} + \dots + x_k^{n+k-1} \\ (n+k-1)x_1 x_2^n \dots x_k &\leq x_1^{n+k-1} + nx_2^{n+k-1} + \dots + x_k^{n+k-1} \\ &\vdots \\ (n+k-1)x_1 x_2 \dots x_k^n &\leq x_1^{n+k-1} + x_2^{n+k-1} + \dots + nx_k^{n+k-1} \end{aligned}$$

ប្រករវិសមភាពទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា បន្ទាប់មកចែកនឹង $(n+k-1)$ យើងទាញបានវិសមភាពដែលត្រូវ
 ស្រាយបញ្ជាក់។

231.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_n &\geq n \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} &\geq n \sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \frac{1}{x_2} \dots \frac{1}{x_n}} \\ \Rightarrow (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) &\geq n^2 \end{aligned}$$

232.▲ តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $x \leq y \leq z$ ។ តាំង

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z - 2(xy + yz + zx)$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} f(x, y, z) - f(x, \sqrt{yz}, \sqrt{yz}) &= y^2 + z^2 + y + z - 2(xy + yz + zx) - 2\sqrt{yz} + 4x\sqrt{yz} \\ &= (y-z)^2 + (\sqrt{y} - \sqrt{z})^2 - 2x(\sqrt{y} - \sqrt{z})^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\sqrt{y} - \sqrt{z})^2 [(\sqrt{y} + \sqrt{z})^2 + 1 - 2x] \\
&= (\sqrt{y} - \sqrt{z})^2 [y + z - 2x + 1 + 2\sqrt{yz}]
\end{aligned}$$

ដោយ $x \leq y \leq z$ នោះ $y + z - 2x \geq 0 \Rightarrow f(x, y, z) - f(x, \sqrt{yz}, \sqrt{yz}) \geq 0$ ហើយអង្គទាំង២
ស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $y = z$ ។ បន្ទាប់មកទៀត យើងនឹងបង្ហាញថា $f(x, \sqrt{yz}, \sqrt{yz}) \geq 0$ ។

តាង $a = x$ និង $b = \sqrt{yz}$ ។ ដូច្នេះ $a, b > 0$ និង $ab^2 = 1$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned}
f(a, b, b) &= a^2 + a + 2b - 4ab \\
&= \frac{1}{b^4} + \frac{1}{b^2} + 2b - \frac{4}{b} \\
&= \frac{1}{b^4} (2b^5 - 4b^3 + b^2 + 1) \\
&= \frac{1}{b^4} (b - 1)^2 (2b^3 + 4b^2 + 2b + 1) \geq 0
\end{aligned}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $b = 1$ ។ ដូច្នេះ $f(x, y, z) \geq f(a, b, b) \geq 0$ ហើយស្មើគ្នា លុះត្រាតែ
 $y = z, b = 1, xyz = 1 \Rightarrow x = y = z = 1$ ។

233.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd &\geq 10 (a^2 b^2 c^2 d^2 abacadbcbdc d)^{\frac{1}{10}} \\
&= 10 (a^5 b^5 c^5 d^5)^{\frac{1}{10}} = 10
\end{aligned}$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា ពេល $a = b = c = d = 1$ ។

234.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
(a + b + c)^3 &= a^3 + b^3 + c^3 + 6abc + 3(a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b) \\
&\geq a^3 + b^3 + c^3 + 6abc + 3.6\sqrt[6]{a^6b^6c^6} = a^3 + b^3 + c^3 + 24abc
\end{aligned}$$

(តាមវិសមភាពកូស៊ី)

235.▲ ករណីអង្គខាងស្តាំនៃវិសមភាព អវិជ្ជមាន រឺ សូន្យ នោះវិសមភាពជាវិសមភាពដាច់ខាត។

ករណីអង្គខាងស្តាំវិជ្ជមាន យើងសន្មតថា $a = \max(a, b, c)$ ។ ដូច្នេះ $a + b - c > 0$ និង
 $c + a - b > 0 \Rightarrow b + c - a > 0$ ព្រោះអង្គខាងស្តាំវិជ្ជមាន។ ដូច្នេះ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃ
ត្រីកោណ។ ដូច្នេះ យើងតាង

$$\begin{aligned}
&a + b - c = x, b + c - a = y, c + a - b = z \\
\Rightarrow &\begin{cases} x, y, z > 0 \\ a = \frac{x+z}{2}, b = \frac{y+x}{2}, c = \frac{z+y}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

វិសមភាពទៅជា

$$(x+z)(y+x)(z+y) \geq 8xyz$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងទាញបាន

$$(x+z)(y+x)(z+y) \geq 2\sqrt{xz} \cdot 2\sqrt{yx} \cdot 2\sqrt{zy} = 8xyz$$

ពិត។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នាទាល់តែនិងមានតែ $x = y = z$ មានន័យថា $a = b = c$ ។

236.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងមាន

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n a_k(1-a_k) &= \left[\prod_{k=1}^n a_k \right] \left[\prod_{k=1}^n (1-a_k) \right] \leq \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right]^n \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (1-a_k) \right]^n = \frac{1}{n^n} \cdot \frac{(n-1)^n}{n^n} \\ &= \frac{(n-1)^n}{n^{2n}} \end{aligned}$$

237.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{b}{a} &= \left[b + \frac{1}{2a} \right]^2 + a^2 + \frac{3}{4a^2} \\ &\geq a^2 + \frac{3}{4a^2} \quad \text{ស្មើគ្នាទាល់តែ } b = -\frac{1}{2a} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{3}{4}} = \sqrt{3} \quad \text{តាមវិសមភាពកូស៊ី} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{b}{a} \geq \sqrt{3}$$

ស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $a^4 = 3/4$ និង $b = -1/2a$ ។

238.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី ចំពោះ $n \geq 2$

$$\begin{aligned} \left[\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \right]^{\frac{1}{n}} &< \frac{1 + \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) + \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)}{n} \\ &= \frac{1 + (n-1) \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)}{n} = 1 + \frac{1}{n} \\ \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} &< \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \Rightarrow U_{n-1} < U_n \end{aligned}$$

ម្យ៉ាងវិញទៀត

$$\left[\left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \right]^{\frac{1}{n+1}} < \frac{1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \cdots + \left(1 - \frac{1}{n} \right)}{n+1} = \frac{1 + n \left(1 - \frac{1}{n} \right)}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{n-1}{n}\right)^n < \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \Leftrightarrow \frac{1}{\left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^n} < \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n} < \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \Leftrightarrow \frac{1}{V_{n-1}} < \frac{1}{V_n} \Rightarrow V_n < V_{n-1}$$

239.▲ យើងតាង

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_1} + \frac{a_n}{a_1 + a_2}$$

ក្នុងសំនេរបន្ទាប់មកទៀតនេះ យើងសន្មតថា $a_{n+1} = a_1; a_{n+2} = a_2; a_{n+3} = a_3; \dots$ ។

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_{n+1}} + \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}}$$

យើងសន្មតថា $a_1 = \max(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ។ តាង $i_1 = 1$ ។ តាង i_2 ជាសន្ទស្សន៍របស់ចំនួនធំបំផុត

រវាង a_2 និង a_3 គឺ បើ $a_2 > a_3$ យក $i_2 = 2$ និងបើ $a_3 > a_2$ យក $i_2 = 3$ ហើយបើ $a_2 = a_3$

នោះយើងយក $i_2 = 2$ ។ ដូច្នេះ $i_2 \leq i_1 + 2$ ។

យើងបង្កើតស្លឹក (i_k) មួយ ដោយកំនើនដូចតទៅនេះ៖

បើ បង្កើតបាន i_k រួចហើយ តាង i_{k+1} ជាសន្ទស្សន៍នៃចំនួនធំជាងគេរវាង a_{i_k+1} និង a_{i_k+2} ដោយ

បើ $a_{i_k+1} = a_{i_k+2}$ យក $i_{k+1} = i_k + 1$ ។ ក្នុងករណីនេះ $i_{k+1} \leq i_k + 2$ ។

ដោយ $i_1 = 1$ នោះ $i_{k+1} \leq 1 + 2k$ ចំពោះគ្រប់ k ។

ដោយ $a_1 = a_{n+1} = \max(a_1, a_2, \dots, a_n) = \max(a_n, a_{n+1})$ នោះ យើងមាន r ដែល

$i_{r+1} = n + 1$ ជាសន្ទស្សន៍របស់ចំនួនធំបំផុតរវាង a_n និង a_{n+1} ដែលត្រូវនឹងចំនួនធំបំផុតរវាង

a_{i_r+1} និង a_{i_r+2} ។ ដូច្នេះ $i_r = n - 1$ រឺ $i_r = n$ ។ ដូច្នេះ $n - 1 \leq i_r \leq 1 + 2(r - 1)$

$$\Rightarrow r \geq n/2 \quad (1)$$

⊗[ដើម្បីពន្យល់អំនះអំនាងខាងលើ ខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍មួយ សន្មតថា $n = 5; a_1$ ធំជាងគេនិង

$a_3 > a_2; a_4 > a_5$ ។ យើងមាន $i_1 = 1; i_2$ ជាសន្ទស្សន៍របស់ចំនួនធំបំផុតរវាង $a_{i_1+1} = a_2$ និង

$a_{i_1+2} = a_3$ ។ ដោយ $a_3 > a_2 \Rightarrow i_2 = 3; i_3$ ជាសន្ទស្សន៍របស់ចំនួនធំបំផុតរវាង $a_{i_2+1} = a_4$ និង

$a_{i_2+2} = a_5$ ។ ដោយ $a_4 > a_5$ នោះ $i_3 = 4$ ។ i_4 ជាសន្ទស្សន៍របស់ចំនួនធំបំផុតរវាង $a_{i_3+1} = a_5$ និង

$a_{i_3+2} = a_6 = a_1$ ។ ដោយ $a_1 > a_5$ នោះ $i_4 = 6$ ។ ករណីនេះយើងទាញបាន $r = 4$ ។ យើងមាន

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \frac{a_3}{a_4 + a_5} + \frac{a_4}{a_5 + a_1} + \frac{a_5}{a_1 + a_2}$$

$$> \frac{a_1}{a_2 + a_3} + 0 + \frac{a_3}{a_4 + a_5} + \frac{a_4}{a_5 + a_1} + 0 \geq \frac{a_1}{2a_2} + \frac{a_3}{2a_4} + \frac{a_4}{2a_1} = \frac{a_{i_1}}{2a_{i_2}} + \frac{a_{i_2}}{2a_{i_3}} + \frac{a_{i_3}}{2a_{i_4}}$$

័័

ដូច្នេះយើងទាញបាន

$$\begin{aligned} f(a_1, a_2, \dots, a_n) &\geq \frac{a_{i_1}}{2a_{i_2}} + \frac{a_{i_2}}{2a_{i_3}} + \dots + \frac{a_{i_r}}{2a_{i_{r+1}}} \quad (2) \\ &\geq \frac{r}{2} \left(\frac{a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_r}}{a_{i_2} a_{i_3} \dots a_{i_{r+1}}} \right)^{\frac{r}{2}} \quad (\text{វិសមភាពកូស៊ី}) \\ &= \frac{r}{2} \geq \frac{n}{4} \end{aligned}$$

ដើម្បីអោយ $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = n/4$ គេត្រូវតែមាន (1) និង (2) ជាសមភាព។ តែសមភាព (2) នាំអោយ $r = n$ តែសមភាពនេះ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព (1)។ ដូច្នេះ $f(a_1, a_2, \dots, a_n) > n/4$ ។

240.▲ តាមវិសមភាពកូស៊ី ចំពោះគ្រប់ i យើងមាន

$$\begin{aligned} 2 + a_i &= 1 + 1 + a_i \geq 3 a_i^{\frac{1}{3}} \\ \Rightarrow \prod_{i=1}^n (2 + a_i) &\geq 3^n \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{3}} = 3^n \end{aligned}$$

241.▲ ① ដោយ a, b ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន នោះគេមាន x, y ដែល $0 < x, y < 90^\circ$ ហើយដែល $\tan x = a; \tan y = b$ ។ វិសមភាពនេះពិត បើ $a = b$ ។ ដូច្នេះ យើងសន្មតថា $a \neq b$ រឺ សមមូលនឹង $x \neq y$ ។ ដូច្នេះ $1/\sqrt{1+a^2} = \cos x; 1/\sqrt{1+b^2} = \cos y$ ។ យើងមាន

$$1 + ab = \frac{\cos x \cos y + \sin x \sin y}{\cos x \cos y} = \frac{\cos(x-y)}{\cos x \cos y}$$

ដូច្នេះវិសមភាពសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} \cos x + \cos y &\geq 2 \sqrt{\frac{\cos x \cos y}{\cos(x-y)}} \quad (*) \\ \Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 y + 2 \cos x \cos y &\leq \frac{4 \cos x \cos y}{\cos(x-y)} \end{aligned}$$

ដោយ $0 < |x-y| < 90^\circ$ នោះ $0 < \cos(x-y) < 1$ ។ ដូច្នេះ

$2 \cos x \cos y \leq 2 \cos x \cos y / \cos(x-y)$ ។ ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\cos^2 x + \cos^2 y \leq \frac{2 \cos x \cos y}{\cos(x-y)}$$

$$\Leftrightarrow \cos(x-y)[\cos^2 x + \cos^2 y] \leq 2 \cos x \cos y$$

$$\Leftrightarrow \cos(x-y)[\cos^2 x + \cos^2 y + 2] \leq 4 \cos x \cos y$$

$$\Leftrightarrow \cos(x-y)[2\cos(x-y)\cos(x+y)+2] \leq 2[\cos(x-y)+\cos(x+y)]$$

$$\Leftrightarrow \cos^2(x-y)\cos(x+y) \leq \cos(x+y)$$

ពិត ព្រោះ $0 < a, b \leq 1$ យើងមាន $0 < x, y < \frac{\pi}{4}$ ដូច្នេះ $0 < x+y < \frac{\pi}{2}$ និង $\cos(x+y) > 0$ ។

2 យើងបំប្លែងវិសមភាព(*) ជា

$$2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \geq 2\sqrt{\frac{1/2[\cos(x+y)+\cos(x-y)]}{\cos(x-y)}}$$

$$\Leftrightarrow 4\cos^2\frac{x+y}{2}\cos^2\frac{x-y}{2}\cos(x-y) \geq 2[\cos(x+y)+\cos(x-y)]$$

$$\Leftrightarrow [1+\cos(x+y)][1+\cos(x-y)]\cos(x-y) \geq 2[\cos(x+y)+\cos(x-y)]$$

តាង $s = \cos(x+y)$ និង $t = \cos(x-y)$ ។ ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$(1+s)(1+t)t \geq 2(s+t)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (1+s)t^2 + (s-1)t - 2s = (t-1)[(1+s)t + 2s]$$

ដោយ $t \leq 1$ ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា $(1+s)t + 2s \leq 0$

ដោយ $ab \geq 3$ នោះ $\tan x \tan y \geq 3$ វិសមមូលនឹង $\sin x \sin y \geq 3 \cos x \cos y$ ។ នាំអោយ

$$\frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)] \geq \frac{3}{2}[\cos(x-y) + \cos(x+y)] \Rightarrow t \leq -2s$$

ដោយ $1+s \geq 0$ នោះ $(1+s)t \leq -(1+s)2s$ ។ យើងទាញបាន $(1+s)t + 2s \leq$

$$-(1+s)2s + 2s = -2s^2 \leq 0 \text{ ដូចដែលចង់បាន។}$$

242.▲ ចំពោះគ្រប់ i តាង $a_i = 1/(1+x_i)$ ។ ដូច្នេះ $0 < a_i < 1, x_i = (1-a_i)/a_i$ និង

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} = 1$$

$$\Rightarrow \prod_{i=1}^{n+1} x_i = \frac{\prod_{i=1}^{n+1} (1-a_i)}{\prod_{i=1}^{n+1} a_i}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$1 - a_i = (a_1 + a_2 + \dots + a_{i-1} + a_{i+1} + \dots + a_{n+1}) \geq n(a_1 a_2 \dots a_{i-1} a_{i+1} \dots a_{n+1})^{\frac{1}{n}}$$

$$\Leftrightarrow 1 - a_i \geq n \left[\prod_{k \neq i} a_k \right]^{\frac{1}{n}}$$

ដោយអង្គទាំងពីស្មើគ្នាបើ $a_k, k \neq i$ ស្មើគ្នាទាំងអស់។ ដូច្នេះ

$$\prod_{i=1}^{n+1} (1 - a_i) \geq n^{n+1} \left[\prod_{k \neq 1} a_k \right]^{\frac{1}{n}} \dots \left[\prod_{k \neq n+1} a_k \right]^{\frac{1}{n}} = n^{n+1} \left[\prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \right]^{\frac{1}{n}} = n^{n+1} \prod_{i=1}^{n+1} a_i$$

$$\Rightarrow \prod_{i=1}^{n+1} x_i = \frac{\prod_{i=1}^{n+1} (1 - a_i)}{\prod_{i=1}^{n+1} a_i} \geq n^{n+1}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ $a_1 = a_2 = \dots = a_{n+1} = 1/(n+1) \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots =$

$$x_{n+1} = n \text{ ។}$$

243.▲ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ k, j តាង $\alpha_{k,j} = x_{j+k}/x_j$ ដែលក្នុងបណ្តាសន្ទស្សន៍ទាំងអស់នេះ បើសន្ទស្សន៍ណាមួយ ធំជាង n យើងដក n ចេញ។ ឧទាហរណ៍ $(n+1)$ ជំនួសដោយ 1; $(n+2)$ ជំនួសដោយ 2; $(2n+1) \rightarrow n+1 \rightarrow 1$ ។ល។

ដូច្នេះ ចំពោះគ្រប់ k យើងមាន

$$\begin{aligned} \alpha_{k,1} \alpha_{k,2} \dots \alpha_{k,n} &= \frac{x_{1+k}}{x_1} \frac{x_{2+k}}{x_2} \dots \frac{x_{n+k}}{x_n} = 1 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n &= x_{1+j} + x_{2+j} + \dots + x_{n+j} \\ x_{n+j} &= x_j \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{a_j (s - x_j)}{x_j} &= \sum_{j=1}^n \frac{a_j (x_1 + x_2 + \dots + x_n - x_j)}{x_j} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{a_j (x_{1+j} + x_{2+j} + \dots + x_{n-1+j} + x_{n+j} - x_j)}{x_j} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{a_j (x_{1+j} + x_{2+j} + \dots + x_{n-1+j})}{x_j} \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \left(\frac{x_{j+1}}{x_j} + \frac{x_{j+2}}{x_j} + \dots + \frac{x_{j+n-1}}{x_j} \right) = \sum_{j=1}^n a_j (\alpha_{1,j} + \alpha_{2,j} + \dots + \alpha_{n-1,j}) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \alpha_{1,j} + \sum_{j=1}^n a_j \alpha_{2,j} + \dots + \sum_{j=1}^n a_j \alpha_{n-1,j} = \sum_{k=1}^{n-1} \left[\sum_{j=1}^n a_j \alpha_{k,j} \right] \\ &\geq \sum_{k=1}^{n-1} \left[n \left(\prod_{j=1}^n a_j \alpha_{k,j} \right)^{\frac{1}{n}} \right] = \sum_{k=1}^{n-1} \left[n \left(\prod_{j=1}^n a_j \right)^{\frac{1}{n}} \right] = n(n-1) \left(\prod_{j=1}^n a_j \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

សមភាពកើតមាន ពេល $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ។ ដូច្នេះ $C(n) = n(n-1)$ ។

244.▲ តាង

$$P = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)\left(1 + \frac{1}{z}\right); Q = \frac{1}{(xyz)^{1/3}}$$

$$\Rightarrow P = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} + \frac{1}{xyz}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 3Q$$

$$\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} \geq 3Q^2$$

$$Q \geq \frac{3}{x+y+z} = 3$$

$$\frac{1}{xyz} = Q^3$$

$$\Rightarrow P \geq 1 + 3Q + 3Q^2 + Q^3 = (1 + Q)^3 \geq (1 + 3)^3 = 64$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា ពេល $x = y = z = 1/3$ ។

245.▲ ជាដំបូងយើងនឹងបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $a, b > 0$ គេមាន

$$\frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2} \geq \frac{1}{3}$$

ហើយអង្គទាំង២ស្មើគ្នា ទាល់តែ $a = b$ ។

យើងមាន

$$\frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2} \geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3(a^2 - ab + b^2) \geq a^2 + ab + b^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

ពិត។ អង្គទាំង២ស្មើគ្នា ទាល់តែ $a = b$ ។ ■

តាង

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_i^9 + x_j^9}{x_i^6 + x_i^3 x_j^3 + x_j^6}$$

$$\forall i, a_i = x_i^3$$

យើងមាន $a_1 a_2 \dots a_n = 1$ ហើយ

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_i^9 + x_j^9}{x_i^6 + x_i^3 x_j^3 + x_j^6} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i^3 + a_j^3}{a_i^2 + a_i a_j + a_j^2} \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left[(a_i + a_j) \frac{a_i^2 - a_i a_j + a_j^2}{a_i^2 + a_i a_j + a_j^2} \right] \geq \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left[(a_i + a_j) \frac{1}{3} \right] \\
&= \frac{1}{3} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i + a_j) \\
&= \frac{1}{3} [(a_1 + a_2) + (a_1 + a_3) + \dots + (a_1 + a_n) + (a_2 + a_3) + (a_2 + a_4) \\
&\quad + \dots + (a_2 + a_n) + \dots] = \frac{n-1}{3} (a_1 + a_2 + \dots + a_n) \\
&\geq \frac{n(n-1)}{3} (a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n} = \frac{n(n-1)}{3} \\
\Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) &\geq \frac{n(n-1)}{3}
\end{aligned}$$

អង្គទាំង២ស្មើគ្នា ទាល់តែ $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$ ។

246.▲ តាង

$f(a, b, c, d) = abc + bcd + cda + dab - \frac{176}{27} abcd = bc(a + d) + ad \left[b + c - \frac{176}{27} bc \right]$
យើងឃើញថា $f(a, b, c, d)$ ជាទំនាក់ទំនងឆ្លុះ (បើគេប្តូរ a ទៅ b និង b ទៅ a ។ល។ នោះ f នៅ
ដដែល)។

1) ករណី $b + c - \frac{176}{27} bc \leq 0$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$f(a, b, c, d) \leq bc(a + d) \leq \left[\frac{b + c + (a + d)}{3} \right]^3 = \frac{1}{27}$$

$\Rightarrow$ វិសមភាពពិត។

2) ករណី $b + c - \frac{176}{27} bc > 0$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$f(a, b, c, d) \leq bc(a + d) + \left(\frac{a + d}{2} \right)^2 \left[b + c - \frac{176}{27} bc \right] = f\left(\frac{a + d}{2}, b, c, \frac{a + d}{2} \right)$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}
f(a, b, c, d) &\leq f\left(\frac{a + d}{2}, b, c, \frac{a + d}{2} \right) = f\left(b, \frac{a + d}{2}, \frac{a + d}{2}, c \right) \text{ ព្រោះ } f \text{ ជាអនុគមន៍ស៊ីមេទ្រី} \\
&\leq f\left(\frac{b + c}{2}, \frac{a + d}{2}, \frac{a + d}{2}, \frac{b + c}{2} \right) = f\left(\frac{a + d}{2}, \frac{b + c}{2}, \frac{a + d}{2}, \frac{b + c}{2} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq f\left(\frac{a+d+b+c}{4}, \frac{b+c}{2}, \frac{a+d}{2}, \frac{a+d+b+c}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}, \frac{b+c}{2}, \frac{a+d}{2}, \frac{1}{4}\right) \\ &= f\left(\frac{b+c}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{a+d}{2}\right) \leq f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{27} \\ &\Rightarrow \text{វិសមភាពពិត។} \end{aligned}$$

247.▲ តាង $E = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{+*} | a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1\}$ និង f ជាអនុគមន៍មួយ កំនត់លើ E ដោយ

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = n^2(n-1) \prod_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n P_k(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

ដែល

$$P_k(a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{1}{a_k} \prod_{i=1}^n a_i$$

បើ សិនជាគ្រប់ a_i សុទ្ធតែខុសគ្នាទាំងអស់ នោះគេមានពីរក្នុងចំណោមនោះ ឧទាហរណ៍ a_1, a_2 ដែល $a_1 < m < a_2$ ដែល $m = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n = 1/n$ ។

យើងមាន

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1 + a_2)A + a_1 a_2 B$$

ដែល

$$A = \prod_{i=3}^n a_i; \quad B = n^2(n-1) \prod_{i=3}^n a_i + \sum_{i=3}^n \frac{P_i(a_1, a_2, \dots, a_n)}{a_1 a_2}$$

(បើ $n = 2$ យើងតាង $A = 1; B = n^2(n-1)$)។ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} f(m, a_1 + a_2 - m, \dots, a_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_n) &= B[m(a_1 + a_2 - m) - a_1 a_2] \\ &= B(m - a_1)(a_2 - m) > 0 \end{aligned}$$

ដូចគ្នា យើងទាញបាន

$$f(m, a_1 + a_2 - m, \dots, a_n) < f(m, m, \dots, a_n) < \dots < f(m, m, \dots, m)$$

ដូច្នេះ $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(m, m, \dots, m)$ ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នាពេល $a_1 = a_2 = \dots = a_n = m \Rightarrow m = 1/n$ ។ ចំពោះ $m = 1/n$

$$f(m, m, \dots, m) = \frac{n^2(n-1)}{n^n} + n \frac{1}{n^{n-1}} = \frac{n^3}{n^n} = \frac{1}{n^{n-3}}$$

$$\Rightarrow f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq \frac{1}{n^{n-3}}$$

$$\Leftrightarrow n^2(n-1) \prod_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n P_k(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq \frac{1}{n^{n-3}}$$

$$\Leftrightarrow n^2(n-1)a_1a_2 \dots a_n + a_1a_2 \dots a_n \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \leq \frac{1}{n^{n-3}}$$

$$\Leftrightarrow n^2(n-1) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \leq \frac{1}{n^{n-3}} \frac{1}{a_1a_2 \dots a_n}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1/n$ ។

248.▲ តាង $a_0 = 1 - (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ ។ យើងមាន

$$a_0 > 0,$$

$$\sum_{k=0}^n a_k = 1,$$

$$\frac{a_1a_2 \dots a_n(1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n)}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \dots (1 - a_n)} = \frac{\prod_{k=0}^n a_k}{\prod_{k=0}^n (1 - a_k)}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីយ៉េងមាន

$$1 - a_i = \left[\sum_{k=0}^n a_k \right] - a_i = \sum_{k \neq i} a_k \geq n \left[\prod_{k \neq i} a_k \right]^{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow \prod_{k=0}^n (1 - a_k) \geq n^{n+1} \left[\prod_{k=0}^n a_k \right]^{\frac{1}{n}} \left[\prod_{k=1}^n a_k \right]^{\frac{1}{n}} \dots \left[\prod_{k \neq n}^n a_k \right]^{\frac{1}{n}} = n^{n+1} \prod_{k=0}^n a_k$$

ព្រោះ a_i នីមួយៗមាន n ដង។

$$\Rightarrow \frac{\prod_{k=0}^n a_k}{\prod_{k=0}^n (1 - a_k)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}$$

ពិតៗ សមភាពកើតមាន ពេល $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 1/(n+1)$ ។

249.▲ តាមសម្មតិកម្ម $x_1; x_2$ និង $y_1; y_2$ ជាអនុគមន៍នៃចំនុចស្ថិតលើរង្វង់កាំរង្វាស់ c មានផ្ចិត

នៅត្រង់គល់តំរុយ។ ដូច្នេះ $x_1 = c \cos \theta$; $x_2 = c \sin \theta$; $y_1 = c \cos \phi$; $y_2 = c \sin \phi$ ។ ដូច្នេះ

$$S = 2 - c(\cos \theta + \sin \theta + \cos \phi + \sin \phi) + c^2(\cos \theta + \cos \phi + \sin \theta + \sin \phi)$$

$$= 2 - \sqrt{2}c \left[\sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) + \sin \left(\phi + \frac{\pi}{4} \right) \right] + c^2 \cos(\theta - \phi) \leq 2 + 2\sqrt{2}c + c^2 = (\sqrt{2} + c)^2$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នាពេល $\theta = \phi = 5\pi/4$ មានន័យថា $x_1 = x_2 = y_1 = y_2 = -c\sqrt{2}/2$ ។

250.▲ ❶ របៀបទី១

តាង $a = 1/x, b = 1/y, c = 1/z$ យើងទាញបាន $xyz = 1$ ។ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត

$$\begin{aligned} & [(y+z) + (z+x) + (x+y)] \left[\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \right] \geq (x+y+z)^2 \\ \Rightarrow & \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2} \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3(xyz)^{\frac{1}{3}}}{2} = \frac{3}{2}$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិត។

២ របៀបទី២

វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2(abc)^{\frac{4}{3}}}$$

តាង $a = x^3, b = y^3, c = z^3$ ដែល $x, y, z > 0$ នោះ

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x^9(y^3+z^3)} + \frac{1}{y^9(z^3+x^3)} + \frac{1}{z^9(x^3+y^3)} \geq \frac{3}{2x^4y^4z^4} \\ \Leftrightarrow & 2y^9z^9(z^3+x^3)(x^3+y^3) + 2x^9z^9(y^3+z^3)(x^3+y^3) + 2x^9y^9(y^3+z^3)(z^3+x^3) \\ & \geq 3x^5y^5z^5(y^3+z^3)(z^3+x^3)(x^3+y^3) \\ \Leftrightarrow & 2y^9z^9(x^3z^3+z^3y^3+x^6+x^3y^3) + 2x^9z^9(x^3y^3+y^6+x^3z^3+y^3z^3) \\ & + 2x^9y^9(y^3z^3+x^3y^3+z^6+x^3z^3) \\ & \geq 3x^5y^5z^5(y^3z^3+x^3y^3+z^6+x^3z^3)(x^3+y^3) \\ \Leftrightarrow & 2x^3y^9z^{12} + 2y^{12}z^{12} + 2x^6y^9z^9 + 2x^3y^{12}z^9 + 2x^{12}y^3z^9 + 2x^9y^6z^9 + 2x^{12}z^{12} \\ & + 2x^9y^3z^{12} + 2x^9y^{12}z^3 + 2x^{12}y^{12} + 2x^9y^9z^6 + 2x^{12}y^9z^3 \\ & \geq 3x^5y^5z^5(x^3y^3z^3+y^6z^3+x^6y^3+x^3y^6+x^3z^6+y^3z^6+x^6z^3 \\ & + x^3y^3z^3) \\ \Leftrightarrow & 2(x^{12}y^{12} + y^{12}z^{12} + z^{12}x^{12}) \\ & + 2(x^{12}y^9z^3 + x^{12}y^3z^9 + x^9y^{12}z^3 + x^9y^3z^{12} + x^3y^{12}z^9 + x^3y^9z^{12}) \\ & + 2(x^6y^9z^9 + x^9y^6z^9 + x^9y^9z^6) \\ & \geq 3x^8y^8z^8 + 3x^5y^{11}z^8 + 3x^{11}y^8z^5 + 3x^8y^{11}z^5 + 3x^8y^5z^{11} \\ & + 3x^5y^8z^{11} + 3x^{11}y^5z^8 + 3x^8y^8z^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \sum_{sym} x^{12}y^{12} + 2 \sum_{sym} x^{12}y^9z^3 + \sum_{sym} x^9y^9z^6 \\
&\quad \geq 3(x^{11}y^8z^5 + x^{11}y^5z^8 + x^8y^{11}z^5 + x^8y^5z^{11} + x^5y^{11}z^8 + x^5y^8z^{11}) \\
&\quad + 6x^8y^8z^8 \\
&\Leftrightarrow \sum_{sym} x^{12}y^{12} + 2 \sum_{sym} x^{12}y^9z^3 + \sum_{sym} x^9y^9z^6 \geq 3 \sum_{sym} x^{11}y^8z^5 + \sum_{sym} x^8y^8z^8 \\
&\Leftrightarrow \left[\sum_{sym} x^{12}y^{12} - \sum_{sym} x^{11}y^8z^5 \right] + 2 \left[\sum_{sym} x^{12}y^9z^3 - \sum_{sym} x^{11}y^8z^5 \right] \\
&\quad + \left[\sum_{sym} x^9y^9z^6 - \sum_{sym} x^8y^8z^8 \right] \geq 0
\end{aligned}$$

-យើងមាន (12,12,0) លុបលើ (11,8,5) ព្រោះ

$$\begin{aligned}
12 &\geq 12 \geq 0; 11 \geq 8 \geq 5 \\
12 &\geq 11; 12 + 12 \geq 11 + 8 \\
12 + 12 + 0 &= 11 + 8 + 5
\end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Muirhead យើងទាញបាន

$$\sum_{sym} x^{12}y^{12} - \sum_{sym} x^{11}y^8z^5 \geq 0$$

-យើងមាន (12,9,3) លុបលើ (11,8,5) ព្រោះ

$$\begin{aligned}
12 &\geq 9 \geq 3; 11 \geq 8 \geq 5 \\
12 &\geq 11; 12 + 9 \geq 11 + 8 \\
12 + 9 + 3 &= 11 + 8 + 5
\end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Muirhead យើងទាញបាន

$$\sum_{sym} x^{12}y^9z^3 - \sum_{sym} x^{11}y^8z^5 \geq 0$$

-យើងមាន (9,9,6) លុបលើ (8,8,8) ព្រោះ

$$\begin{aligned}
9 &\geq 9 \geq 6; 8 \geq 8 \geq 8 \\
9 &\geq 8; 9 + 9 \geq 8 + 8 \\
9 + 9 + 6 &= 8 + 8 + 8
\end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Muirhead យើងទាញបាន

$$\sum_{sym} x^9y^9z^6 - \sum_{sym} x^8y^8z^8 \geq 0$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិត។

251.▲ ❶ របៀបទី១

យើងតាង

$$x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}}, y = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}}, z = \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}}$$

យើងឃើញថា $x, y, z \in (0; 1)$ ។ យើងត្រូវបង្ហាញថា $x + y + z \geq 1$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{8bc} &= \frac{x^2}{1-x^2}, \frac{b^2}{8ac} = \frac{y^2}{1-y^2}, \frac{c^2}{8ab} = \frac{z^2}{1-z^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{512} &= \frac{x^2}{1-x^2} \frac{y^2}{1-y^2} \frac{z^2}{1-z^2} \\ \Rightarrow (1-x^2)(1-y^2)(1-z^2) &= 512 (xyz)^2 \end{aligned}$$

ឱបមាថា $1 > x + y + z$ នោះ

$$\begin{aligned} (1-x^2)(1-y^2)(1-z^2) &> [(x+y+z)^2 - x^2][(x+y+z)^2 - y^2][(x+y+z)^2 - z^2] \\ &= (x+x+y+z)(y+y+z)(x+x+z+y)(x+z)(x+y+z+z)(x+y) \\ &\geq 4(x^2yz)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(yz)^{\frac{1}{2}} \cdot 4(xy^2z)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(xz)^{\frac{1}{2}} \cdot 4(xyz^2)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(xy)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{តាមវិសមភាពកូស៊ី}) \\ &= 512(xyz)^2 \end{aligned}$$

ផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌ។ ដូច្នេះ $x + y + z \geq 1$ ។

❷ របៀបទី២

យើងជំនួស

$$x = \frac{a}{a+b+c}, y = \frac{b}{a+b+c}, z = \frac{c}{a+b+c}$$

វិសមភាពទៅជា

$$xf(x^2 + 8yz) + yf(y^2 + 8zx) + zf(z^2 + 8xy) \geq 1$$

ដែល $f(t) = 1/\sqrt{t}$ ។

ដោយ f ជាអនុគមន៍ផុតលើ $\mathbb{R}^+$ ហើយ $x + y + z = 1$ នោះដោយប្រើវិសមភាពយិនសិន យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} xf(x^2 + 8yz) + yf(y^2 + 8zx) + zf(z^2 + 8xy) \\ \geq f(x(x^2 + 8yz) + y(y^2 + 8zx) + z(z^2 + 8xy)) \end{aligned}$$

យើងមាន $f(1) = 1$ ។ ដោយអនុគមន៍ f ចុះដាច់ខាត នោះយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$1 \geq x(x^2 + 8yz) + y(y^2 + 8zx) + z(z^2 + 8xy)$$

ជាការស្រេច។ ដោយ $x + y + z = 1$ នោះ វិសមភាពនេះសមមូលនឹង

$$(x + y + z)^3 \geq x(x^2 + 8yz) + y(y^2 + 8zx) + z(z^2 + 8xy)$$

$$\Leftrightarrow 3[x(y-z)^2 + y(z-x)^2 + z(x-y)^2] \geq 0 \quad \text{ពិត។}$$

១ របៀបទី៣

តាង $x = bc/a^2, y = ca/b^2, z = ab/c^2$ នោះ $xyz = 1$ ។ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{1+8x}} + \frac{1}{\sqrt{1+8y}} + \frac{1}{\sqrt{1+8z}} \geq 1 \\ \Leftrightarrow & \sqrt{(1+8x)(1+8y)} + \sqrt{(1+8y)(1+8z)} + \sqrt{(1+8z)(1+8x)} \\ & \geq \sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)} \\ \Leftrightarrow & (1+8x)(1+8y) + (1+8y)(1+8z) + (1+8z)(1+8x) \\ & + 2\sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)}(\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z}) \\ & \geq (1+8x)(1+8y)(1+8z) \\ \Leftrightarrow & 1+8x+8y+64xy+1+8y+8z+64yz+1+8x+8z+64xz \\ & + 2\sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)}(\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z}) \\ & \geq (1+8x+8y+64xy)(1+8z) \\ \Leftrightarrow & 3+16x+16y+16z+64xy+64yz+64xz \\ & + 2\sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)}(\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z}) \\ & \geq 1+8z+8x+64xz+8y+64yz+64xy+512xyz \\ \Leftrightarrow & 8(x+y+z) + 2\sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)}(\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z}) \geq 510 \end{aligned}$$

ដោយ $xyz = 1$ នោះតាមវិសមភាពកូស៊ី

$$x + y + z \geq 3$$

$$1 + 8x = 1 + x + x + \dots + x \geq 9 (x^8)^{\frac{1}{9}} = 9x^{\frac{8}{9}}$$

$$1 + 8y = 1 + y + y + \dots + y \geq 9 (y^8)^{\frac{1}{9}} = 9y^{\frac{8}{9}}$$

$$1 + 8z = 1 + z + z + \dots + z \geq 9 (z^8)^{\frac{1}{9}} = 9z^{\frac{8}{9}}$$

$$\Rightarrow (1+8x)(1+8y)(1+8z) \geq 9x^{\frac{8}{9}} \cdot 9y^{\frac{8}{9}} \cdot 9z^{\frac{8}{9}} = 729$$

$$\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z} \geq \sqrt{9x^{\frac{8}{9}}} + \sqrt{9y^{\frac{8}{9}}} + \sqrt{9z^{\frac{8}{9}}} = 3 \left(x^{\frac{4}{9}} + y^{\frac{4}{9}} + z^{\frac{4}{9}} \right)$$

$$\geq 9 \left(x^{\frac{4}{9}} y^{\frac{4}{9}} z^{\frac{4}{9}} \right)^{\frac{1}{3}} = 9$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 8(x+y+z) + 2\sqrt{(1+8x)(1+8y)(1+8z)}(\sqrt{1+8x} + \sqrt{1+8y} + \sqrt{1+8z}) \\ & \geq 8 \cdot 3 + 2 \cdot \sqrt{729} \cdot 9 = 510 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ វិសមភាពពិត។

252.▲ តាង $a = \tan x, b = \tan y, c = \tan z$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < x, y, z < \frac{\pi}{2}$ ។ នោះ $a^2 + 1 = 1/\cos^2 x, b^2 + 1 = 1/\cos^2 y, c^2 + 1 = 1/\cos^2 z$ ។ គុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពដោយ $\cos^2 x \cos^2 y \cos^2 z$ យើងទាញបាន

$$[(ab + bc + ca - 1) \cos x \cos y \cos z]^2 \leq 1$$

យើងមាន

$$(ab + bc) \cos x \cos y \cos z = \sin x \sin y \cos z + \sin y \sin z \cos x = \sin y \sin(x + z)$$

និង

$$(ca - 1) \cos x \cos y \cos z = \sin z \sin x \cos y - \cos x \cos y \cos z = -\cos y \cos(x + z)$$

ដូច្នេះយើងទាញបាន

$$\begin{aligned} [(ab + bc + ca - 1) \cos x \cos y \cos z]^2 &= [\sin y \sin(x + z) - \cos y \cos(x + z)]^2 \\ &= \cos^2(x + y + z) \leq 1 \end{aligned}$$

253.▲ ❶ របៀបទី១

តាង $f(x, y, z) = xy + yz + zx - 2xyz$ ។ តាមលក្ខណៈឆ្លុះ យើងអាចសន្មតថា $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$ ។ ដោយ $x + y + z = 1$ នោះ $x \leq 1/3$ ។ ដូច្នេះ

$$f(x, y, z) = (1 - 3x)yz + xyz + zx + xy \geq 0$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងទាញបាន

$$yz \leq \left(\frac{y+z}{2}\right)^2 = \left(\frac{1-x}{2}\right)^2$$

ដោយ $1 - 2x > 0$ នោះ

$$f(x, y, z) = x(y + z) + yz(1 - 2x) \leq x(1 - x) + \left(\frac{1-x}{2}\right)^2 (1 - 2x) = \frac{-2x^3 + x^2 + 1}{4}$$

បន្ទាប់មកទៀត យើងត្រូវរកតំលៃធំបំផុតរបស់អនុគមន៍

$$F(x) = \frac{-2x^3 + x^2 + 1}{4}$$

ដែល $x \in [0, 1/3]$ ។ យើងមាន

$$F'(x) = \frac{3}{2}x\left(\frac{1}{3} - x\right) \geq 0; \forall x \in \left[0; \frac{1}{3}\right]$$

យើងទាញបាន $F(x) \leq F(1/3) = 7/27; \forall x \in [0; 1/3]$ ។

❷ របៀបទី២

យើងបំប្លែងវិសមភាពទៅជា

$$0 \leq (xy + yz + zx)(x + y + z) - 2xyz \leq \frac{7}{27}(x + y + z)^3$$

យើងមាន

$$0 \leq (xy + yz + zx)(x + y + z) - 2xyz \Leftrightarrow 0 \leq xyz + \sum_{\text{sym}} x^2y$$

ពិត។ យើងមាន

$$\begin{aligned}
& (xy + yz + zx)(x + y + z) - 2xyz \leq \frac{7}{27}(x + y + z)^3 \\
& \Leftrightarrow 7 \sum_{\text{cyclic}} x^3 + 15xyz - 6 \sum_{\text{sym}} x^2y \geq 0 \\
& \Leftrightarrow \left(2 \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y \right) + 5 \left(3xyz + \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y \right) \geq 0
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$2 \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y \geq 0; \text{និង } 3xyz + \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y \geq 0$$

ជាការគ្រប់គ្រាន់។ យើងមាន

$$\begin{aligned}
2 \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y &= \sum_{\text{cyclic}} (x^3 + y^3) - \sum_{\text{cyclic}} (x^2y + xy^2) \\
&= \sum_{\text{cyclic}} (x^3 + y^3 - x^2y - xy^2) \\
&= \sum_{\text{cyclic}} (x^2(x - y) - y^2(x - y)) \\
&= \sum_{\text{cyclic}} (x - y)^2(x + y) \geq 0
\end{aligned}$$

វិសមភាព

$$3xyz + \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y \geq 0 \Leftrightarrow \sum_{\text{cyclic}} x(x - y)(x - z) \geq 0$$

ពិត តាមវិសមភាព Schur ករណី $r = 1$ ។

254. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
& \left(1 + \frac{x}{y}\right) \left(1 + \frac{y}{z}\right) \left(1 + \frac{z}{x}\right) = 2 + \frac{x}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} + \frac{z}{y} \\
& = \left(\frac{x}{y} + \frac{x}{z} + 1\right) + \left(\frac{y}{x} + \frac{y}{z} + 1\right) + \left(\frac{z}{x} + \frac{z}{y} + 1\right) - 1 \\
& \geq 3 \left(\sqrt[3]{\frac{x^2}{yz}} + \sqrt[3]{\frac{y^2}{xz}} + \sqrt[3]{\frac{z^2}{xy}} \right) - 1 \\
& = 3 \left(\frac{x + y + z}{\sqrt[3]{xyz}} \right) - 1 \\
& = 2 \left(\frac{x + y + z}{\sqrt[3]{xyz}} \right) + \left(\frac{x + y + z}{\sqrt[3]{xyz}} \right) - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\geq 2\left(\frac{x+y+z}{\sqrt[3]{xyz}}\right) + 3\left(\frac{\sqrt[3]{xyz}}{\sqrt[3]{xyz}}\right) - 1 \\
&= 2\left(\frac{x+y+z}{\sqrt[3]{xyz}}\right) + 2 \\
&= 2\left(1 + \frac{x+y+z}{\sqrt[3]{xyz}}\right)
\end{aligned}$$

255. ▲ តាង $a/b = p; b/c = q$ ។ ដូច្នេះ $d/c = a/b = p; a/d = b/c = q$ ។ យើងមាន

$$p + q + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 4 \quad (1)$$

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} + \frac{c}{a} + \frac{d}{b} = pq + \frac{p}{q} + \frac{q}{p} + \frac{1}{pq} = \left(p + \frac{1}{p}\right)\left(q + \frac{1}{q}\right)$$

លក្ខខណ្ឌ a, b, c, d ជាចំនួនពិតខុសគ្នា នាំអោយ $p \neq 1; q \neq 1; pq \neq 1$ ។

បើ $p > 0; q > 0$ នោះ

$$p + \frac{1}{p} \geq 2;$$

$$q + \frac{1}{q} \geq 2$$

(1) នាំអោយ $p + 1/p = 2; q + 1/q = 2 \Rightarrow p = q = 1$ ផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម។ ដូច្នេះត្រូវមានមួយក្នុងចំណោម $p; q$ ជាចំនួនអវិជ្ជមាន សន្មតថា $p < 0$ ។ ដូច្នេះ

$$p + \frac{1}{p} \leq -2$$

$$(1) \Rightarrow q + \frac{1}{q} \geq 6; \left(p + \frac{1}{p}\right)\left(q + \frac{1}{q}\right) \leq -12$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $p = -1; q + 1/q = 6 \Rightarrow q = 3 \pm 2\sqrt{2}$ ។

យក $c = 1; \frac{d}{c} = p = -1 \Rightarrow d = -1$ ។ យក $q = 3 - 2\sqrt{2}$ យើងទាញបាន

$$\frac{b}{c} = q = 3 - 2\sqrt{2} \Rightarrow b = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\frac{a}{b} = -1 \Rightarrow a = -3 + 2\sqrt{2}$$

ដូច្នេះតំលៃធំបំផុតស្មើ -12 ។ តំលៃធំបំផុតនេះកើតមាន ឧទាហរណ៍នៅត្រង់ចំនុច

$$a = -3 + 2\sqrt{2}; b = 3 - 2\sqrt{2}; c = 1; d = -1$$

256. ▲ សន្មតថា $a \leq b \leq c$ ។ យើងមាន $c < a + b \Rightarrow 2c < a + b + c = 2 \Rightarrow c < 1$ ។

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2abc = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) + 2abc$$

$$= 4 - 2(ab + bc + ca) + 2abc$$

$$2 - 2(1 - a)(1 - b)(1 - c) = 4 - 2(ab + bc + ca) + 2abc$$

ដូច្នេះ $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc = 2 - 2(1-a)(1-b)(1-c) < 2$ ព្រោះ $a < 1; b < 1; c < 1$ ។

ដោយ $a \leq b \leq c < 1$ នោះ $1-a, 1-b, 1-c$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន។ តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{(1-a) + (1-b) + (1-c)}{3} &\geq \sqrt[3]{(1-a)(1-b)(1-c)} \\ \Rightarrow (1-a)(1-b)(1-c) &\leq \frac{1}{27} \\ \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2abc &\geq 2 - \frac{2}{27} = \frac{52}{27} \end{aligned}$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $a = b = c$ ។

257.▲ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង abc យើងទាញបាន

$$\sqrt{\left(\frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b}\right)\left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{b}{b}\right)} \geq 1 + \sqrt[3]{\left(\frac{a^2}{bc} + 1\right)\left(\frac{b^2}{ca} + 1\right)\left(\frac{c^2}{ab} + 1\right)}$$

តាង $x = a/b, y = b/c, z = c/a \Rightarrow xyz = 1$ ។ ដូច្នេះវិសមភាពទៅជា

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+y+z)(xy+yz+zx)} &\geq 1 + \sqrt[3]{\left(\frac{x}{z} + 1\right)\left(\frac{y}{x} + 1\right)\left(\frac{z}{y} + 1\right)} \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x+y)(y+z)(z+x) + xyz} &\geq 1 + \sqrt[3]{\frac{(x+z)(y+x)(z+y)}{xyz}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x+y)(y+z)(z+x) + 1} &\geq 1 + \sqrt[3]{(x+z)(y+x)(z+y)} \end{aligned}$$

តាង $p = \sqrt[3]{(x+z)(y+x)(z+y)}$ ។ វិសមភាពទៅជា

$$\sqrt{p^3 + 1} \geq 1 + p \Leftrightarrow p^3 + 1 - (1+p)^2 \geq 0 \Leftrightarrow p(p+1)(p-2) \geq 0 \quad (*)$$

យើងមាន

$$p \geq \sqrt[3]{2\sqrt{xz} \cdot 2\sqrt{yx} \cdot 2\sqrt{zy}} = 2$$

ដូច្នេះ (*) ពិត។

258.▲ ❶ យក $p = \frac{m}{m+n}; q = \frac{n}{m+n}$ ដែល m, n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ វិសមភាព

$$pa + qb \geq a^p b^q \Leftrightarrow \frac{ma + nb}{m+n} \geq \sqrt[m+n]{a^m b^n}$$

ពិត តាមវិសមភាពកូស៊ី។

❷ យើងជ្រើសរើសស្ថិតនៃចំនួនសនិទាន $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ដែល $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = p$ ។ តាង

$b_i = 1 - a_i$ យើងទាញបាន $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = q$ ។

តាមសំនួរទីមួយ យើងទាញបាន

$$a_n x + b_n y \geq x^{a_n} y^{b_n} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x + b_n y \geq \lim_{n \rightarrow \infty} x^{a_n} y^{b_n} \Leftrightarrow px + qy \geq x^p y^q$$

❸ តាមវិសមភាពយីនស៊ិន យើងមាន

$$\ln(a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n) \geq a_1 \ln x_1 + a_2 \ln x_2 + \dots + a_n \ln x_n = \ln(x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}) \\ \Rightarrow a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \geq x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}$$

❹ តាង

$$u = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} ; v = \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

ចំពោះគ្រប់ i យើងមាន

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{p} \right) \left(\frac{a_i}{u} \right)^p + \left(\frac{1}{q} \right) \left(\frac{b_i}{v} \right)^q \geq \left[\left(\frac{a_i}{u} \right)^p \right]^{\left(\frac{1}{p} \right)} \left[\left(\frac{b_i}{v} \right)^q \right]^{\left(\frac{1}{q} \right)} = \frac{a_i}{u} \frac{b_i}{v} \\ \Leftrightarrow uv & \left[\frac{a_i^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{b_i^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right] \geq a_i b_i \\ \Rightarrow uv & \left[\frac{|a_i|^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{|b_i|^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right] \geq uv \left| \frac{a_i^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{b_i^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right| \geq |a_i b_i| \\ \Rightarrow uv & \left[\frac{|a_i|^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{|b_i|^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right] \geq |a_i b_i| \\ \Rightarrow uv & \sum_{i=1}^n \left[\frac{|a_i|^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{|b_i|^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right] \geq \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \\ \Leftrightarrow uv & \left[\frac{\sum_{i=1}^n |a_i|^p}{p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)} + \frac{\sum_{i=1}^n |b_i|^q}{q \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)} \right] \geq \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \\ \Leftrightarrow uv & \left[\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right] \geq \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \Leftrightarrow uv \geq \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \\ \Rightarrow & \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \geq \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \end{aligned}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នាទាល់តែ $\left(\frac{a_i}{u} \right)^p = \left(\frac{b_i}{v} \right)^q$ និង $a_i b_i$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ចំពោះគ្រប់ i

$$\Rightarrow \frac{a_i^p}{\sum_{i=1}^n |a_i|^p} = \frac{b_i^q}{\sum_{i=1}^n |b_i|^q} \Rightarrow a_i^p = \frac{\sum_{i=1}^n |a_i|^p}{\sum_{i=1}^n |b_i|^q} b_i^q = c b_i^q \Rightarrow \vec{u}(a_1^p, a_2^p, \dots, a_n^p) = c \vec{v}(b_1^q, b_2^q, \dots, b_n^q)$$

ដូច្នេះមានន័យថា វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ក្លលីនេអ៊ែរនឹង $\vec{v}$ ហើយ $a_i b_i$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ចំពោះគ្រប់ i ។ ករណីនេះយើងទាញបានសមភាព។

សំគាល់

បើ $p = q = 2$ វិសមភាពនេះ ក្លាយជាវិសមភាពកូស៊ី-ស្វាត។

259.▲ តាមវិសមភាពមន-មធ្យមទៅ យើងទាញបាន

$$\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \geq (a^p)^{\frac{1}{p}} (b^q)^{\frac{1}{q}} = ab$$

260.▲ តាង $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ និង ចំពោះ $i = 1, 2, \dots, n$ តាង $w_i = 1/(iH_n)$ ។ យើងមាន $w_i > 0$ ហើយ

$$\sum_{i=1}^n w_i = \frac{1}{H_n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{H_n} H_n = 1$$

តាង $S = x_1 + \frac{x_2^2}{2} + \dots + \frac{x_n^2}{n}$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{S}{H_n} &= \sum_{i=1}^n w_i x_i^i \geq \prod_{i=1}^n (x_i^i)^{w_i} \quad (\text{តាមវិសមភាពមន - មធ្យមទៅ}) \\ &= \prod_{i=1}^n x_i^{i w_i} = \prod_{i=1}^n x_i^{1/H_n} = \left[\prod_{i=1}^n x_i \right]^{1/H_n} \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$\prod_{i=1}^n x_i \geq \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \right)^n = 1$$

ដូច្នេះ $\frac{S}{H_n} \geq 1$ ហើយស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$ ។

261.▲ តាង $q > 0$ ដែល

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow (p-1)q = p$$

ចំពោះគ្រប់ i យើងមាន

$$|a_i + b_i|^p = |a_i + b_i|^{p-1} |a_i + b_i| \leq |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} + |b_i| |a_i + b_i|^{p-1}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \sum_{i=1}^n |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |b_i| |a_i + b_i|^{p-1}$$

តាមវិសមភាព Hölder យើងមាន

$$\sum_{i=1}^n |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

ដូចគ្នា

$$\sum_{i=1}^n |b_i| |a_i + b_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

ដូច្នេះ

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \left[\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\Rightarrow \left[\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right]^{1 - \frac{1}{q}} \leq \left[\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right]$$

$$\Rightarrow \left[\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right]^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

យើងទាញបានសមភាពប្រើ (1) a_i មានសញ្ញាដូច b_i និង (2) $a_i^p = c(a_i + b_i)^p; \forall i$ និង (3)

$b_i^p = d(a_i + b_i)^p; \forall i$ ។ (2) និង (3) $\Rightarrow a_i^p = ab_i^p$ និង (1) $\Rightarrow a_i = \beta b_i, \beta > 0$ ។ ដូច្នេះ

សមភាពកើតមានពេល $\vec{u}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \beta \vec{v}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ដែល $\beta > 0$ ។

262.▲ តាង

$$S = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{4}{3}} + (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}(x + z)^{\frac{2}{3}}} + \frac{y^{\frac{4}{3}}}{y^{\frac{4}{3}} + (y^2 + z^2)^{\frac{1}{3}}(y + x)^{\frac{2}{3}}} + \frac{z^{\frac{4}{3}}}{z^{\frac{4}{3}} + (z^2 + x^2)^{\frac{1}{3}}(z + y)^{\frac{2}{3}}}$$

$$x = a^3; y = b^3; z = c^3$$

តាមវិសមភាព Hölder យើងមាន

$$\begin{aligned}
(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}(x + z)^{\frac{2}{3}} &= [(a^2)^3 + (b^2)^3]^{\frac{1}{3}} \left[(c^2)^{\frac{3}{2}} + (a^2)^{\frac{3}{2}} \right]^{\frac{2}{3}} \geq a^2 c^2 + b^2 a^2 \\
&= (xy)^{\frac{2}{3}} + (xz)^{\frac{2}{3}} \\
&\Rightarrow \frac{x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{4}{3}} + (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}(x + z)^{\frac{2}{3}}} \leq \frac{x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{4}{3}} + (xy)^{\frac{2}{3}} + (xz)^{\frac{2}{3}}} = \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}}}
\end{aligned}$$

តាមរបៀបដូចគ្នា

$$\begin{aligned}
\frac{y^{\frac{4}{3}}}{y^{\frac{4}{3}} + (y^2 + z^2)^{\frac{1}{3}}(y + x)^{\frac{2}{3}}} &\leq \frac{y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}}} \\
\frac{z^{\frac{4}{3}}}{z^{\frac{4}{3}} + (z^2 + x^2)^{\frac{1}{3}}(z + y)^{\frac{2}{3}}} &\leq \frac{z^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}}}
\end{aligned}$$

បូកអង្គនឹងអង្គនៃវិសមភាពបញ្ចូលគ្នា យើងទាញបាន $S \leq 1$ ។

263.▲ យើងមាន $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ។ តាង $s = a + b + c + d$ ។ តាមវិសមភាព Minkowski

$$\begin{aligned}
S_1 &= \sqrt{(a+1)^2 + 2(b-2)^2 + (c+3)^2} + \sqrt{(b+1)^2 + 2(c-2)^2 + (d+3)^2} \\
&\geq \sqrt{(a+b+2)^2 + 2(b+c-4)^2 + (c+d+6)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_2 &= \sqrt{(c+1)^2 + 2(d-2)^2 + (a+3)^2} + \sqrt{(d+1)^2 + 2(a-2)^2 + (b+3)^2} \\
&\geq \sqrt{(c+d+2)^2 + 2(d+a-4)^2 + (a+b+6)^2}
\end{aligned}$$

$$S = S_1 + S_2 \geq \sqrt{(s+4)^2 + 2(s-8)^2 + (s+12)^2} = \sqrt{4s^2 + 288} \geq \sqrt{288} = 12\sqrt{2}$$

ចំពោះ $a = b = c = d = 0$ យើងមាន $S = 12\sqrt{2}$ ។ ដូច្នេះតំលៃតូចបំផុតរបស់ S គឺ $12\sqrt{2}$ ។

264.▲ ① តាង $x = \tan A, y = \tan B, z = \tan C$ ដែល $0 < A, B, C < \pi/2$ ។ លក្ខខណ្ឌសមមូលនឹង

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C \Rightarrow A + B + C = \pi$$

និងដោយ

$$\frac{\tan A}{\sqrt{1 + \tan^2 A}} = \sin A$$

វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

អនុគមន៍ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $[0; \frac{\pi}{2}]$ ។ ដូច្នេះ តាមវិសមភាពយ៉ែនស៊ីន យើងទាញបាន

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin \frac{A + B + C}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

នាំអោយវិសមភាពពិត។

❷ តាង $x = \tan \frac{A}{2}; y = \tan \frac{B}{2}; z = \tan \frac{C}{2}$ ដែល $0 < A, B, C < \frac{\pi}{2}$ ។ លក្ខខណ្ឌសមមូលនឹង

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = 1 \Rightarrow A + B + C = \pi$$

វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$$

ពិតតាមវិសមភាពយ៉ែនស៊ីន។

265.▲ តាង $x_n = \tan a_n$ ដែល $0 < a_n < \pi/2$ ។ យើងមាន

$$x_{n+1} = \tan a_n + \sqrt{1 + \tan^2 a_n} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{a_n}{2} \right)$$

យើងទាញបាន $a_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}}$ ។ ដូច្នេះ $x_n = \cot \theta_n$ ដែល $\theta_n = \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}}$ ។ ដូចគ្នាយើងទាញបាន

$y_n = \tan 2\theta_n$ ។ ដូច្នេះ $x_n y_n = \frac{2}{1 - \tan^2 \theta_n}$ ។ ដោយ $0 < \theta_n < \frac{\pi}{4}$ នោះយើងមាន $0 < \tan^2 \theta_n < 1$ និង $x_n y_n > 2$ ។ ចំពោះ $n > 1$ យើងមាន $\theta_n < \pi/6$ ដូច្នេះ $\tan^2 \theta_n < 1/3$ និង $x_n y_n < 3$ ។

266.▲ តាង T_n ជាពហុធា Chebyshev ទី n ។ យើងដឹងថា $T_n(\cos x) = \cos nx$ និង T_n កំនត់

ដោយ $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), T_0(x) = 1$ និង $T_1(x) = x$ ។ ដូច្នេះមេគុណធំរបស់ T_n

ស្មើនឹង 2^{n-1} ចំពោះ $n \geq 1$ ។

ប្រើរូបមន្តអាំងតេក្រាលស្យុងរបស់ Lagrange ទៅលើពហុធាដឺក្រេទី $T_{n-1}(x)$ និងចំពោះចំនុច

$x_1, x_2, \dots, x_n$ យើងមាន

$$T_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{T_{n-1}(x_k)(x-x_1) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_1) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

ផ្អែមមេគុណធំ យើងទាញបាន

$$2^{n-2} = \sum_{k=1}^n \frac{T_{n-1}(x_k)}{(x_k-x_1) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

យើងយក θ_k ដែល $\cos \theta_k = x_k$ ។ ដូច្នេះ $|T_{n-1}(x_k)| = |\cos(n-1)\theta_k| \leq 1$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} 2^{n-2} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{|T_{n-1}(x_k)|}{(x_k-x_1) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{t_k} \end{aligned}$$

នាំអោយវិសមភាពពិត។

267.▲ ចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពទី៤ យើងទាញបាន

$$\left| \frac{a}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{b}{2}\right)^2} - \frac{b}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \right| \leq \frac{1}{2}$$

យើងជំនួស $\frac{a}{2} = \sin x$ និង $\frac{b}{2} = \sin y$ ។ វិសមភាពក្រោយនេះទៅជា

$$|\sin(x - y)| = |\sin x \cos y - \sin y \cos x| \leq \sin \frac{\pi}{6} \quad (*)$$

យើងចង់បាន t_1 និង t_2 ដែល $\sin t_1 = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ និង $\sin t_2 = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ។

យើងទាញបាន $\cos 2t_1 = 1 - 2 \sin^2 t_1 = 1 - \frac{8-4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\pm \frac{\pi}{6}\right)$ និង $\cos 2t_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{5\pi}{6}$ ។ ព្រោះ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍មួយទល់មួយពី $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ទៅ $[-1; 1]$ នោះ $t_1 = -\frac{\pi}{12}$ និង $t_2 = \frac{5\pi}{12}$ ។

យើងចែកចន្លោះ $\left[-\frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12}\right]$ ជាចន្លោះដាច់បី ដែលនិមួយៗមានប្រវែង $\frac{\pi}{6}$ គឺ $I_1 = \left[-\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{12}\right), I_2 = \left[\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{4}\right)$ និង $I_3 = \left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{12}\right]$ ។ អនុគមន៍ $y = 2 \sin x$ អនុវត្តចំពោះចន្លោះ I_1, I_2, I_3 មានរូបភាពមួយគត់ លើចន្លោះ $I'_1 = \left[\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}; 2 \sin \frac{\pi}{12}\right), I'_2 = \left[2 \sin \frac{\pi}{12}; \sqrt{2}\right), I'_3 = \left[\sqrt{2}; \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}\right]$ រៀងគ្នា។ តាមគោលការណ៍រន្ធដ្រាប ចន្លោះមួយនៃ I'_1, I'_2, I'_3 មានចំនួនពីរនៃចំនួនដែលអោយចំនួនបួន តាងដោយ a និង b ។ យើងទាញបាន ចន្លោះមួយក្នុងចំណោម I_1, I_2, I_3 មានចំនួនពិត x និង y ដែល $a = 2 \sin x$ និង $b = 2 \sin y$ ។ ដោយចន្លោះ I_1, I_2, I_3 មានវង្វាស់ស្មើ $\pi/6$ ដូចគ្នា នោះ $|x - y| \leq \pi/6$ ។ យើងទាញបានវិសមភាព(*) ពិត។

268.▲ ចំពោះ $n = 1 : f(l_1 x_1) \leq l_1 f(x_1)$ សំនើពិត។

ចំពោះ $n = 2$ វាជានិយមន័យរបស់ភាពផុត។ សន្មតថាពិតរហូតដល់ n ។

យើងមាន

$$\sum_{k=1}^{n+1} l_k x_k = \sum_{k=1}^n l_k x_k + l_{n+1} x_{n+1} = (1 - l_{n+1})y + l_{n+1} x_{n+1}$$

ដែល

$$y = \sum_{k=1}^n \frac{l_k}{1 - l_{n+1}} x_k; \quad \sum_{k=1}^n \frac{l_k}{1 - l_{n+1}} = 1$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}
f\left(\sum_{k=1}^{n+1} l_k x_k\right) &= f((1-l_{n+1})y + l_{n+1}x_{n+1}) \leq (1-l_{n+1})f(y) + l_{n+1}f(x_{n+1}) \\
&= (1-l_{n+1})f\left(\sum_{k=1}^n \frac{l_k}{1-l_{n+1}} x_k\right) + l_{n+1}f(x_{n+1}) \\
&\leq (1-l_{n+1})\left[\frac{l_1}{1-l_{n+1}}f(x_1) + \frac{l_2}{1-l_{n+1}}f(x_2) + \cdots + \frac{l_n}{1-l_{n+1}}f(x_n)\right] \\
&\quad + l_{n+1}f(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} l_k f(x_k)
\end{aligned}$$

269.▲ តាង $a = \tan x, b = \tan y, c = \tan z$ ។ ដូច្នេះ x, y, z ជាមុំក្នុងនៃត្រីកោណស្រួចមួយ។
យើងមាន

$$\cos x + \cos y + \cos z \leq \frac{3}{2}$$

វិសមភាពនេះពិត តាមវិសមភាពយ៉ិនស៊ីន។ យើងមានសមភាពពេល $a = b = c = \sqrt{3}$ ។

270.▲ អនុគមន៍ $f(x) = x^{1/3}$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $(0; +\infty)$ ។ តាមវិសមភាពយ៉ិនស៊ីន យើង
មាន

$$\frac{a^{1/3} + b^{1/3}}{2} \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^{1/3} \Rightarrow a^{1/3} + b^{1/3} \leq \frac{2}{2^{1/3}}(a+b)^{1/3}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ និងនាំអោយ $a = b$ ។ ដូច្នេះចំនួនថេរ M តូចបំផុត គឺ $M = \frac{2}{2^{1/3}} = 4^{1/3}$ ។

271.▲ អនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ ផុតលើ $(1; +\infty)$ ។ ដោយ $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$ នោះតាម
វិសមភាពយ៉ិនស៊ីន

$$\begin{aligned}
x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \cdots + x_n f(x_n) &\geq f(x_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot x_2 + \cdots + x_n \cdot x_n) \\
\Leftrightarrow x_1 \frac{1}{\sqrt{1-x_1}} + x_2 \frac{1}{\sqrt{1-x_2}} + \cdots + x_n \frac{1}{\sqrt{1-x_n}} &\geq \frac{1}{\sqrt{1-(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)}}
\end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីស្វាត យើងមាន

$$\begin{aligned}
x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 &\geq \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2 = \frac{1}{n} \\
\Rightarrow \frac{x_1}{\sqrt{1-x_1}} + \frac{x_2}{\sqrt{1-x_2}} + \cdots + \frac{x_n}{\sqrt{1-x_n}} &\geq \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \sqrt{n-1}
\end{aligned}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1/n$ ។

272.▲ បើ $n \geq 0$ អនុគមន៍ $f(x) = x^n$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ $\mathbb{R}^{+*}$ ។ ដូច្នេះតាមវិសមភាពយ៉ិនស៊ីន

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2 \left(\frac{1 + \frac{a}{b} + 1 + \frac{b}{a}}{2} \right)^n = 2 \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) \right)^n$$

តែង ថា $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ នោះ

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2(2)^n = 2^{n+1}$$

បើ $n < -1$ តាំង $p = -n > 1$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2^{n+1} \Leftrightarrow \frac{b^p}{(a+b)^p} + \frac{a^p}{(a+b)^p} \geq \frac{1}{2^{p-1}} \Leftrightarrow \frac{a^p + b^p}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^p$$

អនុគមន៍ $f(x) = x^p$ ជាអនុគមន៍ជិតលើ $\mathbb{R}^{+*}$ ។ ដូច្នេះតាមវិសមភាពយ៉ុងស៊ីន

$$\frac{a^p + b^p}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^p$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិត។ យើងឃើញថា អង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពស្មើគ្នា ទាល់តែ $n \in \{0; -1\}$ និង a, b យ៉ាងម៉េចក៏បាន រឺ $n \notin \{0; -1\}$ និង $a = b$ ។

273.▲ យើងឃើញថាវិសមភាពនៅដដែល បើយើងជំនួស (a, b, c) ដោយ (aa, ab, ac)

(វិសមភាពអូម៉ូសែន)។ ដូច្នេះ យើងអាចសន្មតថា $a + b + c = 1$ (*)។

អនុគមន៍ $f(x) = 1/\sqrt{x}$ ជាអនុគមន៍ជិត ដូច្នេះតាមវិសមភាពយ៉ុងស៊ីន និង (*) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} & af(a^2 + \lambda bc) + bf(b^2 + \lambda ca) + cf(c^2 + \lambda ab) \\ & \geq f[a(a^2 + \lambda bc) + b(b^2 + \lambda ca) + c(c^2 + \lambda ab)] \\ \Rightarrow & \frac{a}{\sqrt{a^2 + \lambda bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + \lambda ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + \lambda ab}} \geq \frac{1}{\sqrt{a(a^2 + \lambda bc) + b(b^2 + \lambda ca) + c(c^2 + \lambda ab)}} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\begin{aligned} & a(a^2 + \lambda bc) + b(b^2 + \lambda ca) + c(c^2 + \lambda ab) \leq \frac{1 + \lambda}{9} \\ \Leftrightarrow & a^3 + b^3 + c^3 + 3\lambda abc \leq \frac{1 + \lambda}{9} \end{aligned}$$

យើងមាន

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)^3 - 3(a^2b + a^2c + ab^2 + ac^2 + b^2c + bc^2 + 2abc)$$

តាម(*) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} & a^3 + b^3 + c^3 + 3\lambda abc \\ & = 1 - 3(a^2b + a^2c + ab^2 + ac^2 + b^2c + bc^2) + 3(\lambda - 2)abc \\ & \leq 1 - 3.6abc + 3(\lambda - 2)abc \quad (\text{វិសមភាពកូស៊ី}) \\ & = 1 + 3(\lambda - 8)abc \end{aligned}$$

$$\leq 1 + 3(\lambda - 8) \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^3 \quad (\text{វិសមភាពកូស៊ី និង ដោយសារ } \lambda \geq 8)$$

$$= 1 + \frac{\lambda - 8}{9} = \frac{1 + \lambda}{9}$$

ពិត ។ សមភាពកើតមានពេលវិសមភាពកូស៊ីទៅជាសមភាព មានន័យថា $a = b = c$ ។

274.▲ ដោយអនុគមន៍ $f(x) = x^t$ ផតលើ $\mathbb{R}^+$ នោះតាមវិសមភាពយីនស៊ិន យើងទាញបាន

$$\sum_{i=1}^n \left(a_i^\alpha + \frac{1}{a_i^\beta} \right)^t \geq n \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^\alpha + \frac{1}{a_i^\beta} \right]^t = n \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^\alpha + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^\beta} \right]^t \quad (*)$$

តែ

ក) ដោយ $\alpha \geq 1$ នោះអនុគមន៍ $f(x) = x^\alpha$ ផតលើ $\mathbb{R}^+$ ដូច្នេះ យើងទាញបាន

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^\alpha \geq \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right]^\alpha = \frac{1}{n^\alpha}$$

ខ) ដោយ $\beta > 0$ នោះអនុគមន៍ $f(x) = 1/x^\beta$ ផតលើ $\mathbb{R}^+$ ដូច្នេះ យើងទាញបាន

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^\beta} \geq \left[\frac{n}{\sum_{i=1}^n a_i} \right]^\beta = n^\beta$$

តាម (*), ក) និង ខ) យើងទាញបាន

$$\sum_{i=1}^n \left(a_i^\alpha + \frac{1}{a_i^\beta} \right)^t \geq n \left(\frac{1}{n^\alpha} + n^\beta \right)$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ ។ ដោយ $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ នោះ

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1/n$$

275.▲ អនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ ផតលើ $\mathbb{R}^+$ ព្រោះ

$$f''(x) = \frac{e^{2x} - e^x}{(1+e^x)^3} \geq 0$$

ចំពោះ $i = 1, 2, \dots, n$ តាង $x_i = e^{y_i}$ ។ ដោយ $x_i \geq 1$ នោះ $y_i \geq 0$ ។

តាមវិសមភាពយីនស៊ិន

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i + 1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{e^{y_i} + 1} \geq \frac{1}{e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i} + 1} = \frac{1}{(x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}} + 1}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ។

276.▲ តាង

$$f(a) = \frac{a}{b+c+1} + \frac{b}{c+a+1} + \frac{c}{a+b+1} + (1-a)(1-b)(1-c)$$

ដោយចាត់ទុកថា b, c ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ យើងឃើញថា f ជាអនុគមន៍ផតធៀបនឹង a ដូច្នេះ តំលៃធំបំផុតរបស់វា គឺនៅក្នុង $a = 0$ រឺ $a = 1$ ។ តាមវិធានដូចគ្នា យើងទាញបានថា f មានតំលៃធំបំផុតនៅក្នុងចំណុចមួយ (រឺច្រើនជាងមួយ) ក្នុងចំណោមចំណុចទាំងប្រាំបី ដែលមាន $(a, b, c) = \{0; 0; 0\}, \{0; 0; 1\}, \{0; 1; 0\}, \{0; 1; 1\}, \{1; 0; 0\}, \{1; 1; 0\}, \{1; 0; 1\}, \{1; 1; 1\}$ ។ យើងពិនិត្យឃើញថា ចំពោះត្រីធាតុនីមួយៗ តំលៃរបស់អនុគមន៍ f ស្មើ 1 ។ ដូច្នេះវិសមភាពពិត។

277.▲ អង្គខាងឆ្វេងជាអនុគមន៍ផត ចំពោះអថេរនីមួយៗ ដោយទប់អថេរផ្សេងទៀត។ វាមានតំលៃធំបំផុតនៅក្នុងចំណុចមួយនៃបញ្ចេធាតុ (a, b, c, d, e) ទាំង 32 ដែល $a, b, c, d, e \in \{p; q\}$ ។ តាង n ជាចំនួនអថេរ ដែលស្មើ p ហើយដូច្នេះអថេរចំនួន $5 - n$ ផ្សេងទៀតស្មើ q ដែល $n \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ ។ ដូច្នេះ យើងត្រូវរកតំលៃធំបំផុតរបស់

$$f(n) = [np + (5 - n)q] \left[\frac{n}{p} + \frac{5 - n}{q} \right]$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} f(n) &= n^2 + (5 - n)^2 + n(5 - n) \left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p} \right) \\ &= n^2 + (5 - n)^2 + n(5 - n) \left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p} - 2 + 2 \right) \\ &= n^2 + (5 - n)^2 + 2n(5 - n) + n(5 - n) \left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}} \right)^2 \\ &= 25 + n(5 - n) \left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}} \right)^2 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $f(n)$ ធំបំផុត បើ

$$n(5 - n) = \frac{25}{4} - \left(n - \frac{5}{2} \right)^2$$

មានតំលៃធំបំផុត មានន័យថា $n = 2$ រឺ $n = 3$ ។ ដូច្នេះ

$$f_{\max} = 25 + 6 \left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}} \right)^2$$

278.▲ តាង $A, B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ និង $a = \sqrt{2} \tan A, b = \sqrt{2} \tan B$ និង $c = \sqrt{2} \tan C$ ។ តាម

ទំនាក់ទំនង $1 + \tan^2 \theta = 1/\cos^2 \theta$ វិសមភាពអាចសរសេរជា

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq 9(ab + bc + ca)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (2 \tan^2 A + 2)(2 \tan^2 B + 2)(2 \tan^2 C + 2) \\ &\quad \geq 9(2 \tan A \tan B + 2 \tan B \tan C + 2 \tan C \tan A) \\ &\Leftrightarrow \frac{4}{9} \geq \cos A \cos B \cos C (\sin A \sin B \cos C + \sin B \sin C \cos A + \sin C \sin A \cos B) \end{aligned}$$

យើងមាន

$$\begin{aligned} \cos(A + B + C) &= \cos A \cos B \cos C - \cos A \sin B \sin C - \sin A \cos B \sin C \\ &\quad - \sin A \sin B \cos C \end{aligned}$$

ដូច្នេះវិសមភាពទៅជា

$$\frac{4}{9} \geq \cos A \cos B \cos C (\cos A \cos B \cos C - \cos(A + B + C))$$

តាង $q = \frac{A+B+C}{3}$ ។ តាមវិសមភាពកូស៊ីនុស៍ និង វិសមភាពយ៉ែនស៊ីន យើងទាញបាន

$$\cos A \cos B \cos C \leq \left(\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \right)^3 \leq \cos^3 q$$

យើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\frac{4}{9} \geq \cos^3 q (\cos^3 q - \cos 3q)$$

យើងមាន

$$\cos 3q = 4 \cos^3 q - 3 \cos q \Rightarrow \cos^3 q - \cos 3q = 3 \cos q - 3 \cos^3 q$$

ដូច្នេះវិសមភាពទៅជា

$$\frac{4}{27} \geq \cos^4 q (1 - \cos^2 q) \quad (*)$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីនុស៍

$$\left[\frac{\cos^2 q}{2} \cdot \frac{\cos^2 q}{2} \cdot (1 - \cos^2 q) \right]^{\frac{1}{3}} \leq \frac{1}{3} \left[\frac{\cos^2 q}{2} + \frac{\cos^2 q}{2} + (1 - \cos^2 q) \right] = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow (*)$ ពិត។ សមភាពកើតមាន ទាល់តែ

$$\tan A = \tan B = \tan C = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow a = b = c = 1$$

279.▲ ❶ ដំនោះស្រាយទី១

តាង $a = y + z, b = z + x, c = x + y$ ។

$$a + b > c \Rightarrow y + z + z + x > x + y \Rightarrow z > 0$$

ដូចគ្នា $x, y, z > 0$ ។

វិសមភាពខាងលើសមមូលនឹង

$$x^3 z + y^3 x + z^3 y \geq x^2 y z + x y^2 z + x y z^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z$$

ដោយវិសមភាពខាងលើអ្វីមួយសែន (បើយើងជំនួស (x, y, z) ដោយ tx, ty, tz នោះវិសមភាពនៅដដែល) នោះយើងអាចសន្មតថា $x + y + z = 1$ ។ ដូច្នេះវិសមភាពសមមូលនឹង

$$yf\left(\frac{x}{y}\right) + zf\left(\frac{y}{z}\right) + xf\left(\frac{z}{x}\right) \geq 1$$

ដែល $f(t) = t^2$ ។ ដោយ f ផុតលើ $\mathbb{R}$ តាមវិសមភាពយីនស៊ីន យើងទាញបាន

$$yf\left(\frac{x}{y}\right) + zf\left(\frac{y}{z}\right) + xf\left(\frac{z}{x}\right) \geq f\left(y \cdot \frac{x}{y} + z \cdot \frac{y}{z} + x \cdot \frac{z}{x}\right) = f(1) = 1$$

❷ ដំនោះស្រាយទី២

តាង $f(a, b, c) = a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a)$ ។ យើងឃើញថា f មិនប្រែប្រួលទេពេលយើងធ្វើចំលាស់ស៊ីគ្លីបនៃ (a, b, c) មានន័យថា ផ្លូវ (a, b, c) ជា (b, c, a) រឺ (c, a, b) ។ ដូច្នេះយើងអាចសន្មតថា $a = \max(a, b, c)$ (តែមិនអាចសន្មតថា $a \geq b \geq c$ បានទេ ព្រោះ f មិនស៊ីមេទ្រី)។ យើងទាញបាន

$$f(a, b, c) = a(b-c)^2(b+c-a) + b(a-b)(a-c)(a+b-c) \geq 0$$

សមភាពកើតមានពេល $a = b = c$ ។

280.▲ បើគ្រប់ a_i ស្មើគ្នាទាំងអស់ នោះអនុគមន៍ M ថេរលើ $\mathbb{R}^*$ ។ ឥលូវនេះ យើងសន្មតថា បណ្តា a_i មិនស្មើគ្នាទាំងអស់ទេ។ តាង $f(\alpha) = \ln[l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \dots + l_n a_n^\alpha]$ ។ យើងមាន

$$\ln M(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \ln[l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \dots + l_n a_n^\alpha] = \frac{f(\alpha)}{\alpha}$$

យើងមាន $\lim_{\alpha \rightarrow 0} a_i^\alpha = 1$ ចំពោះគ្រប់ $a_i > 0$ ដូច្នេះ $\lim_{\alpha \rightarrow 0} f(\alpha) = 0$ ។ ម៉្យាងវិញទៀត ដោយ

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= \frac{l_1 a_1^\alpha \ln a_1 + l_2 a_2^\alpha \ln a_2 + \dots + l_n a_n^\alpha \ln a_n}{l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \dots + l_n a_n^\alpha} \\ \Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow 0} f'(\alpha) &= \frac{l_1 \ln a_1 + l_2 \ln a_2 + \dots + l_n \ln a_n}{l_1 + l_2 + \dots + l_n} = l_1 \ln a_1 + l_2 \ln a_2 + \dots + l_n \ln a_n \\ &= \ln(a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_n^{l_n}) \end{aligned}$$

តាមក្បួន អ្វីៗតាស់ យើងទាញបាន

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \ln M(\alpha) = \ln(a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_n^{l_n}) \Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow 0} M(\alpha) = a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_n^{l_n}$$

ដូច្នេះ ដោយយក $M(0) = a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_n^{l_n}$ យើងទាញបាន M ជាប់ត្រង់ 0 ។

ក) ករណី $\alpha > 1$

អនុគមន៍ $f(x) = x^\alpha$ ផុតជាប់ខាតលើ $\mathbb{R}^{+*}$ ។ ដូច្នេះ

$$l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \cdots + l_n a_n^\alpha > (l_1 a_1 + l_2 a_2 + \cdots + l_n a_n)^\alpha$$

វិសមភាពនេះ ជាប់ខាត ព្រោះ បណ្តា a_i មិនស្មើគ្នាទាំងអស់ទេ។

ដូច្នេះ

$$M(\alpha) = (l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \cdots + l_n a_n^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > l_1 a_1 + l_2 a_2 + \cdots + l_n a_n = M(1)$$

១) ករណី $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

ករណីទី១: $0 < \alpha < \beta$

តាង $t = \beta/\alpha > 1$ ។ ចំពោះគ្រប់ $i \in \{1, \dots, n\}$ យើងតាង $b_i = a_i^\alpha$ ។ តាម ក) យើងមាន

$$\left(\sum_{i=1}^n l_i b_i^t \right)^{\frac{1}{t}} > \sum_{i=1}^n l_i b_i \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n l_i a_i^\beta \right)^{\frac{\alpha}{\beta}} > \sum_{i=1}^n l_i a_i^\alpha \Rightarrow M(\beta) > M(\alpha)$$

ករណីទី២: $\alpha < \beta < 0$

តាង $t = \alpha/\beta > 1$ ។ ចំពោះគ្រប់ $i \in \{1, \dots, n\}$ យើងតាង $b_i = a_i^\beta$ ។ តាម ក) យើងមាន

$$\left(\sum_{i=1}^n l_i b_i^t \right)^{\frac{1}{t}} > \sum_{i=1}^n l_i b_i \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n l_i a_i^\alpha \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} > \sum_{i=1}^n l_i a_i^\beta \Rightarrow M(\beta) > M(\alpha)$$

ដូច្នេះ អនុគមន៍ M កើនជាប់ខាតលើ $\mathbb{R}^{+*}; \mathbb{R}^{-*}$ ហើយជាប់ត្រង់ 0 ។ ដូច្នេះ វាកើនជាប់ខាតលើ $\mathbb{R}$ ។

281.▲● ចំពោះ $\alpha > 0$:

តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា $a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ។

ដូច្នេះ

$$\ln M(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \ln[l_1 a_1^\alpha + l_2 a_2^\alpha + \cdots + l_n a_n^\alpha] = \frac{1}{\alpha} \ln \left[a_1^\alpha \sum_{i=1}^n l_i \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \right] =$$

$$\ln a_1 + \frac{1}{\alpha} \ln \left[\sum_{i=1}^n l_i \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \right]$$

ចំពោះគ្រប់ i យើងមាន $0 < \frac{a_i}{a_1} \leq 1$ ។ ដូច្នេះ $0 < \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \leq 1$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n l_i \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \leq \sum_{i=1}^n l_i = 1$$

$$\ln M(\alpha) \leq \ln a_1 + \frac{1}{\alpha} \ln 1 = \ln a_1$$

$$\Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \ln M(\alpha) = \ln a_1$$

$$\Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} M(\alpha) = a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

● ចំពោះ $\alpha < 0$

លើកនេះយើងសន្មតថា $a_1 = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ។ ដូចខាងលើ យើងមាន

$$\ln M(\alpha) = \ln a_1 + \frac{1}{\alpha} \ln \left[\sum_{i=1}^n l_i \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \right]$$

ដែល $\frac{a_i}{a_1} \geq 1$ ចំពោះគ្រប់ i ។ ដូច្នេះ $0 < \left(\frac{a_i}{a_1} \right)^\alpha \leq 1$ ។

តាមវិធានដូចករណីខាងលើ យើងទាញបាន

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} M(\alpha) = a_1 = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

ដូច្នេះ

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} M(\alpha) = a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} M(\alpha) = a_1 = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

ហើយដោយអនុគមន៍ M កើនជាចំនាត់លើ $\mathbb{R}$ ដូច្នេះ ចំពោះគ្រប់ $\alpha \in \mathbb{R}$ គេមាន

$$\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} < M(\alpha) < \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

● យក $l_1 = l_2 = \dots = l_n = \frac{1}{n}$ យើងទាញបាន

$$M(-1) = \left[\frac{1}{n} (a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}) \right]^{-1} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

$$M(0) = (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}}$$

$$M(1) = \left[\frac{1}{n} a_1 + \frac{1}{n} a_2 + \dots + \frac{1}{n} a_n \right] = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

$$M(2) = \left[\frac{1}{n} a_1^2 + \frac{1}{n} a_2^2 + \dots + \frac{1}{n} a_n^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$$

282.▲ តាង $A = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$ និង $A_i = A - x_i^3 \Rightarrow A = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 A_i$ ។

តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងទាញបាន

$$\frac{1}{3} A_i \geq (x_2^3 x_3^3 x_4^3)^{1/3} = x_2 x_3 x_4 = 1/x_1$$

តាមរបៀបដូចគ្នា យើងទាញបាន

$$\frac{1}{3} A_i \geq \frac{1}{x_i}; \quad \forall i = 1, 2, 3, 4$$

$$\Rightarrow A \geq \sum_{i=1}^4 1/x_i \quad (1)$$

ម៉្យាងវិញទៀត

$$\frac{1}{4} A = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i^3 \geq \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i \right)^3 \quad (\text{តាមវិសមភាពមធ្យមលំដាប់ 3 និង 1})$$

$$= \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i\right) \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i\right)^2 \geq \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i\right)$$

ព្រោះ

$$\left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i\right) \geq (x_1 x_2 x_3 x_4)^{\frac{1}{4}} = 1 \quad (\text{តាមវិសមភាពកូស៊ី})$$

$$\Rightarrow A \geq \sum_{i=1}^4 x_i \quad (2)$$

$$(1) \text{ និង } (2) \Rightarrow \sum_{i=1}^4 x_i^3 \geq \max\{\sum_{i=1}^4 x_i; \sum_{i=1}^4 1/x_i\} \text{ ។}$$

283.▲ បើមានចំនួនណាមួយស្មើសូន្យ ឧទាហរណ៍ $z = 0$ នោះ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$8(x^6 + y^6 + 2x^3 y^3) \geq 9x^3 y^3$$

ពិត ហើយស្មើគ្នាពេល $x = y = z = 0$ ។

បើ $x, y, z > 0$ យើងមាន

$$\begin{aligned} 9(x^2 + yz)(y^2 + zx)(z^2 + xy) &\leq \frac{9}{8}(2x^2 + y^2 + z^2)(x^2 + 2y^2 + z^2)(x^2 + y^2 + 2z^2) \\ &\leq \frac{9}{8} \left[\frac{4(x^2 + y^2 + z^2)}{3} \right]^3 \quad (\text{តាមវិសមភាពកូស៊ី}) \\ &= 9.8 \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} \right)^3 \leq 9.8 \left(\frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} \right)^2 \quad (\text{តាម មធ្យមលំដាប់៣ និង ២}) \\ &= 8(x^3 + y^3 + z^3)^2 \end{aligned}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែនិងនាំអោយ $x = y = z$ ។

284.▲ អនុគមន៍ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x}}$ ជាអនុគមន៍ជិត។ តាមវិសមភាពយីនសិន យើងទាញបាន

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{n}{n-1}} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geq \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$

ម្យ៉ាងវិញទៀត តាមវិសមភាពមធ្យមលំដាប់ 1 និង 1/2 យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}\right)^2 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \leq \sqrt{n} \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}}{\sqrt{n-1}} \leq \sqrt{\frac{n}{n-1}} \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geq \sqrt{\frac{n}{n-1}} \geq \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}}{\sqrt{n-1}} \end{aligned}$$

ពិត។

285.▲ តាង $S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^5}{S - x_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n (S - x_i) \right) &\geq \left(\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^5} \right)^2 \quad (\text{តាមវិសមភាពកូស៊ីស្កាត}) \\ &= n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{5}{2}} \right)^2 \geq n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{5}{2}} \quad (\text{តាមវិសមភាពមធ្យមលំដាប់ } \frac{5}{2} \text{ និង } 2) \\ &= \frac{n^2}{n^{\frac{5}{2}}} \quad (*) \end{aligned}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1/\sqrt{n}$ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត

$$\begin{aligned} 0 &< \sum_{i=1}^n (S - x_i) = (n-1) \sum_{i=1}^n x_i = n(n-1) \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \\ &\leq n(n-1) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{តាមវិសមភាពមធ្យមលំដាប់ } 1 \text{ និង } 2) \\ &= \frac{n(n-1)}{\sqrt{n}} \\ \Rightarrow 0 &< \sum_{i=1}^n (S - x_i) \leq \frac{n(n-1)}{\sqrt{n}} \quad (**) \end{aligned}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1/\sqrt{n}$ ។

(*) និង (**) ។

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^5}{S - x_i} \right) \frac{n(n-1)}{\sqrt{n}} \geq \frac{n^2}{n^{\frac{5}{2}}} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i^5}{S - x_i} \geq \frac{1}{n(n-1)}$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1/\sqrt{n}$ ។

286.▲ ដោយវិសមភាពស៊ីមេទ្រីបន្តិចអថេរទាំងបី យើងអាចសន្មតថា $x \geq y \geq z$ ដោយមិន

បាត់បង់លក្ខណៈទូទៅអ្វីទាំងអស់។ វិសមភាពដែលអោយ អាចសរសេរជា

$$\begin{aligned} x^r(x-y)(x-z) + y^r(y-z)(y-x) + z^r(z-x)(z-y) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (x-y)[x^r(x-z) - y^r(y-z)] + z^r(x-z)(y-z) &\geq 0 \end{aligned}$$

ពិត ព្រោះតួនិមួយៗ សុទ្ធតែវិជ្ជមានទាំងអស់។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ $x = y = z$ ។

287.▲ ① វិសមភាពខាងឆ្វេងដែលអោយមក សមមូលនឹង

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a)$$

$$\Leftrightarrow a(a-b)(a-c) + b(b-c)(b-a) + c(c-a)(c-b) \geq 0$$

ពិត តាមវិសមភាព Schur ករណី $r = 1$ ។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែនឹងមានតែ $a = b = c$ ។

វិសមភាពខាងស្តាំសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a) &\geq 2 \left[(ab)^{\frac{3}{2}} + (bc)^{\frac{3}{2}} + (ca)^{\frac{3}{2}} \right] \\ \Leftrightarrow \sum_{\text{cyclic}} (a^2b + ab^2) &\geq \sum_{\text{cyclic}} 2(ab)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

ពិតតាមវិសមភាពកូស៊ី។

❷ តាង $x = a^{2/3}, y = b^{2/3}, z = c^{2/3}$ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} (3-t) + t(abc)^{\frac{2}{t}} + a^2 + b^2 + c^2 &\geq 2(ab + bc + ca) \\ \Leftrightarrow (3-t) + t(xyz)^{3/t} + x^3 + y^3 + z^3 &\geq 2 \left[(xy)^{\frac{3}{2}} + (yz)^{\frac{3}{2}} + (zx)^{\frac{3}{2}} \right] \end{aligned}$$

តាមសំនួរទី❶ យើងមាន

$$x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz \geq 2 \left[(xy)^{\frac{3}{2}} + (yz)^{\frac{3}{2}} + (zx)^{\frac{3}{2}} \right]$$

ដូច្នេះ ពេលនេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\begin{aligned} (3-t) + t(xyz)^{\frac{3}{t}} &\geq 3xyz \\ \Leftrightarrow \frac{3-t}{3} \cdot 1 + \frac{t}{3} (xyz)^{\frac{3}{t}} &\geq 1^{\frac{3-t}{3}} \cdot \left[(xyz)^{\frac{3}{t}} \right]^{\frac{t}{3}} = xyz \end{aligned}$$

ពិត តាមវិសមភាពមន-មធ្យមទៅ។ យើងឃើញថាអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $a = b = c = 1$ ។

❸ ចំពោះ $t = \frac{1}{2}; 1; 2$ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{5}{2} + \frac{1}{2}(abc)^4 + a^2 + b^2 + c^2 &\geq 2(ab + bc + ca) \\ 2 + (abc)^2 + a^2 + b^2 + c^2 &\geq 2(ab + bc + ca) \\ 1 + 2abc + a^2 + b^2 + c^2 &\geq 2(ab + bc + ca) \end{aligned}$$

288.▲ ❶ យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} - \frac{b+c}{a^2+bc} &= \frac{(a-b)(a-c)}{a(a^2+bc)} \\ \frac{1}{b} - \frac{c+a}{b^2+ca} &= \frac{(b-c)(b-a)}{b(b^2+ca)} \\ \frac{1}{c} - \frac{a+b}{c^2+ab} &= \frac{(c-a)(c-b)}{c(c^2+ab)} \end{aligned}$$

ដូច្នេះវិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\frac{(a-b)(a-c)}{a(a^2+bc)} + \frac{(b-c)(b-a)}{b(b^2+ca)} + \frac{(c-a)(c-b)}{c(c^2+ab)} \geq 0 \quad (*)$$

វិសមភាពខាងលើស៊ីមេទ្រីជៀបនឹង a, b, c ដូច្នេះ យើងអាចសន្មតថា $a \leq b \leq c$ ។ ដូច្នេះ

$$\frac{(c-a)(c-b)}{c(c^2+ab)} \geq 0$$

ដោយអង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $c = a$ រឺ $c = b$ ។

បន្ទាប់មកទៀត

$$\frac{(a-b)(a-c)}{a(a^2+bc)} + \frac{(b-c)(b-a)}{b(b^2+ca)} = \frac{(b-a)^2(a+b)}{ab(a^2+bc)(b^2+ca)} [a(c-b) + cb] \geq 0$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $a = b$ ។

ដូច្នេះវិសមភាព(*) ពិត ដោយ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $a = b = c$ ។

❷ តាមវិសមភាព Schur ចំពោះ $r = -1$ និង តាង $x = a + b, y = b + c$ និង $z = c + a$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{x}(x-y)(x-z) + \frac{1}{y}(y-z)(y-x) + \frac{1}{z}(z-x)(z-y) \\ &= \frac{(a-c)(b-c)}{a+b} + \frac{(b-a)(c-a)}{b+c} + \frac{(c-b)(a-b)}{c+a} \\ &= \frac{c^2+ab}{a+b} - c + \frac{a^2+bc}{b+c} - a + \frac{b^2+ca}{c+a} - b \\ &\Rightarrow \frac{c^2+ab}{a+b} + \frac{a^2+bc}{b+c} + \frac{b^2+ca}{c+a} \geq a+b+c \end{aligned}$$

អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ពេល $x = y = z$ រឺ $a = b = c$ ។

289.▲ ❶ យើងអាចសន្មតថា $a_1 \geq a_2; b_1 \geq b_2; a_1 \geq b_1$ ដោយមិនធ្វើអោយបាត់បង់លក្ខណៈទូទៅទេ។ បើ x រឺ y ស្មើសូន្យ នោះវិសមភាពពិត។ ដូច្នេះ សន្មតថា x និង y មិនសូន្យទាំងពីរ។ បន្ទាប់មកទៀត វិសមភាពស៊ីមេទ្រីជៀបនឹង x, y ដូច្នេះ សន្មតថា $x \geq y$ ។ ដោយ $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ នោះ

$$\begin{aligned} a_1 - a_2 &= (b_1 - a_2) + (b_2 - a_2) \\ \Rightarrow x^{a_1}y^{a_2} + x^{a_2}y^{a_1} - x^{b_1}y^{b_2} - x^{b_2}y^{b_1} \\ &= x^{a_2}y^{a_2}(x^{a_1-a_2} + y^{a_1-a_2} - x^{b_1-a_2}y^{b_2-a_2} - x^{b_2-a_2}y^{b_1-a_2}) \\ &= x^{a_2}y^{a_2}(x^{b_1-a_2} - y^{b_1-a_2})(x^{b_2-a_2} - y^{b_2-a_2}) \\ &= x^{a_2}y^{a_2}(x^{a_1-b_2} - y^{a_1-b_2})(x^{a_1-b_1} - y^{a_1-b_1}) \\ &= x^{a_2}y^{a_2}y^{a_1-a_2} \left[\left(\frac{x}{y}\right)^{a_1-b_2} - 1 \right] \left[\left(\frac{x}{y}\right)^{a_1-b_1} - 1 \right] \geq 0 \end{aligned}$$

ពិត។

② ក) ករណី $b_1 \geq a_2$

ដោយ $a_1 \geq a_1 + a_2 - b_1$ និង $a_1 \geq b_1$ នេះ $a_1 \geq \max(a_1 + a_2 - b_1, b_1) \Rightarrow \max(a_1, a_2) = a_1 \geq \max(a_1 + a_2 - b_1, b_1)$ ។ យើងមាន $a_1 + a_2 - b_1 \geq b_2 \geq b_3$ និង $a_1 + a_2 - b_1 \geq b_1 + a_3 - b_1 = a_3$ ។

$$\Rightarrow \max(a_1 + a_2 - b_1, a_3) \geq \max(b_2, b_3)$$

តាមសំនួរទី១ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \sum_{\text{sym}} x^{a_1} y^{a_2} z^{a_3} &= \sum_{\text{cyclic}} z^{a_3} (x^{a_1} y^{a_2} + x^{a_2} y^{a_1}) \\ &\geq \sum_{\text{cyclic}} z^{a_3} (x^{a_1+a_2-b_1} y^{b_1} + x^{b_1} y^{a_1+a_2-b_1}) \\ &= \sum_{\text{sym}} x^{b_1} y^{a_1+a_2-b_1} z^{a_3} \\ &= \sum_{\text{cyclic}} x^{b_1} (y^{a_1+a_2-b_1} z^{a_3} + y^{a_3} z^{a_1+a_2-b_1}) \\ &\geq \sum_{\text{cyclic}} x^{b_1} (y^{b_2} z^{b_3} + y^{b_3} z^{b_2}) \\ &= \sum_{\text{sym}} x^{b_1} y^{b_2} z^{b_3} \end{aligned}$$

១) ករណី $b_1 \leq a_2$

ដោយ $3b_1 \geq b_1 + b_2 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3 \geq b_1 + a_2 + a_3$ នេះ

$$\begin{aligned} b_1 &\geq a_2 + a_3 - b_1 \\ a_1 &\geq a_2 \geq b_1 \geq a_2 + a_3 - b_1 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} \max(a_2, a_3) &\geq \max(b_1, a_2 + a_3 - b_1) \\ \max(a_1, a_2 + a_3 - b_1) &\geq \max(b_2, b_3) \end{aligned}$$

តាមសំនួរទី១ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \sum_{\text{sym}} x^{a_1} y^{a_2} z^{a_3} &= \sum_{\text{cyclic}} x^{a_1} (y^{a_2} z^{a_3} + y^{a_3} z^{a_2}) \\ &\geq \sum_{\text{cyclic}} x^{a_1} (y^{b_1} z^{a_2+a_3-b_1} + y^{a_2+a_3-b_1} z^{b_1}) \\ &= \sum_{\text{cyclic}} y^{b_1} (x^{a_1} z^{a_2+a_3-b_1} + x^{a_2+a_3-b_1} z^{a_1}) \\ &\geq \sum_{\text{cyclic}} y^{b_1} (x^{b_2} z^{b_3} + x^{b_3} z^{b_2}) \end{aligned}$$

$$= \sum_{\text{sym}} x^{b_1} y^{b_2} z^{b_3}$$

សមភាពកើតមាន ទាល់តែ និង មានតែ $x = y = z$ ។

290.▲ វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\frac{1}{a+b+(abc)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{b+c+(abc)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{c+a+(abc)^{\frac{1}{3}}} \leq \frac{1}{(abc)^{\frac{1}{3}}}$$

តាង $a = x^3, b = y^3, c = z^3$ ដែល $x, y, z > 0$ ។ វិសមភាពទៅជា

$$\frac{1}{x^3 + y^3 + xyz} + \frac{1}{y^3 + z^3 + xyz} + \frac{1}{z^3 + x^3 + xyz} \leq \frac{1}{xyz}$$

$$\Leftrightarrow xyz \sum_{\text{cyclic}} (x^3 + y^3 + xyz)(y^3 + z^3 + xyz)$$

$$\leq (x^3 + y^3 + xyz)(y^3 + z^3 + xyz)(z^3 + x^3 + xyz)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{\text{sym}} x^6 y^3 \geq \sum_{\text{sym}} x^5 y^2 z^2$$

ពិតជាវិសមភាព Muirhead ព្រោះស្តីត (6,3,0) លប់លើស្តីត (5,2,2) ។

291.▲ យើងមាន

$$\sum_{\text{sym}} a^3 = 6(a^3 + b^3 + c^3 + d^3)$$

$$\sum_{\text{sym}} ab\sqrt{cd} = 4(ab\sqrt{cd} + ac\sqrt{bd} + ad\sqrt{bc} + bc\sqrt{da} + bd\sqrt{ca} + cd\sqrt{ab})$$

ដូច្នេះវិសមភាព សមមូលនឹង

$$\sum_{\text{sym}} a^3 \geq \sum_{\text{sym}} ab\sqrt{cd} \Leftrightarrow \sum_{\text{sym}} a^3 b^0 c^0 d^0 \geq \sum_{\text{sym}} a^1 b^1 c^{\frac{1}{2}} d^{\frac{1}{2}}$$

ពិត តាមវិសមភាព Muirhead ព្រោះ (3,0,0,0) លប់លើ $(1,1,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ ។

292.▲ វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$4 \sum_{\text{sym}} x^5 y + 2 \sum_{\text{cyclic}} x^4 y z + 6 x^2 y^2 z^2 - \sum_{\text{sym}} x^4 y^2 - 6 \sum_{\text{cyclic}} x^3 y^3 - 2 \sum_{\text{sym}} x^3 y^2 z \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^4 y^2 \right] + 3 \left[\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^3 y^3 \right] + 2xyz \left[3xyz + \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2 y \right] \geq 0$$

តាមវិសមភាព Muirhead

$$\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^4 y^2 \geq 0$$

$$\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^3 y^3 \geq 0$$

តាមវិសមភាព Schur ចំពោះ $r = 1$

$$\begin{aligned} & \sum_{\text{cyclic}} x(x-y)(x-z) \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_{\text{cyclic}} x(x^2 - xz - xy + yz) \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_{\text{cyclic}} (x^3 - x^2z - x^2y + xyz) \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{cyclic}} (x^2z + x^2y) + \sum_{\text{cyclic}} xyz \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_{\text{cyclic}} x^3 - \sum_{\text{sym}} x^2y + 3xyz \geq 0 \end{aligned}$$

ដូច្នេះវិសមភាពពិត ព្រោះអង្គខាងឆ្វេងជាផលបូកនៃតួមិនអវិជ្ជមាន។

293.▲ ដោយ $xy + yz + zx = 1$ យើងបំប្លែងវិសមភាពអោយទៅជាអ្វីមួយស្មើស

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq \frac{5}{2} \\ \Leftrightarrow & (xy + yz + zx) \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \right)^2 \geq \left(\frac{5}{2} \right)^2 \\ \Leftrightarrow & 4 \sum_{\text{sym}} x^5 y + \sum_{\text{sym}} x^4 yz + 14 \sum_{\text{sym}} x^3 y^2 z + 38x^2 y^2 z^2 \geq \sum_{\text{sym}} x^4 y^2 + 3 \sum_{\text{sym}} x^3 y^3 \\ \Leftrightarrow & \left[\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^4 y^2 \right] + 3 \left[\sum_{\text{sym}} x^5 y - \sum_{\text{sym}} x^3 y^3 \right] + xyz \left[\sum_{\text{sym}} x^3 + 14 \sum_{\text{sym}} x^2 y + 38xyz \right] \\ & \geq 0 \end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Muirhead វិសមភាពខាងលើពិត។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ $x = y, z = 0$ រឺ

$y = z, x = 0$ រឺ $z = x, y = 0$ ។ តែដោយ $xy + yz + zx = 1$ នោះ វាស្មើគ្នាពេល $(x, y, z) = \{(1,1,0); (1,0,1), (0,1,1)\}$ ។

294.▲ យើងមាន

$$(a^2 + ab + b^2)(b^2 + bc + c^2)(c^2 + ca + a^2) = \sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^3b^3 + \frac{1}{2}a^2b^2c^2 + \frac{1}{2}a^4bc + 2a^3b^2c + a^4b^2 \right]$$

ហើយ

$$(ab + bc + ca)^3 = \sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^3b^3 + a^2b^2c^2 + 3a^3b^2c \right]$$

ដូច្នេះ

$$(a^2 + ab + b^2)(b^2 + bc + c^2)(c^2 + ca + a^2) - (ab + bc + ca)^3 = \sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^4bc + a^4b^2 - \frac{1}{2}a^2b^2c^2 - a^3b^2c \right]$$

តែថា ស្វ៊ីត (4,2,0) និង (4,1,1) លប់ស្វ៊ីត (2,2,2) និង (3,2,1) ។ ដូច្នេះតាមវិសមភាព Muirhead

$$\sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^4bc + a^4b^2 - \frac{1}{2}a^2b^2c^2 - a^3b^2c \right] \geq 0$$

295.▲ យើងមាន

$$(xy + yz + zx)[(x + y)^2(y + z)^2 + (y + z)^2(z + x)^2 + (z + x)^2(x + y)^2] = \sum_{\text{sym}} \left(x^5y + 2x^4y^2 + \frac{5}{2}x^4yz + \frac{3}{2}x^3y^3 + 13x^3y^2z + 4x^2y^2z^2 \right)$$

និង

$$(x + y)^2(y + z)^2(z + x)^2 = \sum_{\text{sym}} \left(x^4y^2 + x^4yz + x^3y^3 + 6x^3y^2z + \frac{5}{3}x^2y^2z^2 \right)$$

វិសមភាពដែលអោយសមមូលនឹង

$$\sum_{\text{sym}} (4x^5y + x^4yz + x^2y^2z^2 - x^4y^2 - 3x^3y^3 - 2x^3y^2z) \geq 0 \quad (*)$$

តែស្វ៊ីត (5,1,0) លប់លើស្វ៊ីត (4,2,0) និង ស្វ៊ីត (3,3,0) ដូច្នេះតាមវិសមភាព Muirhead

$$\sum_{\text{sym}} (4x^5y - x^4y^2 - 3x^3y^3) \geq 0 \quad (**)$$

ម្យ៉ាងវិញទៀត តាមវិសមភាព Schur ចំពោះ $r = 1$ យើងមាន

$$\sum_{\text{sym}} \left(\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}xyz - x^2y \right) \geq 0$$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង $2xyz$ វិសមភាពនេះទៅជា

$$\sum_{\text{sym}} (x^4yz + x^2y^2z^2 - 2x^3y^2z) \geq 0 \quad (***)$$

ប្លក(**) និង (***) យើងទាញបាន (*) ពិត។ សមភាពកើតមានពេល $x = y = z$ ។

296.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} & (b+c-a)^2[(c+a)^2+b^2][(a+b)^2+c^2] + (c+a-b)^2[(b+c)^2+a^2][(a+b)^2+c^2] \\ & + (a+b-c)^2[(b+c)^2+a^2][(c+a)^2+b^2] \\ & = \sum_{\text{sym}} \left[\frac{3}{2}a^6 + 2a^5b + a^4b^2 + 3a^4bc + 2a^3b^3 + 3a^2b^2c^2 \right] \\ & [(b+c)^2+a^2][(c+a)^2+b^2][(a+b)^2+c^2] \\ & = \sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^6 + 2a^5b + 3a^4b^2 + 3a^4bc + 2a^3b^3 + 8a^3b^2c + \frac{7}{3}a^2b^2c^2 \right] \end{aligned}$$

វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\sum_{\text{sym}} (3a^6 + 2a^5b - 2a^4b^2 + 3a^4bc + 2a^3b^3 - 12a^3b^2c + 4a^2b^2c^2) \geq 0 \quad (1)$$

តែតាមវិសមភាព Schur

$$\sum_{\text{sym}} \left[\frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}abc - a^2b \right] \geq 0 \quad (2)$$

ដោយគុណអង្គនិមួយៗនៃ (2) នឹង $4abc$ យើងទាញបាន

$$\sum_{\text{sym}} (4a^4bc - 8a^3b^2a + 4a^2b^2c^2) \geq 0 \quad (3)$$

ដូច្នេះយើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\sum_{\text{sym}} (3a^6 + 2a^5b - 2a^4b^2 - a^4b^2 + 2a^3b^3 - 4a^3b^2c) \geq 0 \quad (4)$$

តែស្ទីត (6,0,0) លប់លើស្ទីត (4,1,1) និង ស្ទីត (3,2,1) ដូច្នេះ

$$\sum_{\text{sym}} (3a^6 - a^4bc - 2a^3b^2c) \geq 0 \quad (5)$$

បន្ទាប់មកទៀតស្ទីត (5,1,0) លប់លើស្ទីត (4,2,0) ដូច្នេះ

$$\sum_{\text{sym}} (2a^5b - 2a^4b^2) \geq 0 \quad (6)$$

ហើយជាចុងក្រោយ ស្ទីត (3,3,0) លប់លើស្ទីត (3,2,1) ដូច្នេះ

$$\sum_{\text{sym}} (2a^3b^3 - 2a^3b^2c) \geq 0 \quad (7)$$

ដោយប្លក (5), (6) និង (7) យើងទាញបាន (4)។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា ទាល់តែ $a = b = c$ ។

VI. វិសមីការ

297. $(-3; 2) \cup (4; \infty)$. 298. $(-\infty; -2] \cup \{-1\}$. 299. $(\frac{1}{2}; \infty)$. 300. $(-\infty; -1] \cup [2; \infty)$.
 301. $(-5; -1)$. 302. $(-\infty; -\sqrt{3}) \cup (-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}) \cup (\sqrt{3}; \infty)$. 303. $(2 - 4/\sqrt{3}; 1) \cup$
 $(3; 2 + 4/\sqrt{3})$. 304. $(-\infty; \infty)$. 305. $(-\frac{3+\sqrt{33}}{2}; \frac{-3+\sqrt{33}}{2})$.
 306. $(-1 + \sqrt{3} - \sqrt{3 + 2\sqrt{3}}; 1 + \sqrt{3} + \sqrt{3 + 2\sqrt{3}})$. ▲ វិសមីការនេះសមមូលនឹង
 $p(x) = x^4 - 4x^3 - 6x^2 - 4x + 1 < 0$ ។ យើងកំនត់ x ដែល $p(x) = 0$ ។ ដោយ $x = 0$ មិន
 មែនជាឥសនៃពហុធានេះ ដូច្នេះយើងចែក $p(x) = 0$ នឹង x យើងទាញបាន $x^2 + 1/x^2 -$
 $4(x + 1/x) - 6 = 0$ ។ តាង $y = x + 1/x$ យើងទាញបាន $y^2 - 4y - 8 = 0$ ។ ដូច្នេះ
 $y_1 = 2(1 + \sqrt{3})$ និង $y_2 = 2(1 - \sqrt{3})$ ។ ដូច្នេះពហុធាន $p(x)$ អាចសរសេរជា $p(x) =$
 $(x^2 - 2(1 + \sqrt{3})x + 1)(x^2 - 2(1 - \sqrt{3})x + 1)$ ។ ដោយ $x^2 - 2(1 - \sqrt{3})x + 1 > 0$ ចំពោះ
 គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ដូច្នេះវិសមីការសមមូលនឹង $x^2 - 2(1 + \sqrt{3})x + 1 < 0$ ។
 . 307. $(-1 - \sqrt{3}; \frac{3-\sqrt{17}}{2}) \cup (\sqrt{3} - 1; \frac{3+\sqrt{17}}{2})$. ● តាង $y = x - 2/x$. 308. $(-2; 0) \cup$
 $(2; \infty)$. 309. $(-1; 2)$. 310. $(-\infty; -1) \cup (0; 1/2] \cup (1; 2)$. 311. $(-1; 5/8) \cup (2; 7/3) \cup$
 $(3; \infty)$. 312. $(-2; -1) \cup [0; 1] \cup [2; \infty)$. 313. $(-7; -\sqrt{37}) \cup (-5; 0) \cup (5; \sqrt{37}) \cup$
 $(7; \infty)$.
 314. $(-1; 0)$. 315. $(-\infty; -2) \cup (-1; 1) \cup (2; 3) \cup (4; 6) \cup (7; \infty)$. 316. $(-\infty; 1) \cup$
 $(3/2; 5/2) \cup (7/2; 4)$. 317. $(-1/2; 1)$. 318. $[-2; 1]$. 319. $(0; 1/3) \cup (0; \infty)$.
 320. $[-\frac{1+\sqrt{5}}{2}; -1] \cup [-\frac{1-\sqrt{5}}{2}; 0) \cup [-\frac{1+\sqrt{5}}{2}; 1] \cup [\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \infty)$. 321. $(-\infty; -6) \cup$
 $(\frac{6-6\sqrt{26}}{5}; -4) \cup (-4; 0) \cup (6; \frac{6+6\sqrt{26}}{5})$. 322. $[0; \sqrt{2}]$. 323. $[-1 - 2\sqrt{2}; -3) \cup (1; 3]$.
 324. $\{-1\} \cup [2; \infty)$. 325. $[0; 5; 2]$. 326. $[-\sqrt{3}; 0) \cup (0; 2]$. 327. $[-0,5; \infty)$ ចំពោះ
 $a \in [1; \infty)$; $[-0,5; -0,5(1 - \frac{1}{(1-a)^2})]$ ចំពោះ $a \in (-\infty; 1)$. 328. $[1; 3]$. 329. $[-2; \infty)$
 ចំពោះ $a \in [-2; \infty)$; $\emptyset$ ចំពោះ $a \in (-\infty; -2)$. 330. $(-\frac{5}{8}; 2,4]$. 331. $(\frac{\sqrt{5}-1}{2}; 1]$.
 332. $(3; 4,8]$. 333. $(1; 2/\sqrt{3}]$. 334. $(\frac{\sqrt{13}-5}{2}; 1]$. 335. $[3; 12)$. 336. $[-2; \infty)$.

337. $(\frac{5-\sqrt{13}}{6}; \infty)$. 338. $(\frac{8}{3}; \infty)$. 339. $[2; \frac{2}{3}\sqrt{21})$. 340. $[3/2; 2) \cup (2; 26)$. 341. $(-2; 1) \cup (1; \infty)$. 342. $[0; 1/2)$. 343. $(\frac{1}{2}; \infty)$.

344. $[-4; 0) \cup (4; 6)$. ▲ លក្ខខណ្ឌរបស់វិសមីការ $24 + 2x - x^2 \geq 0$ និង $x \neq 0$ នាំអោយយើងទាញបានចន្លោះពីរ $[-4; 0)$ និង $(0; 6]$ ។ យើងឃើញថា $x \in [-4; 0)$ ជាចំណុចរបស់វិសមីការ ព្រោះអង្គខាងឆ្វេងអវិជ្ជមាន ដែលតូចជាង១ជានិច្ច។ ចំពោះចន្លោះទីពីរ យើងទាញបាន $\sqrt{24 + 2x - x^2} < x$ ។

345. $[-1; -\frac{3}{4}]$. ▲ តាង $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{x+3}$ ។ យើងទាញបាន $y^2 - 3y + 2 < 0$ ។ ដូច្នេះ $1 < y < 2$ សមមូលនឹង

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{x+3} > 1 \\ \sqrt{x+1} + \sqrt{x+3} < 2 \\ x \geq -1 \end{cases}$$

យើងពិនិត្យវិសមីការទីមួយ។ វាសមមូលនឹង $2\sqrt{x^2 + 4x + 3} > -3 - 2x$ ។ អង្គខាងស្តាំអវិជ្ជមានបើ $x \geq -1$ ។ ដូច្នេះ $x \in [-1; \infty)$ ជាចំណុចរបស់វិសមីការ។ លើកអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការទីពីរជាការេ សំរួលរួចហើយ យើងទាញបាន $\sqrt{x^2 + 4x + 3} < -x$ ។ វិសមីការនេះមានចំណុចទាល់តែ $-1 \leq x \leq 0$ (ដោយគិតលក្ខខណ្ឌវិសមីការទីមួយចូល)។ លើអង្គទាំងពីរជាការេ យើងទាញបាន $4x + 3 < 0$ ។

346. ▲ យើងមាន

$$P(x) = (x-1)x(x^4(x^2+x+1)+1)+1 \quad (1)$$

រឺ
$$P(x) = (1-x) + x^2(1-x^3) + x^8 \quad (2)$$

តាម(១) យើងមាន $P(x) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (-\infty; 0] \cup [1; \infty)$ ហើយតាម(២) យើងមាន $P(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (0; 1)$ ។ ដូច្នេះ $P(x) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

347. ▲ អនុគមន៍ $f(x) = P(x)/Q(x)$ កំនត់ចំពោះគ្រប់ x លើកលែងតែចំណុច $x_k, k \in \mathbb{N}, k \leq n$ ដែលជាចំណុចស្វ័យរបស់ពហុធា $Q(x)$ ។ សន្មតថា x_0 ជាចំណុចមួយរបស់វិសមីការ $f(x) > 0$ ។ ដូច្នេះ $P(x_0)$ និង $Q(x_0)$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ដូច្នេះ $\phi(x_0) = P(x_0)Q(x_0) > 0$ មានន័យថា x_0 ក៏ជាវិសមីការ $\phi(x) = P(x)Q(x) > 0$ ។ ចំពោះ $x = x_k$ យើងមាន $\phi(x_k) = 0$ ។ ដូច្នេះ x_k មិនមែនជាវិសមីការនៃ $\phi(x)$ ទេ។ ដូច្នេះវិសមីការអស់របស់ $f(x) > 0$ ក៏ជាវិសមីការរបស់ $\phi(x) > 0$ ដែរ ។ យើងស្រាយបញ្ជាក់ដូចគ្នាថា វិសមីការរបស់ $\phi(x) > 0$ ក៏ជាវិសមីការរបស់ $f(x) > 0$ ដែរ។ បើ $P(x)$ និង $Q(x)$ មានតំលៃ

មានសញ្ញាផ្សេងគ្នា ចំពោះតំលៃ x ស្ថិតក្នុងដែនកំណត់របស់ $f(x)$ នោះវិសមភាព $f(x) > 0$ និង $\phi(x) > 0$ គ្មានរឹស។ ដូច្នេះវិសមីការទាំងពីរសមមូលគ្នា។

348. $a < 0$.

349. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{45}{8}\right) \setminus \{0\}$ ▲ អង្គខាងឆ្វេងកំណត់បើ $x \geq -\frac{1}{2}$ និង $x \neq 0$ ។ យើងមាន $\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} = (1+\sqrt{1+2x})^2$ ដោយអនុគមន៍ $f(x) = (1+\sqrt{1+2x})^2 - 2x - 9 = 2\sqrt{1+2x} - 7$ កើន ហើយដោយ $f(45/8) = 0$ នោះ វិសមីការមានរឹស $-\frac{1}{2} \leq x < 45/8$ និង $x \neq 0$ ។

350. $\left[-1; 1 - \frac{\sqrt{31}}{8}\right)$.▲ យើងមាន $f(x) = \sqrt{3-x} - \sqrt{x+1}$ មានន័យចំពោះ $-1 \leq x \leq 3$ ហើយជាអនុគមន៍ថយ ហើយជាប់នៅលើចន្លោះនេះ។ យើងមាន $f(-1) = 2 > \frac{1}{2}$ និង $f\left(1 - \frac{\sqrt{31}}{8}\right) = \frac{1}{2}$ ។ ដូច្នេះវិសមីការផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $-1 \leq x < 1 - \frac{\sqrt{31}}{8}$ ។

351. ▲ លក្ខខណ្ឌ

$$\begin{cases} 2x+4 \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$$

ដោយអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការវិជ្ជមាន នោះលើកអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការជាការេ យើងទាញបាន

$$9x^2 + 16 \geq 4(2x+4) + 16(2-x) + 16\sqrt{(2x+4)(2-x)}$$

$$9x^2 + 16 \geq -8x + 48 + 16\sqrt{-2x^2 + 8}$$

$$9x^2 + 8x - 32 - 8\sqrt{-8x^2 + 32} \geq 0 \quad (1)$$

តាង $t = \sqrt{-8x^2 + 32} \geq 0; t^2 = -8x^2 + 32$ ។ វិសមីការសមមូលនឹង

$$-t^2 - 8t + x^2 + 8x \geq 0 \quad (2)$$

យើងមាន $g(t) = -t^2 - 8t + x^2 + 8x$ មាន $\Delta = 16 + (x^2 + 8x) = (x+4)^2$ ។ ដូច្នេះ $g(t)$ មានរឹស


$$t_1 = x; t_2 = -x - 8$$

វិសមីការ(២) សមមូលនឹង $\min(t_1; t_2) \leq t \leq \max(t_1; t_2)$ ។ យើងមាន $t_1 - t_2 = 2x + 8$ ដោយ $-2 \leq x \leq 2$ នោះ $2x + 8 > 0$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} -x-8 \leq t \leq x &\Leftrightarrow t \leq x \\ \sqrt{-8x^2+32} \leq x &\Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 \geq \frac{32}{9} \end{cases} \\ &\Rightarrow \frac{4\sqrt{2}}{3} \leq x \leq 2 \end{aligned}$$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

352. $(0; 2)$ ▲ ចំណុចនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃរួមគ្នា។ យើងសង់បន្ទាត់ $2x + 3y = 0$ ។ យើងចង់បានតំលៃធំបំផុតនៃ $z = 2x + 3y$ ។ ចំពោះតំលៃផ្សេងគ្នានៃ z យើងគូសបានបន្ទាត់ស្របនឹងបន្ទាត់ $2x + 3y = 0$ ។ នៅពេលដែល z កាន់តែធំទៅៗ បន្ទាត់ត្រូវនឹងតំលៃ z ទាំងនោះឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយពីគល់តំរុយ។ ដូច្នេះ z ធំបំផុតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធជាតំលៃ z នៅពេលដែលបន្ទាត់ $z = 2x + 3y$ កាត់តាម A។



353. $\{(3; 1)\}$. 354. $a = -1$. ចំនុចចង់បានគឺ $(0; -1)$ ។ 355. $\{(3; \frac{7}{2}); (-3; -\frac{7}{2})\}$. 356. $\{1\}$.

357. ▲ សមីការទី៣ នាំអោយ $4 \leq x \leq 7$ ។ តាង $u = y + z; v = yz$ ។ សមីការ(១)និង(២) ទៅជា

$$\begin{cases} x^3 + x^2(13 - u) + x(2u - 2v - 26) + 5v - 7u + 30 = 0 \\ x^3 + x^2(17 - u) - x(2u + 2v - 26) - 3v + u - 2 = 0 \\ u(-x^2 + 2x - 7) + v(-2x + 5) + x^3 + 13x^2 - 26x + 30 = 0 \quad (4) \\ u(-x^2 - 2x + 1) + v(-2x - 3) + x^3 + 17x^2 + 26x - 2 = 0 \quad (5) \end{cases}$$

យកសមីការទី(៤)ដកទី(៥) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} u(4x - 8) + 8v - 4x^2 - 52x + 32 &= 0 \\ \Rightarrow v &= \frac{1}{2}[u(2 - x) + x^2 + 13x - 8] \end{aligned}$$

ជំនួសចូលសមីការទី(៤) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} 2u(-x^2 + 2x - 7) + (-2x + 5)(u(2 - x) + x^2 + 13x - 8) + 2x^3 + 26x^2 - 52x + 60 &= 0 \\ \Rightarrow u(-5x - 4) + 29x + 5x^2 + 20 &= 0 \\ \Rightarrow u(5x + 4) &= (5x + 4)(x + 5) \end{aligned}$$

ដោយ $4 \leq x \leq 7$ នោះ $5x + 4 \neq 0$ ដូច្នេះ $u = x + 5$ ។ យើងទាញបាន $v = 5x + 1$ ។ ដូច្នេះ

$$y + z = x + 5; yz = 5x + 1$$

ដូច្នេះ y, z ជាឆ្នើសនៃសមីការ $t^2 - (x + 5)t + 5x + 1 = 0$ ។ សមីការនេះមានឆ្នើសបើ ឆ្នើសគ្រឹសមីណង់

$$\Delta = (x - 3)(x - 7) \geq 0 \\ \Rightarrow x \leq 3 \quad \text{ឬ} \quad x \geq 7$$

តែ $4 \leq x \leq 7$ ដូច្នេះ $x = 7$ ។ យើងទាញបាន $y = z = 6$ ។

358. ▲ គុណវិសមីការទីមួយនឹង (-2) រួចបូកចូលវិសមីការទីពីរ យើងទាញបាន

$$(x + 3y)^2 \leq -\frac{4}{a+1} \quad (1)$$

ពី(១) យើងទាញបាន $-\frac{4}{a+1} > 0 \Rightarrow a < -1$ ។

យើងមាន $\frac{1-a}{a+1} + 1 = \frac{2}{a+1} < 0 \Rightarrow \frac{1-a}{a+1} < -1$ ។ ពិនិត្យប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 7y^2 = -1 & (4) \\ 3x^2 + 10xy - 5y^2 = -2 & (5) \end{cases}$$

ដោយ $\frac{1-a}{a+1} < -1$ នោះ បើ (4)និង(៥) មានឆ្នើស នោះប្រព័ន្ធវិសមីការក៏មានឆ្នើសដែរ។ គុណវិសមីការទី៤ នឹង (-2) បូកចូលសមីការទី៥ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 7y^2 = -1 & (4) \\ (x + 3y)^2 = 0 & (5) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3y \\ y^2 = \frac{1}{y} \end{cases}$$

ប្រព័ន្ធនេះមានឆ្នើស។ ដូច្នេះ $a < -1$ ជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអោយប្រព័ន្ធមានឆ្នើស។

២. អនុគមន៍

អ៊ីចស្ប៉ូណង់ស្យែល- លោការីត

I. គណនា

$$359. 9. \quad 360. \ln 3. \quad 361. \ln|a|. \quad 362. 4 \log_a |b|.$$

$$363. 3. \quad 364. 2. \quad 365. 1 \quad 366. 2.$$

$$367. 0 \blacktriangle a^{\sqrt{\log_a b}} = \left(a^{\sqrt{\log_a b}}\right)^{1/\sqrt{\log_a b}} = b^{\sqrt{\log_b a}}, \text{ ដូច្នេះផលសងស្មើគ្នា។}$$

$$368. 3(1 - c - d); \quad 369. \frac{5-d}{2(c-2d+cd+1)};$$

$$370. 5c - 6d - 4. \blacktriangle \text{ យើងមាន } 0,175 = \frac{175}{1000} = \frac{7}{40} = 7/(2^2 \cdot 10). \text{ ។ ដូច្នេះ } \log 0,175 = \log 7 - 2 \log 2 - 1 \text{ ។ យើងមាន } \log 196 = \log 2^2 \cdot 7^2 = 2 \log 2 + 2 \log 7 = c; \text{ និង } \log 56 = \log 2^3 \cdot 7 = 3 \log 2 + \log 7 = d \text{ ។ យើងទាញបាន } \log 2 = \frac{2d-c}{4}; \log 7 = \frac{3c-2d}{4} \text{ ។ ដូច្នេះ } \log(0,175)^4 = 4(\log 7 - 2 \log 2 - 1) = 5c - 6d - 4.$$

$$371. 3 \blacktriangle \text{ តាង } \log_2 12 = a \text{ យើងមាន } 1/\log_6 2 = \log_2 2^3 \cdot 12 = a + 3; \log_2 24 = 1 + a; \log_2 196 = a + 4 \text{ និង } \frac{1}{\log_{12} 2} = a \text{ ។ កន្សោមដែលអោយសមមូលនឹង } (a+1)(a+3) - a(a+4) = 3 \text{ ។}$$

II. សមភាព

372. 1. ▲ យើងមាន

$$\log_{12} 18 = \frac{\log_2 18}{\log_2 12} = \frac{1 + 2 \log_2 3}{2 + \log_2 3}$$

$$\log_{24} 54 = \frac{\log_2 54}{\log_2 24} = \frac{1 + 3 \log_2 3}{3 + \log_2 3}$$

តាង $\log_2 3 = x$ យើងទាញបាន

$$ab + 5(a - b) = \frac{1 + 2x}{2 + x} \cdot \frac{1 + 3x}{3 + x} + 5 \left(\frac{1 + 2x}{2 + x} - \frac{1 + 3x}{3 + x} \right) = \frac{6x^2 + 5x + 1 + 5(-x^2 + 1)}{(x + 2)(x + 3)}$$

$$= \frac{x^2 + 5x + 6}{(x + 2)(x + 3)} = 1$$

III. សមីការ

373. $\{\log_{3/2} 2; 2 \log_{3/2} 2\}$. 374. $\{1 - \sqrt{3}; 0; 2; 1 + \sqrt{3}\}$. 375. $\{1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$.

376. $\{\log_{1/\sqrt{5\sqrt{2}-7}} 6; 0\}$

377. ▲ $\{-2; 3\}$. តាង $3^{x^2} = u, 3^{x+6} = v$ ។ សមីការដែលអោយមានរាង $u^2 - 2uv + v^2 = 0$ រឺ $(u - v)^2 = 0$ ។ ដូច្នេះ $3^{x^2} = 3^{x+6}$ ។ ...។

378. ▲ $\{-2; 3\}$. តាង $2^{\sqrt{2x+1}} = y, 2^x = z$ យើងទទួលបាន $x^2 y + z = 2y + x^2 z/4$ រឺ $\left(\frac{x^2}{4} - 1\right)(2y - z) = 0$ ។ យើងទាញបាន $x_1 = 2$ រឺ $2y = z$ នាំអោយ $x_4 = 4$ ។

379. $\{11\}$. ▲ យើងបំប្លែងអង្គខាងស្តាំនៃសមីការ $4^{\log_{64}(x-3) + \log_2 5} = 4^{\log_4 3(x-3)} (2^{\log_2 5})^2 = 5^2 (4^{\log_4(x-3)})^{1/3} = 25(x-3)^{1/3}$ ។ យើងមាន $25(x-3)^{1/3} = 50, x-3 = 2^3, x = 11$ ។

380. $\{4\}$. 381. $\{-3; -1\}$. 382. $\{27\}$; 383. $\{-1\}$ ▲ យើងបង្រួមសមីការទៅជារាង

$\log_2(3-x)(1-x) = \log_2 2^3$ នាំអោយ $x^2 - 4x - 5 = 0$ នាំអោយ $x = -1$ ។

384. $\{4\}$; 385. $\{8\}$; 386. $\{2\}$; 387. $\{3\}$; 388. $\{3; 3 + \sqrt{2}\}$; 389. $\{-11; -6 - \sqrt{7}; -6 + 7; -1\}$;

390. $\{3\}$; 391. $\{-17\}$; 392. $\{1\}$; 393. $\{2\}$; 394. $\{\sqrt{2}; \sqrt{6}\}$.

395. $\{-2^{1/\log_a 4a^4}; 2^{1/\log_a 4a^4}\}$ ចំពោះ $a \in (0; 1/\sqrt{2}) \cup (1/\sqrt{2}; 1) \cup (1; \infty)$ ក្រៅពីនេះសមីការគ្មានរឺស។

396. $\left\{\frac{3a+3}{7-a}\right\}$ ចំពោះ $a \in (3; 7)$ ក្រៅពីនេះសមីការគ្មានរឹស។

397. $\left\{\frac{2a-1}{6}\right\}$ ចំពោះ $a \in (-\infty; -12) \cup (1/2; \infty)$ ក្រៅពីនេះសមីការគ្មានរឹស។

398. $\{1; 60\}$. ចំពោះ $x = 1$ អង្គទាំងពីរនៃសមីការស្មើស្ម័គ្រ ដូច្នេះ $x = 1$ ជារឹសមួយនៃសមីការនេះ។
 ឥលូវនេះយើងរករឹសផ្សេងទៀតដែលផ្សេងពីមួយៗ គុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\frac{1}{\log_3 x \log_4 x \log_5 x}$
 យើងទាញបាន

$$1 = \frac{1}{\log_5 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} = \log_x 3 + \log_x 4 + \log_x 5$$

$$\Rightarrow \log_x 3.4.5 = 1; \Rightarrow x = 60$$

399. $\{1; \sqrt{3}/8\}$. 400. $\left\{\frac{1}{10}; \sqrt{10}\right\}$. 401. $\left\{\frac{1}{2}; 4\right\}$. 402. $\{3; 3^9\}$. 403. $\{1/625; 5\}$. 404. $\{\sqrt[5]{5}; 5\}$.

405. $\{10\}$.

406. $\{-1/4\}$. 407. $\left\{0; \frac{7}{4}; \frac{3+\sqrt{24}}{2}\right\}$. 408. $\{2\}$. 409. $\left\{\frac{1}{\sqrt[3]{4}}; 8\right\}$. 410. $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}; 1; 4\right\}$. 411. $\left\{\frac{1}{8}; 1; 4\right\}$. 412. $\left\{\frac{1}{9}; 1; 3\right\}$.

413. $\{5\}$. 414. $\{a-1; a+1\}$ ចំពោះ $a \in (1; \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; 2) \cup (2; \infty)$; $\{3\}$ ចំពោះ $a = 2$ ។

415. $\{a^2\}$ ចំពោះ $a \in (0; 1/\sqrt{2}) \cup (1/\sqrt{2}; 1) \cup (1; \infty)$ ។

416. $\{25\}$ 417. $\{1/9\}$ 418. $\left\{\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}\right\}$ 419. $\{2\}$ 420. $\{3\}$

421. $\{1/3\}$ 422. $\{3; 10\}$ 423. $\{2; 4\}$ 424. $\left\{\log_2 \frac{3}{5}; \log_2 \frac{2}{5}\right\}$

425. $\{2\}$ 426. $\{2\}$ 427. $\{0\}$ 428. $\{-1; 2\}$

429. $\{2\}$ 430. $\{-\log_2 3\}$ 431. $\left\{-\frac{9}{10}; 99\right\}$ 432. $\left\{-\frac{1}{10^5}; 10^3\right\}$

433. $\{1000\}$ 434. $\{0\}$ 435. $\left\{\frac{1}{10}; 2; 1000\right\}$ 436. $\{0, 2; 6\}$

437. $\{2\}$. ● តាង $2^{\log_{x^2}(3x-2)} = u, 3^{\log_{x^2}(3x-2)} = v$ រួចហើយដោះស្រាយសមីការ
 $3u^2 - 5uv + 2v^2 = 0$ ជាអនុគមន៍នៃ u រឺ v ។

438. $\left[\frac{1}{5}; \infty\right)$

439. $\{1/16\} \cup [4; \infty)$. ▲ តាង $\sqrt{x} - |\sqrt{x} - 2| = y$ សមីការដែលអោយទៅជា $\log_2 \sqrt{y+6} = \log_2 \sqrt{2}|y|$ រឺ $2y^2 - y - 6 = 0$ ដែលមានរឹស $y_1 = 2$ និង $y_2 = -3/2$ ។ ដូច្នេះ $\sqrt{x} - |\sqrt{x} - 2| = y_1 = 2 \Rightarrow \sqrt{x} - 2 = |\sqrt{x} - 2| \Rightarrow x \geq 4$ ។ ជំនួស $\sqrt{x} - |\sqrt{x} - 2| = y_2 = -\frac{3}{2} \Rightarrow 2\sqrt{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1/16$ ។

440. $\{2\}$. ▲ ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង 13^x យើងទាញបាន

$$\left(\frac{5}{13}\right)^x + \left(\frac{12}{13}\right)^x = 1$$

យើងមាន $\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1$ ។ អនុគមន៍ $y_1 = \left(\frac{5}{13}\right)^x$ និង $y_2 = \left(\frac{12}{13}\right)^x$ ជាអនុគមន៍ចុះ។ ដូច្នេះ

- បើ $x < 2$ នោះ $\left(\frac{5}{13}\right)^x < \left(\frac{5}{13}\right)^2$; $\left(\frac{12}{13}\right)^x < \left(\frac{12}{13}\right)^2$
 $\Rightarrow \left(\frac{5}{13}\right)^x + \left(\frac{12}{13}\right)^x < \left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1$
- បើ $x > 2$ នោះ $\left(\frac{5}{13}\right)^x + \left(\frac{12}{13}\right)^x > \left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1$

ដូច្នេះសមីការមានរឹសតែមួយគត់គឺ $x = 2$ ។

441. {3} 442. {0} 443. {3} 444. {15} ហើយ
 $a = 3$ ។

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

445. $\{(|a|^{66/5}; |a|^{72/5})\}$ ចំពោះ $a \neq \{-1; 0; 1\}$ ។ 446. $\{(1/2; 1/2)\}$ 447. $\{(9/2; 1/2)\}$
 448. $\{(8; 1)\}$ 449. $\{(3/2; 1/2)\}$ 450. $\{(\sqrt[4]{3}; -1); (\sqrt[4]{3}; 1)\}$ 451.
 $\{(4; -1/2)\}$
 452. $\{(0,1; 2); (100; -1)\}$ 453. $\{(2; 10); (10; 2)\}$
 454. $\{(2; 1/6)\}$ 455. $\{(9a/2; a/2); (a/2; 9a/2)\}$ ចំពោះ $a \in (0; 1) \cup (1; \infty)$ ។
 456. $\{(2; 4); (4; 2)\}$
 457. $\{(a^2; a); (a; a^2)\}$ ចំពោះ $a \in (0; 1) \cup (1; \infty)$;
 $\{((a+1)^2; -(a+1)); (-(a+1); (a+1)^2)\}$ ចំពោះ $a \in (-\infty; -2) \cup (-2; -1)$ ។
 458. $\{(3; 9); (9; 3)\}$ 459. $\{(3; 2)\}$ 460. $\{(-2; -2); (2; 2)\}$ 461. $\{(12; 4)\}$
 462. $\{(5; 1/2)\}$ 463. $\{(64; 1/4)\}$ 464. $\{(-2; 4)\}$

V. វិសមភាព

- 465.▲ យើងមាន $2^{300} = 8^{100} < 3^{200} = 9^{100}$ ។
 466.▲ យើងមាន $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} > \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$ ។ ចំពោះ $n > 1$ យើងមាន
 $\log_n \frac{n+1}{n} > \log_{n+1} \frac{n+1}{n} > \log_{n+1} \frac{n+2}{n+1}$
 $\Rightarrow \log_n(n+1) - \log_n n > \log_{n+1}(n+2) - \log_{n+1}(n+1)$
 យើងទាញបាន $\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+1)$ ។
 467.▲ ដោយ $27 > 25$ នោះ $\log_8 27 = \log_4 9 > \log_9 25$ ។

468.▲ តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី យើងអាចសន្មតថា ស្វ៊ីត (x_i) ជាស្វ៊ីតកើន។ ដូច្នេះ ស្វ៊ីត $(\ln x_i)$ ក៏ជាស្វ៊ីតកើនដែរ។ តាមវិសមភាព Chebyshev យើងទាញបាន

$$\sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geq \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n x_i \right] \left[\sum_{i=1}^n \ln x_i \right] \Rightarrow \ln \left[\prod_{i=1}^n x_i^{x_i} \right] \geq \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n x_i \right] \ln \left[\prod_{i=1}^n x_i \right]$$

$$\Leftrightarrow \prod_{i=1}^n x_i^{x_i} \geq \left[\prod_{i=1}^n x_i \right]^{\frac{1}{n} [\sum_{i=1}^n x_i]}$$

469.▲ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$(x^2 + 2yz) \ln x + (y^2 + 2zx) \ln y + (z^2 + 2xy) \ln z \geq (xy + yz + zx)(\ln x + \ln y + \ln z)$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x - z) \ln x + (y - z)(y - x) \ln y + (z - x)(z - y) \ln z \geq 0$$

យើងមាន $\ln x, \ln y, \ln z > 0$ ព្រោះ $x, y, z > 1$ ។

វិសមភាពខាងលើមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី (ជំនួស x ដោយ y រឺ ដោយ z គ្មានអ្វីប្រែប្រួល)។ ដូច្នេះ យើងអាចសន្មតថា $x \geq y \geq z$ ។ ដូច្នេះ $(z - x)(z - y) \ln z \geq 0$ ។ បន្ទាប់មកទៀត អនុគមន៍ $\ln$ ជាអនុគមន៍កើន លើ $\mathbb{R}^{+*}$ យើងទាញបាន

$$(x - y)(x - z) \ln x \geq (y - z)(x - y) \ln y$$

ព្រោះ កត្តានិមួយៗ សុទ្ធតែ វិជ្ជមានរឺសូន្យ ហើយកត្តានិមួយៗនៅអង្គខាងស្តាំ ធំជាងកត្តានិមួយៗនៅអង្គខាងស្តាំ។

VI. វិសមីការ

470. $(-\infty; -2,5) \cup (0; \infty)$

471. $(-1 - \sqrt{2}; -2) \cup (0; \sqrt{2} - 1)$

472. $(-\infty; 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}; \infty)$

473. $(-\infty; -2) \cup (5/8; \infty)$

474. $[-7; -\sqrt{35}) \cup [5; \sqrt{35})$

475. $(2; 7)$

476. $(-\sqrt{5}; -2) \cup (1; \sqrt{5})$

477. $(-1; 1) \cup (3; \infty)$

478. $\left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$

479. $(-1; 1 + 2\sqrt{2})$

480. $(2; 7) \cup (22; 27)$

481. $(2; 4)$

482. $(1; 11/10)$

483. $[-1; 4)$

484. $(-4; -1 - \sqrt{3}] \cup (0; \sqrt{3} - 1]$

485. $(3; 5]$

486. $(2; 5)$

487. $(-\infty; -1) \cup (2; \infty)$

488. $(0; 10^{-4}] \cup [10; \infty)$

489. $(0; \frac{1}{2}) \cup [\sqrt{2}; \infty)$

490. $(0; 1) \cup (\sqrt{3}; 9)$

491. $(1/16; 1/8) \cup (8; 16)$
 493. $(1/16; 1/4) \cup (1/2; 2)$
 495. $\left[\log_2 \frac{\sqrt{3}}{2}; \infty\right)$
 497. $\left(\log_2 \frac{3-\sqrt{5}}{2}; \log_2 \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$
 499. $(-\infty; 0) \cup (\log_2 3; \infty)$
 502. $(\log_2(5 + \sqrt{33}) - 1; \infty)$
 504. $(\log_5(\sqrt{2} + 1); \log_5 3)$
 506. $[2; \infty)$
 509. $(-3; -\sqrt{6}) \cup (\sqrt{6}; 3)$
 511. $[-3; 1)$
 513. $(0; 2) \cup (4; \infty)$
 516. $\left(\frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}; \infty\right)$ ចំពោះ $a \in (1; \infty)$; $\left(1; \frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}\right)$ ចំពោះ $a \in (0; 1)$
 517. $(0; a^5) \cup (a^3; a^2) \cup \left(\frac{1}{a}; \infty\right)$
 518. $(1/a; a^4)$ ចំពោះ $a \in (1; \infty)$; $(a^4; 1/a)$ ចំពោះ $a \in (0; 1)$
 519. $[\log_a(4 + \sqrt{16 + a^2}); 3 \log_a 2)$ ចំពោះ $a \in (0; 1)$; $[\log_a(4 + \sqrt{16 + a^2}); \infty)$ ចំពោះ $a \in (1; \infty)$
 520. $(3; 4) \cup (5; \infty)$
 522. $(0; 1/2) \cup (1; 2) \cup (3; 6)$
 524. $\left(-\frac{4}{3}; -\frac{23}{22}\right)$
 526. $\left(\frac{1}{5}; \frac{1}{2}\right)$
 528. $\left(0; \frac{\sqrt{13}-3}{2}\right) \cup (1; \infty)$
 530. $(3; 5 - \sqrt{3}) \cup (7; \infty)$
 532. $(0; 3) \cup (4; 6) \cup (6; 12) \cup (14; \infty)$
 533. $(0; 4)$
 536. $(1; 2)$
 539. $(-1; \infty)$
 492. $(0; 1/\sqrt{27}) \cup \left[\frac{1}{3}; \sqrt{243}\right] \cup [27; \infty)$
 494. $(0; 1/2) \cup (32; \infty)$
 496. $(-1; \infty)$
 498. $(-\infty; 1 - \log_3 \sqrt[3]{5})$
 500. $(0,01; \infty)$
 501. $(-\infty; -1) \cup (-0,1; 0)$
 503. $(-\infty; 0] \cup [\log_6 5; 1)$
 505. $(-\infty; 0] \cup (0; \infty)$
 507. $[28/3; \infty)$
 508. $\left[\log_3 \frac{83}{19}; \infty\right)$
 510. $(-1/2; 2)$
 512. $\left(-4; \frac{1+\sqrt{17}}{2}\right)$
 514. $(1000; \infty)$
 515. $\left(0; \frac{1}{4}\right] \cup [4; \infty)$
 521. $(1; 2)$
 523. $(-3; -2) \cup (-1; 0) \cup (1; 3)$
 525. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right) \cup [-1; 3]$
 527. $(-3; -1)$
 529. $[-1; 1/2) \cup [1; 2) \cup \left(2; \frac{7}{2}\right)$
 531. $(1; 2)$
 535. $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$
 538. $(1/\sqrt{5}; 1) \cup (3; \infty)$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

540. $\{8\}$

ចំពោះ $a \in (0; 1)$ ។

541. $\{4\}$

542. $(0; 1/a^4)$ ចំពោះ $a \in (1; \infty), (0; a^8)$

ក. ត្រីកោណមាត្រ

I. គណនា

543. ក) $\sqrt{2-a^2}$;

ខ) $1 - \frac{(a^2-1)^2}{2}$ ● $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2$; $a^2 =$
 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha$.

544. ក) $p^2 - 2$; ខ) $p^3 - 3p$

545. $\frac{4\sqrt{3}+3}{10}$;

546. $\frac{\sqrt{3(1-b^2)}-b}{2}$ ▲ តាង $40^\circ + \alpha = \beta$ ។ $\cos(70^\circ + \alpha) = \cos(30^\circ + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \beta -$
 $\frac{1}{2} \sin \beta$ ។ ដោយ $0 < \alpha < 45^\circ$ នោះ $\cos \beta > 0$ ដូច្នេះ $\cos \beta = \sqrt{1-b^2}$ ។

547. $1073/1105$; 548. $\sin 3\alpha = -\frac{117}{125}$, $\cos 3\alpha = \frac{44}{125}$, $\tan 3\alpha = -117/44$.

549. $\tan 2\alpha$; 550. $-\tan \alpha$; 551. $\tan 2\alpha$; 552. $\operatorname{cosec} \alpha$

553. $-1/2$. ▲

$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} &= \frac{2 \sin \frac{\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \times \left(\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} \right) \\ &= \frac{\left(\sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} \right) + \left(\sin \frac{5\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} \right) + \left(\sin \pi - \sin \frac{5\pi}{7} \right)}{2 \sin \frac{\pi}{7}} = \frac{-\sin \frac{\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

554. 1. ● បំប្លែងជា $\frac{\sin \frac{13}{14}\pi - \sin \left(-\frac{\pi}{14}\right)}{2 \sin \frac{\pi}{14}}$

555. $1/3$ ▲ $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)} + \frac{1 - \tan^2(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)} = 1,4$ ។ ដូច្នេះ $2,4 \tan^2(\alpha/2) -$
 $2 \tan(\alpha/2) + 0,4 = 0 \Rightarrow \tan \alpha/2 = 1/3$; $\tan \alpha/2 = 1/2$ ។ យើងមាន $0 < \alpha/2 <$
 $\pi/8$; $\tan \pi/8 = \sqrt{2} - 1 < 1/2$ ។

556. π ▲ តាមសម្មតិកម្ម យើងទាញបាន $0 < \alpha + \beta + \gamma < \frac{3\pi}{2}, 0 < \frac{\beta + \gamma}{2} < \frac{\pi}{2}, \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} < 1$
។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}\tan \frac{\beta + \gamma}{2} &= \frac{\tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2}}{1 - \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2}} = \frac{\frac{1}{3} \cot \frac{\alpha}{2} + \frac{2}{3 \tan \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\alpha}{2}}}{1 - \frac{1}{3} \cot \frac{\alpha}{2} \frac{2}{3 \tan \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\alpha}{2}}} = \cot \frac{\alpha}{2} \\ \Rightarrow \tan \frac{\beta + \gamma}{2} - \cot \frac{\alpha}{2} &= 0 \\ \Rightarrow -\cos \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

557. $\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ ● $\cos 292^{\circ}30' = \sin 22^{\circ}30' = \sqrt{\frac{1-\cos 45^{\circ}}{2}};$

558. 4 ▲ $\operatorname{cosec} 10^{\circ} - \sqrt{3} \sec 10^{\circ} = \frac{2\left(\frac{1}{2} \cos 10^{\circ} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 10^{\circ}\right)}{\sin 10^{\circ} \cos 10^{\circ}} = \frac{4 \sin (30^{\circ}-10^{\circ})}{\sin 20^{\circ}} = 4$

559. $\sqrt{3}$ ▲

$$\frac{2 \cos 40^{\circ} - \cos 20^{\circ}}{\sin 20^{\circ}} = \frac{\cos 40^{\circ} - 2 \sin 30^{\circ} \sin 10^{\circ}}{\sin 20^{\circ}} = \frac{\sin 50^{\circ} - \sin 10^{\circ}}{\sin 20^{\circ}} = \frac{2 \cos 30^{\circ} \sin 20^{\circ}}{\sin 20^{\circ}} = \sqrt{3}$$

560. 4 ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}& -2\sqrt{2} \sin 10^{\circ} \left(2 \sin 35^{\circ} - \frac{\sec 5^{\circ}}{2} - \frac{\cos 40^{\circ}}{\sin 5^{\circ}} \right) \\ &= -2\sqrt{2} \left(2 \sin 35^{\circ} \sin 10^{\circ} - \frac{\frac{1}{2} \sin 10^{\circ}}{\cos 5^{\circ}} - \frac{\cos 40^{\circ} \sin 10^{\circ}}{\sin 5^{\circ}} \right) \\ &= -2\sqrt{2} (2 \sin 35^{\circ} \sin 10^{\circ} - \sin 5^{\circ} - 2 \cos 40^{\circ} \cos 5^{\circ}) \\ &= -2\sqrt{2} (-2 \cos 45^{\circ} - \sin 5^{\circ} + \cos 25^{\circ} - \cos 35^{\circ}) \\ &= -2\sqrt{2} (-\sqrt{2} - \sin 5^{\circ} + 2 \sin 30^{\circ} \times \sin 5^{\circ}) = 4\end{aligned}$$

561. $3/4$ ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
& \cos^2 73^\circ + \cos^2 47^\circ + \cos 73^\circ \cos 47^\circ \\
&= \frac{1 + \cos 146^\circ}{2} + \frac{1 + \cos 94^\circ}{2} + \frac{1}{2}(\cos 120^\circ + \cos 26^\circ) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} + \cos 146^\circ + \cos 94^\circ + \cos 26^\circ \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \cos(180^\circ - 146^\circ) + 2 \cos \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{68^\circ}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \cos 34^\circ + \cos 34^\circ \right) = \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

562. $-\frac{1}{2}$ ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
(\sin 6^\circ - \sin 66^\circ) + (\sin 78^\circ - \sin 42^\circ) &= 2 \cos 60^\circ \sin 18^\circ - 2 \sin 30^\circ \cos 36^\circ \\
&= \sin 18^\circ - \sin 54^\circ = -\frac{2 \cos 36^\circ \sin 18^\circ}{\cos 18^\circ} \cos 18^\circ = -\frac{2 \cos 36^\circ \sin 36^\circ}{2 \cos 18^\circ} \\
&= -\frac{\sin 72^\circ}{2 \cos 18^\circ} = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

563. $-1/\sqrt{2}$; 564. 1; 565. 0 ● $\tan^2 20^\circ = \frac{1 - \cos 40^\circ}{1 + \cos 40^\circ}$

566. $1/5$ ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\cot^2 36^\circ \cot^2 72^\circ - 1 + 1 &= 1 + \frac{\cos 108^\circ \cos 36^\circ}{\sin^2 36^\circ \sin^2 72^\circ} \\
&= 1 - (\cot 36^\circ \cot 72^\circ)^2 \frac{1}{\frac{\cos 36^\circ \cos 72^\circ}{2 \sin 36^\circ}} \\
&= 1 - \cot^2 36^\circ \cot^2 72^\circ \frac{2 \sin 36^\circ}{\sin 144^\circ} \\
&= 1 \\
-4 \cot^2 36^\circ \cdot \cot^2 72^\circ; &\Rightarrow 5 \cot^2 36^\circ \cot^2 72^\circ = 1 \Rightarrow \cot^2 36^\circ \cot^2 72^\circ \\
&= \frac{1}{5}
\end{aligned}$$

567. 433 ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\tan^2 \left(3 \frac{\pi}{18} \right) &= \tan^2 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3} \\
\tan^2 \left(3 \frac{5\pi}{18} \right) &= \tan^2 \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{3} \\
\tan^2 \left(3 \frac{7\pi}{18} \right) &= \tan^2 \frac{7\pi}{6} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ $x_1 = \frac{\pi}{18}; x_2 = \frac{5\pi}{18}; x_3 = \frac{7\pi}{18}$ ជាវិស័យនៃសមីការ $\tan^2 3x = \frac{1}{3}$ ។ សមីការនេះសមមូលនឹង

$$\left(\frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} \right)^2 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{\tan^6 x - 6 \tan^4 x + 9 \tan^2 x}{9 \tan^4 x - 6 \tan^2 x + 1} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 3 \tan^6 x - 25 \tan^4 x + 33 \tan^2 x - 1 = 0$$

តាង $t = \tan^2 x \geq 0$ នោះ $t_1 = \tan^2 \frac{\pi}{18}; t_2 = \tan^2 \frac{5\pi}{18}; t_3 = \tan^2 \frac{7\pi}{18}$ ជាចំណុចនៃសមីការ

$3t^3 - 27t^2 + 33t - 1 = 0$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ូរ៉េ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned}t_1 + t_2 + t_3 &= \frac{27}{3} = 9; \\t_1 t_2 + t_2 t_3 + t_3 t_1 &= \frac{33}{3} = 11 \\t_1 t_2 t_3 &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}A &= t_1^3 + t_2^3 + t_3^3 \\&= (t_1 + t_2 + t_3)^3 - 3(t_1 + t_2 + t_3)(t_1 t_2 + t_2 t_3 + t_3 t_1) + 3t_1 t_2 t_3 \\&= 9^3 - 3 \cdot 9 \cdot 11 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 433\end{aligned}$$

568. ▲ យើងមាន

$$\begin{cases} \sin 1999x = 0 \\ 0 < x < \pi \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{1999}; k = 1, 2, \dots, 1998 \quad (1)$$

$$\begin{aligned}2 \sin x \left(\frac{1}{2} + \cos 2x + \cos 4x + \dots + \cos 1998x \right) \\&= \sin x + \sin(-x) + \sin 3x + \sin(-3x) + \sin 5x + \dots + \sin(-1997x) + \sin 1999x \\&= \sin 1999x \\&\Rightarrow \frac{\sin 1999x}{\sin x} = 2 \left(\frac{1}{2} + \cos 2x + \cos 4x + \dots + \cos 1998x \right), \forall x \in (0, \pi) \quad (2)\end{aligned}$$

យើងដឹងថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន m យើងមាន $\cos mx$ ជាពហុធានីក្រេទី m នៃ $\cos x$ ហើយដែលមានមេគុណរបស់តួដ៏ក្រេទី m ស្មើ 2^{m-1} (ពហុធានី Tchebyshev)។ ដូច្នេះ

$$2 \left(\frac{1}{2} + \cos 2x + \cos 4x + \dots + \cos 1998x \right)$$

ជាពហុធានីក្រេទី 1998 នៃ $\cos x$ ហើយដែលមានមេគុណរបស់តួដ៏ក្រេទី 1998 ស្មើ $2 \cdot 2^{1998-1} = 2^{1998}$ ។

(3)

ពី(១)(២)និង(៣) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned}\frac{\sin 1999x}{\sin x} &= 2 \left(\frac{1}{2} + \cos 2x + \cos 4x + \dots + \cos 1998x \right) \\&= 2^{1998} \prod_{k=1}^{1998} \left(\cos x - \cos \frac{k\pi}{1999} \right)\end{aligned}$$

តែយើងមាន $\cos \frac{1998\pi}{1999} = -\cos \frac{\pi}{1999}$; $\cos \frac{1997\pi}{1999} = -\cos \frac{2\pi}{1999}$; ...; $\cos \frac{1000\pi}{1999} = -\cos \frac{999\pi}{1999}$; នោះ

$$\frac{\sin 1999x}{\sin x} = 2^{1998} \prod_{k=1}^{1998} \left(\cos x - \cos \frac{k\pi}{1999} \right)$$

$$= 2^{1998} \prod_{k=1}^{999} \left(\cos^2 x - \cos^2 \frac{k\pi}{1999} \right) \quad (4)$$

ក្នុង(៤) យើងយក $x = \pi/3$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \frac{\sin \frac{1999\pi}{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} &= 2^{1998} \prod_{k=1}^{999} \left(\frac{1}{4} - \cos^2 \frac{k\pi}{1999} \right) \\ \frac{\sin \left(\frac{\pi}{3} + 666\pi \right)}{\sin \frac{\pi}{3}} &= 2^{1998} \prod_{k=1}^{999} \left(\frac{1 - 4 \cos^2 \frac{k\pi}{1999}}{2^2} \right) \\ \prod_{k=1}^{999} \left(1 - 4 \cos^2 \frac{k\pi}{1999} \right) &= 1 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ $P = 1$ ។

II. សមភាព

569. 570.

571. ● $\alpha + \beta + \gamma = \pi \Rightarrow \alpha + \beta = \pi - \gamma$ ។

572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589.

590.

591. ▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} 16 \sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ &= 8 \cos 80^\circ \cos 40^\circ \cos 20^\circ \\ &= 4 \cos 80^\circ \cos 40^\circ \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 2 \cos 80^\circ \frac{2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ}{\sin 20^\circ} \\ &= \frac{2 \cos 80^\circ \sin 80^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 160^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin(180^\circ - 160^\circ)}{\sin 20^\circ} = 1 \end{aligned}$$

592. ● ប្រើរូបមន្ត $2 \cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha$, $2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$

593. 594.

595. ● ប្រើរូបមន្ត $1 \pm \sin \alpha = \left(\sin \frac{\alpha}{2} \pm \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2$

596. ▲ តាង $R_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_n$ ។ យើងមាន

$$R_1 = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}$$

$$R_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^2}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^3}$$

...

$$R_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

597. ▲ យើងមាន

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x$$

$$= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin^2 x \cos x$$

$$= 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

...

$$\cos nx = T_n(\cos x)$$

យើងនឹងបង្ហាញថា $\cos(n+1)x = T_{n+1}(\cos x)$ ។ យើងមាន

$$\cos(n+1)x = \cos nx \cos x - \sin nx \sin x$$

$$\cos nx = \cos(n-1)x \cos x + \sin(n-1)x \sin x \Rightarrow \sin(n-1)x \sin x$$

$$= \cos nx - \cos(n-1)x \cos x$$

$$\sin nx = \sin(n-1)x \cos x - \sin x \cos(n-1)x \Rightarrow \sin nx \sin x$$

$$= \sin(n-1)x \cos x \sin x - \sin x \cos(n-1)x \sin x$$

$$= [\cos nx - \cos(n-1)x] \cos x - (1 - \cos^2 x) \cos(n-1)x$$

$$= \cos nx \cos x - \cos(n-1)x \cos x - \cos(n-1)x + \cos^2 x \cos(n-1)x$$

$$\Rightarrow \cos(n+1)x = (\cos^2 x + 1 - \cos^2 x) \cos(n-1)x = (1 + \cos x - \cos^2 x) T_{n-1}(\cos x)$$

$$= T_{n+1}(\cos x)$$

598. ▲ យើងមាន


$$(3 + 2\sqrt{2})^x = (\sqrt{2} - 1)^x + 3 \Leftrightarrow (\sqrt{2} + 1)^{2x} = \frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^x} + 3 \quad (1)$$

តាង $2t = (\sqrt{2} + 1)^x > 0$ ។ សមីការ(1) សមមូលនឹង

$$4t^2 = \frac{1}{2t} + 3 \Leftrightarrow 4t^3 - 3t = \frac{1}{2} \quad (2)$$

អនុគមន៍ $f(t) = 4t^3 - 3t - \frac{1}{2}$ មាន ខ្សែកោងកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំនុចបីស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ

$(-1; 1)$ ។ មានន័យថាសមីការ(២)មានចំណុច $t \in (-1; 1)$ ។ តាង $t = \cos \alpha$ ដែល $\alpha \in (0; \pi)$ ។



យើងទាញបាន

$$4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 3\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

ដោយ $\alpha \in (0; \pi)$ នោះ $\alpha = \left\{ \frac{\pi}{9}; \frac{5\pi}{9}; \frac{7\pi}{9} \right\}$ ។ ដូច្នេះសមីការមានរឹសបីគឺ $t_1 = \cos \frac{\pi}{9}$; $t_2 = \cos \frac{5\pi}{9}$; $t_3 = \cos \frac{7\pi}{9}$ ។ យើងមាន $t_2; t_3 < 0$ ។ ដូច្នេះមានតែ $t_1 = \cos \frac{\pi}{9}$ តែមួយគត់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $t > 0$ ។ មានន័យថា $(\sqrt{2} + 1)^x = 2t = 2 \cos \frac{\pi}{9}$ ។

599. ▲ យើងមាន

$$\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi}{7} + 1 - \cos \frac{4\pi}{7} + 1 - \cos \frac{6\pi}{7} \right)$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} \right)$$

តាង $A = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$ នោះ

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot A = 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} + 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} + 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7}$$

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot A = \sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{5\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} + \sin \pi - \sin \frac{5\pi}{7}$$

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot A = -\sin \frac{\pi}{7} \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{7}{4}$$

III. សមីការ

600. $\{\pi n; 2\pi n \pm 3\pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

601. $\{2\pi n \pm \pi/6; 2\pi n + \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

602. $\{\pi n/2 + (-1)^n \pi/12 | n \in \mathbb{Z}\}$

603. $\left\{ \frac{\pi n}{3}; \frac{2\pi n}{3} \pm \frac{1}{3} \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

604. $\{\pi n + \pi/4; 2\pi n \pm \pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$

605. $\{\pi n + (-1)^{n+1} \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$

606. $\{2\pi n \pm \pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$

607. $\left\{ \pi n + (-1)^n \arcsin \left(\frac{2}{3} \right) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

608. $\{2\pi n \pm 2\pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$

609. $\{\pi(5n + 2) + \pi/2; 5\pi n \mid n \in \mathbb{Z}\}$
610. $\{\pi n; 2\pi n + \pi/6 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
611. $\{\pi n + \pi/4; \pi n + \arctan 3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
612. $\{\pi n - \arctan(1/2); \pi n + \arctan 2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
613. $\{\pi n + \pi/6; \pi n + \pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
614. $\{\pi n + 3\pi/4; \pi n + \operatorname{arccot} 2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
615. $\{\pi n + (-1)^{n+1}\pi/4; \pi n + \operatorname{arccot} 2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
616. $\{\pi n + (-1)^n \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
617. $\{2\pi n + \arctan(1/2) \mid n \in \mathbb{Z}\}$
618. $\{\pi n/2 + \pi/8 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
619. $\left\{\frac{\pi n}{2} + \frac{(-1)^n}{2} \arcsin 2(2 - \sqrt{3}) \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
620. $\left\{\frac{\pi n}{2} + \frac{(-1)^n}{2} \arcsin(1 - \sqrt{3 + 2a}) \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$ ចំពោះ $a \in \left[-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right]$
621. $\left\{\frac{\pi n}{2} + \frac{(-1)^{n+1}}{2} \frac{\pi}{12} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
622. $\left\{\frac{\pi n}{5}; \frac{2\pi n}{5} \pm \frac{1}{5} \arccos \frac{1}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
623. $\left\{\pi n + (-1)^n \arcsin \frac{\sqrt{33}-3}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
624. $\{\pi n/5 + (-1)^n \pi/20 - 6/5 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
625. $\{\pi n/2 + \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
626. $\{\pi(2n + 1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$
627. $\left\{\pi n + \frac{\pi}{2}; 2\pi n \pm \frac{\pi}{3}; 2\pi n \pm (\pi - \arccos(2/3)) \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
628. $\{\pi n - \pi/4; \pi n \pm \pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
629. $\left\{2\pi n; 2\pi n \pm 2\pi/3; 2\pi n \pm \arccos \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
630. $\{\pi n + \arctan 5 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
631. $\{\pi n + \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
632. $\{\pi n - \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
633. $\{2\pi n - \pi/4; 2\pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
634. $\{\pi n + \pi/2; \pi n + \arctan(1/4) \mid n \in \mathbb{Z}\}$
635. $\{\pi n + \pi/4; 2\pi n \pm 2\pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$

636. $\{\pi n + \arctan 2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
637. $\{2\pi n; \pi n + \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
638. $\{\pi n - \pi/4; \pi n \mid n \in \mathbb{Z}\}$
639. $\{\pi n + \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
640. $\left\{\pi n - \frac{\pi}{4}; \pi n - \arctan 2 \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
641. $\{\pi n + \pi/4; \pi n - \arctan(1/4) \mid n \in \mathbb{Z}\}$
642. $\left\{\pi n + \frac{\pi}{4}; \pi n + \arctan(3/5) \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
643. $\{\pi n + \arctan 2; \pi n - \arctan(3/4) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ● សរសេរអង្គខាងស្តាំជា
 $-2(\sin^2 x + \cos^2 x)$ រួចចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2 x$ ។
644. $\left\{\pi n - \frac{\pi}{4}; \pi n + \arctan 5 \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
645. $\{\pi n - \arctan \sqrt[3]{4} \mid n \in \mathbb{Z}\}$
646. $\{\pi n - \pi/4; \pi n \pm \pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ● បំលែងអង្គខាងស្តាំនៃសមីការជា

$$3 \sin x (\cos x - \sin x) + 3 = 3 \sin x \cos x - 3 \sin^2 x + 3(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$= 3 \cos x (\sin x + \cos x) = 3 \cos^2 x (\tan x + 1)$$
647. $\{\pi n/2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ● បំលែងអង្គខាងស្តាំនៃសមីការជា $1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x +$
 $2 \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x$
648. $\{2\pi n; 2\pi n + \pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
649. $\{2\pi n + \pi/12; 2\pi n + 7\pi/12 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
650. $\{2\pi n/5 - \pi/5; 2\pi n/5 + 2\pi/15 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
651. $\{2\pi n; 2\pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
652. $\{2\pi n + 5\pi/3 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
653. $\left\{\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{12}(2n+1); \frac{\pi}{8}(1-2n) \mid n \in \mathbb{N}\right\}$
654. $\left\{\pi n + \frac{7\pi}{12} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
655. $\{\pi n/4 \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{4k+2 \mid k \in \mathbb{Z}\}\}$
656. $\left\{\frac{\pi n}{3} - \frac{\pi}{12} \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{1+3m \mid m \in \mathbb{Z}\}\right\}$
657. $\{\emptyset\}$
658. $\{\pi n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ▲ បំលែងសមីការជា $2(\tan 3x - \tan 2x) = \tan 2x (1 + \tan 3x \tan 2x)$
 (១)។ បើ $1 + \tan 3x \tan 2x = 0$ នោះ

$$\frac{\sin 3x \sin 2x + \cos 3x \cos 2x}{\cos 2x \cos 3x} = 0 \Rightarrow \frac{\cos x}{\cos 2x \cos 3x} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\cos 2x (4 \cos^2 x - 3)} = 0$$
 មិនមានរឹស។ ដូច្នេះយើងអាចចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការ(១) នឹង $1 + \tan 3x \tan 2x$ បាន។ សមីការ (១) ទៅជា

$$\begin{aligned}
 2 \frac{\tan 3x - \tan 2x}{1 + \tan 3x \tan 2x} &= \tan 2x \\
 2 \tan x &= \tan 2x \\
 2 \tan x &= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \\
 \tan x &= 0
 \end{aligned}$$

659. $\{90^\circ n + 25^\circ | n \in \mathbb{Z}\}$

660. $\{2\pi n | n \in \mathbb{Z}\}$

661. $\{2\pi n - \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

662. $\left\{ \pi n \pm \frac{\pi}{6}; \pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

663. $\{2\pi n \pm 2\arctan 5 | n \in \mathbb{Z}\}$

664. $\{2\pi n \pm 2\arctan 3; 2\pi n \pm 2\arctan \sqrt{3/11} | n \in \mathbb{Z}\}$

665. $\left\{ \pi n \pm \frac{\pi}{4} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

666. $\left\{ \pi n \pm \frac{\pi}{3}; \pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

667. $\{2\pi n/3 \pm 2\pi/9; \pi n/3 + \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$ ● សរសេរសមីការជាអង្គ $\cos 3(3x) - 2 \cos 2(3x) = 2$

668. $\{\pi n; \pi n/2 \pm \pi/12 | n \in \mathbb{Z}\}$ ● សរសេរសមីការជាអង្គ $2\cos 2(2x) = 1 + \cos 3(2x)$

669. $\{3\pi n | n \in \mathbb{Z}\}$

670. $\left\{ \frac{\pi n}{2}; \frac{\pi n}{2} + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{12} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

671. $\{2\pi n; 4\pi n \pm 2\pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$

672. $\left\{ \pi n + \frac{(-1)^n \pi}{6}; 2\pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ ● ប្រើសមភាព

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) &= \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \\
 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}x\right) &= \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4} - \frac{3}{2}x\right) = \sin 3\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)
 \end{aligned}$$

673. $\{\pi n - \pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

674. $\left\{ 2\pi n \pm \arccos \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} + \arctan \frac{b}{a} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ ចំពោះ $c^2 \leq a^2 + b^2$; $\{\emptyset\}$ ចំពោះ $c^2 > a^2 + b^2$ ▲ ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\sqrt{a^2 + b^2}$ យើងទាញបាន

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (1)$$

យើងមាន

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 = 1$$

ហើយ

$$-1 \leq \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}; \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1$$

តាង $a/\sqrt{a^2 + b^2} = \cos \phi$; $b/\sqrt{a^2 + b^2} = \sin \phi$ ។ សមីការ(១) ទៅជា

$$\cos x \cos \phi + \sin x \sin \phi = \cos(x - \phi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (2)$$

សមីការ(២) មានរឹសបើ

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1 \Rightarrow c^2 \leq a^2 + b^2$$

យើងទាញបាន

$$x - \phi = 2\pi k \pm \arctan\left(c/\sqrt{a^2 + b^2}\right), k \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

ដែល $\phi = 2\pi m + \arctan \frac{b}{a}$, $m \in \mathbb{Z}$ ។ ត្រង់នេះយើងសន្មតថា $a > 0$ ។ ករណី $a = 0$ សមីការទៅជា $b \sin x = c$ ។ ករណី $a < 0$ គុណសមីការនឹង -1 ។

675. $\{\pi n - \pi/8 | n \in \mathbb{Z}\}$

676. $\left\{\pi n; \frac{\pi n}{3} - \frac{\pi}{6} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$

677. $\left\{\frac{4\pi n}{5} + \frac{2\pi}{5}; \frac{4\pi n}{3} + \frac{2\pi}{3} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$

678. $\left\{\frac{\pi n}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$

679. $\left\{\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{8}; \pi n + \frac{3\pi}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$

680. $\left\{n; \frac{-1 \pm \sqrt{4l+3}}{2} \mid n \in \mathbb{Z}; l \in \mathbb{Z}_0\right\}; \mathbb{Z}_0 = \{0; 1; 2; \dots\}$

681. $\{\pi n + \pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

682. $\{\pi n/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

683. $\left\{\frac{\pi n}{6} + \frac{\pi}{12}; 2\pi n \pm \frac{2\pi}{3} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$

684. $\{\pi n; 2\pi n \pm \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$

685. $\{\pi n - \pi/4; \pi n + \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

686. $\{2\pi n/3; \pi n + \pi/4; 2\pi n - \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

687. $\{\pi n/2 | n \in \mathbb{Z}\}$
688. $\{\pi n + \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$
689. $\left\{\frac{\pi n}{6} + \frac{\pi}{48}; \frac{\pi n}{4} + \frac{3\pi}{32} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
690. $\mathbb{R} \setminus \{\pi n | n \in \mathbb{Z}\}$
691. $\{\pi n/5; \pi n \pm 3\pi/8 | n \in \mathbb{Z}\}$
692. $\left\{4\pi n + \frac{17}{6}\pi; \frac{8\pi n}{3} - \frac{5}{18}\pi; \frac{8\pi n}{3} + \frac{\pi}{6} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
693. $\left\{\frac{2\pi n}{5}; \pi n + \frac{\pi}{2}; 2\pi n + \pi \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
694. $\left\{\frac{\pi n}{5}; \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{6} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
695. $\{\pi n + \pi/2; \pi n/6 + \pi/24 | n \in \mathbb{Z}\}$
696. $\{\pi n/4 + \pi/8; \pi n/3 + (-1)^{n+1} \pi/18 | n \in \mathbb{Z}\}$
697. $\{\pi n/5 + (-1)^{n+1} \pi/30; \pi n/4 + \pi/16; \pi n + 3\pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$
698. $\{\pi n + \pi/2; \pi n + (-1)^n \pi/6; 2\pi n \pm 2\pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$
699. $\{\pi n/2; 2\pi n \pm 2\pi/3 | n \in \mathbb{Z}\}$
700. $\left\{\frac{\pi}{7}(2n+1) \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{7l-4 \mid l \in \mathbb{Z}\}\right\}$
701. $\{\pi n | n \in \mathbb{Z}\}$
702. $\left\{\frac{\pi n}{3} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
703. $\left\{\frac{\pi n}{10} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
704. $\{\pi n/3 + \pi/6; \pi n/5 + \pi/10 | n \in \mathbb{Z}\}$
705. $\{\pi n; \pi n/5 + \pi/10 | n \in \mathbb{Z}\}$
706. $\{\pi n; \pi n/3 + \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$
707. $\{n - 5/12; n + 1/4 | n \in \mathbb{Z}\}$
708. $\{\pi n/2; \pi n \pm \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$ ▲ សមីការសមមូលនឹង $(1 - \cos 2x) + 2 \sin^2 2x = (1 - \cos 6x); \Leftrightarrow 2 \sin^2 2x - (\cos 2x - \cos 6x) = 0 \Leftrightarrow 2 \sin^2 2x - 2 \sin 2x \sin 4x = 0$
709. $\left\{\pi n/2 + \frac{\pi}{4}; \frac{\pi n}{5} + \pi/10 \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
710. $\{\pi n + \pi/2; 2\pi n/11 + \pi/11; 2\pi n/5 | n \in \mathbb{Z}\}$
711. $\left\{\pi n \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{3}{4} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
712. $\left\{\frac{2\pi n}{7} + \frac{\pi}{7} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$
713. $\left\{\frac{2\pi n}{7} \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{7k | k \in \mathbb{Z}\}\right\}$

714. $\left\{ \frac{\pi n}{4} + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{24} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ ▲ សមីការសមមូលនឹង $\sin x \cos 3x (1 - \cos 2x) + \cos x \sin 3x (1 + \cos 2x) = -\frac{3}{4}$; $\Leftrightarrow (\sin x \cos 3x + \cos x \sin 3x) + \cos 2x - \frac{3}{4} \Leftrightarrow \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 4x = -\frac{3}{4}$; $\Leftrightarrow \sin 4x = -\frac{1}{2}$ ។
715. $\left\{ \pi n \pm \frac{\pi}{8} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
716. $\left\{ \frac{\pi n}{3} + (-1)^n \frac{\pi}{18} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ ▲ បំបែកអង្គទាំងស្រុងនៃសមីការ

$$\frac{1}{2} \sin x \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right) \right) = \frac{1}{2} \sin x \left(\cos 2x - \cos \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{4} (2 \sin x \cos 2x + \sin x) = \frac{1}{4} (\sin 3x - \sin x + \sin x) = \frac{1}{4} \sin 3x$$
717. $\left\{ \frac{2\pi n}{3} \pm \frac{2\pi}{9} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
718. $\left\{ \frac{\pi n}{3} - \frac{\pi}{9} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
719. $\{ \pi n; \pi n \pm \pi/6 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
720. $\{ \pi n; \pi n \pm \pi/6 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
721. $\left\{ \pi n \pm \frac{1}{2} \arccos \left(-\frac{5}{6} \right) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
722. $\left\{ \pi n \pm \frac{1}{2} \arccos \left(-\frac{1}{4} \right); \pi n \pm \frac{1}{2} \arccos \left(\frac{1}{3} \right) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
723. $\{ \pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
724. $\{ \pi n \pm \pi/8 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
725. $\{ \pi n \pm \pi/6 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
726. $\{ \pi n/2 + \pi/4; \pi n + \pi/2 \mid n \in \mathbb{Z} \}$
727. $\left\{ \pi n/2 + \pi/4; \pi n \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{5}-1}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
728. $\left\{ \pi n + \frac{\pi}{4}; \pi n + \frac{(-1)^n}{2} \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
729. $\left\{ \frac{\pi(4n+1)}{2}; \pi(2n+1) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ ● តាង $\sin x - \cos x = y \Rightarrow 1 - \sin 2x = y^2$ ។
730. $\left\{ \pi n - \frac{\pi}{4}; \frac{\pi n}{2} + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{8} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
731. $\left\{ 2\pi n + \frac{\pi}{4}; 2\pi n + \frac{11\pi}{12}; 2\pi n - \frac{5\pi}{12}; \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
732. $\left\{ 2\pi n; 2\pi n + \frac{\pi}{2}; \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
733. $\left\{ 2\pi n - \frac{\pi}{2}; \pi n - \frac{\pi}{4} + (-1)^n \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$
734. $\{ (4\pi n + \pi/2)^2; (4\pi n + 11\pi/6)^2 \mid n \in \mathbb{Z}_0; (4\pi m - 5\pi/6)^2 \mid m \in \mathbb{N} \}$
735. $\{ 2\pi n + 5\pi/6 \mid n \in \mathbb{Z} \}$ ▲ ដោះស្រាយសមីការរក $\tan x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\sin x$ យើងទាញបាន

$$\tan x = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \pm \sqrt{-2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \right)^2} \right) / 2$$

សមីការមានរឹសទាល់តែ $\sin x = 1/2$ និង $\tan x = -1/\sqrt{3}$ ។

736. $\{2\pi n; 2\pi n + \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

737. $\{2\pi n - \pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

738. $\{2\pi(1 + 4n) | n \in \mathbb{Z}\}$ ▲ សំរួលសមីការជា

$$\sin \frac{5x}{4} + \cos x = 2 \quad (1)$$

ដោយ $\sin(5x/4) \leq 1, \cos x \leq 1$ នោះសមីការ(១) មានរឹសទាល់តែ $\sin(5x/4) = 1$ និង $\cos x = 1$ ។

739. $\{\pi n/3; 2\pi n - \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

740. $\left\{ \pi n - \arctan \frac{1}{6}; \pi n - \arctan \frac{1}{3} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

741. $\left[2\pi n - \frac{\pi}{3}; 2\pi n + \frac{2\pi}{3} \right]; n \in \mathbb{Z}$

742. $\{\pi n \pm \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$

743. $\{2\pi n + 3\pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

744. $\left\{ 2\pi n - \arccos \frac{\sqrt{5}-1}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

745. $\{2\pi n + \pi/8; 2\pi n - 3\pi/8 | n \in \mathbb{Z}\}$

746. $\left\{ \frac{\pi n}{2}; \pi n + \pi/6 \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

747. $\{2\pi n + \pi/2; 2\pi n - \pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$

748. $\{2\pi n; 2\pi n - \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$

749. $\left\{ 2\pi n + \frac{3\pi}{8}; 2\pi n + 7\pi/8; 2\pi n + \pi; \pi n + \pi/4 \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

750. $\{2\pi n; \pi n - \pi/4 | n \in \mathbb{Z}\}$

751. $\{\pi n/3 + (-1)^{n+1}\pi/8 | n \in \mathbb{Z}\}$

752. $\left\{ \pi n + \arctan \frac{2}{3} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$

753. $\{2\pi n + \pi/12; 2\pi n - 7\pi/12 | n \in \mathbb{Z}\}$

754. $\{2\pi n + \pi/6; 2\pi l/3 + 5\pi/18 | n, l \in \mathbb{Z}\}$

755. $\{4\pi n + 13\pi/6 | n \in \mathbb{Z}\}$

756. $\{2\pi n + \arccos(1/3) | n \in \mathbb{Z}\}$

$$757. \{2\pi n + \arccos(1/10) | n \in \mathbb{Z}\}$$

$$758. \{\pi n | n \in \mathbb{Z}\}$$

$$759. \{\log_2(\pi n/4 + \pi/8) | n \in \mathbb{Z}_0\}$$

$$760. \left\{1; \frac{7}{12}\pi; \pi n - \frac{\pi}{12}; \pi n + \frac{7}{12}\pi \mid n \in \mathbb{N}\right\}$$

$$761. \text{សមីការទាំងពីរមិនដូចគ្នាទេ។ សមីការទីមួយមានរឹស } \{\pi n - \pi/4; \pi n + \pi/2 | n \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{សមីការទីពីរមានរឹស } \{\pi n - \pi/4 | n \in \mathbb{Z}\} \text{ ។}$$

$$762. [\sqrt{5} - 1; 2]$$

$$763. \blacktriangle \text{ យក } x = 0 \text{ យើងទាញបាន } 1 + b^2 = \cos(b^2) \text{ ។ នាំអោយ } b = 0 \text{ ។ យើងទាញបាន}$$

$$a(\cos x - 1) = \cos ax - 1 \quad (*)$$

បើ $a = 0$ នោះ (*) ពិតចំពោះគ្រប់ x ។ នោះយើងសិក្សាករណី $a \neq 0$ ម្តងៗ ដោយ(*) ពិតជានិច្ច

នោះ យក $x = 2\pi$ យើងទាញបាន $\cos 2a\pi = 1$ នាំអោយ $2a\pi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ដូច្នេះ

$$a = k, a \neq 0$$

យក $x = \frac{2\pi}{a}$ ជំនួសចូល(*) យើងទាញបាន

$$a \left(\cos \frac{2\pi}{a} - 1 \right) = 0$$

ដោយ $a \neq 0$ នោះ $\cos \frac{2\pi}{a} = 1; \frac{2\pi}{a} = 2m\pi; m \in \mathbb{Z}$ ។ យើងទាញបាន $a = \frac{1}{m}$ ។ ដោយ $a \in \mathbb{Z}$ នោះ

$$a = \pm 1 \text{ ។}$$

បើ $a = 1; b = 0$ នោះ $\cos x - 1 = \cos x - 1$ ពិតគ្រប់ x ។

បើ $a = -1; b = 0$ នោះ $-\cos x + 1 = \cos x - 1$ មិនពិតគ្រប់ x ។

ដូច្នេះសមីការពិតគ្រប់ x បើ $(a = 0; b = 0)$ រឺ $(a = 1; b = 0)$ ។

IV. ប្រព័ន្ធសមីការ

$$764. \left\{ \left(2\pi n \pm \arccos \frac{\sqrt{57}-6}{3} + \frac{13\pi}{2}; 2\pi n \pm \arccos \frac{\sqrt{57}-6}{3} \right) | n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$765. \left\{ \left(\pi n + \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6} - \pi n \right) | n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$766. \left\{ \left(2\pi n \pm \arccos \frac{a}{2 \cos(\pi/8)} + \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{8} - 2\pi n \pm \arccos \frac{a}{2 \cos(\pi/8)} \right) | n \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a \in \left[-2 \cos \frac{\pi}{8}; 2 \cos \frac{\pi}{8} \right]$$

$$767. \left\{ \left(\frac{\pi}{5}(n + 4k) \pm \frac{2\pi}{15} + \frac{(-1)^n}{5} \arcsin 2^a; \frac{\pi}{5}(n - 6k) \pm \frac{\pi}{5} + \frac{(-1)^n}{5} \arcsin 2^a \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{ចំពោះ } a \in (-\infty; 0]$$

$$768. \left\{ \left(\pi \left(n + \frac{k}{2} \right) + \frac{\pi}{6}; \pi \left(-n + \frac{k}{2} \right) + \frac{\pi}{3} \right); \left(\pi \left(n + \frac{k}{2} \right) + \frac{\pi}{3}; \pi \left(-n + \frac{k}{2} \right) + \frac{\pi}{6} \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$769. \left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \pi n; \pi(2n - m) + \frac{\pi}{4} \right) | n, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$770. \left\{ \left(2\pi n + \frac{\pi}{6}; 2\pi k + \frac{\pi}{3} \right); \left(2\pi n + \frac{7\pi}{6}; 2\pi k + \frac{4\pi}{3} \right); \left(2\pi n - \frac{\pi}{6}; 2\pi k + \frac{2\pi}{3} \right); \right. \\ \left. \left(2\pi n + \frac{5\pi}{6}; 2\pi k + \frac{5\pi}{3} \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$771. \left\{ \left(\pi n - \frac{\pi}{4}; \pi m + (-1)^m \frac{\pi}{6} \right) | n, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$772. \left\{ \left(2\pi n \pm \frac{3\pi}{4}; \pi m + (-1)^m \frac{\pi}{6} \right) | n, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$773. \left\{ \left(2\pi n + \frac{\pi}{2}; 2\pi k \pm \arccos \left(-\frac{a}{3} \right) \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a \in (-3; 3];$$

$$\left\{ \left(2\pi n + \frac{\pi}{2}; 2\pi k \right); \left(2\pi n - \frac{\pi}{2}; \pi(2k + 1) \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a = -3$$

$$774. \left\{ \left(2\pi n \pm \arccos \frac{1}{a}; \pi k - \arctan(a + 2) \right); \left(2\pi n \pm \arccos \frac{1}{a+2}; \pi k - \arctan a \right) \right. \\ \left. | n, k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a \in (-\infty; -3] \cup [1; \infty);$$

$$\left\{ \left(2\pi n \pm \arccos \frac{1}{a}; \pi k - \arctan(a + 2) \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a \in (-3; -1];$$

$$\left\{ \left(2\pi n \pm \arccos \frac{1}{a+2}; \pi k - \arctan a \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ ចំពោះ } a \in (-1; 1)$$

$$775. \left\{ \left(\frac{\pi k}{2} + (-1)^{k+1} \frac{\pi}{8}; \frac{\pi n}{5} - \frac{1}{5} \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right) | n, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

776.▲ តាង $a = \tan x$; $b = \tan y$; $c = \tan z$ ។ យើងទាញបាន

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = m^2 & (1) \\ a^3 + b^3 + c^3 = m^3 & (2) \end{cases}$$

ក) បើ $m = 0$ នោះ $a = b = c = 0$ យើងទាញបាន $(x; y; z) = (p\pi; h\pi; k\pi)$

ខ) បើ $m \neq 0$ លើកសមីការទី(២)ជាការេ យើងទាញបាន

$$m^6 = (a^3 + b^3 + c^3)^2$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីស្តាត យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} m^6 &= (a^3 + b^3 + c^3)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2)(a^4 + b^4 + c^4) \\ \Rightarrow m^6 &\leq m^2(a^4 + b^4 + c^4) \\ \Rightarrow m^4 &\leq a^4 + b^4 + c^4 \quad (4) \end{aligned}$$

សមីការទី(១) នាំអោយ

$$m^4 = (a^2 + b^2 + c^2)^2 = (a^4 + b^4 + c^4) + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$$

ហើយតាម(៤) យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} (a^4 + b^4 + c^4) + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) &\leq a^4 + b^4 + c^4 \\ \Rightarrow a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 &\leq 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} a^2b^2 = 0 \\ b^2c^2 = 0 \\ c^2a^2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (a = m; b = c = 0); (a = 0; b = m; c = 0); (a = b = 0; c = m)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \arctan m + p\pi; y = h\pi; z = k\pi \\ x = p\pi; y = \arctan m + h\pi; z = k\pi \\ x = p\pi; y = h\pi; z = \arctan m + k\pi \end{cases}$$

ដូច្នេះចំពោះគ្រប់ m សមីការមានចំណុច

$$\begin{cases} x = \arctan m + p\pi; y = h\pi; z = k\pi \\ x = p\pi; y = \arctan m + h\pi; z = k\pi \\ x = p\pi; y = h\pi; z = \arctan m + k\pi \end{cases}$$

V. វិសមភាព

777.▲ ដោយ $\pi/6 < \alpha < \pi/3$ នោះ $1/\sin \alpha < 2$ និង $1/\cos \alpha < 2$ ។ ដូច្នេះ

$$0 \leq \frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha} \leq \frac{\pi}{4 \sin \alpha} < \frac{\pi}{2}; 0 \leq \frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha} \leq \frac{\pi}{4 \cos \alpha} < \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) \geq 0; \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) \geq 0$$

ករណី $x < \alpha$ នោះ $\cos x > \cos \alpha$ យើងទាញបាន

$$\tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) + \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) \geq \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) > \tan\left(\frac{\pi \cos \alpha}{4 \cos \alpha}\right) = 1$$

ករណី $x = \alpha$ យើងទាញបាន

$$\tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) + \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) = \tan\left(\frac{\pi \sin \alpha}{4 \sin \alpha}\right) + \tan\left(\frac{\pi \cos \alpha}{4 \cos \alpha}\right) = 2 > 1$$

ករណី $x > \alpha$ នោះ $\sin x > \sin \alpha$ យើងទាញបាន

$$\tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) + \tan\left(\frac{\pi \cos x}{4 \cos \alpha}\right) \geq \tan\left(\frac{\pi \sin x}{4 \sin \alpha}\right) > \tan\left(\frac{\pi \sin \alpha}{4 \sin \alpha}\right) = 1$$

778.▲ វិសមភាពសមមូលនឹង

$$\begin{aligned} & 4 \tan^2 A \tan^2 B \tan^2 C - 4(\tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C) - 3 \\ & \leq (1 + \tan^2 A)(1 + \tan^2 B)(1 + \tan^2 C) \\ \Leftrightarrow & 4\left(\frac{1}{\cos^2 A} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos^2 B} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos^2 C} - 1\right) - 4\left(\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{1}{\cos^2 C} - 3\right) - 3 \\ & \leq \frac{1}{\cos^2 A} \frac{1}{\cos^2 B} \frac{1}{\cos^2 C} \\ \Leftrightarrow & \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \geq \frac{3}{4} \\ \Leftrightarrow & \frac{1 + \cos 2A}{2} + \frac{1 + \cos 2B}{2} + \cos^2 C \geq \frac{3}{4} \\ \Leftrightarrow & 2(\cos 2A + \cos 2B) + 4 \cos^2 C + 1 \geq 0 \\ \Leftrightarrow & 4 \cos(A+B) \cos(A-B) + 4 \cos^2 C + 1 \geq 0 \\ \Leftrightarrow & 4 \cos^2 C - 4 \cos C \cos(A-B) + 1 \geq 0 \\ \Leftrightarrow & [2 \cos C - \cos(A-B)]^2 + \sin^2(A-B) \geq 0 \end{aligned}$$

ពិត។

779.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} 1 - \sin \frac{\pi}{14} &= \sin \frac{3\pi}{14} - \sin \frac{\pi}{14} + \sin \frac{5\pi}{14} - \sin \frac{3\pi}{14} + \sin \frac{7\pi}{14} - \sin \frac{5\pi}{14} \\ &= 2 \sin \frac{\pi}{14} \left(\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \sin \frac{\pi}{14}}{2 \sin \frac{\pi}{14}} = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{7} &= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} + \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} \end{aligned} \quad (3)$$

តាង $x = \cos \frac{\pi}{7}; y = \cos \frac{2\pi}{7}; z = \cos \frac{3\pi}{7}$ ។ តាម(២) និង (៣) វិសមភាពអាចសរសេរជា

$$x + y + z > \sqrt{3(xy + yz + zx)} \quad (4)$$

ដោយ $x, y, z > 0$ នោះ (៤) អាចសរសេរជា

$$\begin{aligned} (x + y + z)^2 &> 3(xy + yz + zx) \\ \Leftrightarrow (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 &> 0 \end{aligned} \quad (5)$$

ដោយ x, y, z មានតំលៃខុសគ្នា នោះវិសមភាព(៥)ពិត។

780.▲ ដោយ $x_i \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right]$ នោះ

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \leq \sin x_i \leq 1 &\Leftrightarrow (\sin x_i - 1) \left(\sin x_i - \frac{1}{2} \right) \leq 0; \quad (i = 1; 2; \dots; 2n) \\ \Leftrightarrow \sin^2 x_i - \frac{3}{2} \sin x_i + \frac{1}{2} &\leq 0 \\ \Leftrightarrow \sin x_i + \frac{1}{2 \sin x_i} &\leq \frac{3}{2} \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^{2n} \sin x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{\sin x_i} &\leq \frac{3}{2} 2n = 3n \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងមាន

$$\sum_{i=1}^{2n} \sin x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{\sin x_i} \geq 2 \sqrt{\frac{1}{2} Y}$$

យើងទាញបាន $Y \leq \frac{9}{2} n^2$ ។ យើងមាន $Y = 1800; \Rightarrow n \geq 20$ ។ សញ្ញាស្មើកើតមានទាល់តែ

$\sin x_i = 1$ រឺ $\sin x_i = \frac{1}{2}$ និង $\sum_{i=1}^{2n} \sin x_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{\sin x_i}$ ។ តាង α ជាចំនួន $\sin x_i = 1$ និង β ជា

ចំនួន $\sin x_i = \frac{1}{2}$ ។ ដូច្នេះ

$$\alpha + \beta = 2n; \alpha + \frac{1}{2}\beta = \frac{1}{2}\alpha + \beta \Rightarrow \alpha = \beta = n$$

ដូច្នេះ n ត្រូវជាចំនួនគតិស្រី $n = 20$ ។

781.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} \tan \frac{A}{4} &= \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{B+C}{4} \right) \\ \Rightarrow \tan \frac{A}{4} &+ \tan \frac{B}{4} + \tan \frac{C}{4} + \tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} + \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} + \tan \frac{C}{4} \tan \frac{A}{4} \\ &= 1 + \tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពត្រីកោណយើងទាញបាន

$$\begin{aligned} \tan \frac{A}{4} + \tan \frac{B}{4} + \tan \frac{C}{4} &\geq 3 \sqrt[3]{\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4}} \\ \tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} + \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} + \tan \frac{C}{4} \tan \frac{A}{4} &\geq 3 \sqrt[3]{\left(\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} \right)^2} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$1 + \tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} \geq 3 \sqrt[3]{\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4}} + 3 \sqrt[3]{\left(\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} \right)^2}$$

តាង $t = \sqrt[3]{\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4}} > 0$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} 1 + t^3 &\geq 3t + 3t^2 \\ \Rightarrow t &\leq 2 - \sqrt{3}; \text{ រឺ } t \geq 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

ដោយ A, B, C ជារង្វាស់មុំក្នុងត្រីកោណ នោះ $0 < t < 1$ ដូច្នេះ $t \leq 2 - \sqrt{3}$ ។ មានន័យថា

$$\tan \frac{A}{4} \tan \frac{B}{4} \tan \frac{C}{4} \leq (2 - \sqrt{3})^3$$

សញ្ញាស្នើកើតមានពេល $\tan \frac{A}{4} = \tan \frac{B}{4} = \tan \frac{C}{4} = 2 - \sqrt{3}$ រឺពេល $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ ។ ដូច្នេះតំលៃធំបំផុតគឺ $\max T = (2 - \sqrt{3})^3$ ។

782.▲ យើងមាន $0 < (n+1)x < \pi/2$ ដូច្នេះ $0 < nx < \frac{\pi}{2}; 0 < x < \pi/2$ ។ វិសមភាពអាចសរសេរជា

$$\tan nx \sin x + \cos^{2n} x > 1$$

តាង $f(n) = \tan nx \sin x + \cos^{2n} x$ ។ យើងនឹងបង្ហាញថា

$$f(k+1) > f(k), \forall k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

យើងមាន

$$\Leftrightarrow \tan(k+1)x \sin x + \cos^{2(k+1)} x > \tan kx \sin x + \cos^{2k} x$$

$$\Leftrightarrow \cos^{2k} x - \cos^{2k+2} x < \sin x (\tan(k+1)x - \tan kx)$$

$$\Leftrightarrow \cos^{2k} x \sin^2 x < \frac{\sin x \sin x}{\cos(k+1)x \cos kx}$$

$$\Leftrightarrow \cos^{2k} x < \frac{1}{\cos(k+1)x \cos kx}$$

$$\Leftrightarrow \cos^{2k} x \cos(k+1)x \cos kx < 1$$

ពិត។ ដូច្នេះ $f(n) > f(n-1) > \dots > f(0) = 1$ ពិត។

783.▲ បើ A, B, C ជាមុំក្នុងនៃត្រីកោណ នោះ

$$\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2};$$

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1$$

វិសមភាពសមមូលនឹង

$$27 \left(\tan \frac{A}{2} \tan^2 \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan^2 \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan^2 \frac{A}{2} \right) < 4 \left(\cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \left(\tan \frac{A}{2} \tan^2 \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan^2 \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan^2 \frac{A}{2} \right) < \frac{4}{27}$$

តាង $x = \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}$; $y = \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}$; $z = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}$ ។ ដូច្នេះ $x, y, z > 0$; $x + y + z = 1$

ហើយវិសមភាពសមមូលនឹង

$$x^2 y + y^2 z + z^2 x < \frac{4}{27} \quad (1)$$

តាង $P = x^2 y + y^2 z + z^2 x$ ។ សន្មតថា $x \geq y > 0$; $x \geq z > 0 \Rightarrow y^2 z \leq xyz$; $z^2 x \leq x^2 z$ ។

ដូច្នេះ

$$P = x^2 y + y^2 z + z^2 x \leq x^2 y + xyz + \frac{1}{2} z^2 x + \frac{1}{2} x^2 z$$

$$= xy(x+z) + \frac{1}{2} xz(x+z)$$

$$= x(x+z) \left(y + \frac{z}{2} \right) = 4 \cdot \frac{x}{2} \left(\frac{x+z}{2} \right) \left(y + \frac{z}{2} \right)$$

ប្រើវិសមភាពពូស៊ី ចំពោះ $\frac{x}{2}, \left(\frac{x+z}{2} \right), \left(y + \frac{z}{2} \right)$ ហើយដោយដឹងថា $\frac{x}{2} \neq \frac{x+z}{2}$ យើងទាញបាន

$$P < 4 \left(\frac{\frac{x}{2} + \frac{x+z}{2} + y + \frac{1}{2} z}{3} \right)^3 = 4 \left(\frac{x+y+z}{3} \right)^3 = \frac{4}{27}$$

784.▲ តាង a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃមុំ A, B, C ។ តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស យើងមាន

$$\sin A = \frac{a}{2R}; \sin B = \frac{b}{2R}; \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{c^2} = m$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស យើងទាញបាន

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= m(a^2 + b^2 + 2ab \cos C) \\ \Rightarrow |\cos C| &= \frac{|m-1|}{m} \frac{a^2 + b^2}{2ab} \geq \frac{|m-1|}{m} \\ \Rightarrow \sin^2 C &= 1 - \cos^2 C \leq 1 - \frac{(m-1)^2}{m^2} = \frac{2m-1}{m^2} \\ \Rightarrow \sin C &\leq \frac{\sqrt{2m-1}}{m} \end{aligned}$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $a = b$ រឺ $A = B$ ។ ដូច្នេះ $\max \sin C = \frac{\sqrt{2m-1}}{m}$ ។

785.▲ យើងមាន

$$\begin{aligned} f(\tan 2x) &= \tan^4 x + \cot^4 x = (\tan^2 x + \cot^2 x)^2 - 2 \tan^2 x \cot^2 x \\ &= ((\tan x + \cot x)^2 - 2 \tan x \cot x)^2 - 2 \\ &= \left(\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} - 2 \right)^2 - 2 \\ &= \left(\frac{4}{\sin^2 2x} - 4 + 2 \right)^2 - 2 \\ &= \left(4 \frac{\cos^2 2x}{\sin^2 2x} + 2 \right)^2 - 2 \\ &= \left(\frac{4}{\tan^2 2x} + 2 \right)^2 - 2 \\ &= \frac{16}{\tan^4 2x} + \frac{16}{\tan^2 2x} + 2 \end{aligned}$$

តាង $t = \tan 2x \Rightarrow f(t) = 16/t^4 + 16/t^2 + 2$ ។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} f(\sin x) + f(\cos x) &= 16 \left[\frac{1}{\sin^4 x} + \frac{1}{\cos^4 x} + \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} \right] + 4 \\ &= 16[4 + 3(\cot^2 x + \tan^2 x) + \cot^4 x + \tan^4 x] + 4 \end{aligned}$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី យើងមាន

$$\begin{aligned} \cot^2 x + \tan^2 x &\geq 2 \\ \cot^4 x + \tan^4 x &\geq 2 \end{aligned}$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $\tan^2 x = 1$ ។ ដូច្នេះ

$$f(\sin x) + f(\cos x) \geq 16[4 + 3 \cdot 2 + 2] + 4 = 196$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) ។

786.▲ ជាដំបូងយើងបង្ហាញថាវិសមភាព

$$\frac{a}{b} \geq \frac{a-t}{b-t} \quad (1)$$

ពិតចំពោះគ្រប់ $a, b, t \in \mathbb{R}$ ដែល $a < b; b > t \geq 0$ ។ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\frac{a}{b} \geq \frac{a-t}{b-t} &\Leftrightarrow a(b-t) \geq (a-t)b \\
&\Leftrightarrow ab - at \geq ab - bt \\
&\Leftrightarrow at \leq bt \\
&\Leftrightarrow 0 \leq t(b-a)
\end{aligned}$$

ពិត។

ក្នុងត្រីកោណ ABC មួយ បើ $A > B > C$ នោះ $a > b > c$ ដែល a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងឈមនឹងមុំ A, B, C ។ យើងមាន $a = 2R \sin A > b = 2R \sin B > c = 2R \sin C$ ដូច្នេះ $\sin A > \sin B > \sin C$ ។

ដែនកំនត់របស់ y :

$$\begin{cases} \frac{x - \sin A}{x - \sin C} \geq 0 \\ \frac{x - \sin B}{x - \sin C} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \sin A \\ x < \sin C \\ x \geq \sin B \\ x < \sin C \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \sin A \\ x < \sin C \end{cases}$$

ចំពោះ $x \geq \sin A$:

ប្រើវិសមភាព(១)ចំពោះ $t = x - \sin A \geq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{x - \sin A}{x - \sin C} &\geq \frac{x - \sin A - (x - \sin A)}{x - \sin C - (x - \sin A)} = 0 \\
\frac{x - \sin B}{x - \sin C} &\geq \frac{x - \sin B - (x - \sin A)}{x - \sin C - (x - \sin A)} = \frac{\sin A - \sin B}{\sin A - \sin C} \\
&\Rightarrow y \geq 0 + \sqrt{\frac{\sin A - \sin B}{\sin A - \sin C}} - 1
\end{aligned}$$

សញ្ញាស្មើកើតមានពេល $x = \sin A$ ។ ហើយ

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{\sin A - \sin B}{\sin A - \sin C}} - 1 &\leq 1 \Leftrightarrow \frac{\sin A - \sin B}{\sin A - \sin C} \leq 4 \\
&\Leftrightarrow \sin A - \sin B \leq 4 \sin A - 4 \sin C \\
&\Leftrightarrow 0 \leq 3 \sin A + \sin B - 4 \sin C \\
&\Leftrightarrow 0 \leq 3(\sin A - \sin B) + (\sin B - \sin C)
\end{aligned}$$

ពិត។

ចំពោះ $x < \sin C$: យើងមាន

$$y > \sqrt{1} + \sqrt{1} - 1 = 1$$

ដូច្នេះ $\min y = \sqrt{\frac{\sin A - \sin B}{\sin A - \sin C}} - 1$ ពេល $x = \sin A$ ។

VI. វិសមីការ

$$787. \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n\right); n \in \mathbb{Z};$$

$$788. [2\pi n - 2\pi/3; 2\pi n + 2\pi/3]; n \in \mathbb{Z};$$

$$789. (\pi n - \arctan 2; \pi n + \pi/3); n \in \mathbb{Z};$$

$$790. (\pi n; \pi n + \pi/2) \cup [\pi n + 3\pi/4; \pi(n+1)); n \in \mathbb{Z}$$

$$791. (-\pi/4 + 2\pi n; \pi/6 + 2\pi n) \cup (5\pi/6 + 2\pi n; 5\pi/4 + 2\pi n); n \in \mathbb{Z}$$

$$792. \left(2n - \frac{1}{8}; 2n + 7/8\right); n \in \mathbb{Z}$$

$$793. \left(\frac{\pi n}{2} + \frac{5\pi}{24}; \frac{\pi(n+1)}{2} + \frac{\pi}{24}\right); n \in \mathbb{Z} \bullet \cos^3 x \sin 3x + \cos 3x \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin 4x$$

$$794. \left\{\frac{\pi}{2} + \pi n\right\} \cup \left[\pi n - \frac{\pi}{4}; \pi n - \pi/6\right] \cup \left[\pi n + \frac{\pi}{6}; \pi n + \pi/4\right]; n \in \mathbb{Z} \bullet$$

$$\cos x \cos 2x \cos 3x = \cos 2x \frac{\cos 2x + \cos 4x}{2} = \frac{\cos 2x (2 \cos^2 2x + \cos 2x - 1)}{2}$$

$$795. \{\mathbb{R}\} \setminus \left\{\frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi n}{2}\right\}; n \in \mathbb{Z}$$

$$796. \left(-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}; \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}\right); n \in \mathbb{Z} \bullet \sin^6 x + \cos^6 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$$

$$797. \left(\pi n + \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3}; \pi(n+1) - \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3}\right); n \in \mathbb{Z} \bullet 8 \sin^6 x - \cos^6 x = (2 \sin^2 x - \cos^2 x)(4 \sin^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x)$$

$$4 \sin^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x + \cos^4 x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$798. \left(\pi n - \frac{\pi}{4}; \pi n - \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\pi n + \frac{\pi}{6}; \pi n + \frac{\pi}{4}\right); n \in \mathbb{Z}$$

$$799. \left(2\pi n - \frac{\pi}{4} + \arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3}; 2\pi n + \frac{3\pi}{4} - \arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \cup \left(\pi(2n+1); 2\pi n + \frac{3\pi}{2}\right); n \in \mathbb{Z} \bullet$$

$$\text{តើ } \sin x + \cos x = y$$

$$800. \left(\arctan(\sqrt{2} - 1); \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\pi + \arctan(\sqrt{2} - 1); \frac{5\pi}{4}\right)$$

$$801. \left(\pi n + \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}; \pi(n+1) - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right); n \in \mathbb{Z}$$

$$802. [2\pi n - 7\pi/6; 2\pi n + \pi/6]; n \in \mathbb{Z}$$

$$803. (\pi/4 + \pi n; \pi/2 + \pi n); n \in \mathbb{Z}$$

$$804. [n + 1/4; n + 3/4]; n \in \mathbb{Z}$$

VII. ប្រព័ន្ធវិសមីការ

805. ▲ ដោយ $0 \leq x \leq \pi/4$ នោះ $\cos x \neq 0$ ។ ចែកសមីការទីមួយនឹង $\cos^3 x$ និងតាង

$\tan x = t$ យើងទាញបាន

$$\begin{aligned}(4-6m)t^3 + 3(2m-1)t(t^2+1) + 2(m-2)t^2 - (4m-3)(t^2+1) &= 0 \\(4-6m)t^3 + (6m-3)t^3 + (6m-3)t + (2m-4)t^2 - (4m-3)t^2 - 4m+3 &= 0 \\t^3 - (1+2m)t^2 + 3(2m-1)t - 4m+3 &= 0 \\(t-1)(t^2 - 2mt + 4m-3) &= 0\end{aligned}$$

យើងទាញបាន $t = 1$ ដែលត្រូវនឹង $x = \frac{\pi}{4}$ ជាវិសម្បយនៃប្រព័ន្ធ។ ដូច្នេះប្រព័ន្ធមានវិសម្បយគត់បើ
លក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវបានបំពេញ

១) សមីការ $t^2 - 2mt + 4m - 3 = 0$ មាន $\Delta = m^2 - 4m + 3 < 0 \Rightarrow 1 < m < 3$

២) សមីការ $t^2 - 2mt + 4m - 3 = 0$ មានវិសម្បយគត់ស្មើ 1 ។ ដូច្នេះ $1 - 2m + 4m - 3 = 0; m = 1$ ។ បើ $m = 1$ នោះ $\Delta = 0$ សមីការមានវិសម្បយគត់។

៣) សមីការ $t^2 - 2mt + 4m - 3 = 0$ មានវិស $t_1 \leq t_2 < 0$ ដូច្នេះ

$$\Delta > 0; t_1 t_2 = 4m - 3 > 0; S = t_1 + t_2 = 2m < 0$$

វិសមីការនេះគ្មានវិស។

ដូច្នេះដើម្បីអោយប្រព័ន្ធមានវិសម្បយគត់ $1 \leq m < 3$ ។

៤. តាហ្គា

I. គណនា

806. ▲ លក្ខខណ្ឌដែលអោយសមមូលនឹង

$$P(xy) = P(x).P(y); \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (1)$$

ក្នុង (1) យើងយក $x = y = 0$ យើងទាញបាន

$$P(0) = P^2(0)$$

ដូច្នេះ $P(0) = 1$ រឺ $P(0) = 0$ ។

១) បើ $P(0) = 1$ នោះ ក្នុង(1) យក $y = 0$ យើងទាញបាន $P(0) = P(x).P(0)$ នោះ

$$P(x) = 1; \forall x \in \mathbb{R}$$

២) បើ $P(0) = 0$ នោះ $P(x) = xQ(x)$ ដែល $Q(x)$ ជាតាហ្គាមានដឺក្រេទាបជាង $P(x)$ មួយឯកតា

។ លក្ខខណ្ឌ(1) ទៅជា

$$xyQ(xy) = xyQ(x).Q(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

នោះ $Q(xy) = Q(x).Q(y); \forall x, y \in \mathbb{R}$ ។ ដូច្នេះយើងទាញបាន $Q(x) = 1$ រឺ $Q(x) = xQ_1(x)$

ដែល $Q_1(x)$ ជាតាហ្គាមានដឺក្រេទាបជាង $Q(x)$ មួយឯកតា។ ដូច្នេះជាសរុបយើងទាញបាន

$$P(x) = 1; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$P(x) = x^n; \forall x \in \mathbb{R}$$

ដែល n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។

807. ▲ ដោយដឹងថា $2x + 1 = (x + 1)^2 - x^2$ នោះលក្ខខណ្ឌដែលអោយសមមូលនឹង

$$P(x + 1) - (x + 1)^2 = P(x) - x^2$$

តាង $Q(x) = P(x) - x^2$ ។ ដូច្នេះ $Q(x) = Q(x + 1) = \dots = Q(x + n) = \dots$ ។ ដូច្នេះ

$Q(0) = Q(1) = \dots = Q(n) = \dots$ ។ យើងទាញបាន $Q(x) - Q(0) \equiv 0$ ចំពោះ $x = 0, x =$

$1, \dots, x = n, \dots$ ។ ដូច្នេះ $Q(x) - Q(0) \equiv 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ។ យើងទាញបាន

$$P(x) = x^2 + C$$

ដែល $C = Q(0) = P(0)$ ។ ជំនួសទំនាក់ទំនងដែលបានចូលលក្ខខណ្ឌដើម យើងទាញបាន

$$(x + 1)^2 + C = x^2 + 2x + 1 + C$$

ពិតចំពោះគ្រប់ C ។ ដូច្នេះ

$$P(x) = x^2 + C$$

ដែល C ជាចំនួនថេរណាមួយ។

808. ▲ យើងមាន

$$P((x+1)^2) - (x+1)^2 = P(x^2) - x^2$$

តាង $Q(t) = P(t) - t$ ។ យើងទាញបាន $Q(0) = Q(1) = \dots = Q(n^2) = \dots$ ។ ដូច្នេះ

$Q(x) = Q(0)$ ។ យើងទាញបាន $P(x) = x + C$ ដែល $C = Q(0) = P(0)$ ។ ជំនួសចូលក្នុងក្លែង
ដើម យើងទាញបាន $P(x) = x + C$ ដែល C ជាចំនួនថេរណាមួយ។

809. ▲ ពហុធា $f(x) - 5$ មានរឹសជាចំនួនគត់ a, b, c, d ។ ដូច្នេះ

$$f(x) - 5 = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)g(x)$$

ដែល $g(x) = x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m$ និង $b_1, b_2, \dots, b_m$ ជាចំនួនគត់។ សមីការ $f(x) = 8$
សមមូលនឹង

$$(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)g(x) = 3$$

ដូច្នេះបីក្នុងចំណោមចំនួនគត់បួន $x-a, x-b, x-c, x-d$ ស្មើ 1 រឺ -1។ ដូច្នេះត្រូវមានពីរដែល
ស្មើគ្នា ដែលករណីនេះមិនអាច ព្រោះចំនួនទាំងបួនខុសៗ។

810.▲ តាង $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ ដោយ $a_i \geq 0$ ចំពោះ $i < n$ និង $a_n > 0$
។ យើងមាន $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ ។

តាង $x_{n+1} = x_1$ ។

បើ $n = 1$ យើងទាញបាន $[P(1)]^2 = 1 \cdot [P(1)]^2$ ពិត។

បើ $n \geq 2$ យើងមាន

$$P^2(X) = \sum_{i=0}^n a_i^2 X^{2i} + 2 \sum_{i < j} a_i a_j X^{i+j}$$

ចំពោះ $p \in \mathbb{N}^*$ តាង

$$S_p = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_{k+1}}{x_k} \right)^p$$

តាមវិសមភាពកូស៊ី

$$S_p \geq \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{x_{k+1}}{x_k} \right)^p \right]^{\frac{1}{n}} = 1$$

តែថា

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P^2 \left(\frac{x_{k+1}}{x_k} \right) = \sum_{i=0}^n a_i^2 S_{2i} + 2 \sum_{i < j} a_i a_j S_{i+j} \geq \sum_{i=0}^n a_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_i a_j = P^2(1)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n P^2 \left(\frac{x_{k+1}}{x_k} \right) \geq nP^2(1)$$

ស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ។

៥. សមីការអនុគមន៍

I. គណនា

811. ▲ តាមលក្ខខណ្ឌទី១យើងទាញបាន

$$f(f(x) + 1) = f(1 - x)$$

តាមលក្ខខណ្ឌទី២ យើងទាញបាន

$$f(x) + 1 = f(1 - x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

ជំនួស $t = 1 - x$ យើងទាញបាន

$$f(1 - t) + 1 = f(t)$$

ដូច្នេះ $f(1 - x) + 1 = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$ ជំនួសចូល(1) យើងទាញបានថា គ្មានអនុគមន៍ណាផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌទេ។

812. ▲ យើងមាន $f(1) + f(2) = 4f(2) \Rightarrow f(2) = \frac{f(1)}{3} = \frac{2}{3}$ (1) ។ ចំពោះ $n \geq 3$ យើងមាន

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + f(n) = n^2 f(n) \\ f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) = (n-1)^2 f(n-1) \end{cases} \\ \text{យើងទាញបាន} \quad & f(n) = n^2 f(n) - (n-1)^2 f(n-1) \\ & \Rightarrow f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1) \end{aligned}$$

ដូច្នេះចំពោះ $n \geq 3$ យើងទាញបាន

$$f(n) = \frac{(n-1)(n-2) \dots 2}{(n+1)n \dots 4} f(2) = \frac{6}{n(n+1)} f(2) = \frac{4}{n(n+1)}$$

813. ▲ យើងនឹងបង្ហាញថា $f(x) = 0$ ជាចំលើយតែមួយគត់។ សន្មតថាចំនោទមានចំលើយ

$f(x) \neq 0$ ។ ដូច្នេះមានចំនួន $a \in \mathbb{R}$ ដែល $f(a) = b \neq 0$ ។ យើងយក $y = a$ យើងទាញបាន

$$f(xb) = x^n f(b)$$

តាង $t = xb$ ។ យើងទាញបាន

$$f(t) = \frac{f(b)}{b^n} t^n = C t^n$$

ដែល C ជាចំនួនថេរ។ ជំនួស $f(x) = Cx^n$ ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌ យើងទាញបាន $C = 0$ ដូច្នេះ
 $f(x) = 0$ ។

814. ▲ លក្ខខណ្ឌ $af(x^2 + yz) + bf(y^2 + zx) + cf(z^2 + xy) = 0$ (1) មានលក្ខណៈឆ្លុះរៀប
 នឹង x, y, z ។ ដូច្នេះដោយសារលក្ខណៈនេះ និងដោយសារ a, b, c មិនសូន្យទាំងបីព្រមគ្នា យើងអាច
 សន្មតថា $a \neq 0$ ។

យក $y = z = 0$ យើងបាន $af(x^2) + (b + c)f(0) = 0 \Rightarrow f(x^2) = -\frac{(b+c)f(0)}{a}$ ចំពោះគ្រប់ x
 ។

យក $x = 0, z = 1$ យើងបាន $af(y) + bf(y^2) + cf(0) = 0$ ។ ដូច្នេះ

$$f(y) = -\frac{bf(y^2) + cf(0)}{a} = -\frac{-\frac{b+c}{a}f(0) + cf(0)}{a} = \frac{b^2 + bc - ac}{a^2} \cdot f(0)$$

ចំពោះគ្រប់ $y \in \mathbb{R}$

ដូច្នេះ f ជាអនុគមន៍ថេរលើ $\mathbb{R}$ ។ តាង $f(x) = K$ ។ ជំនួសចូលក្នុង(1) យើងទាញបាន
 $(a + b + c)K = 0$

បើ $a + b + c \neq 0$ នោះ $K = 0$ ដូច្នេះ $f(x) \equiv 0$ ។

បើ $a + b + c = 0$ នោះ K ជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន។

815. ▲ យក $y = 1$ យើងទាញបាន $f(xf(1)) = x^p$ ។ $f(1)$ មិនអាចស្មើសូន្យបានទេ ព្រោះបើស្មើ
 សូន្យ នោះ $f(0) = x^p$ ចំពោះគ្រប់ x មិនអាច។ តាង $c = f(1)$ ដូច្នេះ $f(x) = x^p/c^p$ ។ ដូច្នេះ

$$x^p y^q = f(xf(y)) = \frac{[xf(y)]^p}{c^p} = \frac{x^p y^{p^2}}{c^{p+p^2}}$$

ពិតចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}$ ។ ដូច្នេះ $c = 1$ និង $q = p^2$ ។ បើ $q = p^2$ នោះយើងទាញបាន

$$f(xf(y)) = x^p [f(y)]^p = x^p y^{p^2} = x^p y^q$$

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}^+$ ។

816. ▲ ពីលក្ខខណ្ឌទីមួយ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{Z}$ និង $k \in \mathbb{N}$ យើងមាន

$$\begin{cases} f(m + k.19) \geq f(m) + k.19 \\ f(m - k.19) \leq f(m) - k.19 \end{cases}$$

ពីលក្ខខណ្ឌទីពីរ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{Z}$ និង $k \in \mathbb{N}$ យើងមាន

$$\begin{cases} f(m + k.99) \leq f(m) + k.99 \\ f(m - k.99) \geq f(m) - k.99 \end{cases}$$

សមីការ $1 = 19x + 99y$ មានរឹស $x = -26 + 99t; y = 5 - 19t, t \in \mathbb{Z}$ ។ ចំពោះ $t = 0; 1$ យើង
 ទាញបាន $(x; y) = \{(-26; 5); (73; -14)\}$ ។

ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{Z}$ យើងមាន

$$f(m+1) = f(m-19.26+99.5) \leq f(m+99.5) - 19.26 \leq f(m) + 99.5 - 19.26 \\ = f(m) + 1$$

$$f(m+1) = f(m+73.19-14.99) \geq f(m-14.99) + 19.73 \geq f(m) - 14.99 + 19.73 \\ = f(m) + 1$$

ដូច្នេះ $f(m+1) = f(m) + 1$ ចំពោះ $m \in \mathbb{Z}$ ។ ដូច្នេះ $f(m+n) = f(m) + n$ ចំពោះគ្រប់

$m, n \in \mathbb{Z}$ ។ យក $m = 0$ យើងទាញបាន $f(n) = f(0) + n$ ។ តាង $a = f(0)$ ។ ដូច្នេះ

$f(n) = a + n$ ។ ជំនួសចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌដើមយើងទាញបាន $f(n) = n + a$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះគ្រប់

$a \in \mathbb{Z}$ ។

817. ▲ អោយ $x = y = 0$ យើងទាញបាន $f(0) = 0$ ។ អោយ $y = 0$ យើងទាញបាន

$xf(x) = f^2(x) \Rightarrow f(x) = 0$ រឺ $f(x) = x$ ។ យើងឃើញថា $f(x) = 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ រឺ

$f(x) = x$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ សុទ្ធតែផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដែលអោយ។ បន្ទាប់មកទៀតយើងបង្ហាញ
ថា បន្សំនៃអនុគមន៍ទាំងពីរមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ មានន័យថា អនុគមន៍

$$f(x) = \begin{cases} 0; & x \in D_1 \\ x; & x \in D_2 \end{cases}$$

ដែល $D_1 \cup D_2 = \mathbb{R}$ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌទេ។ ឧបមាផ្ទុយពីនេះថា មាន $x_1 \in D_1; x_2 \in D_2$ ដែល

$f(x_1) = 0$ និង $f(x_2) = x_2$ ។ ចំពោះ $x_1 \in D_1$ ដែល $x_1 \neq 0$ គេអាចរកបាន មេគុណ a មួយដែល

$ax_1 = x_2$ គឺ $a = x_2/x_1$ ។

ជំនួស y ដោយ x និង x ដោយ y យើងទាញបាន

$$xf(x+y) + yf(y-x) = yf(x+y) + xf(x-y) \\ (x-y)f(x+y) = (x-y)f(x-y)$$

ពិតចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}$ ។ ដូច្នេះ

$$f(x+y) = f(x-y)$$

តាង $t = x - y; \Rightarrow x = t + y$ ដូច្នេះ $f(t+2y) = f(t)$ ចំពោះគ្រប់ $t, y \in \mathbb{R}$ ។ យក $y = bt$ ។

ដូច្នេះ $f((1+2b)t) = f(t)$ ។ តាង $K = 1 + 2b$ នោះ

$$f(Kt) = f(t)$$

ចំពោះគ្រប់ $K, t \in \mathbb{R}$ ។

ដូច្នេះ ដោយយក $K = a; f(ax_1) = f(x_1) \Rightarrow ax_1 = 0$ អាចតែករណី $ax_1 = x_2 = 0$ មួយ
ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ

$$f(x) = 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R} \text{ រឺ } f(x) = x \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

818. ▲ អោយ $x = y$ យើងទាញបាន $f(0) = 0$ ។ អោយ $y = 1$ យើងទាញបាន

$$f(x+1)(f(x)-1) = f(x-1)[f(x)+1] \quad (1)$$

អោយ $x = 2$ យើងទាញបាន $f(3)(f(2) - 1) = f(2) + 1$ ។ ដោយ $f(2) \neq 1$ នោះ

$$f(3) = \frac{f(2) + 1}{f(2) - 1} = 1 + \frac{2}{f(2) - 1}$$

ដោយ $f(2), f(3)$ ជាចំនួនគត់ នោះ $f(2) - 1$ ត្រូវតែជាតួចែកនៃ 2 ។ ដូច្នេះ

$$f(2) - 1 = 2 \text{ នោះ } f(2) = 3; f(3) = 2$$

$$f(2) - 1 = 1 \text{ នោះ } f(2) = 2; f(3) = 3$$

$$f(2) - 1 = -1 \text{ នោះ } f(2) = 0; f(3) = -1$$

$$f(2) - 1 = -2 \text{ នោះ } f(2) = -1; f(3) = 0$$

$$1) \text{ ករណី } f(2) = 3; f(3) = 2$$

ក្នុង(១) ជំនួស $x = 3$ យើងទាញបាន $f(4) = 9$ ។ ជំនួស $x = 4$ យើងទាញបាន $f(5) = \frac{5}{2}$ មិនយក។

$$2) \text{ ករណី } f(2) = 2; f(3) = 3 \text{ ។ តាមវិធានដោយកំនើន យើងទាញបាន}$$

$$f(n) = n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$3) \text{ ករណី } f(2) = 0; f(3) = -1 \text{ ។ តាមវិធានដោយកំនើន យើងទាញបាន}$$

$$f(n) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ 1, & n = 4k + 1 \\ -1, & n = 4k - 1 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$4) \text{ ករណី } f(2) = -1; f(3) = 0 \text{ ។ តាមវិធានដោយកំនើន យើងទាញបាន}$$

$$f(n) = \begin{cases} 0, & n = 3k \\ 1, & n = 3k + 1 \\ -1, & n = 3k - 1 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

819. ▲ យើងមាន $f(1) = 1; f(2) = 2$ ។ សន្មតថា $f(k) = k$ ចំពោះ $k = 1, 2, \dots, n$ ។ យើងនឹងបង្ហាញថា $f(n+1) = n+1$ ។

បើ $n+1 = 2j$ នោះ $1 \leq j < n$ ហើយ

$$f(n+1) = f(2j) = f(2)f(j) = 2j = n+1$$

បើ $n+1 = 2j+1$ នោះ $1 \leq j < n$ ហើយ

$$2j = f(2j) < f(2j+1) < f(2j+2) = f(2)f(j+1) = 2j+2$$

ដូច្នេះ $2j < f(2j+1) < 2j+2$ ។ ដោយ $f(2j+1)$ ជាចំនួនគត់ នោះ $f(2j+1) = 2j+1 = n+1$ ។

820. ▲ យក $x = y$ យើងទាញបាន $0 < 2f^2(x^2) \leq 2f(x)f(x^3)$ ដូច្នេះ $f(x)$ និង $f(x^3)$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

យក $x = 0$ យើងទាញបាន

$$0 < 2f^2(0) \leq f(0)f(y^3) + f(0)f(y) \\ f(0)[2f(0) - f(y) - f(y^3)] \leq 0$$

យើងទាញបាន

១) បើ $f(0) < 0$ នោះ $0 > 2f(0) \geq f(y) + f(y^3)$ ហើយដោយ $f(y)$ និង $f(y^3)$ មានសញ្ញាដូចគ្នាចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នោះ $f(y) < 0$ ចំពោះគ្រប់ $y \in \mathbb{R}$ ។ ផ្ទុយពីសម្មតិកម្មដែល $f(1999) > 0$ ។

២) បើ $f(0) > 0$ នោះ $0 < 2f(0) \leq f(y) + f(y^3); \forall y \in \mathbb{R}$ ។ ដូច្នេះ $f(y) > 0; \forall y \in \mathbb{R}$ ។ ដូច្នេះ $f(2000) > 0$ ។

៣) បើ $f(0) = 0$ នោះ តាង $f(x) = x^n g(x)$ ដែល $g(0) \neq 0$ ។ ដោយ $f(x)$ និង $f(x^3)$ មានសញ្ញាដូចគ្នា នោះ $x^n g(x)$ និង $(x^n)^3 g(x^3)$ មានសញ្ញាដូចគ្នា។ ដោយ x^n និង $(x^n)^3$ មានសញ្ញាដូចគ្នា នោះ $g(x)$ និង $g(x^3)$ ក៏ត្រូវតែមានសញ្ញាដូចគ្នាដែរ។ យើងមាន

$$0 < 2x^{4n} g^2(x^2) \leq 2x^n g(x)x^{3n} g(x^3) = 2x^{4n} g(x)g(x^3); \forall x \in \mathbb{R}$$

ដូច្នេះ អាច $g(x) > 0; \forall x \in \mathbb{R}$ រឺ $g(x) < 0; \forall x \in \mathbb{R}$ ។ តែដោយ $f(1999) > 0$ នោះ $g(x) > 0; \forall x \in \mathbb{R}$ ។

ដូច្នេះ $f(2000) = 2000^n g(2000) > 0$ ។

ឯកសារដើម

សៀវភៅនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅខាងក្រោមនេះ

1. Pierre Bornsztein, *Inégalité*, 2001
2. Hojoo Lee, *Topic in Inequalities-Theorems and Techniques*
3. A.I Prilepko, *Problem Book in High-School Mathematics*, MIR Moscow, 1985*
4. D.O. Shklarsky, N.N. Chentzov, I. M. Yaglom, *The USSR Olympiad Problem Book*, Dover Publications, INC. New York, 1993.
5. Dusan Djukic, Vladimir Jankovic, Ivan Matic, Nikola Petrovic, *The IMO Compendium*, Springer, 2006
6. GS. PHAN ĐỨC CHÍNH, *101 Bài Toán Chọn lọc*, Nhà Xuất Bản Trẻ, 1996
7. *Tuyển Tập Đề thi olympic 30-4, Môn Toán*, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1999.

* លំហាត់គ្រឹះស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា,

កម្រិតវិទ្យាល័យ,

ភាគ ២- ពីគណិត វិភាគ

ដោយ លីម សុវណ្ណវិចិត្រ

សៀវភៅកំណែលំហាត់ផ្នែកពីគណិត ដែលរួមមានសមភាព សមីការ វិសមភាព វិសមីការ នៃអនុគមន៍ធម្មតា អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និង អ៊ីចស្ទ័រណង់ស្យែល។ សៀវភៅនេះប្រជុំ ដោយលំហាត់ងាយ និងពិបាកចំនួនប្រហែលជា៨០០លំហាត់ ដកស្រង់ចេញពីការប្រឡង សិស្សពូកែនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក។ បើអ្នកចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែម្នាក់ សៀវភៅ មួយក្បាលនេះប្រហែលជាសៀវភៅដែលអ្នកចង់បាន។