

ជីវវិទ្យា

ជា គីមអៀង

សំនួរ ~ ចំណេះដឹង




ចំណេះដឹងគ្រប់វិសាមញ្ញ

ផ្នែកទី

12

តារាង 1



ជំនួយស្មារតី និង ពង្រីកចំណេះដឹង
ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី

* រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង *

ពោធិ៍កថា

សំនួរចម្លើយ ជីវវិទ្យា ភាគ 1 នេះត្រូវបានកើតឡើងដោយសារការនិពន្ធអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ និងដោយសំអាងទៅលើឯកសារជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងជួយសំរួលការងារលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងជួយពង្រឹងពង្រីកផ្តល់ចំណេះដឹង ពិតប្រាកដដល់ប្អូនៗ យុវសិស្សដើម្បីឈានបន្តវិជ្ជាទៅឧត្តមសិក្សា ។

ទោះបីជាសៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងស៊ីតសំរាប់រាំងក៏ដោយ ក៏តែងតែមានកំហុស ឆ្គង និងកង្វះខាតច្រើនមិនជុតឡើយ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ សាស្ត្រាចារ្យធារិទ្ធ ផ្នែកជីវវិទ្យា នៅវិទ្យាល័យ អង់ហ្សេប្រូនេសធារិទ្ធ (professeurs de biologie à Angers) ដែលបានផ្តល់ឯកសារ ជាច្រើន ។

អរគុណដល់យុវសិស្ស **លី ជិនឡុង** និស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងដែលបានជួយវាយកុំព្យូទ័រក្របសៀវភៅ និងឯកសារមួយចំនួន ។

ជា គឹមអៀង


ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០២

ឯកសារយោង

1. សៀវភៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (2001 - 2002)
2. Annales baccalauréat (toutes les années)
3. ANNA BAC (HATIER)
4. Exos T.S (HATIER)
5. T.S obligatoire et spécialité
(BORDAS PERFORMANCE)
6. Biologie T.S (BORDAS)
7. Biologie 1^{re} S (BORDAS)
8. Biologie 1^{re} S (HACHETTE)
9. Biologie T.S (HACHETTE)
10. Biologie T.D (NATHAN)
11. Biologie 1^{re} B (NATHAN)
12. Biologie T.D (BORDAS)
13. Biologie Humaine 1^{re} AB (Nathan)
14. Biologie Humaine (Nathan)
15. Biologie T.C (NATHAN)
16. ADIP : VIH et SIDA

ចេញផ្សាយដោយ ឬ ចំណែកនៃការងារនេះដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន

ស្នេហាសិទ្ធិគ្រប់ចំណេះដឹង



ជំពូក I: ការបន្តពូជដូចនៃកោសិកា Reproduction Conforme

បេឡេនឌី ១

មីតូស (Mitose)

① តើកោសិកាទាំងឡាយនៃសារពាង្គកាយពហុកោសិកា កើតពីកោសិកាដំបូងបំផុត ចំនួនប៉ុន្មាន? ហើយគេហៅថាអ្វី? តើកោសិកានេះត្រូវចែកខ្លួនតាមចលនាការអ្វីដើម្បី បង្កើតជាសារពាង្គកាយមួយ?

- + កើតពីកោសិកាដំបូងបំផុតតែ មួយគត់ ដែលគេហៅថា "ស៊ីកូត" ឬ "ស៊ីត"
- + ស៊ីកូតត្រូវចែកខ្លួនតាមចលនាការ មីតូស ដើម្បីបង្កើតជាសារពាង្គកាយមួយ ។

② ដូចម្តេចដែលហៅថាពពិតមានសេនេទិច? តើគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយមួយ មានជួរពពិតមានសេនេទិចដូចគ្នា ឬ ខុសគ្នា? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង?

- + ពពិតមានសេនេទិច : មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ 36
- + គ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយមួយមានជួរពពិតមានសេនេទិចដូចគ្នាទាំងអស់ពីព្រោះគ្រប់ កោសិកាសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃស៊ីកូតដែលធ្វើមីតូសជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរាប់រងនូវចំនួន និង រូបរាងត្រឹមត្រូវដូចគ្នាក្នុងកោសិកា ដែលឬនិយាយថា ដូចគ្នាទាំងអស់នៃស៊ីកូត។

③ ដូចម្តេចដែលហៅថាមីតូស? ហេតុដូចម្តេចបានជាគេចាត់ទុកមីតូសនិងការបន្តពូជ ដោយឥតភេទជាការបន្តពូជដូច?

+ មិត្តសៈ មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ 39

+ ពីព្រោះគ្រប់កោសិកាកូនដែលកើតពីមិត្តសៈ និងកើតពីការបន្តពូជដោយឥតភេទសុទ្ធតែ មានពត៌មានសេនេទិចដូចគ្នាទាំងអស់ហើយដូចកោសិកាដើមទៀតផង ។

④ ដូចម្តេចដែលហៅថាការបន្តពូជដូច? តើការបន្តពូជដូចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា?

+ ការបន្តពូជដូច : មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ 1 ។

+ សារៈសំខាន់នៃការបន្តពូជដូច :

- ធ្វើឱ្យកោសិកាកូន មានពត៌មានសេនេទិចដូចគ្នា ។
- បញ្ជូនទាំងស្រុងនូវពត៌មានសេនេទិច (ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រូម៉ូសូម) ពីជំនាន់ កោសិកាមួយទៅជំនាន់កោសិកាមួយ ។

⑤ តើសារៈសំខាន់នៃការបន្តពូជដោយឥតភេទមានយ៉ាងណា? តើគេចាត់ទុកការបន្ត ពូជដោយឥតភេទជាអ្វីដែរ ?

+ សារៈសំខាន់នៃការបន្តពូជដោយឥតភេទ :

ផ្តល់ដល់សន្តានក្រោយឱ្យមានសភាវៈសេនេទិចដូចគ្នាបេះបិទ ហើយដូចឯកត្តៈ ដើមទៀត លើកលែងតែមានបំរែបំរួលសភាវៈតំនពូជ (មួយតាស្យុង) កើតឡើង ក្នុងពេលមិត្តសៈ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

+ គេចាត់ទុកការបន្តពូជ ដោយឥតភេទថាការបន្តពូជដូច ។

⑥ ចូរនិយាយពីលំនាំទី 1 និងលំនាំទី 2 ដែលកើតឡើងនៅពេលកោសិកាមួយធ្វើ មិត្តសៈ ។

នៅពេលកោសិកាមួយធ្វើមីតូស មានលំនាំ 2 កើតឡើងដូចតទៅ :


- លំនាំទី 1 : ពតិមានសេនេទិច (ក្រូម៉ូសូម) របស់កោសិកាមេស្ទួយតំលើងទ្វេ បន្ទាប់មក ញែកជា 2 ក្រុមដូចគ្នា ហើយណ្ឌូយ៉ូចែកជាណ្ឌូយ៉ូកូនពីរ ។
- លំនាំទី 2 : ស៊ីតូប្លាស ចែកជាពីរផ្នែកស្មើគ្នានៅពេលជិតបញ្ចប់មីតូស ។

៧ ១/. ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រំព្វដែលចង្អុល ។

២/. តើជាមីតូស ឬ មេយ៉ូស? ស្ថិតក្នុងវគ្គណា?

ចូរបញ្ជាក់អំនះអំណាច ។

៣/. ចូរកំណត់ចំនួនក្រូម៉ូសូម និងចំនួនក្រូម៉ាទីត ។



១/. ដាក់ឈ្មោះ :

១ : ខ្សែកាំ ២: សង់ទ្រីយ៉ូល ៣: អាស្តែរ ៤: ត្រួយអាក្រូម៉ាទីចកំពុងកកើត

៥ : សង់ត្រីមែរ ៦: ក្រូម៉ាទីត

២/. នេះជាមីតូស ស្ថិតក្នុងប្រជាស ពីព្រោះមានកំនអាស្តែរ និង ត្រួយអាក្រូម៉ាទីច គ្មានណ្ឌូយ៉ូកំពុងរលាយ ក្រូម៉ូសូមដែលមានក្រូម៉ាទីតពីរ លេចរូបរាងឡើង ។

៣/. - ក្រូម៉ូសូម ៣គូរ អូម៉ូឡូក គឺ $2n = 6$


- ក្រូម៉ូសូម 1 មានក្រូម៉ាទីត 2 $\rightarrow$ ចំនួនក្រូម៉ាទីត គឺ $6 \times 2 = 12$

៨ ១/. ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រំព្វដែលចង្អុល ។

២/. តើជាមីតូស ឬ មេយ៉ូស? ស្ថិតក្នុងវគ្គ ណា?

ចូរបញ្ជាក់អំនះអំណាច ។

៣/. ចូរកំណត់ចំនួនក្រូម៉ូសូម និងចំនួន ក្រូម៉ាទីត ។




- ១/. ដាក់ឈ្មោះ ១: សរសៃក្រមួសូម ២: សរសៃប៉ូល ៣: អាស្មែរ ៤: បន្ទះអេក្វាទ័រ
- ២/. នេះជាមីតូស ឬ មេយ៉ូស? ស្ថិតក្នុងមេតាផាស។ ពីព្រោះក្រមួសូមអូមីឡូកទាំងឡាយដែលប្រេះបណ្តោយមកជុំត្រង់ប្លង់អេក្វាទ័រដោយក្រមួសូមមួយភ្ជាប់លើសរសៃក្រមួសូមតែមួយ គឺមិនជុំជា តេត្រាតដោយភ្ជាប់ លើសរសៃក្រមួសូមតែ ១ ដូចមេយ៉ូសទេ។
- ៣/. - ក្រមួសូមមាន ៣គូ គឺ $2n=6$
- ក្រមួសូម ១ មានក្រម៉ាទីត $2 \Rightarrow$ ចំនួនក្រម៉ាទីតសរុបគឺ $6 \times 2 = 12$

⑨ ១/. ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រួញដែលចង្អុល។

២/. តើជាមីតូស ឬ មេយ៉ូស? ស្ថិតក្នុងវគ្គ ណា?

ចូរបញ្ជាក់អំនះអំណាច។

៣/. ចូរកំណត់ចំនួនក្រមួសូម និងចំនួន ក្រម៉ាទីតនៅប៉ូលនីមួយៗ។



១/. ដាក់ឈ្មោះ :

១: ខ្សែកាំ ២: សង់ទ្រីយ៉ូល ៣: អាស្មែរ ៤: សរសៃក្រមួសូម.

៥: សរសៃប៉ូល ៦: ត្រួយអាក្រម៉ាទីច

២/. ជាមីតូស ស្ថិតក្នុងអាណាផាស។ ពីព្រោះសង់ត្រូមែរនៃគ្រប់ក្រមួសូមនីមួយៗ ត្រូវបែកចេញពីគ្នាដែលធ្វើឱ្យក្រម៉ាទីតផ្តាច់ចេញពីគ្នាបង្កើតបានជាក្រមួសូមកូន២ក្រុម ដូចគ្នា គឺឌីប្លូអ៊ីតដែលរត់ឡើងប៉ូលរៀងៗខ្លួន។

៣/. នៅប៉ូលនីមួយៗ :

- ក្រូម៉ូសូមមាន ៣គូអូម៉ូឡូក គឺ $2n = 6$
- ក្រូម៉ូសូមមួយ មានក្រូម៉ាទីត ១ $\Rightarrow$ ចំនួនក្រូម៉ូសូម = ចំនួនក្រូម៉ាទីត = 6

⑩ ១/. ចូរដាក់រូបថតខាងក្រោមតាមលំដាប់ពេលវេលានៃដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់មីតូស

២/. ដោយចេញពីរូបភាពខាងក្រោម ចូរឱ្យនិយមន័យមីតូស ។



a



b



f



c



e



g



d

10 μ m



i



j



h

១/. រូបភាពតាមលំដាប់ពេលនៃមីតូស : d, i, c, b, a, g, h, j, e, f ។

២/. មីតូសជាចលនការដែលរ៉ាប់រងនូវរបាយក្រុមសូម ក្នុងកោសិកាកូនឱ្យដូចគ្នានឹង
កោសិកាមេ ។

* គូរដឹង : d: ចន្លោះវគ្គ. i : ចុងចន្លោះវគ្គ. c: ដើមប្រូជាស. b: ប្រូជាស.

a : ចុងប្រូជាស. g : មេតាជាស. h: ដើមអាណាជាស. j : ចុងអាណាជាស.

e : ដើមតេឡូជាស. f : ចុងតេឡូជាស (ចប់មីតូស) ។

① រូបខាងក្រោមបង្ហាញនូវខ្នាត ឬសខ្លឹមស ដែលសង្កេតដោយ មីក្រូសកម្ម


អុបទិច :

តើកោសិកា A, B

C, D ស្ថិតនៅក្នុង

វគ្គណាខ្លះនៃមីតូស?

ចូរបញ្ជាក់អំនះអំនាង ។



+ កោសិកា A : ស្ថិតក្នុងមេតាជាស ព្រោះក្រុមសូម បង្កើតជាបន្ទះអេក្វាទ័រ

+ កោសិកា B : ស្ថិតក្នុងតេឡូជាស ព្រោះក្រុមសូម ផ្គុំនៅប៉ូលសងខាង

+ កោសិកា C : ស្ថិតក្នុងប្រូជាស ព្រោះក្រុមសូមដើមសេច្ចបរាង ។

+ កោសិកា D : ស្ថិតក្នុងអាណាជាស ព្រោះក្រុមសូម បំលាស់ទីទៅកាន់ប៉ូលផ្ទុយគ្នា ។

1 2 ខាងក្រោម : ជាមីតូសនៃកោសិកាស្រូវខ្ចីមស ($2n = 16$) ។ តើរូប 1, 2, 3, 4, 5, 6, តាងវគ្គណាខ្លះ ?



១. អានាជាស

៤. មេតាជាស (មើលពីចំហៀង)

២. ប្រជាស

៥. តេទ្យជាស

៣. មេតាជាស : បន្ទះអេក្វាទ័រ
(មើលពីមុខ : ប៉ូល)

៦. ចប់អានាជាស

1 3 តើធាតុកោសិកាអ្វីដែលចូលរួម ក្នុងមីតូសកោសិកាសត្វមាននាទីដូចម្តេច?

+ គឺសង់ត្រូសូម

+ វាមាននាទីបង្កើតជាអាស្មែរហើយខ្សែកាំអាស្មែររួមជាមួយប្រូតូប្លាសបង្កើតបាន
ជាត្រួយអាក្រូម៉ាទីច ។

1 4 ចំពោះរុក្ខជាតិ តើមីតូសប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មនៅតំបន់ណាខ្លះ?

គឺនៅតំបន់មេជាសិកាកំពូលដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកចុងរិស និង ពន្លកដើម (រាប់រង
ការលូតលាស់ផ្នែកកំពស់) ។

ចំណាំ: មេជាសិកាបន្ទាប់ស្ថិតនៅក្នុងសំបកដើមរាប់រងការលូតលាស់ផ្នែកកំពស់នៃសរីរាង្គ ។

① ⑤ តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយកោសិកាចែកខ្លួនតាមមីតូស?

កត្តាដែលធ្វើឱ្យកោសិកាចែកខ្លួនតាមមីតូស :

+ ចំពោះសារពាង្គកាយពហុកោសិកា

- មានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់
- អរម៉ូនដែលផលិតពី : ក្រពេញភេទ ទីរូអ៊ីត អ៊ីប៉ូក្រីស មានអំពើមិន ផ្ទាល់ទៅលើ
មីតូស ។

+ ចំពោះសារពាង្គកាយឯកកោសិកា

- កត្តាផលច្រប $\frac{\text{មាឌឈ្នួល}}{\text{មាឌស៊ីតូប្លាស}}$ គឺក្នុងករណីដែលស៊ីតូប្លាស រីកចំពេកធ្វើឱ្យឈ្នួល
មិនអាចត្រួតពិនិត្យមាឌស៊ីតូប្លាសបានបណ្តាលឱ្យកោសិកាចែកខ្លួន ។

① ⑥ ក្នុងមីតូសក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងនៅពេលណា? បាត់ទៅវិញនៅពេលណា? ហេតុអ្វី?

- ក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងនៅ : ប្រជាសហើយបាត់ទៅវិញនៅ : តេឡូផាសពីព្រោះ :
 - នៅ ប្រជាស ក្រម៉ាទីនធ្វើស្ត្រេកម្មរុញខ្លីកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរហូតដល់ចុងប្រជាស
ដែលធ្វើឱ្យលេចរូបរាងជាក្រូម៉ូសូម ។
 - នៅតេឡូផាស ក្រូម៉ូសូមរលាស្ត្រេករក្សាជា ក្រម៉ាទីនវិញ ដែលធ្វើឱ្យតេមីលលែង
ឃើញ ។

១៧ ផលប្រយោជន៍ ស្វ័យតំណើងខ្លួននៃក្រូម៉ូសូម

អាចរក្សានូវទំរង់រូបរាងក្រូម៉ូសូមឱ្យនៅដដែលគ្រប់ចំណែកកោសិកាជាហេតុនាំឱ្យក្រុមក្រូម៉ូសូមនៃប្រភេទភាវសនីមួយៗដែលស្ថិតក្នុងស៊ីតូតអាចចំលងឡើង វិញយ៉ាងឡើងទាត់នូវទំរង់ពិសេសរបស់ខ្លួនទៅឱ្យកោសិកា លូតលាស់ទាំងឡាយនៃ សារពាង្គកាយ ។

១៨ តើមីតូសកោសិកាសត្វ និង កោសិកាក្រូជាតិ ខុសគ្នាដូចម្តេច ?

មីតូស

- មានកំណែអាស្តែ នៅប៉ូលទាំងសងខាង
នៃត្រួយ៉ុងអាត្រូម៉ាទិចព្រោះ
កោសិកាសត្វមានសង់ត្រូសូម
- នៅតេឡូផាស ចំណែកស៊ីតូប្លាសកើត
នៅត្រង់សន្ទុចកោសិកា
ចែកផ្តាច់ជាកោសិកាកូន២

មីតូសក្រូជាតិ

- គ្មានអាស្តែនៅប៉ូលទាំងសង
ខាងនៃត្រួយ៉ុងអាត្រូម៉ាទិចទេ
ព្រោះគ្មានសង់ត្រូសូម តែមាន
កន្លឹបប៉ូលលេចឡើង ។
- នៅតេឡូផាស ចំណែកស៊ីតូប្លាស
កើតឡើងដោយមានកំណត្តាស
សែលុយឡូស ត្រង់ ឬរង្វង់អេក្វាទ័រ
គឺមិនចែកផ្តាច់ចេញពីគ្នាទេ ។

សំគាល់ : កន្លឹបប៉ូលកើតពីការឡើងកំហាប់ នៃស៊ីតូប្លាសក្បែរណ្វៃ (cytoplasme périnucléaire) ។

① ⑨ តើមិត្តសមាននាទីដូចម្តេច?

- ចំពោះសារពាង្គកាយពហុកោសិកា (សត្វនិងរុក្ខជាតិ) មិត្តសធានាការលូតលាស់នៃសារពាង្គកាយ ហើយពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ មិត្តសមាននាទីបង្កើតកោសិកាថ្មីជំនួសកោសិកាចាស់ដែលស្លាប់បាត់បង់ ។
- ចំពោះសារពាង្គកាយឯកកោសិកា មិត្តសបង្កើតឯកក្តុះថ្មី និងបង្កើតចំនួនឯកក្តុះឱ្យបានច្រើន ។
- មិត្តសរ៉ាប់រងកំនើនកោសិកានិងតំហែរក្បាពត៌មានសេនេទិចឱ្យនៅដដែល ។

② ① ហេតុដូចម្តេចបានជាគេចាត់ទុកមិត្តសនៃសារពាង្គកាយឯកកោសិកាជាការបន្តពូជ?

ពីព្រោះមិត្តសនៃសារពាង្គកាយឯកកោសិកាបានបង្កើតកោសិកាកូនដែលជាឯកក្តុះថ្មី និងបង្កើនចំនួនឯកក្តុះកូនច្រើន ។

② ① ហេតុដូចម្តេចបានជាកោសិកាកូនមានចំនួន និងរូបរាងក្រមូសូមដូចកោសិកាមេក្រោយពីមិត្តស?

ពីព្រោះ:

- នៅវគ្គ S នៃចន្លោះវគ្គមានបាតុភូត ស្វ័យតំឡើងទ្វេនៃក្រមូសូម
- នៅអាណាជាស ក្រមូសូមទី១នៃក្រមូសូមនីមួយៗបែកពីគ្នាផ្តល់ជាក្រមូសូមកូន២ក្រុមដូចគ្នាបេះបិទ ហើយធ្វើរបាយស្មើគ្នានៅប៉ូលនីមួយៗនៃកោសិកា ។

២២ ព្រះម្សាងមាន $2n = 4$ ។

ក- ចាប់ពីស៊ីក្លូតមួយរហូតដល់ជាសារពាង្គកាយមួយ តើវាត្រូវប្រព្រឹត្តតាមរបៀបអ្វី ដើម្បីដុះដាល?

ខ- តើកោសិកាកូននីមួយៗ មានចំនួនក្រូម៉ូសូមប៉ុន្មាន?

គ- ហេតុអ្វីបានជាកោសិកានីមួយៗ មានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា?

ក- ដើម្បីដុះដាលលូតលាស់សារពាង្គកាយ ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មតាមរបៀបមីតូស ។

ខ- កោសិកាកូននីមួយៗ មានចំនួនក្រូម៉ូសូម $2n = 4$ គឺដូចកោសិកាមេ ។

គ- កោសិកានីមួយៗមានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា ពីព្រោះកោសិកាទាំងនេះជាលទ្ធផលដែល ស៊ីក្លូតធ្វើ មីតូស ជាបន្តបន្ទាប់ គឺនៅចន្លោះវគ្គ មានការស្វ័យតំលើងទ្វេនៃក្រូម៉ូសូម ហើយ នៅអាណាជាសមានរបាយក្រូម៉ូសូមស្មើគ្នានៅប៉ូលទាំងសងខាង ។

២៣ តើបាតុភូតសំខាន់ ២ ក្នុងមីតូសដែលរ៉ាប់រងចំនួន និង រូបរាងក្រូម៉ូសូមឱ្យនៅ ដដែលក្នុងកោសិកាកូនគឺអ្វីខ្លះ? ចូរបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់អ្នក ។

បាតុភូតសំខាន់ពីរក្នុងមីតូសគឺ :

- ការស្វ័យតំលើងទ្វេនៃក្រូម៉ូសូមនៅវគ្គ S នៃចន្លោះវគ្គ ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់រូបរាង ក្រូម៉ូសូមឱ្យនៅដដែល និងតំឡើងបរិមាណទ្វេនៃក្រូម៉ូសូម ។
- ការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រូម៉ាទីតទាំងពីរបស់ក្រូម៉ូសូមនីមួយៗ ដោយចល័តទៅរកប៉ូល ជួយគ្នានៃត្រឡប់អាត្រូម៉ាទីតនៅអាណាជាស ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ការបែងចែក ក្រូម៉ូសូម ដូចគ្នាបេះបិទក្នុងកោសិកាកូនទាំងពីរ ។

② ④ តើមិត្តសត្រូវកត់សំគាល់ដោយមានបំរែបំរួលអ្វី?

- តើបំរែបំរួលនេះចាប់ផ្តើមនៅក្នុងវគ្គណានៃមិត្តស? ហើយមានលក្ខណៈសំគាល់ដូចម្តេច?

- មិត្តសត្រូវកត់សំគាល់ដោយមានបំរែបំរួលណែនាំនៃកោសិកា ។
- បំរែបំរួលនេះចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រធាន ហើយសំគាល់ដោយណែនាំកើនមាឌ បន្ទាប់មក ក្លាស់ណែនាំ និងនុយក្លេអូលរលាយជាមួយស៊ីតូប្លាសបង្កើតជាប្រូតូប្លាស ។

② ⑤ ពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ តើកោសិកាណាខ្លះដែលនៅតែបន្តចែកខ្លួនតាមមិត្តស ហេតុអ្វី?

នៅពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ កោសិកានៅតែបន្តចែកខ្លួនតាមមិត្តស គឺជាកោសិកា នៅគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់ (លើកលែងតែ កោសិកាសាច់ដុំ កោសិកាក្រហម កោសិកា ប្រសាទ) ពីព្រោះកោសិកាទាំងនេះ មានកោសិកាខ្លះងាប់ ដូចនេះដើម្បីរក្សាលំនឹងចំនួន កោសិកា វាត្រូវតែចែកខ្លួនតាមមិត្តសបន្តទៀត ។


② ⑥ តើបាក់តេរីដែលជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាធ្វើចំណែកកោសិកាតាមមិត្តសឬទេ? តើកោសិកាកូននីមួយៗក្លាយជាអ្វី? តើគេចាត់ទុកមិត្តសដូចម្តេចដែរចំពោះបាក់តេរី?

- + បាក់តេរីក៏ធ្វើចំណែកកោសិកាតាម មិត្តសដែរ
- + កោសិកាកូននីមួយៗ ក្លាយជាសារពាង្គកាយថ្មីទៀត

+ ហេតុនេះគេចាត់ទុកមីតូស របស់បាក់តេរីជាការបន្តពូជដូច ។

សំណួរក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្រសួងអប់រំ :

១. ពន្យល់ពាក្យ : ក្រូម៉ាទីន, ក្រូម៉ាទីត, ក្រូម៉ូសូម, មីតូស, ការបន្តពូជដូច, សង់ត្រូមែរ, បន្ទះអេក្វាទ័រ, ពតិមានសេនេទិច ។
២. ចូរពណ៌នាពីវត្ថុនីមួយៗនៃដំណើរមីតូស ។
៣. ចូរប្រៀបធៀបមីតូសសត្វ និង មីតូសរុក្ខជាតិ ។
៤. ក្នុងចំណែកមីតូស បាតុភូតសំខាន់ពីរធ្វើឱ្យកោសិកាកូន និងកោសិកាមេ មានចំនួន និងរូបរាងក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា ។ តើបាតុភូតទាំងនោះជាអ្វី?
៥. កោសិកាមួយ មានចំនួនក្រូម៉ូសូម $4 (2n = 4)$ ។ ក្រូម៉ូសូមមានរូបរាងដូចបង្ហាញក្នុង (1) ។ ចូរគូររូបបង្ហាញដោយ ដាក់ចំណងជើងដែល បង្ហាញអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃមីតូសរបស់កោសិកានេះ ។



៦. សិស្សម្នាក់គូររូបតាងក្រូម៉ូសូមនៅប៉ូលនៃកោសិកាកំពុងធ្វើមីតូស ។ កោសិកានោះមានចំនួនក្រូម៉ូសូម 4 ។ តើសិស្សបានធ្វើកំហុសឆ្គងអ្វីខ្លះក្នុង រូបលេខ (2) ?




១. មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ ៩, ៨, ៣៩, ១, ២៦, ៥៥, ៣៦ ។
២. ពណ៌នាវត្ថុនីមួយៗនៃដំណើរមីតូស :
(មើលក្នុងមេរៀន "ដំណើរមីតូស") ។

៣. ប្រៀបធៀបមីតុសសត្វ និង រុក្ខជាតិ : មើលសំណួរទី (៩..១៣..៩.) ។

៤. បាតុភូតសំខាន់ពីរគឺ :

- ស្វ័យគំឡើងទ្វេ ក្រមួសូមនៅចន្លោះវត្ថុ ។
- ក្រមាំទិតទាំងពីរ នៃក្រមួសូមនីមួយៗ បែកគ្នា ហើយធ្វើដំណើរទៅប៉ូលផ្ទុយគ្នា ។

៥. រូបបំប្រែព្រវត្តទាំង ៤ របស់មីតុស :



៦. រូបនេះតំណាងឱ្យកោសិកាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាណាផាស (ក្រមួសូមនៅប៉ូលទាំងសងខាង កោសិកា) ។ កំហុសឆ្គងគឺ :

- ក្រមួសូមនីមួយៗ មានក្រមាំទិត ២ ។
- ប៉ូលម្ខាងៗ មានក្រមួសូមមិនស្មើគ្នាគឺម្ខាងមានតែ ៣ ៗម្ខាងទៀតមាន ៤ ។



② ⑦ + ដូចម្តេចដែលហៅថាការីយ៉ូទីប?

+ តើការសិក្សាពីការីយ៉ូទីប មានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ? ?

+ ការីយ៉ូទីប : មើលសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រទី១

+ សិក្សាពីការីយ៉ូទីប មានប្រយោជន៍ឱ្យដឹងថា :

- ចំនួនក្រូម៉ូសូម ជាចំនួនគូជានិច្ច
- ក្នុងប្រភេទតែមួយ ការីយ៉ូទីបថេរជានិច្ច ។ ពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយ ការីយ៉ូទីបខុសគ្នាជានិច្ច ដែលអាចអោយគេស្គាល់ពីប្រភេទនីមួយៗបាន
- ជាភេទញី ឬភេទឈ្មោលទៅតាមប្រភេទនីមួយៗនៃការីយ៉ូទីប ។
- មានជំងឺ ឬលក្ខណៈមិនធម្មតា ករណីការីយ៉ូទីបប្រែប្រួល ។

② ⑧ តើគេអាចស្គាល់ប្រភេទនីមួយៗ នៃការីយ៉ូទីបតាមរយៈការីយ៉ូទីបបានឬទេ ? ពីព្រោះអ្វី ? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផង ។

+ គេអាចស្គាល់ប្រភេទនីមួយៗនៃការីយ៉ូទីបតាមរយៈការីយ៉ូទីបបាន ពីព្រោះក្នុងប្រភេទតែមួយ ចំនួន និងរូបរាងក្រូម៉ូសូម (ការីយ៉ូទីប) ថេរជានិច្ចហើយវាខុសគ្នាជានិច្ចពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយ ។

ឧទាហរណ៍ : មនុស្ស $2n=46$ ខុសពីគោដែល $2n=60$ ។ ក្នុងករណីដែលប្រភេទផ្សេងគ្នាមានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា (ឧ.ដំឡូងបារាំង និងថ្នាំជក់ $2n = 48$) នោះរូបរាងក្រូម៉ូសូម ក្នុងកោសិកាប្រភេទទាំងពីរនោះក៏មិនដូចគ្នាដែរ ។

② ⑨ ចូរសរសេររូបមន្ត ការីយ៉ូទីប

- មនុស្សស្រី និង ប្រុស ($2n = 46$)
- មាន់ញី និង ឈ្មោល ($2n = 32$)

- ការីយ៉ូទីបមនុស្សស្រី : 44 អូតូសូម + XX
- ការីយ៉ូទីបមនុស្សប្រុស : 44 អូតូសូម + XY
- មាន់ញី : 30 អូតូសូម + XY
- មាន់ឈ្មោល : 30 អូតូសូម + XX

③ ① ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា អេត្រូក្រូម៉ូសូម?

ខ. តើសត្វណាខ្លះដែលការីយ៉ូទីប សត្វញីឈ្មោល មានអេត្រូក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា និង ខុសគ្នាពីការីយ៉ូទីបរបស់មនុស្ស ?

ក. អេត្រូក្រូម៉ូសូម : មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ 65

ខ. សត្វញីឈ្មោលដែលមានអេត្រូក្រូម៉ូសូមដូចមនុស្ស គឺ :

ថនិកសត្វ ល្អិត កង្កែប សត្វល្អិតស្លាបពីរ :

- សត្វញី : XX សត្វឈ្មោល : XY

• សត្វញីឈ្មោលដែលមានអេត្រូក្រូម៉ូសូម ខុសពីមនុស្ស :

បក្សី ត្រីមួយចំនួន មេអំបៅ ទ្រីតុង :

- សត្វញី : XY សត្វឈ្មោល : XX

③ ① ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា ក្រមួសូមឌីប្យូអ៊ីត? ក្រមួសូមអាប្យូអ៊ីត?

ខ. កោសិកាដែលផ្ទុកក្រមួសូមឌីប្យូអ៊ីតនិងអាប្យូអ៊ីតហៅថា កោសិកាអ្វី?

គ. តើចំនួន ឌីប្យូអ៊ីត នៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា កើនឡើងទៅតាមទំហំ (មាឌ) និងកំរិតវិវត្តនៃការរស់រវើកទេ?

ក.- ក្រមួសូមឌីប្យូអ៊ីត និងក្រមួសូមអាប្យូអ៊ីត : ស្បែកកោដ្យូលពាក្យទំព័រ 8

ខ.- កោសិកាដែលផ្ទុកក្រមួសូម ឌីប្យូអ៊ីត ហៅថា កោសិកា ឌីប្យូអ៊ីត

• កោសិកាដែលផ្ទុកក្រមួសូម អាប្យូអ៊ីត ហៅថា កោសិកា អាប្យូអ៊ីត

គ. ចំនួន ឌីប្យូអ៊ីតក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា មិនកើនឡើងទៅតាមទំហំ(មាឌ) និង កំរិតវិវត្តន៍ នៃការរស់រវើក ពីព្រោះវាជាចំនួនថេរជានិច្ច ដែលលក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទ ការរស់រវើក ។

សំគាល់ : ភាពខុសគ្នា និងទំនាក់ទំនងរវាងក្រមួសូម ឌីប្យូអ៊ីត និងអាប្យូអ៊ីត (ស្មើមើលមេរៀនមេរៀន)

③ ② ចំពោះមនុស្ស : $2n = 46$ ។

ក. តើក្នុងកោសិកាលូតលាស់ មានក្រមួសូមភេទឬទេ?

ខ. រវាងមនុស្សស្រី និងមនុស្សប្រុស តើមានក្រមួសូមដូចគ្នាប៉ុន្មានគូ? តើហៅថាអ្វី ហើយខុសគ្នាប៉ុន្មានគូ? តើហៅថាអ្វីដែរ?

ក. ក្នុងកោសិកាលូតលាស់ មានក្រមួសូមភេទ 1 គូជានិច្ច ។

ខ. រវាងមនុស្សប្រុស និងស្រី :

- ក្រមួសូម ដែលដូចគ្នាមាន 22 គូ ហៅថា " អូតូសូម " ឬ " ក្រមួសូមធម្មតា " ។

-ក្រមួស្មមដែលខុសគ្នាមាន ១គូ ហៅថា អេតេរូស្មម (អេតេរូក្រមួស្មម) ឬ ក្រមួស្មមភេទ ឬ កូណូស្មម ។

③ ③ ហេតុដូចម្តេច បានជាគេចាត់ចំនួន និងរូបរាងក្រមួស្មមជា លក្ខណៈពិសេស នៃ ប្រភេទការវស់?

ពីព្រោះ តាមរយៈចំនួន និង រូបរាងក្រមួស្មម គេអាចស្គាល់ប្រភេទការវស់ នីមួយៗ បាន គឺក្នុងប្រភេទតែមួយ ចំនួន និងរូបរាងក្រមួស្មមដូចគ្នាជានិច្ចហើយ ប្រភេទផ្សេងគ្នា តែងតែមានចំនួននិងរូបរាងក្រមួស្មមខុសគ្នាជានិច្ច ។ ករណីដែលការវស់ខ្លះមានចំនួន ក្រមួស្មម ដូចគ្នា ក៏រូបរាងក្រមួស្មមខុសគ្នាដែរ ។

③ ④ តើគេធ្វើការវិជ្ជាទីបនៅវគ្គណានៃមីតូស ? ហេតុអ្វី?

គេធ្វើការវិជ្ជាទីបនៅ មេតាផាស ព្រោះក្នុងវគ្គនេះ ក្រមួស្មមលេចរូបរាងល្អ ^{ជ្រាស់}
(ក្រមួស្មមរូបរាងល្អជាអតិបរិមា) ធ្វើឱ្យគេអាចពណ៌នារូបរាង និង រាប់ចំនួនក្រមួស្មមរបស់ ប្រភេទនីមួយៗបានយ៉ាងងាយ ។

③ ⑤ ក្នុងការធ្វើការវិជ្ជាទីប ហេតុអ្វីបានជាគេប្រើ កុលស៊ីស៊ីន?

ពីព្រោះវាជាសារធាតុគីមីដែលរំលាយ ឬបង្អាក់មិនឱ្យមានកំនត្រយ៉ាងអាត្រម៉ាទីច។ ដូច្នេះក្រមួស្មមដែលផ្គុំត្រង់ឬរាងអេក្វាទ័រនៅមេតាផាសមិនអាចរត់ឡើងប៉ូលរៀង ខ្លួនទេ ជាហេតុអាចឱ្យគេថតយក បន្ទះអេក្វាទ័រដែលជាសំនុំក្រមួស្មមមានរូបរាងនិងចំនួនច្បាស់ លាស់សំរាប់ធ្វើការវិជ្ជាទីប ។

③ ⑥ ចំពោះកោសិកា ឌីប្លូអ៊ីត និងទ្រីប្លូអ៊ីត តើមួយៗមាន ក្រុមអាប្លូអ៊ីត ប៉ុន្មាន ក្រុម? តើកោសិកានីមួយៗ មានក្រូម៉ូសូមខុសៗគ្នាប៉ុន្មានបែប? ចូរឱ្យ ឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់?


- ចំពោះកោសិកា ឌីប្លូអ៊ីត មួយៗមានក្រុម អាប្លូអ៊ីត ២ក្រុម ។
- ចំពោះកោសិកា ទ្រីប្លូអ៊ីត មួយៗ មានក្រុមអាប្លូអ៊ីត ៣ក្រុម ។
- កោសិកានីមួយៗ មានក្រូម៉ូសូម n បែបខុសគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ : មនុស្ស $2n = 46 \rightarrow n = 23$

ដូច្នេះក្នុងកោសិកាមួយនេះ មានក្រូម៉ូសូម ២៣ បែបខុសគ្នា ។

③ ⑦ ខាងក្រោមជាក្រុមក្រូម៉ូសូមនៃកោសិកាពីរបស់សត្វករកេរពីរក្នុងប្រភេទតែមួយ ។

១. តើទីដ្ឋភាពក្រូម៉ូសូមទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងវគ្គណានៃវដ្តកោសិកា? ចូរបញ្ជាក់ អំនះអំណាច?
២. ចូរវិភាគដោយដាក់លាក់នូវការវិវឌ្ឍទីបទាំងពីរនេះ? (បញ្ជាក់ពីចំនួនក្រូម៉ូ សូម និង ភាពខុសគ្នានៃក្រូម៉ូសូមក្នុង កោសិកាទាំងពីរ)
៣. កំណត់ភេទញីឈ្មោសរបស់សត្វទាំង ២ ដោយបញ្ជាក់ អំណះអំណាច?



១) ទិដ្ឋភាពក្រូម៉ូសូមទាំងនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងមេតាផាស ពីព្រោះក្រូម៉ូសូមនីមួយៗបង្ក ឡើង ដោយក្រម៉ាទីន រួញខ្លីភ្ជាប់ដោយសង់ត្រូមែរ លេចចេញច្បាស់ ដែលអាច ឱ្យគេធ្វើ ការវិវិទ្យាបាន ។

២) ការវិវិទ្យាមាន២២ក្រូម៉ូសូមដែលផ្គុំជាគូៗ ។ ដូច្នេះវាស្ថិតក្នុងកោសិកាឈាមរបស់យើងដោយ មានរូបមន្តក្រូម៉ូសូម $2n = 22$ ។


- រូបក្នុងកោសិកា A បន្ទាត់ទី 1 ខាងស្តាំមាន ក្រូម៉ូសូម 1 គូដែលមានរូបរាង ខុសគ្នា (XY) ។
- រូបក្នុងកោសិកា B បន្ទាត់ទី 1 ខាងស្តាំមាន ក្រូម៉ូសូម 1 គូដែលមានរូបរាងដូចគ្នា (XX)
- យើងឃើញថារវាងកោសិកា A និង B មានក្រូម៉ូសូម 1 គូនេះ ខុសគ្នា ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា វាជា ក្រូម៉ូសូមភេទ (អេតេរូក្រូម៉ូសូម) ។

៣) សត្វករកោរ ស្ថិតក្នុងថ្នាក់មិនកសត្ត ដូច្នេះកោសិកា A គូក្រូម៉ូសូមភេទមានរាងខុសគ្នា គឺជាកោសិកាសត្វឈ្មោល ឯកោសិកា B ដែលមានក្រូម៉ូសូមភេទដូចគ្នាគឺជាកោសិកាសត្វញី ។

③ ⑧ ក្រម៉ាទីននៅចន្លោះវគ្គពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រូនិចច្រើនប្រភេទខ្សោយ តើវា មានទិដ្ឋភាពបែបណា? ករណីពង្រីកកម្រិតខ្លាំង តើវាមានទិដ្ឋភាពដូចម្តេច?

- + ករណីពង្រីកខ្សោយ ក្រម៉ាទីន មានទិដ្ឋភាពជាគ្រាប់ៗ (រូបលេខ១)
- + ករណីពង្រីកខ្លាំង វាមានទិដ្ឋភាពជាបណ្តាញសរសៃ ហើយរាងបែងជាគ្រាប់ៗប្រទាក់ បន្តគ្នាមានសភាព ដូចខ្សែកគ្រាប់គុជ (រូប២) ។ គ្រាប់គុជមួយជា នុយក្លេអូសូម (អង្គត់ជួត : 10nm) ។ ធាតុបង្កនុយក្លេអូសូម ជាម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន អ៊ីស្តូន (histone) និង ADN ។ ADN រុំពីលើប្រូតេអ៊ីន នីមួយៗ ពីររង្វង់ ហើយតភ្ជាប់គ្នាពី

ប្រូតេអ៊ីន មួយទៅប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតបង្កើតជា នុយក្លេអូតី ឡាម៉ង់ មានរាងស៊ីឡាំង អង្កត់ផ្ចិត 10nm (រូប.3) ដូច្នេះនុយក្លេអូតីឡាម៉ង់ នេះហើយជាក្រូម៉ាទីន នៅចន្លោះវត្ថុ ។




- ③ ក. ក្រូម៉ូសូមនៅចន្លោះវត្ថុហៅថាអ្វី? តើវាបង្កឡើងពីអ្វីខ្លះ ?
- ខ. ហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចមើល ឃើញក្រូម៉ូសូមនៅចន្លោះវត្ថុ?

ក. ក្រូម៉ូសូមនៅចន្លោះវត្ថុហៅថា ក្រូម៉ាទីន (នុយក្លេអូតីឡាម៉ង់) ។ វាបង្កឡើង ពីADNដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញប្រូតេអ៊ីនពីរៗដុំ ហើយតភ្ជាប់ពីប្រូតេអ៊ីនមួយទៅប្រូតេអ៊ីនមួយ

ខ. គេមិនអាចមើលឃើញក្រូម៉ូសូមនៅចន្លោះវត្ថុ ពីព្រោះវាជាក្រូម៉ាទីន (ឬ នុយក្លេអូតីឡាម៉ង់) រលាដែលមិនទាន់រុំជាស្មៅ ។

៤ ① តើនៅមេតាផាស ក្រមួសមានទំរង់ដូចម្តេច?



នៅមេតាផាស ក្រមួសម បង្កឡើងពីក្រមាំទី២ ភ្ជាប់គ្នាដោយសង់ត្រមែ ។ ក្រមាំទី៣នីមួយៗជា ក្រមាំទី៣ ដែលរុញខ្លី ជាអតិបរិមា (ស្បែកក្រមួសនៃ នុយក្លេអូភីឡាម៉ង់ តាំងពីប្រផាស) ។ ហេតុនេះ

ហើយទើប ក្រមួសម នៅមេតាផាសមានរូបរាងយ៉ាងច្បាស់ល្អ ។

៤ ① តើជីវិតកោសិកា ប្រព្រឹត្តទៅដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំៗប៉ុន្មាន? តើដំណាក់ កាលទាំងនេះបង្កើតបានជាប៉ុន្មាន វដ្តកោសិកា? ហើយត្រូវនឹងមីតូសប៉ុន្មានដង?

+ ជីវិតកោសិកា ប្រព្រឹត្តទៅដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំៗពីរគឺ :

- ចន្លោះវគ្គ និងមីតូស

+ ដំណាក់កាលទាំង ២នេះ បង្កើតបានជាមួយវដ្តកោសិកាហើយត្រូវ នឹងមីតូស ៤ដង

៤ ② តើក្រមួសម ជាធាតុអចិន្ត្រៃយ៍របស់កោសិកា តើពិតឬទេ? ចូរបញ្ជាក់ការ អះអាងរបស់អ្នក ។

ជាការពិត ។ ពីព្រោះក្នុងចន្លោះវគ្គ និងវគ្គមីតូសនៃវដ្តកោសិកានីមួយៗមាន វគ្គមានក្រមួសមជានិច្ច គ្រាន់តែវាស្ថិតនៅក្រោមទំរង់ខុសគ្នា :

- ចន្លោះវគ្គ : ក្រមួសម ជាក្រមាំទី៣ ឬនុយក្លេអូភីឡាម៉ង់ រលា ចូនមួយសរសៃ ចូន២សរសៃ ដោយការស្លៀងត់ឡើងទ្វេ ។

- **វគ្គបីតួស** : ក្រុមសូម ជាក្រុមទីនិរុញ្ញឌី លេចជារូបរាងផ្សេងៗ ចូន មានក្រុមទីតមួយ ចូនក្រុមទី២ ។

④ ③ ចូរបង្ហាញពីការវិវត្តន៍ នៃរូបរាង និងទំរង់ក្រុមសូមក្នុងវដ្ត កោសិកា

វិវត្តរូបរាង និងទំរង់ក្រុមសូមក្នុងវដ្តកោសិកា :


*** បញ្ជីវគ្គ :**

- **វគ្គ G₁** : ភីឡាម៉ង់រណា ដោយមិនទាន់ស្វ័យតំឡើងទេ ។
- **វគ្គ S** : នុយក្លេអូភីឡាម៉ង់ ដែលរណា តំឡើងទេ ប្រកបដោយភ្នែក ស្វ័យតំឡើងទេជាច្រើន ។
- **វគ្គ G₂** : នុយក្លេអូភីឡាម៉ង់នីមួយៗបង្កើតបានក្រុមទី២ សរសៃ ភ្ជាប់ ដោយសង់ត្រូមែរ ។

*** វគ្គបីតួស :**

- **ប្រដាប់** : នុយក្លេអូភីឡាម៉ង់ រុញ្ញឌីដោយរងស្បៀរកម្ម បង្កើតបានជា ក្រុមសូម ដែលមានក្រុមទីពីរ ។
- **រេតាដាស** : ស្បៀរកម្មប្រព្រឹត្តទៅជា អតិបរមា ធ្វើឱ្យ ក្រុមសូម លេចរូប រាងច្បាស់ជាងវគ្គផ្សេងៗ ។ ក្រុមសូម ១ មាន ក្រុមទី ២ ២ ។
- **អាណាដាស** : សង់ត្រូមែរ នៃក្រុមសូមបែកជាពីរ ធ្វើឱ្យក្រុមទី២ទាំង២ បែកចេញពីគ្នា បង្កើតជាក្រុមសូមក្នុងពីរ ដែលក្រុមសូម កូននីមួយៗ មាន ក្រុមទី២តែមួយ ។

- វត្តមាន : ក្រមួសមកនីមួយៗ ត្រូវបានរូបរាងទៅវិញ ដោយសារ
ការលាស្បែកនៃ ឧបករណ៍ភូមិសាស្ត្រ ។



④ ④ + ទំរង់ក្រមួសមកនីមួយៗនឹងទទួលបានក្នុងរង្វង់កោសិកា ។ តើអ្វីជាបុព្វហេតុនៃបំណាស់ទំរង់នេះ
+ តើសារធាតុបង្កើននៃក្រមួសមក មានអ្វីខ្លះ?

+ បុព្វហេតុនៃបំណាស់ទំរង់ក្រមួសមកក្នុងរង្វង់ កោសិកា គឺការរុះរាស្បែក និងរលា
ស្បែក នៃក្រមួសមក ។

- ធាតុបង្កើននៃ ក្រមួសមក មាន ADN និង ប្រូតេអ៊ីន ។

4 5 ក្នុងវគ្គនីមួយៗ តើក្រមួសូមនីមួយៗមាន ក្រម៉ាទីតចំនួន ប៉ុន្មាន ?

+ ប្រធាន : ក្រមួសូមមួយ មានក្រម៉ាទីត 2

+ មេតាធាន : ក្រមួសូមមួយ មានក្រម៉ាទីត 2

+ អាធានាធាន : ក្រមួសូមមួយ មានក្រម៉ាទីត 1

+ គេន្ទ្រធាន : ក្រមួសូមមួយ មានក្រម៉ាទីត 1

4 6 ក្នុងសារពាង្គកាយពហុកោសិកា តើកោសិកាណាដែលចែកខ្លួន តាមមីតូស ?

- គឺ កោសិកាសត្វលាស់នៃសរីរាង្គ របស់សារពាង្គកាយ និងកោសិកាពូជនៅក្នុង ក្រពេញភេទ ដែលចែកខ្លួនតាម មីតូស ។

4 7 តើចំនួន និងរូបរាងក្រមួសូមក្នុងកោសិកាសត្វលាស់ត្រូវបាន ចំណងយ៉ាងត្រឹម ត្រូវពីក្រមួសូមរបស់ស៊ីតូតដោយសារចលនាការអ្វី? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាងរបស់អ្នក?

ដោយសារចលនាការមីតូស ពីព្រោះ មីតូសជាចលនាការដែលធានាលំនឹងនៃ ចំនួន និងរូបរាងក្រមួសូម ក្នុងកោសិកាកូនឱ្យនៅដដែលដូចកោសិកាមេ ។

4 8 ក. ចំពោះ សេនេទិច តើគេចាត់ទុកក្រមួសូមជារូបធាតុអ្វី ? តើវាមានមូលដ្ឋាន រូបធាតុនៅឯណា?

ខ. តើលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រមួសូម ចំពោះប្រភេទការវាស់នីមួយៗ គឺអ្វីខ្លះ?

ក. គេចាត់ទុកក្រមួសូម ជារូបធាតុតំនពូជ ។

វាមានមូលដ្ឋានរូបធាតុ ស្ថិតនៅ ក្នុងឈ្មួញ នៃកោសិកា ។

ខ. លក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រូម៉ូសូម ចំពោះប្រភេទ ភាវសន្ធិមួយៗ គឺចំនួន និងរូបរាង នៃក្រូម៉ូសូម (ការីយ៉ូទីប) ។

④ ⑨ តើក្រូម៉ូសូម មាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

ក្រូម៉ូសូម មាននាទីកំណត់លក្ខណៈតូចៗ របស់ភាវសន្ធិ គឺក្រូម៉ូសូមមានផ្ទុកព័ត៌មាន សេនេទិច ដែលចាំបាច់សំរាប់ការសាងសង់លក្ខណៈ សារពាង្គកាយ ។ ដូចនេះក្រូម៉ូសូម ជាទំរពព័ត៌មានសេនេទិច ។

⑤ ① តើតេរីនីមួយទៅលើអ្វីខ្លះ ដើម្បីកំណត់ភាវសន្ធិនៅក្នុង ប្រភេទតែមួយ?

តេរីនីមួយនៅលើលក្ខណៈបីយ៉ាង :

- ការីយ៉ូទីបដូចគ្នា
- លក្ខណៈរូបរាងដូចគ្នា
- អាចបង្កាត់គ្នាបាន ហើយកូនដែលកើតមក មានលទ្ធភាព នឹងបង្កើតកូន បានទៀត

⑤ ① ចូរបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបពីលក្ខណៈខុសគ្នា នៃក្រម៉ាទីន និង ក្រូម៉ូសូម ។

ជា

- ក្រម៉ាទីន៖ ជានុយក្លេអូភីឡាម៉ង់រណា ដែលមានសភាពខ្សែកត្រាប់តូចៗ ។ វាគ្មានរូបរាង ច្បាស់លាស់ទេ គឺជាបណ្តាញសរសៃ ។ វាអាចតំឡើងទ្វេនៅវគ្គ S នៃចន្លោះវគ្គ ហើយ អាចរុំជាស្បែក និងរណស្បែកវិញ នៅពេលមីតូស ។

- ក្រមួសូម : ជានុយក្លេអុក្លីឡាម៉ង់ ដែលរុញខ្លី ។ វារងស្បៀរកម្មជាអតិបរមា។ នៅមេតាផាស វាមានរូបរាងច្បាស់លាស់ជាអក្សរ V រាងដំបង ឬ ចំនុច៣ ក្រមួសូម បង្កដោយក្រម៉ាទីត២ ឬ មួយទៅតាមវ៉ត្លនីមួយៗនៃមីតូស ។


សំណួរស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអង្គ

១. ពន្យល់ពាក្យ : ក្រមួសូមអុម្ពិឡូក កោសិកាអាបូអ៊ីត កោសិកាឌីបូអ៊ីត អេឡេក្រូមួសូម អូតូសូម ការីយ៉ូទីប វដ្តកោសិកា ចន្លោះវដ្ត នុយក្លេអុក្លីឡាម៉ង់ នុយក្លេអូសូម ។

២. ហេតុអ្វីបានជា ក្រមួសូម មិនលេចរូបរាងនៅចន្លោះវដ្ត ?

៣. រូបភាព (១) បង្ហាញពីក្រមួសូម នៅក្នុងកោសិកា ជ្រូសូ ក្លីលញី និងឈ្មោល ។

ក. ចូរពិនិត្យទិដ្ឋភាពក្រមួសូម និងកំណត់ចំនួនក្រមួសូមក្នុង កោសិកា ជ្រូសូ ក្លីលញីនិងឈ្មោល ។




ខ. តើកោសិកាទាំងនេះ ជាកោសិកា អាបូអ៊ីត ឬ ឌីបូអ៊ីត? ហេតុអ្វី?

គ. ចូរធ្វើចំណែកថ្នាក់ក្រមួសូមទាំងនេះ ?

៤. រូបភាព (២) បង្ហាញពីការីយ៉ូទីបរបស់មនុស្ស ប្រុសដែលមានជំងឺម្យ៉ាង (ឯកត្តៈ មានទិដ្ឋភាពជាមនុស្សស្រី គ្មានពុកមាត់ ពងស្វាសមិនលូតលាស់ ហើយអារ) ។

ក. ចូរវិភាគការីយ៉ូទីប ដោយបញ្ជាក់ថា ហេតុដូចម្តេចបានជាគេថា ការីយ៉ូ ទីប នេះជារបស់មនុស្សប្រុស?

ខ. តើការិយ្យទីបនេះមានអ្វីខុសប្លែកពី
ធម្មតា? តើអ្នកអាចទាញយកសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
អំពីបុព្វហេតុនៃជំងឺរបស់ជននេះបានទេ?



ចំណើន

១. ពន្យល់ពាក្យ : មើលសៀវភៅពន្យល់ពាក្យ ទំព័រ ៨.៦.៦៥.៦៨.៣.៤៧.១៣.២៤ ។
២. ពីព្រោះវាជាបណ្តាញ ក្រមាទិន ដែលជាភិទ្យាម័ងគ្នា មិនទាន់រុំជាស្បែក (មិនទាន់រង
ស្បែកកម្ម) ។
៣. ក. - ទិដ្ឋភាពក្រមូសូម : ជាក្រមូសូម មានរូបរាងច្បាស់នៅមេតាផាស :

- អូតូសូមរាងជាអក្សរ V : 2 គូ
- អូតូសូមរាងចំនុច : 1 គូ
- អេតេរូសូម : 1 គូ : ញី XX និង ឈ្មោល XY ។
- + ចំនួនក្រមូសូម : $2n = 8$

ញី = ៦ អូតូសូម + XX និង ឈ្មោល ៦ អូតូសូម + XY

ខ. ជាកោសិកាឌីប្លូអ៊ីត ពីព្រោះវាមានរូបរាងដូចគ្នាពីរៗ ។

គ.

ប្រូសូភីល	១	VV	VV	..	II
ប្រូសូភីល	២	VV	VV	..	II

៤. ក. វិភាគការិយ្យទីប : ជាការិយ្យទីបរបស់មនុស្សប្រុស ពីព្រោះមានក្រមូសូម Y ។

ខ. ការិយ័ទីបនេះ មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីធម្មតាគឺ $2n = 47$ ។ ពីព្រោះ

ការិយ័ទីបនេះ មានក្រូម៉ូសូមភេទដល់ទៅ ៣គឺ XXY (ប្រុសធម្មតា XY) ។

បុព្វហេតុនៃជំងឺរបស់ជននោះ គឺបណ្តាលមកពីមានក្រូម៉ូសូមភេទដល់ទៅបី គឺ XXY ។

សំគាល់ : ករណីបើសិស្សរៀនដល់មេឃ្វិស អាចមានសំនួរ សួរថា : បុព្វហេតុអ្វីដែល
នាំឱ្យមនុស្សប្រុសមានក្រូម៉ូសូម ភេទ XXY (បុព្វហេតុនាំកើតជំងឺនេះ)

ចម្លើយ : បណ្តាលមកពីនៅពេលមេឃ្វិស ក្នុងកំនរអូវុល គូក្រូម៉ូសូមអូម៉ូ ឡូក
 XX មិនផ្តាច់ចេញពីគ្នាទេ ហេតុនេះគេបានអូវុលម្យ៉ាង ដែលមានក្រូម៉ូសូមភេទ X
ដល់ទៅ ២ ។ នៅពេលដែលស្ពែរម៉ាតូសូអ៊ីត Y ជួបបង្កកំនើត ជាមួយអូវុល (XX)
វាផ្តល់ជាស៊ីកូតដែលមាន ក្រូម៉ូសូមភេទ ដល់ទៅបីគឺ (XXY) ។



មេរៀនទី ១ :

មេយ៉ូស Meiose

១២ ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា មេយ៉ូស ?

ខ. ចូរបង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងមេយ៉ូស និងមីតូស ។

គ. មេយ៉ូស : ជាចំណែកកោសិកា ២ដងបន្តបន្ទាប់ដែលកោសិកាឌីប្លូអ៊ីតមេមួយ បង្កើតបានជាកោសិកាអាប្លូអ៊ីតកូន ៤ ។

ខ. លក្ខណៈខុសគ្នា :

មេយ៉ូស

- ចំណែកកោសិកា 2 ដង បន្តបន្ទាប់តែ ការតំឡើងទ្វេនៃត្រូម៉ូសូមមានតែម្តង
- ជាចំណែក កោសិកាភេទ ធានានូវ កំណែមេត
- ចំនួនត្រូម៉ូសូម 2n បន្ថយមកនៅពាក់ កណ្តាល គឺចំនួន n
- នៅប្រូផាស (អាចមានបាតុភូតត្រូស៊ីញូអូរី
- មានការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃ ត្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូក
- កោសិកាមេមួយ (2n) បង្កើតបាន កោសិកា កូន 4 (n)

មីតូស

- ចំនែកកោសិកាតែ 1 ដង ៦ ការតំឡើង ទ្វេនៃត្រូម៉ូសូមមានតែម្តងដែរ
- ចំណែកកោសិកា លូតលាស់ធានាការ លូតលាស់សារពាង្គកាយ
- ចំនួនត្រូម៉ូសូម 2n រក្សានៅដដែល គឺ គ្មានការបន្ថយទេ
- គ្មានបាតុភូតត្រូស៊ីញូ អូរីទេ
- គ្មានការផ្តាច់ចេញពីគ្នា នៃត្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូកទេ ។
- កោសិកាមេមួយ (2n) បង្កើតបាន កោសិកាកូន 2 (2n) ។

៥៣ តើហេតុការណ៍ ដែលកើតឡើងរវាងប្រជាស I នៃមេឃ្លូស និង ប្រជាសនៃមីតូស ខុសគ្នាដូចម្តេច?

ប្រជាស I

- មានបណ្តុំគ្នាពីរៗនៃគូ ក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ប្រេបណ្តោយ (តេត្រាត) ។
- អាចមានបាតុភូត ត្រូស៊ីញូអូរី

ប្រជាស

- គ្មានភាពផ្គុំគ្នាពីរៗនៃ គូក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកប្រេបណ្តោយទេ (គ្មានតេត្រាត)
- គ្មានបាតុភូត ត្រូស៊ីញូអូរីទេ ។

៥៤ តើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរវាងអាណាផាស I និងអាណា ផាស II នៃមេឃ្លូស ខុសគ្នាដូចម្តេច?

អាណាផាស I

- មានការផ្តាច់ចេញពីគ្នា នៃគូក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ទៅកាន់ប៉ូលផ្ទុយគ្នា គឺជា n ក្រូម៉ូសូម ដែលប្រេបណ្តោយ ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រូមែរទេ ។
- មានការបន្ថយក្រូម៉ូសូមពី $2n$ ទៅ n

អាណាផាស II

- n ក្រូម៉ូសូមដែលប្រេបណ្តោយ ធ្វើចំណែកសង់ត្រូមែរនាំឱ្យត្រូម៉ាទីតបងប្អូន ទាំង 2 ផ្តាច់ចេញពីគ្នា បង្កើតជា n ក្រូម៉ូសូមកូន ២ ក្រុមរត់ឡើងប៉ូលផ្ទុយគ្នា ។
- រក្សាក្រូម៉ូសូម ឱ្យនៅ n ដដែល ។

៥៥ តើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរវាងអាណាសផាស I នៃមេឃ្លូស និងអាណាផាស មីតូស ខុសគ្នាដូចម្តេច?

អាណាឆ័រស I

- មានការផ្លាចចេញពីគ្នា នៃគូក្រមួសូម អូម៉ូឡូក នៅកាន់ប៉ូលផ្ទុយគ្នា គឺជា n ក្រមួសូម ដែលប្រេះបណ្តោយដោយគ្មាន ធ្វើចំណែកសង់ត្រូមែរទេ ។
- បន្ថយក្រមួសូមពី $2n \rightarrow n$

អាណាឆ័រស

- គ្មានការផ្លាចចេញពីគ្នា នៃគូក្រមួសូម អូម៉ូឡូកទេ ប៉ុន្តែក្រមួសូម នីមួយៗធ្វើ ចំណែក សង់ត្រូមែរ នាំឱ្យ ក្រម៉ាទីត បងប្អូន ផ្តាច់ចេញពីគ្នា បង្កើតជាក្រមួសូម 2 ក្រុម ដូចគ្នា តែទៅប៉ូលផ្ទុយគ្នា
- រក្សាក្រមួសូម $2n$ ឱ្យនៅដដែល ។

5 6 តើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើង រវាងមេតាផាស I និង មេតា ផាសមីតូសខុសគ្នា ដូចម្តេចខ្លះ?


មេតាផាស I

- គូក្រមួសូម អូម៉ូឡូក ដែលប្រេះបណ្តោយ (តេត្រាត) ផ្គុំត្រង់ប្លង់ អេក្វាទ័រ ។ សង់ត្រូមែរនីមួយៗ ស្ថិត នៅសងខាងប្លង់ អេក្វាទ័រ (គឺក្រមួសូម 1 គូតោងលើ សរសៃក្រមួសូមតែ 1)

មេតាផាស

- គូក្រមួសូម អូម៉ូឡូក ដែលប្រេះ បណ្តោយ មិនផ្គុំជា តេត្រាតទេ គឺសង់ ត្រូមែរនៃ ក្រមួសូម 1 ភ្ជាប់ នឹងសរសៃ ក្រមួសូមតែ មួយត្រង់ប្លង់អេក្វាទ័រ ។

- 5 7 ១.** ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រំព្យាបាលដែលចង្អុល ។
២. តើជាមីតូស ឬមេយ៉ូស? ស្ថិតក្នុងវគ្គណា? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង ។
៣. កំណត់ចំនួនក្រមួសូម និងក្រម៉ាទីត នៅ ប៉ូលនីមួយៗ



១. ដាក់ឈ្មោះ :

- ១ : ខ្សែកាំ ២ : សង់ទ្រីយ៉ូល ៣ : អាស៊ែរ ៤ : សរសៃក្រមួសូម
 ៥ : សរសៃប៉ូល ៦ : ត្រយ៉ុងអាត្រូម៉ាទីច, ៧. ក្រមួសូមអាបូអ៊ីត ក្រុម
 ២. គឺជាមេយ៉ូស ស្ថិតក្នុងអាណាផាស II ពីព្រោះជាវគ្គដែលសង់ត្រូមែរចែកជា ២ ធ្វើឱ្យ n
 ក្រមួសូម មានក្រម៉ាទីតតែមួយៗរត់ឡើងប៉ូលរៀងខ្លួន (វគ្គ ក្បា n ក្រមួសូមដដែល) ។
 ៣. នៅប៉ូលនីមួយៗ មានក្រមួសូម ៣ ដែលមានរូបរាងខុសគ្នាទាំងអស់ $\Rightarrow n=3$ ។
 - ដោយក្រមួសូមមួយ មានក្រម៉ាទីត ៤ នាំអោយចំនួនក្រម៉ាទីត គឺ ៣ ។

⑤ ③ ១. ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រួញ ដែលចង្អុល ។ ២. តើជាមេយ៉ូស ឬមីតូស? ស្ថិតក្នុងវគ្គណា? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង? ៣. ចូរកំណត់ចំនួនក្រមួសូម និងចំនួនក្រម៉ាទីត នៅប៉ូលនីមួយៗ ។	
--	--

១. ដាក់ឈ្មោះ

- ២ : សង់ទ្រីយ៉ូល . ១ : ខ្សែកាំ. ៣ : អាស៊ែរ. ៤ : សរសៃក្រមួសូម.
 ៥ : សរសៃប៉ូល. ៦ : ត្រយ៉ុងអាត្រូម៉ាទីច, ៧: n ក្រមួសូមប្រេះបណ្តោយ ២ ក្រុម ។
 ២. ជាមេយ៉ូស ស្ថិតក្នុងអាណាផាស I ពីព្រោះគូក្រមួសូម អូម៉ូឡូកផ្គាច់ចេញពីគ្នា
 ទៅប៉ូលផ្ទុយគ្នា ទាំងប្រេះបណ្តោយ ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រូមែរទេ គឺជាការបន្ថយ
 ក្រមួសូមពី $2n \Rightarrow n$ ។

៣. នៅប៉ូលនីមួយៗ មានក្រូម៉ូសូម 3 ដែលមានរូបរាងខុសគ្នាទាំងអស់នាំអោយចំនួន

ក្រូម៉ូសូម $n = 3$ ។

- ដោយក្រូម៉ូសូម មួយមានក្រូម៉ាទីត ២នាំអោយចំនួនក្រូម៉ាទីត: $2 \times 3 = 6$


⑤ ① ១. ចូរដាក់ឈ្មោះតាមព្រួញ ដែលចម្លង ។

២. តើជាមេឃូស ឬមេឃូស ស្ថិតក្នុងវគ្គណា?

ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង?

៣. ចូរកំនត់ចំនួនក្រូម៉ូសូម $2n$ និងកំនត់

ចំនួនតេត្រាត ។



១. ដាក់ឈ្មោះ:

១ : តេត្រាត, ២ : ខ្សែកាំ, ៣: សង់ទ្រីយ៉ូល , ៤ : អាស្តែរ, ៥ : ត្រយ៉ុងអាត្រូម៉ាទីច
កំពុងកើត ។

២. វាជាមេឃូស ស្ថិតក្នុងប្រជាស I ពីព្រោះចាប់ផ្តើមមានកំនអាស្តែរ និង ត្រយ៉ុង
អាត្រូម៉ាទីច ឈ្លាយកំពុងរលាយ ជាពិសេសគឺ ក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកដ៏ ជាតេត្រាត ។

៣. ក្រូម៉ូសូមមាន ៣គូអូម៉ូឡូក ដូច្នេះ $2n = 6$ ។

- ដោយតេត្រាតមួយ មានក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ១គូ

នាំអោយ ក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ៣ គូមាន ៣ តេត្រាត ។

⑥ ① ក្នុងមេឃូស តើវគ្គណាដែលមានការបន្ថយក្រូម៉ូសូមពី $2n$ ទៅ n ? ហើយវគ្គណា
ដែលរាប់រងនូវចំណែកស្មើគ្នា នៃក្រូម៉ូសូម ក្នុងកោសិកាតូច? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង
របស់អ្នក ។

- គឺក្នុងអាណាបាស I ជាវគ្គដែលមានការបន្ថយត្រូម៉ូសូម ពី 2n ទៅ n ត្រូម៉ូសូម ពីព្រោះវគ្គនេះ គូត្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកដែលប្រេះបណ្តោយ ត្រូវឃ្លាតចេញពីគ្នា ទៅកាន់ ប៉ូលរៀងខ្លួន ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រមែរទេ ។


- គឺក្នុងអាណាបាស II ជាវគ្គដែលរាប់រងនូវចំណែកស្មើគ្នានៃត្រូម៉ូសូម ក្នុងកោសិកាកូន ពីព្រោះវគ្គនេះ n ត្រូម៉ូសូមដែលប្រេះបណ្តោយ ធ្វើចំណែកសង់ត្រមែរ ធ្វើឱ្យត្រូវម៉ាទីតបងប្អូន ផ្តាច់ចេញពីគ្នា បង្កើតជា n ត្រូម៉ូសូម ២ក្រុមដូចគ្នា រត់ ឡើងប៉ូលរៀងខ្លួន ។

6 1 ១. ក្នុងមេយ៉ូស តើមានប៉ុន្មានចំណែកកោសិកា?

២. នៅក្នុងកោសិកា A, B, C, តើកោសិកានីមួយៗ មានត្រូម៉ូសូមប៉ុន្មាន?

៣. ចំពោះកោសិកា A, B, C, តើត្រូម៉ូសូមនីមួយៗ មាន ត្រូវម៉ាទីតប៉ុន្មាន?

៤. តើអ្នកសំគាល់ឃើញដូចម្តេច ចំពោះចំនួនត្រូម៉ូសូម របស់កោសិកាដែល កើតក្នុងចំណែកទី 1 និងទី 2 នៃមេយ៉ូស? (ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ពីធាតុភូតដែលកើត មានចំពោះត្រូម៉ូសូមនៅក្នុងចំណែកនីមួយៗ) ។ (ស្រង់ពីឯកសារគេហទំព័រ មូលនិច្ច សេរីបារាំង F.F.L)



១. ក្នុងមេយ៉ូស មាន២ចំណែកកោសិកា ។

២. កោសិកានីមួយៗ មានក្រូម៉ូសូម

A=4. B=2. C=2

៣. ចំនួនក្រូម៉ាទីត នៃក្រូម៉ូសូមនីមួយៗ ក្នុងកោសិកា :

A=2. B=2. C=1

៤. + គូបចំណែកទី 1 : ចំនួនក្រូម៉ូសូម ត្រូវបន្ថយពី $2n$ ទៅ n នេះបណ្តាលមកពី មានការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូក ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រូវមែន ។


+ គូបចំណែកទី 2 : ចំនួន n ក្រូម៉ូសូមរក្សានៅដដែលនេះបណ្តាលមកពី មានការផ្តាច់ចេញនៃក្រូម៉ាទីត ដោយមានចំណែកសង់ត្រូវមែន ។

⑥ ② ១. ចូរដាក់ឈ្មោះនៃតំនូសបំប្រែពូជខាងស្តាំ

នេះដែលត្រូវគ្នាទៅ នឹងលេខ 1. 2. 2'. 3. 4

(ឯកសារគរុកោសល្យមូលនិធិសិប្បកម្ម)

២. តើទំរង់នេះ កើតមានឡើងនៅក្នុងវគ្គ និងចំណែកអ្វីនៃមេយ៉ូស? តើទំរង់នេះ អាចនាំឱ្យមានបាតុភូតអ្វី?



១. ដាក់ឈ្មោះ : ១ : សង់ត្រូវមែន. ២. ២' : ក្រូម៉ូសូមដែលមានក្រូម៉ាទីត ២.

៣ : ក្រូម៉ាទីត. ៤ : ក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ១គូ ឬ តេត្រាត ។

២. ទំរង់នេះ កើតមានឡើងក្នុងប្រជាស នៃចំណែកទី១ មេយ៉ូស ។ ទំរង់នេះ អាចនាំឱ្យកើតមានបាតុភូត ត្រូវស៊ីញអូរី ។

⑥ ③ កោសិកាមួយ មានក្រូម៉ូសូម $2n=4$ ។ ក្រូម៉ូសូមនីមួយៗនៃក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកនេះ ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិចខុសគ្នា ។


១. តើកោសិកានេះ អាចផ្តល់កាម៉ែតបាន ប៉ុន្មានប្រភេទ ក្រោយពេលមេយ៉ូស?

២. ចូរអ្នកតាង ចំណែកទាំង២ នៃមេយ៉ូស និងប្រភេទកោសិកាដែលទទួលបាន ។

១. កោសិកា $2n=4$ នាំអោយ $n=2$ ។ ក្រោយពេលមេយ៉ូស វាអាចផ្តល់ កាម៉ែត


$$2^n = 2^2 = 4 \text{ ប្រភេទ ។}$$

២. តារាងគំនូសចម្រុះនៃមេយ៉ូស




⑥ ④ កោសិកា ឬអ៊ីតមាន $2n=6$ ។ បើវាធ្វើមេឃូស តើវាអាច បង្កើតកាម៉ែតបាន ប៉ុន្មានប្រភេទ? ចូរគូសតំនូសបំប្រែញពីលទ្ធភាព ដែលបង្កើតប្រភេទកាម៉ែត ។ ក្រុមមូសូម នីមួយៗ នៃតួអូម៉ូឡូកជួរ ព័ត៌មានសេនេទិចមិនដូចគ្នាទេ ។

+ កោសិកា $2n = 6$ នាំអោយ $n = 3$ ក្រោយមេឃូស វាអាចបង្កើតកាម៉ែត $2^n = 2^3 = 8$ ប្រភេទ។



6 5



តេត្រាតូមួយ


ក្បាល

១. ឧបមាថា តេត្រាតូមួយនេះ រងបាតុភូត ត្រូវបានអូរី ចូរអ្នកគូសបង្ហាញ អំពី ក្រមួសូម នៃការម៉ែតក្រោយពីមេឃូស ។


២. បើសិនជាតេត្រាតូនេះ មិនរងនូវបាតុភូត ត្រូវបានអូរីទេ ចូរតាងក្រមួសូមនៃការម៉ែត ដែលកើតឡើង ។

+ គំនូសបំប្លែង :

១. ក្រោយត្រូវបានអូរី មានការម៉ែត 4 ប្រភេទ :



២. គ្មានត្រូវបានអូរី មានការម៉ែត 2 ប្រភេទ :



6 6

រូប ក



រូប ខ



រូប គ




រូបខាងលើបង្ហាញ ពីវគ្គនៃចំណែកកោសិកា ។ តើរូបទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងវគ្គណា នៃចំណែកកោសិកាអ្វី? (បញ្ជាក់ចំណើយរបស់អ្នក) ? [EXOST S (HATER)]

+ រូប (ក) ស្ថិតក្នុង អាណាជាស្រូវ នៃមេយ៉ូស ពីព្រោះត្រូវមានបងប្អូនផ្ទាច់ ចេញពីគ្នា ទៅកាន់ប៉ូលរៀងខ្លួន (ដោយសារមានចំណែកសង់ត្រូវមែរ) ។

+ រូប (ខ) ស្ថិតនៅក្នុង ផាសនៃមីតូសពីព្រោះ ត្រូវមានបងប្អូននៃតួត្រូវ រួមអូម៉ូឡូក ផ្ទាច់ចេញពីគ្នា បង្កើតជា $2n$ ត្រូវសូមកូនដូចគ្នា រត់ឡើងប៉ូល ។

+ រូប (គ) ស្ថិតក្នុងអាណាជាស្រូវពីព្រោះតួត្រូវសូមអូម៉ូឡូក ផ្ទាច់ចេញពីគ្នា ទៅកាន់ប៉ូលជួយគ្នា ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រូវមែរទេ ។

6 7



ចូរប្រាប់ឈ្មោះវគ្គទាំង ៣នេះ ដោយបញ្ជាក់ចំណើយរបស់អ្នក ។

(ឯកសារគរុកោសល្យ នៃមូល និធិសេរីបារាំង) F. F. L.

A : មើលសំនួរ ទី ៦៦ រូប (ក)

B : មេតាជាស្រូវ នៃមេយ៉ូស ពីព្រោះសង់ត្រូវមែរ នៃ n ត្រូវសូមស្ថិតនៅលើ បង្អួចអេក្វាទ័រ នៃត្រយ៉ុងអាត្រូម៉ាទីច ។

C : មើលសំនួរ ទី ៦៦ រូប (គ)

6 8 ក. ចូរបង្ហាញភាពខុសគ្នា នៃចំនួនត្រូវ ឌីប្លូអ៊ីត និងអាប្លូអ៊ីត?

ខ. តើត្រូវសូម ឌីប្លូអ៊ីត និងអាប្លូអ៊ីតមានទំនាក់ទំនង នឹងគ្នាដូចម្តេច?

ក. ការពន្យល់គ្នា ទោះ :

ក្រុមសូមឌីប្លូម៉ាត


- ជាក្រុមសូមស្ថិតនៅជា គូជានិច្ច (2n) ហើយគូនីមួយៗមានរូបរាង និងប្រវែងដូចគ្នា (ក្រុមសូមអូម៉ូ-ទ្យូក) គឺមួយជារបស់មេ និងមួយជារបស់ប្រាំ ។
- ជា ក្រុមសូមដែលស្ថិតនៅក្នុងកោសិកាពូតលាស់ និងកោសិកាកេទ ដែលមិនទាន់ធ្វើមេយ៉ូស ។

ក្រុមសូមអាប្លូម៉ាត

- ជាក្រុមសូម ដែលគ្មានគូ (n) គឺមានតែមួយក្នុងចំណោមអូម៉ូទ្យូក ១គូ (គឺជារបស់មេ ឬជារបស់ប្រាំ)
- ជា ក្រុមសូមដែលស្ថិតនៅក្នុងកោសិកាម៉ែត និងកោសិកាកេទ ដែលរងមេយ៉ូសហើយ ។

ខ. ទំនាក់ទំនងទោះគ្នា

- នៅពេលមេយ៉ូស : ចំនួនក្រុមសូម ឌីប្លូម៉ាត (2n) ត្រូវបន្ថយជាចំនួនក្រុមសូម អាប្លូម៉ាត (n) ក្នុងកាម៉ែត ។
- នៅពេលបង្កកំណើត : ចំនួនអាប្លូម៉ាត (n) នៃកាម៉ែតព្យុណ្ឌល បន្សំឡើងវិញជាចំនួនឌីប្លូម៉ាត (2n) ក្នុងស៊ីកូត ។



⑥ ⑨ ក្នុងកំណកាម៉ែត តើមេយ៉ូស មាននាទីដូចម្តេច?

កងកំនកាម៉ែត មេឃុំសមាននាទី :

- បន្ថយចំនួនក្រូម៉ូសូមឌីប្លូអ៊ីត ទៅជាក្រូម៉ូសូមអាប្លូអ៊ីត ($2n \Rightarrow n$)
- បំបែកគូក្រូម៉ូសូមភេទ ជាហេតុនាំឱ្យកាម៉ែតនីមួយៗ ជួបក្រូម៉ូសូមភេទតែ

១ គត់ក្នុងចំនោមក្រូម៉ូសូមភេទ ១គូ ។

⑦ ① ហេតុដូចម្តេចបានជាមេឃុំសមានបន្ថយក្រូម៉ូសូម ឌីប្លូអ៊ីតទៅជាអាប្លូអ៊ីតបាន?

ពីព្រោះ មេឃុំស ជាចំណែក២ដង បន្តបន្ទាប់ដោយ :

- នៅចំណែកទី 1 : នៅអាណាជាស I គូក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូតផ្តាច់ចេញពីគ្នា

ដោយគ្មានធ្វើចំណែកសង់ត្រូមែរទេ គឺជាការបន្ថយក្រូម៉ូសូមពី $2n \Rightarrow n$

ក្រូម៉ូសូមប្រេះបណ្តោយ

- នៅចំណែកទី 2 : នៅអាណាជាស II សង់ត្រូមែរនៃ n ក្រូម៉ូសូមចែកជា ២

នាំឱ្យក្រូម៉ាទីតផ្តាច់ចេញពីគ្នាដោយរាប់រងក្រូម៉ូសូមឱ្យ n ដដែល ។

⑦ ① តើកណ្តុរញី និងឈ្មោលមាន ក្រូម៉ូសូមភេទដូចម្តេចខ្លះ? ក្រោយពេលមេឃុំស តើកណ្តុរញីបង្កើតកាម៉ែតប៉ុន្មានយ៉ាង? ឈ្មោលបានប៉ុន្មានយ៉ាង? តើស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ឬ អូវុល ជាអ្នកកំណត់ភេទ?

+ កណ្តុរញី មានក្រូម៉ូសូមភេទ XX

កណ្តុរឈ្មោល មានក្រូម៉ូសូមភេទ XY

+ ក្រោយមេឃុំស កណ្តុរញីមានអូវុល ១យ៉ាង គឺ X ឯកណ្តុរឈ្មោលមាន ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ២យ៉ាងគឺ X និង Y ។

• គឺស្មើ ម៉ាតូសូអ៊ីត ជាអ្នកកំណត់លេខ ។

⑦ ② តើការបន្តពូជដោយភេទ របស់ផ្សិត សរដៅរីយ៉ា ប្រព្រឹត្តទៅដោយស៊ីកូតរបស់វា ឆ្លងកាត់ចលនការអ្វីខ្លះ?

ការបន្តពូជរបស់ផ្សិត សរដៅរីយ៉ា ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយស៊ីកូតឆ្លងកាត់ចលនការមេយ៉ូស ដើម្បីបន្ថយក្រមួសមពី $2n$ ទៅ n ។ បន្ទាប់មកកោសិកា (n ក្រមួសម) នីមួយៗឆ្លងកាត់ មីតូស ១ដងបន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យស្បីនីមួយៗ មានក្រមួសមជាចំនួន អាបូអ៊ីត (n) ។

*** ចំណាំ :** ចំពោះផ្សិតផ្ទុរ សរដៅរីយ៉ា មេយ៉ូសមិនមែនបង្កើតកាម៉ែតទេ គឺមាននាទី បញ្ជូន ក្រមួសមដែលកំណត់លក្ខណៈមេបាទៅសន្តានក្រោយ (ទៅឱ្យស្បី) ដោយចូលរួមពី មីតូស បន្ថែម១ដងទៀត ។

⑦ ③ តើការបង្កកំណើតមាននាទីដូចម្តេច ?

ការបង្កកំណើតមាននាទីផ្ទុំឡើងវិញនូវក្រមួសមអាបូអ៊ីត (n) របស់បា និងក្រមួសមអាបូអ៊ីត (n) របស់មេដើម្បីបង្កើតឱ្យបានជាក្រមួសមឌីបូអ៊ីតនៃស៊ីកូតមួយ ។

⑦ ④ ការបញ្ជូនក្រមួសមពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ ត្រូវធ្វើឡើងដោយមាន អន្តរាគមន៍ ពីបាតុភូតជីវសាស្ត្របំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះ? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាង?

ការបញ្ជូនក្រមួសម ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ ត្រូវធ្វើឡើងដោយមានអន្តរាគមន៍ ពីបាតុភូតបំពេញតួនាទី ២គឺ : មេយ៉ូស និង ការបង្កកំណើត ។

ចម្លើយ :

- ពេលមេយ៉ូស មានការផ្គាច់ចេញពីគ្នានៃត្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូត ដែលនាំឱ្យកាម៉ែត នីមួយៗមានត្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាប្តូអ៊ីត (n) ។

- ពេលបង្កក់នើត មានការផ្គុំឡើងវិញនៃត្រូម៉ូសូមអាប្តូអ៊ីតរបស់កាម៉ែតពី ឈ្មោល ដោយផ្តល់ជាស៊ីក្លូត មាន $2n$ ត្រូម៉ូសូមវិញ ។

ដូច្នេះមេយ៉ូស និងការបង្កក់នើតជាបាតុភូតបំពេញគ្នា ដែលធានាលំនឹងនៃត្រូម៉ូសូម របស់ប្រភេទឆ្លងកាត់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ ។

សំគាល់: ចំពោះជឿត សរដៅយ៉ា ក៏បញ្ជូនត្រូម៉ូសូមទៅសន្តានក្រោយតាមបាតុភូត បំពេញគ្នាទាំង ២នេះដែរ ។

7 5 ក្នុងសត្វមួយប្រភេទចំនួនឌីប្លូអ៊ីតនៃត្រូម៉ូសូម គឺ $2n=4$ ។ តើមានចំនួនក្រម៉ាទីត សរុបប៉ុន្មាននៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកានីមួយៗ :

- ដែលចេញពីចំណែកទី 1 នៃមេយ៉ូស
- ដែលចេញពីចំណែកទី 2 នៃមេយ៉ូស [Annabac (HATIER) បានដាក់ប្រឈម ប្រជែងចូលមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងកសិកម្ម (១៩៩៧)]

ចំនួនក្រម៉ាទីត សរុបក្នុងកោសិកានីមួយៗ :

+ ចេញពីចំណែកទី 1 នៃមេយ៉ូស: ត្រូម៉ូសូមត្រូវបន្ថយពី $2n \Rightarrow n$ ហើយត្រូម៉ូសូម នីមួយៗ មានក្រម៉ាទីត 2 នាំអោយ ចំនួនក្រម៉ាទីត = 4 ។

+ ចេញពីចំណែកទី 2 នៃមេយ៉ូស: ត្រូម៉ូសូមនៅតែ n ដដែល ហើយត្រូម៉ូសូមនីមួយៗមាន ក្រម៉ាទីតតែ ១ នាំអោយ ចំនួនក្រម៉ាទីត = 2 ។

7 6 ចូរបង្ហាញហេតុការណ៍សំខាន់ៗជាងគេក្នុងចលនាការមីតូស មេយ៉ូស ការបង្កកំនើត?

ហេតុការណ៍សំខាន់ៗជាងគេ :

+ **ក្នុងមីតូស:** គឺការតំឡើងទ្វេនៃក្រូម៉ូសូមនៅវគ្គS នៃចន្លោះវគ្គ និងការចែកស្មើគ្នានៃក្រូម៉ូសូម នៅអាណាផាសដើម្បីរាប់រងនូវក្រូម៉ូសូម $2n$ ដដែល ។

+ **ក្នុងមេយ៉ូស:** ការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូត ដើម្បីបន្ថយក្រូម៉ូសូមពី $2n \rightarrow n$ ។

+ **ក្នុងការបង្កកំនើត:** ការផ្តុំឡើងវិញនៃក្រូម៉ូសូមអាបូអ៊ីតរបស់កាំម៉ែតមេ និងកាំម៉ែត ជាដើម្បីឱ្យទៅជា $2n$ ក្រូម៉ូសូមក្នុងស៊ីក្លូត ។

7 7 ហេតុដូចម្តេច បានជាកាំម៉ែតត្រូវតែមានចំនួន ក្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាបូអ៊ីត?

+ កាំម៉ែតត្រូវតែមានចំនួនក្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាបូអ៊ីត ព្រោះដើម្បីធានាឱ្យបានក្រូម៉ូសូម ឌីប្លូអ៊ីតវិញ ក្នុងពេលបង្កកំនើត គឺការវិលវិលនៃប្រភេទរក្សាដដែលពេលដែលចំនួនក្រូម៉ូសូមអាបូអ៊ីតនៃកាំម៉ែតមេបាបនូវឡើងវិញ ។

បើសិនជាកាំម៉ែតមាន $2n$ ក្រូម៉ូសូម នោះនៅពេលបង្កកំនើត ស៊ីក្លូត ទី២ មានក្រូម៉ូសូម ដល់ទៅ $4n$ ខុសពីមេបា ហើយខុសពីធម្មតា ។

7 8 ហេតុដូចម្តេច បានជាកំនកាំម៉ែត ត្រូវកើតមានឡើង តាមលំនាំមេយ៉ូស?

កំនកាំម៉ែត ត្រូវកើតមានឡើង តាមលំនាំមេយ៉ូសព្រោះវាជាលំនាំពិសេសមួយដែលបន្ថយ ក្រូម៉ូសូមពី $2n$ ទៅ n នៅក្នុងកាំម៉ែត ។ បើកំនកាំម៉ែត មិនឆ្លងកាត់មេយ៉ូសទេ

នោះកាម៉ែតនីមួយៗ នឹងមាន $2n$ ក្រុមសូមដែលនៅពេលបង្កក់នើតនឹងផ្តល់ជាស៊ីក្លូត ដែលមានក្រុមសូមដល់ទៅ $4n$ ខុសពីធម្មតា ។

7 ① តើសំភារៈតំនពូជ ដែលត្រូវបញ្ជូនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ គឺជាអ្វី? រាល់ រូបរាង បន្តពូជ តើវាត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈអ្វី ហើយឆ្លង កាត់ ចលនការអ្វីខ្លះ? [ច្នៃជាសំនួរដោយស្រង់ចេញពី annabac HATIER 97 ហើយដាក់ចេញប្រឈម ប្រជែងចូលមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ (១៩៩៧)] ។

+ សំភារៈតំនពូជជាក្រុមសូម (ឬ ADN ឬ សេណូម) ។

+ ក្នុងការបន្តពូជដោយភេទ : សំភារៈតំនពូជ :

- បញ្ជូនតាមរយៈកាម៉ែត

- ឆ្លងកាត់ចលនការ មេយ៉ូស (ដែលបន្ថយក្រុមសូមពី $2n \Rightarrow n$) និង ឆ្លងកាត់ ចលនការបង្កក់នើត (ដែលបន្សុំឡើងវិញ នូវក្រុមសូមអូម៉ូឡូត) ។

+ ក្នុងការបន្តពូជដោយឥតភេទ : សំភារៈតំនពូជ :

- បញ្ជូនតាមរយៈ កោសិកា I (ស្ប) កោសិកា — លូតលាស់ I ក្រុម (ដាលីកាដេម មើម ឬស ស្លឹក...)

- ឆ្លងកាត់ចលនការមីតូស ។

8 ① + បាតុភូតសំខាន់គួរឱ្យកត់សំគាល់ក្នុងចំណែកទី ១នៃមេយ៉ូសគឺអ្វី?


+ បាតុភូតសំខាន់គួរឱ្យកត់សំគាល់ក្នុងចំណែកទី២ នៃមេយ៉ូសគឺអ្វី?

+ គឺការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រុមសូម អូម៉ូឡូតនីមួយៗ ដែលបណ្តាលឱ្យបន្ថយ ចំនួនក្រុមសូមពាក់កណ្តាល (ពី $2n \Rightarrow n$) ។

+ គឺការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រុមម៉ាទីតបងប្អូនរបស់ក្រុមសូមនីមួយៗដោយសារ សង់ត្រូមែរធ្វើចំណែកបណ្តាលឱ្យ ក្រុមសូមនៅ n ដដែល (ពី $n \Rightarrow n$) ។

សំណួរស្រាវជ្រាវអំពីស្បែកក្រអូចអប់រំ :

១. ដូចម្តេចដែលហៅថាមេយ៉ូស?
២. ចូរពណ៌នាដោយសង្ខេបពីដំណើរបស់មេយ៉ូស ។
៣. ដូចម្តេចដែលហៅថា ត្រូស៊ីញូអូរី? តើវាកើតមាននៅពេលណា?
៤. ហេតុអ្វីបានជាគេថា មេយ៉ូស និងការបង្កក់ទើត ជាបាតុភូតពីរបំពេញគ្នា?
៥. ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នា រវាងមេយ៉ូស និងមីតូស
៦. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ តើរូបណាមួយជាចំណែកទី I នៃមេយ៉ូស? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកយល់ដូចនេះ? ចូរពន្យល់ ។



១. មេយ៉ូស : មើលសំណួរទី ៥២ ក

២. សង្ខេបដំណើរមេយ៉ូស : ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកោសិកាភេទ នៃក្រពេញភេទ ។ ក្នុងមេយ៉ូស កោសិកាធ្វើចំណែក ២ដងបន្តបន្ទាប់ :

- ចំណែកទី I មេយ៉ូសមានការតំលើងទ្វេត្រូម៉ូសូម នៅចន្លោះវ៉ុត ។ ចំណែកនេះរាប់រងការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃតួត្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក ។ វាបន្ថយចំនួន ត្រូម៉ូសូមពី $2n$ ទៅ n ត្រូម៉ូសូម ។

- ចំណែកទី II នៃមេយ៉ូស : រាប់រងការផ្តាច់ចេញពីគ្នានៃក្រម៉ាទីតបងប្អូនរបស់ត្រូម៉ូសូមនីមួយៗ ។ ដូចនេះកាម៉ែតនីមួយៗ មានត្រូម៉ូសូមមួយ ក្នុងតួអូម៉ូឡូកនីមួយៗ ។

៣. ក្រសួងកម្មវិធី : ជាការប្តូរអង្គភាពទៅវិញទៅមករវាងក្រុមម៉ឺន ២ ក្នុងចំណោម
ក្រុមម៉ឺន ៤ នៃតេត្រាត ។ ធាតុភូតនេះកើតមាននៅប្រជាស I ។

៤. មើលសំនួរទី ៧៤ ចាប់ពី : ពីព្រោះ..... ។

៥. មើលសំនួរទី ៥២

៦. រូប (ក) បង្ហាញពីចំណែកទី ១មេឃុំស ពីព្រោះតេត្រាត តំរូវប្រតិបត្តិការនៅលើប្លង់
អេក្រង់ ហើយភ្ជាប់ខ្លួនទៅ នឹងត្រឡប់អាត្មាម៉ឺន ដោយសង់ត្រូវមែនវា ។ វិគ្គនេះជាវគ្គ
មេតាផាស I ។



* កំណត់សំគាល់

- បើសំនួរសួរពីនាទីមេឃុំសក្នុងកំណែកម្រិត សិស្សត្រូវឆ្លើយតាមសំនួរទី ៦៩
- បើសំនួរសួរថា : តើមេឃុំសមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ? សិស្សត្រូវឆ្លើយ :

មេឃុំសមាននាទី :

- បន្ថយក្រមូសូម ពី $2n$ ទៅ n ដើម្បីធានាកំណែកម្រិត
- ចូលរួមជាមួយការបង្កកំណើត ដើម្បីបញ្ជូនក្រមូសូមពីជំនាន់មួយ ទៅជំនាន់មួយ ។



មេរៀនទី ២

ការបន្តពូជដោយភេទរបស់សត្វនិងមនុស្ស

La reproduction sexuée chez l'animal et l'homme

៩ ១ ដូចម្តេចដែលហៅថាការបន្តពូជដោយភេទ ? តើការបន្តពូជដោយភេទមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា ?

+ ការបន្តពូជដោយភេទ : ជាការបង្កើតឯកត្តៈកូន ដោយមានអន្តរាគមន៍ពី មេយ៉ូស (ពីការម៉ែត) និង ការបង្កកំនើត ។

+ សារៈសំខាន់នៃការបន្តពូជដោយភេទ :

- ពេលមេយ៉ូស ឯកត្តៈអេតេរ៉ូស៊ីកូត ចំពោះសែនច្រើន ផ្តល់នូវការម៉ែតច្រើនយ៉ាងណាស់ ។


- ពេលបង្កកំនើត ការជួបគ្នាដោយចៃដន្យនៃប្រភេទការម៉ែតផ្សេងៗបាន ផ្តល់នូវសេណូទីប ខុសប្លែកៗគ្នាយ៉ាងច្រើន ជាហេតុនាំអោយសារពាង្គកាយមាន លក្ខណៈ រូបរាង ខុសប្លែកៗគ្នាយ៉ាងច្រើនអនេក មិនងាយដូចគ្នាបេះបិទគ្រប់ចំណុចទេ លើកលែងតែកូនភ្លោះចេញពីស៊ីកូតតែមួយ ។

* ចំណាំ : ចំនុចទី២នៃសំណួរនេះ សិស្សនឹងងាយយល់បានច្បាស់នៅពេលរៀនមេរៀនឌីអ៊ីប្រីមីស ។

៩ ២ តើដំណាក់ទី១ និង ដំណាក់ទី២ នៃការបន្តពូជដោយភេទគឺអ្វីខ្លះ ?

- ដំណាក់ទី ១ នៃការបន្តពូជដោយភេទ គឺកំណើត ។
- ដំណាក់ទី ២ នៃការបន្តពូជដោយភេទគឺការបង្កកំនើត ។

③ តើប្រដាប់បន្តពូជមនុស្សប្រុស បង្កើនដោយសរីរាង្គអ្វីខ្លះ ?



ប្រដាប់បន្តពូជមនុស្សប្រុសបង្កើនដោយ :

- លិង្គ : (Pénis = Verge)
- បង្កូរនោម = បំពង់កាម-នោម (Urètre)
- បំពង់យីង = បំពង់ទឹកកាម (Canaux défférents)
- ពងស្វាស (testicule)
- ថង់ពងស្វាស (Scrotum = bourse)
- ក្រពេញឧបសម្ព័ន្ធ = ថង់ពូជពីរ (Vésicules séminales) ក្រពេញប្រស្នាត (Prostaste) ក្រពេញខ្វែរ (glande de cooper) ។

④ តើលិង្គ បង្កូរនោម បំពង់យីង ថង់ពងស្វាស មាននាទីដូចម្តេចខ្លះ ?

- លិង្គមាននាទីបញ្ជូនស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតទៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សស្រី ។

- បង្ករនោម : មាននាទីសំរាប់ដឹកនាំ និង បញ្ចេញទឹកកាមនិងទឹកនោម ។
- បំពង់យ៉ង : មាននាទីដឹកនាំស្បែកមាត់សូអ៊ីតពីបំពង់អេពីឌីមីមទៅកាន់បង្ករនោម ដោយឆ្លងកាត់ថង់ពូជ និង ប្រស្នាត ។
- ថង់ពងស្វាស : មាននាទីផ្ទុកពងស្វាសនៅក្រៅសារពាង្គកាយ ។


8 5 តើក្រពេញឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រដាប់បន្តពូជរបស់មនុស្សប្រុសមានអ្វីខ្លះ?
បញ្ជាក់ទីតាំង និងតួនាទី ។

ក្រពេញឧបសម្ព័ន្ធមានថង់ពូជ ប្រស្នាត ខ្វែរពែ ។

- ថង់ពូជ : មាន២ នៅសងខាងបំពង់ទឹកនោម ។ វាមាននាទីផលិតទឹកពូជ១ ផ្នែកដើម្បី ចូលរួមបង្កើតទឹកកាម ព្រមទាំងមាននាទីស្តុកទុកទឹកកាមមុនពេលរាល់ រចាញ់ចេញ (ejaculation) ។
 - ប្រស្នាត : ស្ថិតនៅក្រោមប្លោកនោម ពីទ្វារវិញបង្ករនោម ។ វាមាននាទីបញ្ចេញទឹក ពូជមួយផ្នែកដើម្បីចូលរួមក្នុងកំនើតទឹកកាម ។
 - ខ្វែរពែ : ស្ថិតនៅតាមបង្ករនោម ក្រោមប្រស្នាត ។ វាមិនបានចូលរួមក្នុងកំនើត ទឹកកាមទេ ប៉ុន្តែវាបញ្ចេញទឹករំអិល ៣-៤ តំលាក់ មុនពេលរចាញ់ចេញនៃទឹកកាម ។
- * ត្រូវដឹង : ទឹកពូជរាប់រងការចិញ្ចឹមនិងដង្កឹកនាំស្បែកមាត់សូអ៊ីត ។


8 6 ចូរនិយាយពីទម្រង់ពងស្វាស

ពងស្វាសមានរាងដូចស៊ីតទំងន់ជាមធ្យម១៥។
 ពងស្វាសនីមួយៗ មានជួរកំបាំង សេមីនីហ្វែរ
 (Séminifères) រមួលគងលើគ្នា ហើយបន្តទៅ
 ក្នុងបំពង់អេពីឌីឌីម ។ បំពង់នេះមានតែមួយគត់
 (៦-៧ម៉ែត) ប៉ុន្តែបត់បែន បង្រួមត្រឹម ៥ស.ម ។
 បំពង់អេពីឌីឌីមបន្ត ដោយបំពង់យ៉ង ។



៨ ៧ តើពំនុះពងស្វាស ពង្រីកនឹងមីក្រូស្យុងបង្ហាញនូវមុខកាត់នៃបំពង់សេមីនីហ្វែរ
 យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?

- ពំនុះពងស្វាសពង្រីកនឹងមីក្រូស្យុង បង្ហាញមុខកាត់នៃបំពង់សេមីនីហ្វែរ មាន២
 ផ្នែក : ផ្នែកនៃបំពង់ (ផ្នែកសំបក) និងផ្នែកប្រហោងកណ្តាល ។ ផ្នែកសំបកមានកោសិកា
 ២បែប : កោសិកាស៊ីតូលី ជាកោសិកាចិញ្ចឹម និងកោសិកាពូជបង្កើត ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីត ។ នៅ
 ចន្លោះបំពង់ទាំងនេះ គេឃើញសរសៃឈាមសរសៃប្រសាទ និង ជាពិសេសកោសិកា
 អាំងទេមីស្យែល ដែលផលិតអរម៉ូនភេទឈ្មោះ ។ ផ្នែកប្រហោង មានក្បាលម៉ាតូសូអ៊ីត ។



⑧ ⑧ ខ្នាតបំពង់សេមីនីតែ បង្ហាញនូវផ្នែកអ្វីខ្លះ? តើផ្នែកមួយណាមានកំណែស្តែ -
 ម៉ាតូសូអ៊ីត ហើយផ្នែកមួយណាដែលស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតចាកចេញពីពងស្វាស ?

➔ ខ្នាតបំពង់សេមីនីតែ បង្ហាញនូវ ២ ផ្នែក :

ផ្នែកសំបកនិងផ្នែកប្រហោង ។

- ផ្នែកសំបក : មានកំណែស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត
- ផ្នែកប្រហោង : ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតចាកចេញពីពងស្វាស

⑧ ⑨ ចូរបញ្ជាក់ពីទីតាំងកោសិកាអាំងទេទីស្បែរ និង កោសិកាស៊ីតូលីក្នុង
 ពងស្វាស និង នាទីរបស់កោសិកាប្រភេទនីមួយៗនេះ ។

- កោសិកាអាំងទេទីស្បែរ នៅផ្នែកចន្លោះនៃបំពង់សេមីនីតែទាំងឡាយ ។
- កោសិកាស៊ីតូលី ជាកោសិកានៅក្នុងបំពង់សេមីនីតែ (មើលរូបសំនួរ ៩៥) ។
- កោសិកាអាំងទេទីស្បែរ មាននាទីបង្កើតអម្ទិសភេទឈ្មោល តេស្តូស្តេរ៉ូន ។
- កោសិកាស៊ីតូលី មាននាទីសំរាប់អោយកោសិកាភេទទាំងអស់ភ្ជាប់ខ្លួន ហើយមាន
 នាទីចិញ្ចឹមក្នុងកំណែស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ។

⑨ ⑩ តើតេស្តូស្តេរ៉ូនជាអ្វី? វាផលិតចេញពីកោសិកាអ្វី? ហើយវាមាននាទីយ៉ាងដូច
 ម្តេចខ្លះ ?

- តេស្តូស្តេរ៉ូន ជាអម្ទិសភេទឈ្មោល
- វាផលិតចេញពីកោសិកាអាំងទេទីស្បែរនៃក្រពេញពងស្វាស ។

- វាមាននាទី :

- បង្កើនសកម្មភាព ក្នុងកំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីត
- ធ្វើអោយលូតលាស់សិរាង្គភេទ
- ធ្វើអោយលេចឡើងនូវលក្ខណៈភេទបន្ទាប់ (សំឡេង, ឬកញ្ចក់, សំបូររោម ច្រើន....) ក្នុងពេលពេញវ័យ ហើយទ្រទ្រង់នូវលក្ខណៈនេះរហូត ។

⑨ ① ក- តើកំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីត ប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា ? វាចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?
ហើយបញ្ចប់នៅពេលណា ?

ខ- តើកំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីត មានរយៈពេលប៉ុន្មាន ?

ក- កំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីតកើតមានក្នុងពងស្វាស ផ្នែកសំបកនៃបំពង់សេមីនីត ។

- វាចាប់ផ្តើមនៅពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ ហើយបញ្ចប់នៅពេលសារ ពាង្គកាយ អស់ជីវិត ។

ខ- កំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីត មានរយៈពេល២ខែកន្លះ (៧៤ថ្ងៃ) ។

⑨ ② ហេតុអ្វីបានជាគេថាកំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីត ប្រព្រឹត្តជានិរន្តរ៍ ?

ពីព្រោះចំពោះមនុស្សប្រុស កំណែស្តែងម៉ាតូសូអ៊ីតចាប់ផ្តើម ចាប់ពីពេលពេញវ័យ រហូតដល់អស់ជីវិត គឺប្រព្រឹត្តជានិរន្តរ៍ដោយគ្មានការផ្អាកទេ គ្រាន់តែមនុស្សប្រុស អាយុកាន់តែច្រើន សកម្មភាពពងស្វាសត្រូវបន្ថយជាលំដាប់រហូតដល់អស់ជីវិត ។

⑨ ③ ហេតុអ្វីបានជាពងស្វាសត្រូវរក្សាទុកក្នុងពងពងស្វាសដែលស្ថិតនៅក្រៅ សារពាង្គកាយ ?

ពីព្រោះ : សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងថង់ពងស្វាស ទាបជាងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងសារពាង្គ កាយមួយ
រឺ ពីរអង្សា ដែលជាសីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុត ក្នុងការផលិតនិងថែរក្សា ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ។

⑨ ④ គេថាពងស្វាសមានមុខងារ២យ៉ាង គឺជាក្រពេញអង់ដូត្រីន និង អ៊ុចសូត្រីន ។
ចូរពន្យល់ ។

ពងស្វាសមានមុខងារ ២ យ៉ាង :

- មុខងារក្រពេញអ៊ុចសូត្រីន ពីព្រោះបង្កើតស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតដោយបញ្ចេញមកក្រៅ
សារពាង្គកាយ ។
- មុខងារជាក្រពេញអង់ដូត្រីនពីព្រោះបញ្ចេញអរម៉ូនភេទតេស្តូស្តេរ៉ូន និង
អង់ដ្រូសែន ដោយដឹកនាំតាមផ្លូវឈាមមានអំពើក្នុងសារពាង្គកាយ ។

តួរដឹម

- ក្នុងវ័យជាអំប៊ុយ៉ុង ពងស្វាសស្ថិតនៅក្នុងប្រហោងពោះcoelie abdominale
- តាមធម្មតា ពងស្វាសត្រូវរីកិលមកក្រៅបន្តិចម្តងៗ តាមបំពង់ក្រលៀន
ហើយធ្លាក់ចូលក្នុងថង់ពងស្វាសមុនកំណើត ។ (បំពង់ក្រលៀន: canal inguinal)
- ជូនកាលពងស្វាស ស្ថិតនៅក្នុងប្រហោងពោះ ឬ បំពង់ក្រលៀនរហូត
ករណីនេះគេហៅថាត្រីបទ័រគីឌី (Cryptorchidie) ។
- ពងស្វាសត្រីបទ័រគីឌីទាំង ២ ធ្វើអោយមនុស្សអារតែមិនបាត់បង់លក្ខណៈ
ភេទបន្ទាប់ទេ ។ គេត្រូវធ្វើការវះកាត់ ដើម្បីអោយវាធ្លាក់ចូលក្នុងថង់ពងស្វាស ។

១៥) ក្នុងរូបខាងក្រោម កោសិកា A, B, C, D មានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចតទៅ $A=2n$, $B=2n$, $C=n$, $D=n$, $E=n$ ។

កោសិកា D មិនចែកខ្លួនឡើយទេ ប៉ុន្តែបំបែកទៅជាកោសិកា E ។

ក) តាមរូបខាងលើ តើកោសិកាណាដែលរងចំណែកទី I និងកោសិកាណាដែលរងចំណែកទី II នៃមេឃ្យូស ។

ខ) ប្រាប់ឈ្មោះ កោសិកា A, B, C, D, E, F, G ។

1- ផ្នែកប្រហោង

2- សរសៃឈាម



ក- តាមរូបខាងលើ គឺមិនមែនកោសិកា A, C, D ទេ ដែលរង ចំណែកទី I នៃមេឃ្យូស ពីព្រោះចំនួនក្រូម៉ូសូម មិនបានបន្ថយពាក់កណ្តាលរវាង A-B, C-D, D-E ទេ ។

លទ្ធភាពតែមួយគឺ :

- ចំណែកទី I នៃមេឃ្យូស: $B \rightarrow C$

- ចំណែកទី II នៃមេឃ្យូស: $C \rightarrow D$ ។

ខ)

A : ស្តែម៉ាតូកូនី

E : ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត

B : ស្តែម៉ាតូស៊ីត I

F : កោសិកាស៊ីតូលី

C : ស្មៅម៉ាតូស៊ីត II

G : កោសិកាអាំងទែទីស្យែល


D : ស្មៅម៉ាទីត

១៦ ក្នុងវគ្គបំបែកឯកទេស តើស្មៅម៉ាទីតបានបំបែកទៅជាស្មៅម៉ាតូស៊ីត ដូចម្តេច?

ស្មៅម៉ាទីត បានបំបែកជាស្មៅម៉ាតូស៊ីត ដោយសារ :

- បំបែកឯកទេស បង្កើតជាកន្ទុយ
- ការបំបាត់ចេញនូវស៊ីតូប្លាសមួយចំនួនធំ
- ប្រដាប់កុលស៊ី រលាយចូលគ្នា បង្កើតជាអាត្រូសូមត្របពីលើណ្វៃយ៉ូ ។
- ការពន្លតនៃណ្វៃយ៉ូ ដោយផ្តល់ជាទំរង់ក្បាលស្មៅម៉ាតូស៊ីត
- បំបែករូលសង់ទ្រីយ៉ូលដែលនៅខាងក្រោម ផ្តល់កំណើតជាប់ពង់តូចៗ

របស់កន្ទុយ (មើលរូប)



១- ស៊ីតូប្លាស

៥- សង់ទ្រីយ៉ូល

២- និង ៦ មីតូកុងទ្រី

៧- បំពង់តូចៗនៃកន្ទុយ

៣- ក្លាសស៊ីតូប្លាស

៨- ផ្នែកស៊ីតូប្លាសដែលផ្ដាច់ចេញ

៤- ណឺយ៉ូ

១៧ តើស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត អាចមានសមត្ថភាពធ្វើចលនាបាន និងចូលបង្កកំណើតបាន នៅ ពេលណា ?

ស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត អាចមានសមត្ថភាពធ្វើចលនាបាន និង បង្កកំណើតបាន នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់បំពង់អេពីមីម ។

១៨ + ចេញពីពងស្វាស តើស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីតចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្វី ?
+ តើទឹកកាម និង ទឹកពូជខុសគ្នាដូចម្តេច ?

+ ស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត ចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារទឹកពូជ ។

+ ភាពខុសគ្នារវាងទឹកពូជ និង ទឹកកាម

ទឹកកាម

ទឹកពូជ

កើតចេញពីការបញ្ចេញរបស់
ថង់ពូជ ក្រពេញប្រូស្តាតនិងខ្វីពែរ
លាយជាមួយនឹងស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត
(ទឹកពូជ + ស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត)

កើតពីការបញ្ចេញរបស់ថង់ពូជ
ក្រពេញប្រូស្តាត និង ខ្វីពែរ ដោយ
គ្មានលាយស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីតទេ

១ ១ ចំពោះមនុស្ស $2n=46$ ។ តើក្រូម៉ូសូមមានប៉ុន្មាន?

ក- ក្នុងស្បែកម៉ាតូស៊ីតទី II មួយ?

ខ- ក្នុងស្បែកម៉ាទីតមួយ?

គ- ក្នុងស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតមួយ?

ឃ- ក្នុងស្បែកម៉ាតូកូនីមួយ?

ង- ក្នុងស្បែកម៉ាតូស៊ីតទី I មួយ?

(ក) $n=23$, (ខ) $n=23$, (គ) $n=23$ (ឃ) $2n=46$ (ង) $2n=46$

១ ០ ០ តើចំនួនស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីត មានប៉ុន្មានដែលកើតចេញពី :

ក- ស្បែកម៉ាតូកូនីមួយ ?

ខ- ស្បែកម៉ាតូស៊ីតទី II មួយ ?

គ- ពីស្បែកម៉ាទីតមួយ ?

ឃ- ពីស្បែកម៉ាតូស៊ីត I មួយ ?

ក-៤.

ខ-២.

គ=១.

ឃ=៤

១ ០ ១ តើស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតមនុស្សចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក? ផ្នែកនីមួយៗកើតពីអ្វីខ្លះ ?

ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតចែកចេញជា ៣ ផ្នែក

- ក្បាល: មានរាងទ្រវែង (5μ) ។ មានអាត្រូសូមនៅគ្រប់លើណ្វៃយ៉ូដីធំ ស៊ីតូប្លាសតិច
- ផ្នែកកណ្តាល : ប្រវែង $6 \mu m$ ។ ស៊ីតូប្លាសមានសង់ត្រូសូម និង មីតូកុងដ្រី
- ផ្នែកកន្ទុយ: (ផ្កាសែល) ជាសរីរាង្គចលករមានប្រវែង 40μ ។

① ① ② ចូរបង្ហាញថាទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុស មិនមែនផ្ទុកតែស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតទេ ។

ទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុសមិនមែនផ្ទុកតែស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតទេ ។ សមាសធាតុទឹកកាម :

- ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីត (100.000.000 ក្នុង 1 ml)
- ទឹកពូជបញ្ចេញដោយថង់ពូជ (60% នៃចំណុះសរុប)
- ទឹកពូជបញ្ចេញដោយប្រស្នាត (២០% នៃចំនុះសរុប) ។

គួរដឹង

- + ក្នុងរោងចេញម្តងៗ ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតមានចំនួន ៣០០-៤០០ លាន
- + ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីត អាចរស់នៅក្នុងផ្លូវភេទស្រីក្នុងរយៈពេល ៤-៥ ថ្ងៃ ។
- + ល្បឿនបំលាស់ទីទៅមុខ : 10-50 μm ក្នុង 1 វិនាទីនៅក្នុងទឹកកាម ។
- + ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតដែលយកចេញពីពងស្នាសដោយមិនឆ្លងកាត់អេពីឌីឌីម មិនអាចមានចលនាទេ ។ វាអាចមានចលនានិងអាចចូលបង្កកំណើតជាមួយអូវុំ ស៊ីតបានទាល់តែវាឆ្លងកាត់អេពីឌីឌីម ។
- + ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតដែលផលិតឥតឈប់ឈរនៅក្នុងពងស្នាស ត្រូវស្តុកទុកនៅផ្នែកកន្ទុយនៃអេពីឌីឌីម ។

① ① ③ តើស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីត អាចហែលនៅក្នុងទឹកពូជបានសារអ្វី ? ចូរពន្យល់ ។

ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតហែលក្នុងទឹកពូជបាន ដោយសារប្រដាប់ចលករមួយដែលបង្កឡើងដោយផ្ទាសែលយ៉ាងរឹងមួយ ។ ផ្ទាសែលនេះបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកកណ្តាលរបស់ ស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតតាមបាតរបស់វា ។ វិសេរបស់ផ្ទាសែលរ៉ាំរ៉ៃ ដោយសារមីតូក្រុងឌ្រីដែល ផ្តល់ថាមពលគីមីសំរាប់ ជួយអោយស្បែកម៉ាតូសូអ៊ីតបំលាស់ទី និង ធ្វើចលនាបាន ។

១០៤ តើអាក្រសូមជាអ្វី ? វាមាននាទីដូចម្តេច ?


អាក្រសូមជាធាតុគោសិកាដែលបំបាក់លើឈ្នួញ នៅផ្នែកខាងលើក្បាលរបស់ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត ។ វាមាននាទីជួសជុលស្បែក សំរាប់រំលាយគ្នាសអូរុលក្នុងពេលបង្កកំណើតដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងអូរុល ។

១០៥ កាលណាគេត្រៀម (ដោយកាត់ពងស្វាសទាំង២ចេញ) មុនពេលពេញវ័យ គ្រប់ ការយើងឃើញថាលក្ខណៈភេទបឋមនិងបន្ទាប់ ត្រូវបាត់បង់ព្រមទាំង អារទៀតផង ។ តើលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញពីនាទីរបស់ពងស្វាសយ៉ាងដូចម្តេច ?

លទ្ធផលនៃការត្រៀមនេះ បង្ហាញថាពងស្វាសមាននាទី ២ យ៉ាង :

- បង្កើតអ័រម៉ូនភេទដែលមាននាទីកំណត់លក្ខណៈភេទបឋម និង ភេទបន្ទាប់ ។ ហេតុនេះកាលណាគ្មានពងស្វាស វាបាត់បង់លក្ខណៈភេទ ។
- បង្កើតស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត ។ ហេតុនេះកាលណាគ្មានពងស្វាស គឺគ្មានស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតដែលនាំអោយអារ ។

វិធីគៈ : ប្រដាប់បន្តពូជរបស់ស្រ្តី



ប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី ស្ថិតនៅក្នុងពោះ ។ វាចែកជា

ក- ផ្នែកខាងក្នុង :

- ១- អូវ៉ូល : មានពីរ ។ មានមុខងារផ្ទុកផ្ទុលីតុលជាច្រើនដែលនឹងរីកចំរើនជា អូវ៉ូស៊ីត និង ជលិតអរម៉ូនភេទ ។
- ២- ប្រមោយស្បូន : ជាបំពង់បត់បែននៅសងខាងស្បូន ។ នៅចុងម្ខាង រាងដូច ឡាវ បន្តពីអូវ៉ូលមកស្បូនហើយវាមាននាទីទទួលយកអូវ៉ូលដែលដាច់ចេញពីអូវ៉ូលនាំមក រកស្បូន ។
- ៣- ស្បូន : ជាសរីរាង្គសាច់ដុំដែលប្រហោងកណ្តាល ។ ផ្នែកខាងលើធំភ្ជាប់ទៅ នឹងដៃទាំង ២ នៃស្បូន ផ្នែកខាងក្រោមតូច មានសាច់ដុំរង្វង់សំរាប់បិទផ្នែកក្រោមនៃ

ស្បូនហៅថា "កស្បូន" ។ ផ្ទៃក្នុងគ្រាលដោយភ្លាសសើម តំរូវនឹងការទទួលស៊ុតដែលបង្កកំណើត ។

៤- យោធិ៍ : ជាសាច់ដុំមួយដែលបង្កើតស្បូនមកទ្វារមាស ។ ប្រវែងមធ្យមពី 6-8cm នៅផ្នែកខាងក្រោមវាខ័ណ្ឌដោយសន្ទះមួយហៅថា ក្រដាសព្រហ្មចារីយ៍ ។


៥- ផ្នែកទាងក្រៅ :

- ទ្វារមាស : ការពារយោធិ៍ដោយបបូរកូច និង ធំ ។

① ① ⑥ តើអ្វីដែលពេញវ័យមានទំងន់ដូចម្តេចខ្លះ ?

ចំពោះស្ត្រី និង សត្វព្រឹមានអុវ៉ែពីរ ។ អុវ៉ែនីមួយៗបង្កឡើងដោយ ២ ផ្នែក :

- ផ្នែកក្នុងសំបុរដោយសរសៃឈាម ។
- ផ្នែកជាយ (សំបក) ជាកន្លែងដែលកាម៉ែតញីលូតលាស់



ត្រូវដឹង:

- A : ជុលីគុលទី ១
- B : ជុលីគុលទី ២
- C : ជុលីគុលទី ៣ (មិនទាន់ទុំ)
- D : ជុលីគុលទី ៣ ឬ ប្រហោង (ទុំ)

① ① ⑦ ចូរបង្ហាញពីមុខងាររបស់អុវ៉ែ ។


អុវ៉ែជាក្រពេញភេទព្រឹ មាននាទី ២ យ៉ាង :

- ផលិតអ្វីស៊ីត (អូវុល) ដែលជាភោសិកាបន្តពូជញី
- ផលិតអរម៉ូនភេទ ២ យ៉ាង : អ៊ីស្ត្រូសែន និង ប្រូសេស្តេរ៉ូន ។

- ១០៩** ក) តើផូលីគុលទាំងឡាយ កកើតនៅត្រង់ផ្នែកណាមួយនៃអូវុល ?
- ខ) តើផូលីគុលអ្វី ដែលស្ថិតនៅស្បែកមី មិនលូតលាស់ ក្នុងរយៈពេលជាង ១០ឆ្នាំ ក្នុងជីវិតកុមារី ? ក្នុងផូលីគុលនេះ មានផ្ទុកភោសិកាភេទញីឆ្មោះអ្វី ?

- ក- កកើតនៅត្រង់ផ្នែកសំបក (ផ្នែកងាយនៃអូវុល) ។
- ខ- គឺជាផូលីគុលដើម ។ វាផ្ទុកភោសិកាភេទញីគឺអូវុលីត (ក្នុងប្រជាស) ។

១០១ ចូរអ្នកដាក់ចំណងជើងរូប ព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះតាមរូបព្រួញ ដែលចង្អុល



- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ១- ភោសិកាផូលីគុល | ២- តែកក្រៅ |
| ៣- តែកក្នុង | ៤- អូវុលីត |
| ៥- ធាតុរាវក្នុងផូលីគុល | ៦- ផូលីគុលដ៏ក្រាប ឬ ផូលីគុលប្រហោង |

១១០ តើភោសិកាផូលីគុល មានមុខងារយ៉ាងដូចម្តេច ?

គោតិកាផ្ចលីគុល មានមុខងារ ៦ រ៉ាង :

- ជួយផ្គត់ផ្គង់ធាតុ ចាំបាច់ដល់ការរីកចម្រើននៃអូស្ត្រូស៊ីត
- បញ្ចេញអរម៉ូនភេទអ៊ីស្ត្រូសែន ក្នុងវគ្គផ្ចលីគុលរួច ប្រសើរឡើង និង អ៊ីស្ត្រាដូល តិចតួច ក្នុងវគ្គលុយតេអ៊ីច (ពេលដែលគោតិកាផ្ចលីគុលក្លាយជាអង្គឡើង)

១១១ ផ្ចលីគុលនីមួយៗ បង្កឡើងពីអ្វីខ្លះ?

ផ្ចលីគុលនីមួយៗ បង្កឡើងពី :-

- អូស្ត្រូស៊ីត
- ស្រទាប់គោតិកាផ្ចលីគុល ភរណីខ្លះមានប្រហោងជុកធាតុរាវ
- តែក (តែកក្នុង និងតែកក្រៅ) ។

១១២ តើការរីកចម្រើននៃផ្ចលីគុល ជាលទ្ធផលនៃអ្វីខ្លះ ? (តើកំណើនមាឌរបស់ ផ្ចលីគុលបណ្តាលមកអ្វី ?)

ការរីកចម្រើននៃផ្ចលីគុលជាលទ្ធផលនៃ :

- ជំនុះដំនាលនៃគោតិកាផ្ចលីគុល
- កំនើនឡើងនៃធាតុរាវផ្ចលីគុល
- កំនើនកំរាស់តែក
- ទំហំទំហាត់អូស្ត្រូស៊ីត

១១៣ តើចំណែកទី ១ នៃមេយ៉ូស ចាប់ផ្តើមតាំងពីកាលណាមក ? ចំណែកនេះបន្ត សកម្មភាពវិញនៅពេលណា ? ហើយបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលណា ? តើការបញ្ចប់ចំណែក ទី១ នេះផ្តល់នូវគោតិកាអ្វីខ្លះ ?

- ចំណែកទី១ នៃមេយ៉ូស កើតមានតាំងពីនៅជាតិម្លេះ គឺចាប់ផ្តើមតាំងពីមុន ខែទី ៧ ។
- វាចាប់ផ្តើមបន្តសកម្មភាពឡើងវិញ (ប្រហែល២០ម៉ោង) មុនដំណើរអូវុលក្នុងវគ្គ ផ្ចលីគុល ។

- វាបញ្ចប់ប្រហែលជា ៦ ម៉ោង មុនដំណើរអូរុល

- ការបញ្ចប់ចំណែកទី I ផ្តល់កំណើតជាគោលការណ៍ដែលមួយមានផ្ទៃ គឺជា អូរុលីត II

ឯមួយទៀតជាគោលការណ៍ខុសគ្នា គឺជាគោលការណ៍ទី ១ ។

①①④ តើចំណែកទី II នៃមេឃូសចាប់ផ្តើមឡើងយ៉ាងដូចម្តេច បន្តពីចំណែកទី I ?

ហើយ ផ្ទុកនៅវត្តណា ? តើហេតុការណ៍អ្វីដែលជំរុញអោយមានការ បញ្ចេញនូវ

គោលការណ៍ទី ២ (= តើហេតុការណ៍អ្វីដែលនាំអោយមានការ បញ្ចប់មេឃូស ?)

- ចំណែកទី ២ នៃមេឃូស ចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាមៗ តែម្តង បន្តពីចំណែកទី I ។

- វាផ្ទុកនៅមេកាដាស II

- ហេតុការណ៍ដែលជំរុញអោយបញ្ចេញគោលការណ៍ទី២ គឺការជ្រៀតចូលនៃ ស្បែកតូសូអ៊ីត ទៅក្នុងអូរុលីតទី II ដែលជាការបង្កកំនើត ។

①①⑤ ក- តើផ្ទុលីតុលនៅក្នុងអូរុលី ចាប់ផ្តើមលូតលាស់ទំហំក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មានខែ មុនមានរដូវ ?

ខ- តើដំណើរអូរុល កើតមានប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងមានរដូវ ?

ក- ផ្ទុលីតុលនៅក្នុងអូរុលី ចាប់ផ្តើមលូតលាស់ទំហំក្នុងរយៈពេល ៤ខែ មុនពេលមានរដូវ ។

ខ- ដំណើរអូរុល កើតមាន ១៤ ថ្ងៃ មុនពេលមានរដូវ ។

①①⑥ ហេតុដូចម្តេចបានជាគេចាក់អូរុលប្រព្រឹត្តជាអទិរន្ត ?

ពីព្រោះ :

- កំនត់អ្វីដែលចាប់ផ្តើមតាំងពីនៅជាអំប្រើយ៉ាងប៉ុន្មានត្រូវផ្អាកសកម្មភាព មុនឬក្រោយ កំណើតបន្តិច ដោយគាត់នៅជាអ្វីស៊ីត ក្នុងប្រជាសា ។

- នៅពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ អ្វីស៊ីត បន្តមេឃ្វិស ហើយគាត់ទៀតនៅ មេតាជាស៊ីត II ជាអ្វីស៊ីត II ។

- មេឃ្វិសអាចបញ្ចប់បាននៅក្នុងដៃស្បូន ទាល់តែមានការបង្កកំណើត ។ ដំណើរនេះមាន ជាធម្មតា ពី១៣-១៥ ឆ្នាំ រហូតអស់រដូវក៏នៅអាយុ ៤៥-៥៥ឆ្នាំ គឺគ្មានកំនត់អ្វីទៀតទេ ។

- ករណីមានគភ៌ ក៏ផ្អាកដំណើរមេឃ្វិសដែរ ។ ដូច្នេះកំនត់អ្វីប្រព្រឹត្តជាទិន្នន័យ ។

① ① ⑦ ក្នុងកំនត់អ្វីរបស់ស្រ្តីក្រមុំ តើមានការបំប្លែងពីអ្វីស៊ីត II ទៅជាអ្វីស៊ីត រឺទេ? តើក្នុងករណីណា ទើបមានការបំប្លែងអ្វីស៊ីត II ទៅជាអ្វីស៊ីត ?

- ជាទូទៅ គ្មានការបំប្លែងពីអ្វីស៊ីត II ទៅជាអ្វីស៊ីតទេ ចំពោះស្រ្តីក្រមុំ ។

- ការបំប្លែងពីអ្វីស៊ីត II ទៅជាអ្វីស៊ីត តើមានឡើង ទាល់តែក្នុងករណីមានស្តែម៉ាតូ- សូអ៊ីត ជ្រៀតចូលទៅក្នុងអ្វីស៊ីត II គឺដាស់ចំណែកទី២ នៃមេឃ្វិសឱ្យ បន្តទៅទៀតដើម្បី បញ្ចប់កំនត់អ្វីស៊ីត ។

ចំណាំ : ជាទូទៅអ្វីស៊ីតនីមួយៗ មិនអាចវិវត្តរហូតដល់អ្វីស៊ីតទេ មានតែមួយចំនួនតូច ប៉ុណ្ណោះដែលអាចវិវត្តបានកាលណា មានស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតជ្រៀតចូល ។

① ① ⑧ ចំពោះដំណើរកំនត់អ្វីស៊ីត តើស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមាននាទីដូចម្តេច?

ក្នុងដំណើរកំនត់អ្វីស៊ីត ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមាននាទីដាស់ចំណែកទី ២ មេឃ្វិសឱ្យបន្តដើម្បី បញ្ចប់កំនត់អ្វីស៊ីត ។

១១១ អ្នកស៊ុត II ដែលមិនបានជួបស្នែម៉ាតូសូអ៊ីត តើវាទៅជាយ៉ាងណា ?

អ្នកស៊ុត II ទាំងបាច់ ហើយត្រូវបញ្ចេញមកក្រៅតាមឈាមរដូវ ។

១២១ តើលក្ខណៈភេទបឋម និងភេទបន្ទាប់ត្រូវបានកំណត់និងទ្រទ្រង់ដោយសារអ្វី?

លក្ខណៈភេទបឋម និង ភេទបន្ទាប់ ត្រូវបានកំណត់និងទ្រទ្រង់ដោយសារអម្ព័នភេទ តេស្តូស្តេរ៉ូន ចំពោះមនុស្សប្រុស ប្រូសេស្តេរ៉ូន និង អ៊ីស្ត្រាដូលចំពោះមនុស្សស្រី ។

១២១ ចូរប្រៀបធៀបកំរនស្នែម៉ាតូសូអ៊ីត និង កំរនអូវុល ។

ចំនួនចរម

- ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល ៣ ដូចគ្នា គឺវគ្គដំណុះដំណាល វគ្គកំណើន និង វគ្គទំនុំ ។
- បង្កើតការម៉ែត ។

ចំនួនឧសភា

កំរនស្នែម៉ាតូសូអ៊ីត

- ប្រព្រឹត្តទៅជាអនិរន្តរ៍ចាប់ពីពេល ពេញវ័យរហូតដល់អស់ជីវិត ។

កំរនអូវុល


- ប្រព្រឹត្តទៅជាអនិរន្តរ៍ចាប់តាំងពី អំប្រើយ៉ុង រហូតដល់អាយុ ៤៥-៥៥ឆ្នាំ ដោយមានការផ្អាកដោយវគ្គសំរាក២ គឺ ប្រជាស I និងមេតាជាស II ហើយ អាចបញ្ចប់បានទាល់តែមានការបង្ក កំនើត ។

- នៅវត្តកំនើនស្តែម៉ាតូស៊ីត I កើន
មានតិចតួច ។
- ក្នុងវត្តទំនុំ ចំណែកទាំង២ នៃមេឃ្យុស
ប្រព្រឹត្តបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយគ្មានជ្រក
ទេ ហើយបាននូវចំណែកស្មើគ្នា នៃ
ស៊ីតូប្លាស ក្នុងស្តែម៉ាទីត
- មានបំពេងឯកទេស ពីស្តែម៉ាទីត
ទៅ ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត យ៉ាងស៊ាំញ៉ាំ
- ចេញពីស្តែម៉ាតូស៊ីត I មួយ ផ្តល់
ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ៤ ។

- នៅវត្តកំនើន អូស៊ីត I កើនមាន
យ៉ាងខ្លាំង ។
- ក្នុងវត្តទំនុំចំណែកទី១ ចាប់បន្តបញ្ចប់ ។
ចំណែកទី២ បន្តភ្លាមប៉ុន្តែជ្រកនៅ
មេតាផាស II (អូស៊ីត II) ហើយ
ទាល់តែមានការជ្រៀតចូលនៃ
ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ទើបមានការបញ្ចប់
ចំណែកទី២ ។ ចំណែកស៊ីតូប្លាសចែកមិន
ស្មើគ្នាទេ គឺផ្តល់ជាអូស៊ីត១ មានធំ
និង គោលិកាប៉ូល ១មានតូច ។
- គ្មានបំពេងឯកទេសទេ ។
- ចេញពីអូស៊ីត I មួយ ផ្តល់ជាអូស៊ីត
តែមួយគត់ ៦គោលិកា២ទៀត(ឬ៣)
ជាគោលិកាប៉ូល ។

ចំណាំ: ចំពោះកំនើនអូស៊ីតមិនជានិច្ចកាលផ្តល់គោលិកាប៉ូលតែ ២ នោះទេ :

- បើគោលិកាប៉ូលទី១ មិនរងចំណែកទី២ នៃមេឃ្យុសទេនោះពេលចប់មេឃ្យុសវាផ្តល់
បាន គោលិកាប៉ូលសរុបតែ២ទេ គឺគោលិកាប៉ូលទី១ មួយនិង គោលិកាប៉ូលទី២ មួយ ។
- បើគោលិកាប៉ូលទី ១ រងចំណែកទី២ នៃមេឃ្យុស នោះពេលចប់មេឃ្យុសវាផ្តល់បាន
គោលិកាប៉ូលទី ២ សរុប ៣ ។



1 - កោសិកាពូជ ($2n$)

3' - តោលិកាប៉ូលែរទី 1 (n)

2 - ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ($2n$)

4 - ស្តែម៉ាទីត (n)

អូរូតូមី ($2n$)

អូរូទីត (n)

2' - ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត I ($2n$), អូរូស៊ីត I ($2n$)

4' - តោលិកាប៉ូលែរទី 2 (n)

3 - អូរូស៊ីត II (n)

5 - ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត (n)


① ② ② ចំពោះមនុស្ស អូរូស៊ីតធំជាងស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយម៉ឺនដង ។ ចូរបង្ហាញពីការចំណាត់ចែងនៃមាត្រដ្ឋាននេះ ។

វិមាត្រដ៏ធំនៃអូស៊ីតនេះ បណ្តាលមកពីមានស៊ីតូប្លាស្ទច្រើន ដែលចាំបាច់ក្នុងការស្តុក ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមបំរុងច្រើន សំរាប់ចិញ្ចឹមអំប្រើយ៉ាងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដំបូង បន្ទាប់ ពីបង្កកំណើត ។ ក្រៅពីនេះមានផ្ទុកនូវ ARN ផ្សេងៗ រីបូសូម... ដើម្បីសំយោគប្រូទីន ដែលចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងដែលស៊ីតូតចែកខ្លួន យ៉ាងសកម្ម ។

① ② ③ ចូរនិយាយពីទំរង់ការម៉ែតញីក្នុងសភាពជាអូស៊ីត II ។

អូស៊ីតជាកោសិកាធំជាងគេនៅក្នុងសារពាង្គកាយ ។ វាមានរាងស្មើ ។ អង្កត់ផ្ចិតប្រែប្រួល ទៅតាមប្រភេទសត្វនីមួយៗ ។

- ភ្នាសអូស៊ីត :
 - កំរងកោសិកាផ្ទុលីគុល
 - តំបន់ប៉េលុយស៊ីត
 - ភ្នាសស៊ីតូប្លាស
 - នៅចន្លោះភ្នាសស៊ីតូប្លាសនិងប៉េលុយស៊ីតមានកោសិកាប៉ូលទី ១
- ស៊ីតូប្លាសយ៉ាងច្រើន
- គ្រាប់តូចៗនៅក្រោមភ្នាសស៊ីតូប្លាស
- ណ្វៃយូស៊ីតនៅក្នុងចំណែកទី II (ឯកសារ II) ។



① ② ④ ដូចម្តេចដែលហៅថាវដ្តអូវ៉េ ? តើដំណើរអូវ៉េចែកវដ្តអូវ៉េជាប៉ុន្មានវគ្គ?
អ្វីខ្លះ ? ចូរបញ្ជាក់ដោយសង្ខេប ។

+ វដ្តអូវ៉េ : មើលសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ ៤៧

+ ដំណើរអូវ៉េ ចែកវដ្តអូវ៉េជា ២ វគ្គ គឺវគ្គផ្ទុលីគុល និង វគ្គលុយតេអ៊ិច ។

• វគ្គផ្ទុលីគុល : មានរយៈពេលមធ្យម ១៤ថ្ងៃ (អាចប្រែប្រួលពី១២-១៧ថ្ងៃ) ។

ក្នុងវគ្គនេះ ផ្ទុលីគុលដែលបញ្ឈប់ការលូតលាស់តាំងពីជីវិតជាភិក្ខុបានបង្កើត ការវិវត្តរបស់វា
ដោយអូវ៉ូស៊ីត I បញ្ចប់ចំណែកទី១ និងបន្តចំណែកទី២ ហើយគាំងនៅមេតាផាស II មុននឹង
ចាក ចេញពីអូវ៉េ ។

• វគ្គលុយតេអ៊ិច : មានរយៈពេលថេរ (១៣-១៤ថ្ងៃ) ត្រូវកត់សំគាល់ដោយមាន
អង្គលេឿងកើតឡើងចេញពីផ្ទុលីគុលដែលផ្ទុះបែក ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវដ្ត អង្គលេឿងរូបាស្វិត
ដោយបន្ទុកនូវស្នាមស ។ តែបើមានការបង្កកំណើត អង្គលេឿង ត្រូវបន្តរហូតដល់គភី
អាយុ ៦ ខែ ។

* ត្រូវដឹង: ការបង្កកំណើតអាចកើតមានចាប់ពីថ្ងៃប្រហែលទី ១១-១២ នៅប្រហែលថ្ងៃទី
១៧ ក្រោយពេលមានរដូវ ពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលនេះ អូវ៉េចាកចេញពីអូវ៉េ ។ ក្រៅពីចន្លោះ
ថ្ងៃនេះ មិនអាចមានការបង្កកំណើតទេ ។

ផ្ទៃលីតុលទាំងអស់ សុទ្ធតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយសារទំហំរបស់វា ដែលសំគាល់
ទៅលើទំហំទំហាត់នៃអូស៊ីត (កាម៉ែតញី) ការលូតលាស់នៃស្រទាប់កោសិកាផ្ទៃលីតុល
ចាប់ពី តិចទៅច្រើន កំនើននៃធាតុរាវផ្ទៃលីតុល និង កំរាស់តែក ។

① ② ⑦ តើចំនួនអូស៊ីត មានប៉ុន្មានចេញពី :

ក- អូស៊ីតមួយ ?

ខ- អូស៊ីត១៤ មួយ ?

គ- អូស៊ីតមួយ ?

ឃ- កោសិកាប៉ូលមួយ

ក-១

ខ-១

គ-១



ឃ-០

① ② ⑧ ចូរសង្ខេបហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងវដ្តស្បូន ។

ក្នុងវដ្តស្បូន គេសង្កេតឃើញ :

- ក្នុងវគ្គផ្ទៃលីតុល : ភ្លាសសើមស្បូន ដែលត្រូវបំផ្លាញស្ទើរតែអស់ពេលមានរដូវត្រូវបាន
បង្កើនឡើងក្រាស់វិញ (1-3mm) ។ ឯក្រពេញរាងបំពង់ក៏លូតលាស់ ។

- ក្នុងវគ្គលាយតេអ៊ីច : ក្រោយដំណើរអូស៊ីត ភ្លាសសើម បន្តរីកចំរើនជាអតិបរមា
(5mm) ។ ក្រពេញឡើងរមូលខ្លាំង បញ្ចេញគីតុសែន ធ្វើអោយភ្លាសសើម មានទិដ្ឋភាព
ដូចចេញរណា ។ បើគ្មានកំណាច់សំបុកនៃអំប្រើយ៉ុងទេ នោះសរសៃឈាមដែល រមូលខ្លាំង
ត្រូវដាច់លាយឡំជាមួយភ្លាសសើមស្បូនដែលជាដូវរបស់ស្រ្តី ។



① ② ③ តើអង្គល្បឿងវិវត្តន៍ពីអ្វី? វាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយវាបាត់ទៅវិញយ៉ាងដូចម្តេច?

- អង្គលេឿងវិវត្តន៍ពីកោសិកាផ្ទុកនៃផ្ទុកដែលផ្ទុកបែក ។

- វាកើតឡើងនៅវគ្គលុយតេអ៊ិច ដោយផ្ទុកដែលផ្ទុកបែក ត្រូវបិទភ្លើងទៅ វិញ ហើយកោសិកាផ្ទុកត្រូវបំបែកជាជាតិកាបូនតេអ៊ិច ដែលមានជាតិលីពីត យ៉ាងច្រើន និងជាតិពណ៌លឿង ។

- វាស្ថិតនៅទៅវិញនៅចុងវគ្គលុយតេអ៊ិច ដោយបន្សល់នូវស្នាមស ហើយវាផ្ទុកចាប់ ផ្ទើរទៀត ។

សំគាល់: ករណីបើមានកំណាច់សំបុកនៃអំប្រើយ៉ុងនោះអង្គលេឿង មិនវិនាសទេវានៅ មានរហូតដល់ខែទី ៦ នៃឆ្នាំ ។

① ③ ① តើអង្គលេឿងមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ ?

អង្គលេឿងមាននាទីបញ្ចេញ អរម៉ូនភេទញី ២ យ៉ាង ក្នុងវគ្គលុយតេអ៊ិច :

- អ៊ីស្ត្រាឌីយ៉ូល បន្តិចបន្តួច
- ប្រូសេស្តេរ៉ូនច្រើន

① ③ ① ហេតុអ្វីបានជាគេហៅលំដាប់ដែលក្លាសសើមស្បូនថាជាវដ្តដូរ ?

ពីព្រោះចំពោះមនុស្សស្រី ព្រឹត្តិការណ៍ដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងលំដាប់នេះ គឺការមាន រដូវផ្ទុះដាច់ក្លាសសើមស្បូននិងធ្លាក់ឈាម) ដែលប្រព្រឹត្តទៅវិលមកដដែលៗក្នុងរយៈ ពេល ២៨ ថ្ងៃម្តង បង្កើតបានជាវដ្ត ។

សំនួរថ្មីចម្លោះបឹង :

① ③ ② ចូរនិយាយពីអំពើជីវសាស្ត្រ សំខាន់ៗ នៃអរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូសេន ។

+ នៅពេលពេញវ័យ អីស្រូសែន :

- ធ្វើអោយស្បូន យោនី ក្រពេញឧបសម្ព័ន្ធ រីកចំរើន និង លូតលាស់
- ធ្វើអោយរោមនៅលើប្រដាប់បន្តពូជលូតលាស់
- ធ្វើអោយលេចបន្ថែមនូវលក្ខណៈរូបរាងជាស្រី (រីកចំរើន ក្រពេញដោះ ស្បែកទន់

សំឡេងស្រួយ)

+ ក្នុងវដ្តភេទនីមួយៗ អីស្រូសែន :

- ធ្វើអោយភ្នាសសើមស្បូន និង ភ្នាសយោនីដុះដាលរីកចំរើន
- ធ្វើអោយក្រពេញកស្បូន មានសកម្មភាពបញ្ចេញរំអិលកស្បូន ។
- មានអំពើលើមេតាបូលីស (គ្រុយស៊ីត លីពីត ទឹក)

សំនួរបន្ថែមចំណេះដឹង :

① ③ ③ ចូរនិយាយពីអំពើជីវសាស្ត្រសំខាន់ៗនៃអម្ចាស់ប្រុសស្មើរ្យង ។

ប្រុសស្មើរ្យង :

- ធ្វើអោយភ្នាសសើមស្បូនឡើងក្រាស់ដូចធ្មេញរណា
- ភ្លេចការបញ្ចេញនៃក្រពេញកស្បូន
- ធ្វើអោយកោសិកានៃក្រពេញទឹកដោះដុះដាលរីកចំរើន ។
- ធ្វើអោយសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនឡើងខ្ពស់ ។

* សំនួរព្រិះរិះ : តើការកាត់អូវែរចេញមុនពេលគ្រប់ការ និង ក្រោយពេលគ្រប់ការផ្តល់
នូវផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះ ?

① ③ ④ ស្រ្តី ១នាក់ ត្រូវ និង ការ៉ូលីន មានរដូវដំណាលគ្នា គឺថ្ងៃទី ១៥ មេសា ។

ត្រូវ មានរដូវដូចគ្នា ២២ ថ្ងៃ ការ៉ូលីនមានរដូវដូចគ្នា ៣០ ថ្ងៃ ។

1⁰ - ចូរបញ្ជាក់ថ្ងៃដែលមានអូវុលធ្លាក់ និង មានរដូវក្នុងរដ្ឋបន្ទាប់ចំពោះស្រ្តី ម្នាក់ៗ ។

(វគ្គលុយតេអ៊ុច មានរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ទោះបីជាវដ្តវែងឬខ្លីក៏ដោយ)

2⁰ - ចូរគណនាវគ្គនីមួយៗ នៅលើបន្ទាត់ត្រង់មួយដោយកំណត់ថ្ងៃមានរដូវ និងថ្ងៃមានដំណើរអូវុល (0.5cm = 2 ថ្ងៃ) ។

1⁰) ចំពោះត្រូវ :

- ដំណើរអូវុល : ថ្ងៃទី ២៣ មេសា ។



- ថ្ងៃមានរដូវនៅរដ្ឋបន្ទាប់ ៧ ឧសភា ។

ចំពោះការ៉ូលីន :

- ដំណើរអូវុល : ថ្ងៃទី ១ ឧសភា

- រដូវនៅរដ្ឋបន្ទាប់ : ថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា ។


2⁰ - គំនូសបំប្រែង : (0.5cm សំរាប់ 2 ថ្ងៃ)



① ③ ⑤ ដូចម្តេចដែលហៅថា “ការបង្កកំណើត” ? ចំពោះមនុស្សតើការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា ?

+ ការបង្កកំណើត : មើលក្នុងសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ ១

+ ចំពោះមនុស្ស : ការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំពូលនៃដៃស្បូន ក្បែរអូវុលប្រហែល 1/3 ពីមាត់ប្រមោយដៃស្បូន ។



① ③ ⑥ តើការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស មានប៉ុន្មានដំណាក់ ? ចូរសង្ខេបដំណាក់
នីមួយៗ ។

ការបង្កកំណើត មាន-៣ ដំណាក់កាល :

១- ការឆ្លងកាត់ស្រោមអូវុល : ពេលដែលស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត ជួបកោសិកាផ្ទុយលីតុល
ដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញអូវុលីត វាធ្វើអោយកោសិកានេះរុញលិប ។ នេះជាហេតុធ្វើឱ្យ ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត
ខិតទៅជិតអូវុលីត រួចវាបោះតំបន់បើលុយស៊ីតក្រោមអំពើ ២ : អង់ស៊ីមបញ្ចេញ ដោយ
អាក្រូសូម និង កំលាំងរុញរបស់កន្ទុយ ។

២- ការចូលនៃស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត និង ប្រតិកម្មរបស់អូវុលីត :


ការជ្រៀតចូលនៃស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត ធ្វើអោយមានបាតុភូត ២ កើតឡើង :

- ការរំដោះចេញនៃបន្ទុកគ្រាប់តូចៗ ទៅក្នុងលំហចន្លោះអូវុលីតនិងតំបន់បើលុយ ស៊ីត
ដោយបង្កបានជាភ្លាសបង្កកំណើតមួយ សំរាប់រារាំងការចូលនៃស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតផ្សេងទៀត ។

- អូវុលីត II បន្តចំណែកទី 2 រហូតដល់ចប់ក្លាយជាអូវុលីត (→ អូវុល) ។

៣- ការរលាយណឺយ៉ូ : ណឺយ៉ូកាម៉ែតញីឈ្មោល ឡើងបែងក្លាយជាប្រូតុយក្លេអូសញី
ឈ្មោល ហើយវារលាយចូលគ្នា បានជាណឺយ៉ូស៊ីត ។ បន្ទាប់មកស៊ីតចែក តាមមីតូសបានជា
កោសិកាដំបូង ២ នៃអំប្រីយ៉ុង ។

(រង្វង់រូបទំព័រ ១១)



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ១- កោសិកាដូលីគុល | ៧- ណ្វៃយ៉ូនេអាណាដាស II |
| ២- គោលិកាប៉ូលីទី ១ | ៨- ក្លាសបង្កក់លើត |
| ៣- លំហដ្ឋវិញអូស៊ីត | ៩- ស៊ីតូប្លាស្មាអូស៊ីតទៅជាអូស៊ីត |
| ៤- ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតជួបកោសិកាដូលីគុល | ដែលរួមគ្នា |
| ធ្វើអោយវារួញលីប | ១០- ប្រូនុយក្លេអូសឈ្មោល |
| ៥- ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតជ្រៀតចូល | ១១- ប្រូនុយក្លេអូសញី |
| ក្នុងប៉េលុយស៊ីត | ១២- ណ្វៃយ៉ូស៊ីត |
| ៦- គ្រាប់តូចៗបញ្ចេញសារធាតុ | ១៣- គោលិកាប៉ូលីទី ១ និង ២ |
| ទៅក្នុងលំហដ្ឋវិញអូស៊ីត | |

① ③ ⑦ តើស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត បោះតំបន់បើលុយស៊ីតក្រោមអំពើអ្វីខ្លះ ?

- + ក្រោមអំពើពីរ :
- អង់ស៊ីមបញ្ចេញដោយអាត្រូសូម (acrosome)
- កំលាំងជំរុញរបស់កន្ទុយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត

① ③ ⑧ តើការជ្រៀតចូលនៃស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ទៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្មរបស់អូវូស៊ីត ធ្វើអោយមាន បាតុភូតអ្វីខ្លះកើតឡើង ?

ធ្វើអោយមានបាតុភូតពីរកើតឡើង :

- ការរំដោះចេញនៃបន្ទុក របស់ត្រាប់តូចៗទៅក្នុងលំហ ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ អូវូស៊ីត និងបើលុយស៊ីត ។ សារធាតុរំដោះចេញ បង្កបានជាភ្នាសបង្កកំណើតមួយ ដែលរារាំងការចូលរបស់ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតផ្សេងទៀត ។
- អូវូស៊ីត II បន្តធ្វើចំណែកទី ២ នៃមេយ៉ូស ។


① ③ ⑨ ក្នុងពេលណាទើបណែយូនៃកាម៉ែតញី ឈ្មោល ក្លាយទៅជាប្រូនុយក្លេអូសញី ឈ្មោល ?

- ណែយូនៃកាម៉ែតញីឈ្មោល ក្លាយជាប្រូនុយក្លេអូសញីឈ្មោល នៅពេលវាឡើងបោងខ្លាំងមុននឹងរលាយចូលគ្នាទៅជាណែយូស៊ីកូត ។

① ④ ⑩ តើការបង្កកំណើត ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលណា ?

បញ្ចប់ នៅពេលប្រុសយកកូនក្មេងមកឲ្យឈ្មោលទាំងពីរ រួមគ្នាជាណែយូរតែមួយ គឺ

អូវុលក្លាយជាស៊ីត ។



- 1^o) ① ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ចូលក្នុងអូវុលីត II អូវុលីត II បន្តធ្វើមេយ៉ូស ។
- ② កោសិកាកូន២ កើតពីស៊ីកូត ធ្វើមីតូស ១ ដង ។
- ③ ការរលាយចូលគ្នានៃប្រុសយកកូនក្មេងមកឲ្យឈ្មោល ។
- ④ ណែយូកាម៉ែត កើតឡើងវិញ គោលិកាប៉ូលទី ២ កើតឡើង ណែយូ
កាម៉ែតក្លាយឡើងបែងជាប្រុសយកកូនក្មេង ។

⑤ ស៊ីកូតផ្ដើមធ្វើមិត្តស លើកទី ១

⑥ អូរ៉ូស៊ីត II ស្ថិតនៅតាំងក្នុង មេតាជាស II រុំព័ទ្ធដោយស្ដែម៉ាតូសូអ៊ីត ។

2) រៀបតាមលំដាប់នៃបាតុភូត :

6 → 1 → 4 → 3 → 5 → 2 ។

សំណួរដកស្រង់ពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំ :

- ១- តើកំនកាម៉ែតកើតនៅទីណា ក្នុងសារពាង្គកាយសត្វ ?
- ២- តើស្ដែម៉ាតូស៊ីត I នីមួយៗ ផលិតបានជាស្ដែម៉ាតូសូអ៊ីតប៉ុន្មាន ? តើអូរ៉ូល ចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវផលិតចេញពីអូរ៉ូស៊ីត I នីមួយ ៗ ?
- ៣- ហេតុអ្វីបានជាអូរ៉ូលនៃសារពាង្គកាយមនុស្សស្រីមានកំណត់ ?
- ៤- ពន្យល់ពីដំណាក់ផ្សេងៗ នៃការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស ។

ចម្លើយ :

- ១- កំនកាម៉ែតឈ្មោល កើតនៅក្នុងពងស្វាស ឯកំនកាម៉ែតញីកើតនៅក្នុងអូរ៉ូ ។
- ២- ស្ដែម៉ាតូស៊ីត I នីមួយៗ ផលិតបានស្ដែម៉ាតូសូអ៊ីត 4 ។
- អូរ៉ូស៊ីត I នីមួយៗ ផលិតបានអូរ៉ូល 1 ។
- ៣- ចំនួនអូរ៉ូលនៃសារពាង្គកាយ មនុស្សស្រី មានកំណត់ព្រោះមានតែអូរ៉ូស៊ីត ចំនួន 400 ទៅ 450 ប៉ុណ្ណោះ ដែលបន្តការវិវត្តន៍នៅក្នុង 400 ទៅ 450 រដ្ឋជីវិតបន្តពូជ ក្នុងចន្លោះភាពគ្រប់ការ និង ភាពអស់រដូវ ។
- ៤- ដំណាក់ផ្សេងៗ នៃការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស :

(មើលចម្លើយសំណួរទី 136) ។

រចនាសម្ព័ន្ធ ៣ :

ការបង្កពងដោយគេឈរបស់រុក្ខជាតិ
La reproduction sexuée des végétaux

① ④ ②. តើការផ្លាស់ប្តូរនៃកំនើតរបស់រុក្ខជាតិប្រព្រឹត្តទៅដោយឆ្លងកាត់វគ្គអ្វីខ្លះ?
ចូរប្រាប់ពី ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម និង ដំណាក់កាលបញ្ចប់របស់វគ្គនីមួយៗ ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃកំនើត ឆ្លងកាត់២វគ្គ: ឌីប្លូដាស និង អាប្លូដាស ។

ឌីប្លូដាស : ចាប់ ផ្តើមពីការបង្កកំនើត(ពីស៊ីកូត) រហូតដល់មេយ៉ូស៊ីស(កំនស្សី) ។

អាប្លូដាស: ចាប់ផ្តើមពីកំនស្សី រហូតដល់ការបង្កកំណើត ។

① ④ ③. តើទំរង់រុក្ខជាតិដែលផលិតកាម៉ែត ហៅថាអ្វី? ក្នុងដំណាក់កាលនេះ
កោសិកា រុក្ខជាតិមានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចម្តេច?

+ ហៅថាកាម៉ែតូកីត ។

+ កោសិកាទាំងអស់នៃកាម៉ែតូកីត មានក្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាប្លូអ៊ីត (n) ។

① ④ ④. តើទំរង់រុក្ខជាតិដែលផលិតស្សី ហៅថាអ្វី? ក្នុងដំណាក់កាលនេះ
កោសិការុក្ខជាតិ មានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចម្តេច?

+ ហៅថាស្សីកីត ។

+ កោសិកាទាំងអស់នៃស្សីកីត មានក្រូម៉ូសូមជាចំនួនឌីប្លូអ៊ីត ($2n$) ។

① ④ ⑤ ហេតុដូចម្តេច បានជាគេថា កាម៉ែតូភីតជាទំរង់រុក្ខជាតិអាប្តិអ៊ីត? ឯ ស្បៀរភីត ជាទំរង់រុក្ខជាតិឌីប្តិអ៊ីត?

+ គេថាកាម៉ែតូភីត ជាទំរង់រុក្ខជាតិអាប្តិអ៊ីតពីព្រោះកាម៉ែតូភីត លូតលាស់ពីស្បៀដែលជាគោសិកាកើតពីមេឃ្លូស គឺវាមានក្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាប្តិអ៊ីត ។

+ គេថាស្បៀរភីតជាទំរង់រុក្ខជាតិឌីប្តិអ៊ីត ពីព្រោះវាលូតលាស់ពីស៊ីកូតដែលជាគោសិកាមានក្រូម៉ូសូម (2n) ។

① ④ ⑥ ហេតុដូចម្តេច បានជាស្បៀទាំងឡាយលូតលាស់តាមមីតូស ផ្តល់ជាកាម៉ែតូភីត ដែលជាពហុគោសិកាអាប្តិអ៊ីត ?

ពីព្រោះ មីតូសជាចលនការរាប់រងនូវដំណុះដាលគោសិកា និង ចំនួនក្រូម៉ូសូមឱ្យនៅដដែល ។ ដូច្នេះ ស្បៀដែលជាគោសិកាអាប្តិអ៊ីត ក្រោយពីមីតូសវាត្រូវផ្តល់ជាកាម៉ែតូភីតពហុគោសិកាដោយមានក្រូម៉ូសូមអាប្តិអ៊ីតដូចគោសិកាដើម ។

① ④ ⑦ តើការឆ្លាស់គ្នានៃកំនើតស្បៀរភីត និង កាម៉ែតូភីតកើតមានចំពោះរុក្ខជាតិមានផ្កាដែរ ឬ ទេ ? ចូរបញ្ជាក់ការអះអាង ។

ការឆ្លាស់គ្នានៃកំនើតក៏កើតមានចំពោះរុក្ខជាតិមានផ្កាដែរ ពីព្រោះ យើងសង្កេត ឃើញ៖

- គ្រាប់លំអងនៃកេសរឈ្មោល និងថង់កំននៃកេសរញី ជាកាម៉ែតូភីតដែលបង្កើត កាម៉ែត ។

- ប្លោកលំអងនៃកេសរឈ្មោល និង អូវ៉ៃនៃកេសរញី ជាស្បៀរភីតដែលបង្កើតស្បៀអាប្តិអ៊ីត ។

① ④ ⑧ . តើការម៉ែត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកវា ជាអ្វី? ហើយស្បៀងភ័ក្តិរបស់អ្នកវាជាអ្វី ?

+ ការម៉ែត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកវាជាគល់ 2 បែបរាងដូចស្លឹក ។ វាជាពហុកោសិកាអាប៊ូអ៊ីត ដែលខុសគ្នាបន្តិច ដោយពណ៌នៅលើតែមន្ទីររបស់គល់ឈ្មោលពណ៌បៃតង លឿង ឯតែម របស់ គល់ញីពណ៌បៃតងចាស់

+ ស្បៀងភ័ក្តិរបស់អ្នកវា ជាគល់ឥតភេទរាងដូចស្លឹកដែលជាពហុកោសិកាឌីប៊ូអ៊ីត ។

① ④ ⑨ តើសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលរបស់អង់ស្សស្តែមគឺជាអ្វី ? ចូរនិយាយពី សរីរាង្គនេះ ។

សរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលរបស់អង់ស្សស្តែមគឺជាកញ្ចក់កេសរឈ្មោល ។

វាមាន២ផ្នែក : ផ្នែកទី១ មានរាងជាសរសៃគ្មារហោរថាទងកេសរឈ្មោល និង ផ្នែកទី 2 ដែលមានទម្រង់ជាថង់ ហៅថា ប្លោកលំអង ដែលស្ថិតនៅខាងចុងនៃទងកេសរឈ្មោល ។ គ្រាប់លំអងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្លោកលំអង ។ ផ្កាមួយអាចមានកេសរឈ្មោល ឬ ច្រើន ។

① ⑤ ⑩ . តើសរីរាង្គបន្តពូជញីរបស់អង់ស្សស្តែមគឺជាអ្វី? ចូរនិយាយពីសរីរាង្គនេះ ។

សរីរាង្គបន្តពូជញីរបស់អង់ស្សស្តែម គឺជាកញ្ចក់កេសរញី ។ វាមាន១ផ្នែក:

- ផ្នែកកំពូលគឺស្ថិតម៉ាតដែលមានទំហំធំបន្តិច និងមានសភាពស្អិតៗសំរាប់ទទួល លំអង ។


- ជើងទំររបស់ស្ថិតម៉ាតគឺកេសរញី ។

- ផ្នែកបាតនៃកញ្ចក់កេសរញីគឺ អូវ៉េ ដែលមានអ្នកលម្អយូរ រឺ ច្រើន ។ អូវ៉េលូតលាស់ ទៅជាគ្រាប់ ។ ជាមួយអាចមានកេសរញីមួយ ឬ ច្រើន ។

151. តើកំនត្រាប់លំអង ប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា? ហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

+ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្លាស្ទីតូអ៊ីតនៃកេសរណ្ទាល

+ ដំណើរកំនត្រាប់លំអង : ដំបូងកោសិកាមេនីមួយៗដែលមាន $2n$ ក្រូម៉ូសូម ចែកខ្លួនតាមមេឌីសដោយផ្តល់ជា កោសិកាអាប៉ូអ៊ីត 4 (មីក្រូស្យ) ។ បន្ទាប់មកកោសិកា អាប៉ូអ៊ីត នីមួយៗ ធ្វើចំណែកតាមមីតូស៊ីស ដង ដូច្នេះកោសិកាមួយៗ ត្រូវមានណ្វៃយូ 2 (ណ្វៃយូលូត លាស់ និង ណ្វៃយូបន្តពូជ) ដែលមានក្លាស្ទូម 2 ស្រទាប់ព័ទ្ធជុំវិញ វាជាគ្រាប់លំអង ។



152. តើគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតណ្ទាលទេ ។ តើពិត ឬទេ ?

ចូរបញ្ជាក់ ការអះអាងរបស់អ្នក ។

ជាការពិត ។ ពីព្រោះតាមពិត គ្រាប់លំអងជាអ្នកបង្កើតកាម៉ែត ។ គ្រាប់លំអង ជាកោសិកាដែលមានណ្វៃយូអាប៉ូអ៊ីត 2 ។ ណ្វៃយូមួយជាណ្វៃយូលូតលាស់ វាជាអ្នកនាំ

ដំណើរលូតលាស់នៃបំពង់លំអង ដែលចាក់ចូលរហូតដល់អូវុល ។ ឯណែយ៉ូមួយទៀតជាណែយ៉ូបន្តពូជ វាចែកខ្លួនជា២តាមមីតូសដោយផ្តល់ជាស្មែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ ។


1 5 3. ចំពោះរុក្ខជាតិ តើអូវុលជាកាម៉ែតញី ឬ ទេ? ចូរបញ្ជាក់ការអះអាង ។

+ អូវុលមិនមែនជាកាម៉ែតញីទេ ។

+ វាជាទំរង់ពហុកោសិកាដែលផ្ទុកកោសិកាមេ 1 ។ កោសិកាមេនេះ រងមេយ៉ូស និង មីតូស ដើម្បីបង្កើតជាថង់កំន ។ នៅក្នុងថង់កំននេះទើបមានកាម៉ែតញី ។

1 5 4. តើថង់កំន និង កាម៉ែតញី កើតឡើងដូចម្តេច ?

កោសិកាមេមួយនៃអូវុលចែកខ្លួនតាមមេយ៉ូស បានស្ប៉ូអាប៊ូអ៊ីត 4 ។ ប៉ុន្តែស្ប៉ូ 3 ត្រូវវងាប់ ។ ឯស្ប៉ូមួយទៀត(មេកាស្ប៉ូ) ចែកខ្លួនតាមមីតូស 3 ដងបន្តបន្ទាប់ ។ លទ្ធផលផ្តល់ជាថង់កំនមួយដែលមានកោសិកា 7 តែមានណែយ៉ូ 8 ។ ណែយ៉ូ 2 ស្ថិតក្នុង កោសិកាវាងចំមួយនៅកណ្តាលថង់កំន ។ ឯកោសិកាបន្តពូជពីរគឺ អូអូស្ទែរ ស្ថិតនៅជិតមីក្រូពីលកណ្តាលកោសិកា២ទៀត (ស៊ីណេស៊ីត) ឯកោសិកា 3 ផ្សេងទៀត(អង់ទីប៉ូត) ស្ថិតនៅឈមម្ខាងទៀត នៃថង់កំន (ថង់អំប្រិយ៉ុង) ។



155. តើការបង្កក់នើតរបស់រុក្ខជាតិមានជាមានលក្ខណៈ ពិសេសដូចម្តេច ?

ចូរបង្ហាញ ?


+ ពិសេសត្រង់ការបង្កក់នើតរុក្ខជាតិជា ការបង្កក់នើត ទ្វេ :

+ ពេលដែលស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតទាំង២ ធ្វើដំណើរតាមបំពង់លំអង ចូលទៅក្នុងថង់កំនៈ

- ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយ រលាយជាមួយអូអូស្វែរ n ផ្តល់ជាស៊ីកូតឌីប្លូអ៊ីត ($2n$) ដែល នឹងលូតលាស់ជាអំប្រីយ៉ុង ។

- ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត១ ទៀត រលាយជាមួយណ្វៃយ៉ូប្លែរ ដោយផ្តល់ជាម៉ាស

កោសិកាមួយដែលផ្ទុកអាហារបំរុង : ជាអាស់ប៊ុយមែន (ទ្រីប្លូអ៊ីត ($3n$)) ។



វិធាន

រក្សាប្លូប្លែរ = រក្សាប្លូស្តីកំន

១៥៦. ដូចម្តេចដែលហៅថាៈ ការបង្កកំនើតទ្វេ ? តើនៅពេលណា ទើបការបង្កកំនើតនៅ ក្នុងផ្កាអាចកើតមានឡើង ?

- + ការបង្កកំនើតទ្វេ ជាការបង្កកំនើតរបស់រុក្ខជាតិដែលកើតមានឡើងរវាងស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ជាមួយអូអូស្ទ្រី និងស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ទៀត ជាមួយណែយ៉ូប៊ូលែរ ។
- + ការបង្កកំនើតនៅក្នុងផ្កា អាចកើតមានឡើងនៅពេលស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ចូលក្នុងចង់អំប្រើយ៉ុង ។


១៥៧. តើស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ចូលដល់អូអូស្ទ្រី តាមរយៈអ្វី?

តាមរយៈបំពង់លំអងនៃគ្រាប់លំអងដែលដុះពន្លកដើម្បីពន្លតខ្លួនចូលដល់អូអូស្ទ្រី ។

១៥៨. តើអំប្រើយ៉ុងរុក្ខជាតិ លូតលាស់ពីអ្វី? ហើយតើអាស់ប៊ុយមែននៃគ្រាប់រុក្ខជាតិកើត ឡើងពីអ្វី?

- + អំប្រើយ៉ុងរុក្ខជាតិលូតលាស់ពីស៊ីកូតដែលកើតពីស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតបង្កកំនើតជាមួយអូអូស្ទ្រី ។
- + អាស់ប៊ុយមែននៃគ្រាប់រុក្ខជាតិកើតចេញពីស៊ីកូតដែលបានពីស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត បង្កកំនើតជាមួយណែយ៉ូប៊ូលែរ ។

159



នេះជាផ្នែកខាងចុងនៃបំពង់លំអង ។ ចូរដាក់ឈ្មោះអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងរូប
ទីមួយៗ និងរៀបចំឡើងវិញនូវតំនូសបំប្រែពូជនេះអោយបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់វិវត្តនៃ
គ្រាប់លំអងនេះ

+ ① ភ្នាសបំពង់លំអង

② មីតូសនៃណ្វៃយ៉ូបន្តពូជ

③ ក្រមួសូមនៃណ្វៃយ៉ូបន្តពូជ

④ ណ្វៃយ៉ូលូតលាស់ដែលកំពុងរលាយទៅវិញ

⑤ ណ្វៃយ៉ូលូតលាស់

⑥ ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត 2 ។

+ ② - ការតំរៀបតាមលំដាប់វិវត្តន៍ត្រឹមត្រូវ:

B → A → C ។

160. ដូចម្តេចដែលហៅថា ដំណើរលំអង ? តើចំពោះអង់ស្យូស្តែម ដំណើរ
លំអងមាន ប៉ុន្មានយ៉ាង ? អ្វីខ្លះ ? ចូរបញ្ជាក់ ។

ដំណើរលំអង់ការផ្ទេរ គ្រាប់លំអង់ពីប្លោកលំអង់ទៅស្ថិតម៉ាត ។

ដំណើរលំអង់មាន ៣ យ៉ាង :

- ដំណើរលំអង់ឯង (ស្វ័យបង្កកំនើត) = គ្រាប់លំអង់ត្រូវផ្ទេរពីប្លោកលំអង់ទៅស្ថិតម៉ាតនៃផ្កាតែមួយ ។

- ដំណើរលំអង់កាត់ = គ្រាប់លំអង់របស់ផ្កានៃរុក្ខជាតិមួយធ្លាក់លើស្ថិតម៉ាតរបស់ផ្កានៃរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតតាមខ្យល់ សត្វល្អិត ទឹក... ។

- ដំណើរលំអង់សិប្បនិម្មិត = គ្រាប់លំអង់ត្រូវបញ្ចូនដោយមនុស្ស ពីរុក្ខជាតិមួយទៅរុក្ខជាតិមួយ ។

① ⑥ ① . ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើដំណើរលំអង់សិប្បនិម្មិត?

ពីព្រោះគេចង់បង្កើតពូជថ្មី ឬ លក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិបែបថ្មីតាមចិត្តគេចង់បាន ។


សំណួរអកស្រង់ពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំ

II

1. តើផ្នែកណាដែលមាននាទីនាំស្តែមម៉ាតូសូអ៊ីតទៅជួបអូមូស្ទែរ ?
2. តើដំណុះគ្រាប់លំអង់ មានដំណើរដូចម្តេច ?
3. តើគ្រាប់លំអង់ និង ស្បៀ មានលក្ខណៈដូចគ្នាអ្វីខ្លះ ?
4. តើការបង្កកំនើតរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្បៀស្តែមអោយកំនើតជាអ្វីខ្លះ ?


III ចូរបំពេញពាក្យបន្ថែមនៅក្នុងតំនូលបំព្រួញខាងក្រោម៖

ក. ចំណាស់គ្នាទៃកំទើត៖



ខ. ដំណើរលំអង និង ការបង្កកំទើត

ត្រាប់លំអងផលិតដោយ



II ចំណើយ

1. ផ្នែកដែលដឹកនាំស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ទៅជួបអូអូស្ទែរ គឺបំពង់លំអង ។
2. នៅពេលដែលគ្រាប់លំអង ធ្លាក់ជាប់ទៅលើស្ទិចម៉ាត វាក៏ដុះពន្លកឡើង ហើយពន្លកខ្លួនតាមកកេសរញី ដោយបង្កើតជាបំពង់លំអង រហូតដល់អូរុល ។ ណ្វៃយ៉ូទាំងពីរបស់គ្រាប់លំអងធ្វើដំណើរក្នុងបំពង់លំអង ។ ណ្វៃយ៉ូទី១នៅខាងចុង ធ្វើអោយបំពង់លំអងលូតលាស់ ហើយវាក៏រលាយបាត់ទៅវិញ ។ ណ្វៃយ៉ូទីពីរចែកខ្លួនតាមមីតូស បានជាស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត 2 ដែលគ្មានផ្ទាំងសែល ។ ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយ បង្កកំនើតជាមួយអូអូស្ទែរ (រីកាម៉ែតញី) បានស៊ីកូតឌីប្លូអ៊ីតមួយ និង ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយទៀត រលាយជាមួយណ្វៃយ៉ូប៉ូលែរ ហើយបង្កើតជាអាល់ប៊ុយមែនទ្រីប្លូអ៊ីត (3n) ។
3. គ្រាប់លំអង និង ស្បី មានទំរង់តូចល្អិត ហើយជាកោសិកាអាប្លូអ៊ីតដូចគ្នា ។
4. ការបង្កកំនើតរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែម អោយកំនើតជាស៊ីកូត ដែលនឹងលូតលាស់ជាអំប្រីយ៉ុង និង អាល់ប៊ុយមែនដែលជាម៉ាសកោសិកាមួយផ្ទុកអាហារបំរុង គឺជាការបង្កកំនើតទ្វេ ។

III ក. 1 កាម៉ែត 2 ការបង្កកំនើត 3 មេយ៉ូស 4 ស្បី

- | | |
|-------------------|---------------|
| 2. 1 ប្លោកលំអង | 5 ស៊ីកូត |
| 2 ស្ទិចម៉ាត | 6 អាល់ប៊ុយមែន |
| 3 កកេសរញី | 7 អំប្រីយ៉ុង |
| 4 អូរុល | 8 អាហារបំរុង |

ជំពូកទី 3: សំភារៈសេនេទិច

មេរៀនទី 1:

ADN ជាទំព័រព័ត៌មានសេនេទិច

ADN: le support de
l'information génétique

(162) តើធាតុបង្កើតមីនៃក្រូម៉ូសូមគឺអ្វីខ្លះ? តើធាតុបង្កណាមួយនៃក្រូម៉ូសូម
ជាទំព័រព័ត៌មានសេនេទិច?

- ធាតុបង្កើតមីនៃក្រូម៉ូសូមគឺ ADN និងប្រូតេអ៊ីន (អ៊ីស្តូន)
- ធាតុបង្កក្រូម៉ូសូមដែលជាទំព័រព័ត៌មានសេនេទិចគឺ ADN

(163) ហេតុដូចម្តេចបានជាស៊ីកូតសត្វកណ្តុរ ទន្សាយ មនុស្ស...លូតលាស់ទៅ
ជាសត្វកណ្តុរ ទន្សាយ មនុស្ស...ជានិច្ច?


ពីព្រោះក្នុងស៊ីកូតនីមួយៗ មានផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិចដែលទទួលពីការមែត
របស់មេបាជានិច្ច។ ព័ត៌មានសេនេទិចនេះគឺជា ប្លង់សំរាប់ដឹកនាំការសាងសង់
លក្ខណៈរបស់ភាវវន្តនីមួយៗ។ ហេតុនេះហើយទើបស៊ីកូតត្រូវតែលូតលាស់ជា
ឯកត្តៈដូចមេបា។

(164) តើអ្វីជាភ្នំម្នីកូក? វាមានរូបរាងប៉ុន្មានបែប? មានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ភ្នំម្នីកូក: មើលសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ 38 ។
- វាមានរូបរាង 2 បែប: រូប ៣៩'៥" និង រូប ៣៩'៤"។

- + រូបរាង S (Smooth=រលីង) មានស្រោមកើតពីគ្រួញស៊ីត ។
វាមានលក្ខណៈសហ័សតិបង្កអោយមានជំងឺរលាកសួត ។
- + រូបរាង R (Rough=គគ្រាត) គ្មានស្រោមហើយមិនបង្កអោយ
មានជំងឺទេ ។

(165) ខាងក្រោមជាពិសោធន៍របស់ ត្រីកីត ដែលបង្ហាញពីការបំប្លែង
បាក់តេរី។ ចូរអ្នកវិភាគពិសោធន៍នេះ ។



យើងឃើញថា ក្នុងឈាមកណ្តុរដែលស្លាប់ មានផ្ទុកល្បាយនៃ បាក់តេរី
“R” និង “S” ដែលរស់ ។ យើងអាចសន្និដ្ឋានថា បាក់តេរី “s” ដែលស្លាប់
ហើយកាលណាយកមកដាក់លាយជាមួយបាក់តេរី “R” ដែលរស់នោះវាមាន
សារធាតុ១ដែលបំប្លែងបាក់តេរី “R” គ្មានស្រោមទៅជាបាក់តេរី “S”មាន
ស្រោម។ វាអាចបង្កជំងឺ និង បញ្ចូលលក្ខណៈនេះទៅសណ្តានក្រោយ ។


(166) តើសារធាតុអ្វីដែលបំប្លែងបាក់តេរី R គ្មានស្រោមទៅជាបាក់តេរី S មានស្រោម? តើគេរកឃើញដោយធ្វើពិសោធន៍ដូចម្តេច?

-គឺជាសារធាតុគីមី “ADN” ។

-គេរកឃើញដោយលោក អាវីរី និង សហការីធ្វើពិសោធន៍ដូចតទៅ៖

គេទាញយក ADN ពីក្នុងម៉ូកូក S តាមបច្ចេកទេសគីមីហើយបាក់ ADN ទោះទៅក្នុងកែវដែលមានបាក់តេរី R ។ បន្ទាប់មកលោកអាវីរីចាក់បញ្ចូលល្បាយបាក់តេរីនេះទៅក្នុងសត្វកណ្តុរ ។ កណ្តុរស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួត ព្រោះឈាមរបស់វាមានបាក់តេរី S ។

ដូច្នេះ ADN ជាសារធាតុដែលអាចធ្វើអោយបាក់តេរី R គ្មានស្រោមក្លាយជាបាក់តេរី S មានស្រោមដែលបង្កអោយមានជំងឺ ។



(167) ហេតុដូចម្តេចបានជាគេសន្និដ្ឋានក្នុងពិសោធន៍របស់លោកអាវីរី ថា ម៉ូលេគុល ADN ជាទំរង់ព័ត៌មានសេនេទិច?

ពីព្រោះនៅពេលដែល ADN របស់បាក់តេរី S ជ្រៀតចូលទៅក្នុង ADN នៃបាក់តេរី R គ្មានស្រោមធ្វើអោយបាក់តេរី R មានលក្ខណៈថ្មីមួយទៀត គឺជាមួយADNរបស់បាក់តេរីSវាអាចសំយោគស្រោមការពារដែល បង្កអោយមានជីវិតរលាកស្លូត ហេតុនេះទើបគេថា ADNជាទំរពតិមានសេនេទិច ។

(168) អ៊ីដ្រូលីសមូលេគុល ADN ផ្តល់អ្វីខ្លះ?

អ៊ីដ្រូលីស ADN ផ្តល់:

- អាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4)
- ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$)
- បាសអាសូតមាន 2បែប:
 - + បាសព្យូរិចគឺ អាដេនីន (A) និង កាឡីន (G)
 - + បាសពីរីមីឌិចគឺ ទីមីន (T) និង ស៊ីតូស៊ីន (C)

(169) តើឯកតានៃធាតុបង្កើតមី (ម៉ូណូមែរ) របស់ ADN គឺអ្វី?ហើយឯកតានៃធាតុបង្កើតមួយៗនេះមានអ្វីខ្លះ?

- គីនុយក្លេអូទីត
- នុយក្លេអូទីតនីមួយៗកើតឡើងពីបណ្តុំនៃ:
 - + អាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) 1ម៉ូលេគុល
 - + ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$) 1ម៉ូលេគុល
 - + បាសអាសូត (A រឺ T រឺ C រឺ G) 1ម៉ូលេគុល

(170) តើ ADN មាននុយក្លេអូទីតប៉ុន្មានបែប? វាខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសារ អ្វី? ចូរបញ្ជាក់អំនះអំនាង?

-នុយក្លេអូទីតមាន 4 បែប ។

-វាខុសគ្នាដោយសារបាសអាសូត ។ ពីព្រោះនុយក្លេអូទីតនីមួយៗ មានអាស៊ីតផូស្វ័រិច និង ស្ករដេអុកស៊ីរីបូសដូចគ្នា ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់បាសអាសូត ។ ហេតុនេះដោយ បាសអាសូតមាន 4 បែបខុសគ្នានោះនុយក្លេអូទីតក៏មាន 4 បែបខុសគ្នាដែរ ។

(171) ក/ ចូរបង្ហាញនុយក្លេអូទីតទាំង 4 បែបរបស់ ADN ។

ខ/ ចូរសរសេរគំនូសបំប្លែងទំរង់ទូទៅនៃនុយក្លេអូទីត 1 ប្រភេទ ។

ក/ នុយក្លេអូទីតទាំង 4 បែបរបស់ ADN:

-នុយក្លេអូទីតអាដេនីន $H_3PO_4 + C_5H_{10}O_4 + A$

-នុយក្លេអូទីតទីមីន $H_3PO_4 + C_5H_{10}O_4 + T$

-នុយក្លេអូទីតស៊ីតូស៊ីន $H_3PO_4 + C_5H_{10}O_4 + C$

-នុយក្លេអូទីតកាឡីន $H_3PO_4 + C_5H_{10}O_4 + G$

ខ/ គំនូសបំប្លែងទំរង់ទូទៅនៃនុយក្លេអូទីតមួយប្រភេទ:



នុយក្លេអូទីតអាដេនីន

(172) តើលោកវ៉ាតសុន(Watson) និង គ្រីក(Crick) បង្ហាញនូវគំរូម៉ូលេគុល ADN ដូចម្តេច?

+ ADN មានទំរង់ជាខ្សែខ្មៅ 2 ដែលជាច្រវាក់នុយក្លេអូទីត 2 ស្របគ្នាវ៉ាជា

រង្វង់លើគ្នា ។ បើគេពន្លាតខ្សែខ្មៅទ្វេនេះដាក់អោយរាបស្មើមួយលេខគុណ ADN មានសភាពជាដណ្តើរវែងដែលមានទទឹង 2nm និង បណ្តោយពីច្រើនមីលីម៉ែត រហូតដល់ច្រើនម៉ែត ។

-មេដណ្តើរកើតពីស្ករដេអុកស៊ីរីបូស និង អាស៊ីតផូស្វ៊ីក


-កាំដណ្តើរកើតពីបាសអាសូតបំពេញគ្នាពីរៗ គឺ: អាដេនីន និង ទីមីន

(A-T) ស៊ីតូស៊ីន និង កាឡីន (C-G) ។

ប្រាក់ទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន:

~រវាង A-T ភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

~រវាង C-G ភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3



(173) ក្នុងប្រាក់ទី១១នៃមូលេគុលADN តើនយក្សអូទីតភ្ជាប់គ្នាដូចម្តេច?

ក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាមួយៗ អាស៊ីតផូស្វ័រិចនៃនុយក្លេអូទីតមួយភ្ជាប់ទៅនឹងស្ករ
ដេអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេអូទីតមួយទៀតដោយសម្ព័ន្ធគីមី “ កូរ៉ាឡង់ ” ។

(174) ហេតុអ្វីបានជាគេថា ADN ជាទំរង់ព័ត៌មានសេនេទិច?

ពីព្រោះម៉ូលេគុល ADN ផ្ទុកព័ត៌មានដាច់ខាតនៃនុយក្លេអូទីតគឺ ព័ត៌មានដាច់
ខាតនៃនុយក្លេអូទីតនេះហើយ ជាព័ត៌មានសេនេទិច ដែលជាប្លង់សំរាប់សាងសង់
លក្ខណៈសារពាង្គកាយ ។ ហេតុនេះទើបគេថា ADN ជាទំរង់ព័ត៌មានសេនេទិច ។

(175) តើ ADN មានលក្ខណៈពិសេសដូចម្តេចខ្លះ?

លក្ខណៈពិសេសរបស់ ADN :

+ បរិមាណនៅក្នុងកោសិកា

-បរិមាណADNក្នុងកោសិកាលូតលាស់ថេរជានិច្ចក្នុងប្រភេទតែ1 តែពី
ប្រភេទ មួយទៅប្រភេទមួយខុសគ្នាជានិច្ច ។

-បរិមាណADN ក្នុងកោសិកាបន្តពូជត្រូវថយពាក់កណ្តាល
ទៅនឹងក្រុម ADN ក្នុងកោសិកាស្មុគស្មាញ ។

+ ស្វ័យតំឡើងទ្វេ

ADNមានលទ្ធភាពស្វ័យតំឡើងទ្វេដោយផ្តល់នូវ ADN កូន2ដូចគ្នា
បេះបិទទៅនឹង ADN មេ ។

(176) តើបាសអាសូតមានលក្ខណៈពិសេសដូចម្តេច?

លក្ខណៈពិសេសនៃបាសអាសូត:

-បរិមាណទីមីន និង អាដេនីន ស្មើគ្នា

-បរិមាណស៊ីតូស៊ីន និង កាឡីន ស្មើគ្នា

$$\text{ដូចនេះផលធៀប } \frac{A}{T} = 1, \frac{C}{G} = 1 \Rightarrow \frac{A+C}{T+G} = 1$$

-បាស A បំពេញ T C បំពេញ G (A-T ; C-G)

- បាស A មិនបំពេញ C T មិនបំពេញ G

$$\left(\frac{A}{C} \neq 1 \quad \frac{T}{G} \neq 1 \quad \frac{A+T}{C+G} \neq 1 \right)$$

(177) ម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗខុសគ្នាដោយសារអ្វី?

ម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗ ខុសគ្នាដោយសារ តំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត
ដែលជា: ចំនួន ទីតាំង ប្រភេទនៃនុយក្លេអូទីត ។

(178) ហេតុអ្វីបានជា ជាមួយនឹងប្រភេទ នុយក្លេអូទីតតែ 4យ៉ាងអាចបង្កើត
(ប្រភេទ)
រាប់លានភាវវស្ស?

ពីព្រោះ ADN នីមួយៗ មាននុយក្លេអូទីតរាប់ម៉ឺន រាប់លាន ហើយ
នុយក្លេអូទីតក្នុង ADN នីមួយៗតំរូវតាមតំនលំដាប់ពិសេសរៀងៗខ្លួន ដែល
បង្កើតបានជា ADN យ៉ាងច្រើនប្រភេទ ។

ប្រភេទដ៏ច្រើននេះ សំយោគនូវប្រភេទប្រូទីតយ៉ាងច្រើនអនេកសំរាប់
កំនត់លក្ខណៈដ៏ច្រើនប្លែកៗ ដោយបង្កើតរាប់លានប្រភេទភាវវស្សផ្សេងៗគ្នា ។

(179) ហេតុអ្វីបានជាក្នុងកោសិកាបន្តពូជបរិមាណADNមានតែពាក់កណ្តាល
នៃបរិមាណ ADN ក្នុងកោសិកាលូតលាស់?

ពីព្រោះក្នុងកោសិកាបន្តពូជក្រុមសូមត្រូវបន្ថយពាក់កណ្តាល($2n-n$)
ដោយសារមេយ៉ូស ។ ដូច្នេះ ADN ដែលជាធាតុបង្ករបស់ក្រុមសូមត្រូវតែ
សមាមាត្រទៅនឹងចំនួនក្រុមសូម គឺបន្ថយពាក់កណ្តាលដែរ ។

(180) តើស្វ័យតំឡើងទ្វេ ADN ប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា? ពេលណា? តើ
ស្វ័យតំឡើងទ្វេចាប់ផ្តើមពីចំណុច ឬ ច្រើន? ហើយចំណុចស្វ័យតំឡើងទ្វេ
ស្ថិតក្រោមរូបភាពជាអ្វី?

- + ស្វ័យតំឡើងទ្វេ ADN ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា ។
- + ស្វ័យតំឡើងទ្វេប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវគ្គ S នៃចន្លោះវគ្គ
- + ស្វ័យតំឡើងទ្វេចាប់ផ្តើមពីចំណុចច្រើន
- + ចំណុចផ្តើមស្វ័យតំឡើងទ្វេស្ថិតក្រោមរូបភាពជា “ភ្នែកស្វ័យតំឡើងទ្វេ” ។

(181) តើចលនកម្មស្វ័យតំឡើងទ្វេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ចលនការស្វ័យតំឡើងទ្វេប្រព្រឹត្តដូចតទៅ៖

- ច្រវាក់ទាំងពីរនៃ ADN មេបែកចេញពីគ្នានៅត្រង់ចំណុចជាច្រើននៃមូលេគុល
ដោយការផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយ ។
- នុយក្លេអូទីតសេរីក្នុងណ្វៃយ៉ូភ្ជាប់ជាមួយ នុយក្លេអូទីតច្រវាក់មេទាំង២ តាម
គោលការណ៍បំពេញបាស ។ ច្រវាក់នីមួយៗនៃមូលេគុល ADN មេជាពុម្ពគំរូ
សំរាប់សំយោគច្រវាក់ម្ខាងទៀតនៃមូលេគុល ADN កូន ។
- សំនុំប្រតិកម្មទាំងនេះ (ការផ្តាច់សម្ព័ន្ធបាសរវាងច្រវាក់ទាំង២ និង ការភ្ជាប់

នុយក្លេអុទីតសេរី...) ស្ថិតនៅក្រោមអំពើនៃអង់ស៊ីមយថាប្រភេទ “ADN-ប៊ូលីមេរាស” ។

ចប់ស្ទួយតំឡើងទ្វេម្តងៗគេបាន ADN កូន២ដូចគ្នាបេះបិទហើយដូចទៅនឹង ADN មេទៀត ។

(182) តើម៉ូលេគុលADNកូនទាំង២ដូចគ្នានឹងADNមេត្រង់ចំណុចណាខ្លះ?

ADNកូនដូចADNមេត្រង់៖ ចំនួន ប្រភេទ ទីតាំងនៃនុយក្លេអុទីត ។

(183) ហេតុអ្វីបានជាគេថាចលនការស្ទួយតំឡើងទ្វេADN ប្រព្រឹត្តតាមបែបពាក់កណ្តាលរក្សាទុក?

ពីព្រោះម៉ូលេគុលADNកូន ទីមួយៗត្រូវរក្សាប្រវាក់ម្ខាងជាប្រវាក់ ADNមេទាំងស្រុង ឯប្រវាក់ម្ខាងទៀតជាប្រវាក់កើតថ្មី ។

(184) តើស្ទួយតំឡើងទ្វេADN ត្រូវការអ្វីខ្លះជាចាំបាច់?

ស្ទួយតំឡើងទ្វេADN ត្រូវការជាចាំបាច់នូវ៖

- នុយក្លេអុទីតសេរី (ដេអុកស៊ីរីបូនុយក្លេអុទីតសេរី)
- អង់ស៊ីម ADN-ប៊ូលីមេរាស
- ថាមពល ATP

(185) ហេតុដូចម្តេចបានជាគោសិកាកូនទទួលព័ត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុងពីគោសិកាមេ?

ពីព្រោះនៅពេលធ្វើមីតូសៈ

-ក្នុងចន្លោះវគ្គ ម៉ូលេគុល ADN ស្ទើរតែឡើងទ្វេ

-នៅអាណាដាសមានការចែកស្មើជា2ក្រុម ADNកូនទៅប៉ូលីមីយ៉ា

ដូច្នេះកោសិកាកូនទទួល ADNទាំងស្រុងពីកោសិកាមេ ពោលគឺទទួល

ព័ត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុង ។

(186) តើស្ទើរតែ ឡើងទ្វេADNមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ? (=តើស្ទើរតែឡើង
ទ្វេADN មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?)

ស្ទើរតែឡើងទ្វេADNមាននាទី:

-រ៉ាប់រងការតែងឡើងទ្វេនៃក្រូម៉ូសូម

-រ៉ាប់រងរូបរាង និង ចំនួនក្រូម៉ូសូមអោយនៅដដែលក្រោយចំណែក

កោសិកា

-ចូលរួមជាមួយអាណាដាសនៃមីតូសដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានសេនេទិចទាំង

ស្រុងពីកោសិកាមេទៅកោសិកាកូន ។

(187) ហេតុអ្វីបានជាគេថា ម៉ូលេគុលADN ជាម៉ាត្រូម៉ូលេគុលមានក្រុម?

ពីព្រោះវាកើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតជាច្រើន ហើយនុយក្លេអូទីតនេះភ្ជាប់
គ្នាក្នុងលំដាប់កំណត់ច្បាស់លាស់ហៅថា “តំនលំដាប់” គឺ ADN ខុសគ្នាពីមួយ
ទៅមួយដោយសារ ចំនួន ទីតាំង និង ប្រភេទនុយក្លេអូទីតទាំង4 បើមានបំណង
ប្តូរនុយក្លេអូទីតតែបណ្តាលអោយមានបំណងប្តូរទំរង់ និង មុខងារADN ។
ម្យ៉ាងទៀតតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីតADN ជាក្រុមជាក់លាក់សំរាប់កំណត់តំន -

លំដាប់ រឿងរ៉ាវក្នុងក្បួនអ៊ីត ARN_៣ ដើម្បីសំយោគប្រភេទអ៊ីនយថាប្រភេទ ។

(188) បង្ហាញថា ADN មានលទ្ធភាពផលិតចេញបាននូវម៉ូលេគុល ADN ខ្លួនឯងបាន ។

ADN មានលទ្ធភាពផលិតចេញនូវម៉ូលេគុល ADN ខ្លួនឯងបាន ព្រោះ៖

- ប្រវាក់នុយក្លេអូទីតទាំង ២ ខ្សែ ដែលភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ខ្សោយអាចផ្តាច់ចេញបានយ៉ាងងាយ

- ពេលដែលប្រវាក់ទាំង ២ ផ្តាច់ចេញពីគ្នានុយក្លេអូទីតសេរីក្នុងណែយ បាន ភ្ជាប់ទៅនឹងបាសនៃប្រវាក់នីមួយៗ តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-T, C-G ដដែល ។

ទីបំផុតយើងបានម៉ូលេគុល ADN កូន ២ ដែលដូចគ្នាសុទ្ធសាទៅនឹង ម៉ូលេគុល ADN មេ៖ បាតុភូតនេះគឺជាការចម្លងដោយខ្លួនឯងបាន ។

(189) ហេតុអ្វីបានជាស្វ័យតំឡើងទ្វេ ADN ផ្តល់នូវ ADN កូន ២ ដូចគ្នា បេះបិទហើយដូច ADN មេទៀត?

ពីព្រោះពេលស្វ័យតំឡើងទ្វេម្តងៗ ប្រវាក់ទាំង ២ នៃ ADN មាននាទីជា ពុម្ពគំរូ ឯនុយក្លេអូទីតសេរីរត់ទៅបំពេញតាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-T: C-G ។ ហេតុនេះគេបាន ADN កូន ២ ដែលមួយៗមានប្រវាក់ម្ខាងជាប្រវាក់ ពុម្ពគំរូមេ ឯប្រវាក់ម្ខាងទៀតជាប្រវាក់កើតថ្មីគឺ ដូចគ្នាបេះបិទហើយដូច ADN មេទៀត ។

(190) ហេតុអ្វីបានជាក្រោយពេលស្វ័យតំឡើងទ្វេ គេថា ADN កូនទាំង២ ដូចគ្នាលេះបិទទៅនឹង ADN មេ?

ពីព្រោះ ADN កូនទាំង២ មានច្រវាក់ម្ខាងជាច្រវាក់ ADN មេ (ជា ពុទ្ធតំរូវ) ឯច្រវាក់ម្ខាងទៀតជាច្រវាក់បំពេញបាត់ទៅនឹងច្រវាក់មេ ។

(191) តើបរិមាណ ADN ក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយប្រភេទផ្សេងគ្នា ដូចគ្នា រឺ ខុសគ្នា? ពីព្រោះអ្វី?

ចំពោះប្រភេទផ្សេងគ្នាបរិមាណ ADN ក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា ខុសគ្នាទាំង អស់ ពីព្រោះប្រភេទផ្សេងគ្នា មានការវិវឌ្ឍទីបីខុសគ្នា (លើកលែងតែចំនួន តូច) ដូច្នេះ ADN ដែលជាធាតុបង្ករបស់ក្រុមសូម ត្រូវតែខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែរ ។

(192) ចំពោះកោសិកាទាំងឡាយនៃសារពាង្គកាយក្នុងប្រភេទតែ១ មាន បរិមាណ ADN ខុសគ្នា រឺ ដូចគ្នា? ព្រោះអ្វី?

ចំពោះកោសិកាទាំងឡាយនៃសារពាង្គកាយប្រភេទតែ១ បរិមាណ ADN ដូចគ្នាទាំងអស់ ពីព្រោះគ្រប់កោសិកាស្ថិតលាស់នៃប្រភេទតែមួយសុទ្ធតែមាន ចំនួនក្រុមសូមដូចគ្នាទាំងអស់ (ការវិវឌ្ឍទីបីដូចគ្នា) នាំអោយ ADN ដែលជាធាតុ បង្ករបស់ក្រុមសូមត្រូវតែដូចគ្នា ។

(193) ចំពោះប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិទាំងអស់ក្នុងចំណោមផលច្រៀប រវាង នុយក្លេអូទីតផ្សេងៗទាំង៤របស់ ADN ក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិការបស់ខ្លួនដូច ខាងក្រោម: $\frac{A}{T}$, $\frac{C}{G}$, $\frac{A+C}{T+G}$, $\frac{C}{A}$, $\frac{T}{G}$, $\frac{A+T}{C+G}$

តើផលធៀបណាមួយ? ផលធៀបណាប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ?
ហេតុអ្វី?

-ផលធៀបដែលថេរគឺ: $\frac{A}{T}$, $\frac{C}{G}$, $\frac{A+C}{T+G}$

ព្រោះ A និង T, C និង G ជាបាសបំពេញគ្នាទៅតាម $A=T$, $C=G$ ដូច្នេះ

ផលធៀប $\frac{A}{T} = 1$, $\frac{C}{G} = 1$ ហើយ $\frac{A+C}{T+G} = 1$ ។


-ផលធៀបប្រែប្រួលគឺ $\frac{C}{A}$, $\frac{T}{G}$, $\frac{A+T}{C+G}$

ពីព្រោះ A និង C , T និង G មិនមែនជាបាសបំពេញគ្នា ទៅតាម $A \neq C$,

$T \neq G$ ដូច្នេះផលធៀប $\frac{C}{A} \neq 1$, $\frac{T}{G} \neq 1$ ហើយ $\frac{A+T}{C+G} \neq 1$ ។


(194) តំនូសបំប្លែងខាងក្រោមតំណាងនូវផលនៃ ¹⁹⁴ADN របស់កោសិកា
ក្នុងវដ្តកោសិកា។ ចូរដាក់ចំនងជើងទៅតាមតំណក់កាលនីមួយៗនិងពន្យល់
បញ្ជាក់ពីវិវត្តបរិមាណ ADN ដែលតាងដោយ Q និង 2Q ក្នុងវដ្តកោសិកា
ជាអនុគមន៍នៃពេល។

បរិមាណ ADN ក្នុងវដ្តកោសិកា



ដាក់ចំណងជើងដំណាក់កាលនីមួយៗ និងបញ្ជាក់ពីវិវត្តបរិមាណADN :

បរិមាណADN ក្នុងវដ្តកោសិកា



-កាលណាបរិមាណADN នៅត្រង់ Q នោះជាវគ្គ G_1 នៃចន្លោះវគ្គ: នុយក្លេអូកីឡាម៉ង់ធម្មតាគឺមិនទាន់តំឡើងទេ ។

-ក្នុងរយៈពេលវគ្គ S បរិមាណ ADN ឡើងទ្រើតនុយក្លេអូកីឡាម៉ង់ បង្ហាញភ្នែកតំឡើងទ្រើត ។

-វគ្គ G_2 ដែលបញ្ចប់ចន្លោះវគ្គនុយក្លេអូកីឡាម៉ង់ទាំងអស់តំឡើងទ្រើត ជាស្រេច ។

-មីតូសចាប់ផ្ដើមតាំងពីការលេចរូបរាងដំបូងនៃក្រុមសូមដែលបណ្តាលពី ធ្វើស្បែកកម្មបរិមាណ ADN $2Q$ ។

-ចប់មីតូស (តេឡូផាស) ក្រុមសូមរលាស្បែកហើយបរិមាណADN ចុះត្រឹម Q វិញនេះបណ្តាលពីការចែកជា 2 ក្រុមស្មើគ្នា ទៅប៉ូលរៀងខ្លួន ក្រុមសូម

មួយមានក្រម៉ាទីតតែមួយគត់ ។

-20 ម៉ោងក្រោយមកវដ្តកោសិកាថ្មីចាប់ផ្តើមពីដើមចន្លោះវគ្គតទៀត ។

(195) គេវាស់បរិមាណ ADN ក្នុងកោសិកាមនុស្សតេទទួលបានបរិមាណ ADN ក្នុងកោសិកាផ្សេងៗគ្នា:

បរិមាណADNក្នុងកោសិកា	កោសិកាថ្លើម	កោសិកាប្រសាទ	កោសិកាស្បែក
មួយៗ គិតជាពិកូក្រាម(10^{-12} g)	7,3	7,3	7,3

ចេញពីចំនេះដឹងរបស់អ្នក និង ពិលទ្ធផលក្នុងតារាងនេះ ចូរទាញការសន្និដ្ឋាន ។


គ្រប់កោសិកាទាំងអស់នេះ ជាកោសិកាលូតលាស់ដែលចេញពីស៊ីក្លូតតែ ។
ធ្វើមីតូសជាបន្តបន្ទាប់រាប់រងADNដែលជារូបធាតុតំនពូជអោយនៅថេរដែល
ក្នុងគ្រប់កោសិកានៃសរីរាង្គ ។

(196) ក្នុងឈ្លើយនៃកោសិកាកណ្តុរ

មានបរិមាណ ADN :

$2Q$ ត្រូវនឹងក្រម៉ូសូម $2n$ ក្នុងដើម

ចន្លោះវគ្គ ។



ក/ តើ 1,2,3,4,5 តំណាងអោយវគ្គអ្វីខ្លះ?

ខ/ តើ DE, EF, FG, GH, HI, IJ ជាវគ្គអ្វីខ្លះ?

ក/ 1: វគ្គ G_1 , 2 : S, 3 : G_2 , 4: ចំនែកទី1, 5: ចំនែកទី2

ខ/ DE ប្រជាសា និង មេតាជាសា , EF អាណាជាសា , FG: គេ.

សំនួរដងស្រង់ចេញពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំ:

- 1/ ចូរពណ៌នាការពិសោធន៍របស់លោក ត្រី ភីត ។
- 2/ ចូរពណ៌នាពិសោធន៍របស់លោកអារី និង ស្ការី ។
- 3/ តើម៉ូលេគុលADN មាននុយក្លេអូទីតប៉ុន្មានយ៉ាង? ហេតុអ្វីបានជា
នុយក្លេអូទីតទាំងនោះខុសគ្នា?
- 4/ នុយក្លេអូទីតនៃម៉ូលេគុលADN តភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?
- 5/ ក្រោយពីពេលស្វ័យតំឡើងទ្វេហើយហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូន
ទាំង2ដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ?

សំគាល់: សំនួរដើម្បីអោយស្របនឹងចំណេះច្នៃមេតាគ្យ: ហេតុអ្វីបានជា

គេជាម៉ូលេគុល ADN កូន...

ចំណេះ:

- 1/ សៀវភៅសិស្សទំព័រ 56-57 ។
- 2/ សៀវភៅសិស្សទំព័រ 57-58 ។
- 3/ ម៉ូលេគុល ADN មាននុយក្លេអូទីត4យ៉ាង ។ បានជានុយក្លេអូទីត
ទាំង4យ៉ាងនេះខុសគ្នាព្រោះនុយក្លេអូទីតនីមួយៗកើតពីបាស4យ៉ាង(A,T,C,
G) ខុសគ្នាទាំងអស់ ។
- 4/ នុយក្លេអូទីតនីៗក្នុងប្រភេទនីមួយៗភ្ជាប់គ្នាដោយ **សម្ព័ន្ធកូរ៉ាញ៉ុង**

គឺភ្ជាប់ពីអាស៊ីតដូស្ត្រិចនៃនុយក្លេអូទីត1 ទៅនឹង ស្ករដេអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេអូ-
ទីត1ទៀត ។

៥/ ក្រោយពេលស្វ័យតំឡើងទ្វេហើយ ម៉ូលេគុល ADNក្នុងទាំង2ដូច
គ្នាបេះបិទទៅនឹង ADNមេ ពីព្រោះម៉ូលេគុល ADNក្នុងមានច្រវាក់ម្ខាងនៃ
ម៉ូលេគុលADNមេជាពុម្ពគំរូ ។



197

អ្វីទៅជាពត៌មានសេនេទិច ? តើវាស្ថិតនៅឯណា ? ហើយតើម៉ូលេគុលអ្វីដែលជាទំព័រពត៌មានសេនេទិច ?

- ពត៌មានសេនេទិច : មើលសៀវភៅពន្យល់ពាក្យទំព័រ ៣៦
- វាស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកា ។
- + ទំព័រពត៌មានសេនេទិច គឺ ម៉ូលេគុល ADN ។

198

តើកោសិកាមេ អាចបញ្ជូនពត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុងទៅអោយកោសិកាកូនដោយសារអ្វី ?

កោសិកាមេ អាចបញ្ជូនពត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុង ទៅអោយកោសិកាកូនដោយសារមីតូស ដែលក្នុងនោះវាបំបែកដោយចលនការ ២ :

- ស្វ័យគំលើងទ្វេ ADN នៅចន្លោះវគ្គ
- ចំណែកស្មើគ្នានៃ ADN ទៅបំបែកខ្លួននៅអាណាផាស

199

ដូចម្តេចដែលហៅថា ផេណូទីប ?

ដើម្បីសង្ខេបចេញជាផេណូទីប តើពត៌មានសេនេទិចត្រូវសំយោគចេញជាម៉ូលេគុលអ្វី ?

- + ផេណូទីប គឺជាសំណុំលក្ខណៈរបស់សារពាង្គកាយ ។
- + ដើម្បីសង្ខេបចេញជាផេណូទីប ពត៌មានសេនេទិច ត្រូវសំយោគចេញជាម៉ូលេគុលប្រូទីត ។

200


អ្វីទៅជាប្រូទីត ? យោងទៅតាមចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ តើគេចែកប្រូទីតជាប៉ុន្មានក្រុម ? អ្វីខ្លះ ?

ប្រូទីតជាសារធាតុសរីរាង្គ ដែលកើតពីធាតុសំខាន់ៗ C, H, O, N ។ ឯកតានៃធាតុបង្ក
របស់ប្រូទីត គឺអាស៊ីតអាមីនេ ។


ទៅតាមចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ គេចែកប្រូទីតជា ៣ ក្រុម :

ក. អាស៊ីតអាមីនេ : ជាប្រូទីតងាយបំផុត ។ អាស៊ីតអាមីនេនីមួយៗមានបណ្តុំកាបូកស៊ីល
(-COOH), បណ្តុំអាមីន (-NH₂) និងភ័ក្តិកាល់ R ។

រូបមន្តទូទៅនៃអាស៊ីតអាមីនេ :



រូបមន្តលាត



រូបមន្តស្មើលាត

ខ. ប៊ីប្រូទីត : ជាប៉ូលីមែរនៃអាស៊ីតអាមីនេ ។ វាអាចជាឌីប៊ីប្រូទីត ទ្រីប៊ីប្រូទីត
តេត្រាប៊ីប្រូទីត ប៉ងតាប៊ីប្រូទីត... ។ ប្រសិនបើអាស៊ីតអាមីនេ មានច្រើនជាងនេះ គេហៅប៊ីប្រូទីត
ថាប៉ូលីប៊ីប្រូទីត ។ (ប៉ូលីប៊ីប្រូទីតអាចកើតពីអាស៊ីតអាមីនេតិចជាង 50) ។


គ. ប្រូតេអ៊ីន : ជាប៉ូលីមែរនៃអាស៊ីតអាមីនេ ដែលបង្កឡើងដោយច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីប្រូទីត
មួយ រឺ ច្រើន ។ វាមានចំនួនអាស៊ីតអាមីនេលើសពី 50 ។

201

ចូរសរសេររូបមន្តស្មើលាតរបស់អាស៊ីតអាមីនេ ។

តើអាស៊ីតអាមីនេមាននាទីប៉ុន្មានយ៉ាង ? អ្វីខ្លះ ?

+ រូបមន្ត ស្មើលាតរបស់អាស៊ីតអាមីនេ :




+ អាស៊ីតអាមីនេ មាននាទី ២ យ៉ាងគឺ នាទីអាស៊ីត (-COOH) និង នាទីបាស (-NH₂) ។

តើអាស៊ីតអាមីនេ មានប៉ុន្មានប្រភេទ ? វាខុសគ្នាដោយសារអ្វី ? ចូរអោយឧទាហរណ៍ ២ ដោយបញ្ជាក់តាមរូបមន្ត ?


+ អាស៊ីតអាមីនេមាន ២០ ប្រភេទ ។

+ វាខុសគ្នាដោយសាររ៉ាឌីកាល់ (R) ។

+ ឧទាហរណ៍ : គីតូកូល (គីស៊ីន) : $\text{H} - \text{CH} - \text{COOH}$



ស៊ីស្តេអ៊ីន : $\text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH}$



តើអាស៊ីតអាមីនេ ២ ភ្ជាប់ដោយសារចំណងអ្វី ? វាភ្ជាប់របៀបដូចម្តេច ? ចូរសរសេររូបមន្តចំណងនេះ ។

អាស៊ីតអាមីនេ ភ្ជាប់គ្នាដោយសារចំណងប៊ីប៊ីទីត ។ វាភ្ជាប់គ្នាពីបណ្តុំកាបូកស៊ីលនៃអាស៊ីតអាមីនេមួយទៅ បណ្តុំអាមីននៃអាស៊ីតអាមីនេមួយទៀត ដោយបំបាត់ទឹក ១ ម៉ូលេគុល ។

រូបមន្តចំណងប៊ីប៊ីទីត : -CO-NH-



រ៉ាឌីកាល់ក្នុងរូបមន្តអាស៊ីតអាមីនេ អាស្យាទីត គឺ :

$\text{-CH}_2 - \text{COOH}$ ហើយរ៉ាឌីកាល់ក្នុងរូបមន្តត្រេអូអ៊ីន គឺ : $\text{CH}_3 - \text{CH} -$
 OH



ក. ចូរសរសេររូបមន្ត ស្ទើរលាតរបស់អាស៊ីតអាមីនេទាំង ២ ។

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាត ឌីប៊ីប៊ីទីតដែលកើតពីអាស៊ីតអាមីនេទាំង ២ ។

+ ក. រូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ : $R - CH - COOH \Rightarrow$ រូបមន្តទូទៅ :



+ ខ. រូបមន្តឌីប៊ីប៊ុទ្រីត :



205

តើអាស៊ីតអាមីនេទាំង 20 យ៉ាងអាចភ្ជាប់គ្នាជាឌីប៊ីប៊ុទ្រីត បានប៉ុន្មានប្រភេទ ? ទ្រីប៊ីប៊ុទ្រីត ប៉ុន្មាន ប្រភេទ ? ករណីប៉ូលីប៊ីប៊ុទ្រីតមានអាស៊ីតអាមីនេចំនួន n តើវាបង្កើត បានជា ប៉ូលីប៊ីប៊ុទ្រីតបាន ប៉ុន្មានប្រភេទ ?

+ ឌីប៊ីប៊ុទ្រីតកើតពីអាស៊ីតអាមីនេ ២ តភ្ជាប់គ្នា ។ ដូច្នេះអាស៊ីតអាមីនេទាំង 20 ប្រភេទអាច បង្កើតបាន : $20 \times 20 = 20^2 = 400$ ប្រភេទឌីប៊ីប៊ុទ្រីត ។

+ ទ្រីប៊ីប៊ុទ្រីតកើតពីអាស៊ីតអាមីនេ 3 តភ្ជាប់គ្នា ។ ដូច្នេះអាស៊ីតអាមីនេទាំង 20 ប្រភេទអាច បង្កើតបាន : $20^3 = 8000$ ប្រភេទទ្រីប៊ីប៊ុទ្រីត ។

+ ករណីប៉ូលីប៊ីប៊ុទ្រីតមានអាស៊ីតអាមីនេចំនួន n វាអាចបង្កើតបាន 20^n ប្រភេទប៉ូលីប៊ីប៊ុទ្រីត ។

ចូរនិយាយពីនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន ។

ប្រូតេអ៊ីន មាននាទីជា :

- + ប្រូតេអ៊ីនទំរង់ : ភ្នាសកោសិកា ធាតុកោសិកា ជាលីកាសន្ទាន ជាលីកាស្បែក ពូរសាច់ដុំជាប្រូតេអ៊ីន ។ ការកម្រិតសាច់ ក៏បណ្តាលមកពីប្រូតេអ៊ីន ទំរង់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែរ ។
- + អង់ស៊ីម : ជាកាតាលីករជីវៈជួយជំរុញប្រតិកម្មគីមី បំបែក និង សំយោគ ។ អង់ស៊ីម 1 មានអំពើទៅលើប្រតិកម្មតែ 1 ប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ។
- + អង់ទីករ : ជាមូលេគុលយថាប្រភេទដែលបញ្ចេញដោយសារពាង្គកាយ ដើម្បីឆ្លើយតប និង ការជ្រៀតចូលនៃធាតុមកពីក្រៅ (មេរោគ) គឺវាមាននាទីការពារសារពាង្គកាយ ។
- + អរម៉ូន (ភាគច្រើនជាប្រូតេអ៊ីន) : បញ្ចេញដោយក្រពេញអង់ដូត្រីន ។ វាដឹកនាំតាមឈាម និង មានអំពើទៅលើដង្ហើមប្រព្រឹត្តនៃជាលីកា ឬ សរីរាង្គ ។
- + អេម៉ូកូប៊ីន : ដឹកនាំអុកស៊ីសែនចាំបាច់សំរាប់ដំណកដង្ហើម ។

207

តើអង់ស៊ីមទាំងអស់មានកំនើតជាអ្វី ? តើវាជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រតិកម្មគីមី ក្នុងសារពាង្គកាយដូចម្តេចខ្លះ ?

- + អង់ស៊ីមទាំងអស់ មានកំនើតជាប្រូតេអ៊ីន ។
- + វាជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រតិកម្មគីមីបំបែក និង សំយោគ ។ អង់ស៊ីមនីមួយៗ ជាកាតាលីករជីវៈយថាប្រភេទ គឺវាមានអន្តរាគមន៍ តែទៅលើប្រតិកម្មគីមីតែមួយប្រភេទៗ ប៉ុណ្ណោះ ប្រៀបដូចជាកូនសោរមួយដែលអាចបើកបានតែមេសោរមួយ ។ ដោយកោសិកា មានប្រតិកម្មរាប់ពាន់ខុសគ្នា នោះក្នុងកោសិកាក៏មានរាប់ពាន់អង់ស៊ីមដែរ ។

208

តើត្រូវអង់ទីករទាំងអស់ សុទ្ធតែជាមូលេគុលអ្វី ? វាមាននាទីដូចម្តេច ?

+ គ្រប់អង្គទីក្រុងទាំងអស់ សុទ្ធតែជាម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ។

+ វាមាននាទីការពារសារពាង្គកាយ ដោយឆ្លើយតប និងការជ្រៀតចូលនៃធាតុមកពីក្រៅ (មេរោគ) ។

209

តើគ្រប់អម្លែងទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនឬទេ ?

ចូរបង្ហាញពីនាទីអម្លែងដោយអោយឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ។

+ អម្លែងទាំងអស់ មិនមែនសុទ្ធតែជាប្រូតេអ៊ីនទេ គឺមួយចំនួនតូចជាអម្លែងស្ទើរអីត វាជាធាតុស្រលាយ ពីកូឡេស្ទេរ៉ូល (ឧទា. អម្លែងភេទ) ។

+ អម្លែងមាននាទីរ៉ាប់រងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ជាលិកា ឬ សរីរាង្គ នៃសារពាង្គកាយ ។

ឧទា. អាំងស៊ុយលីន ផលិតចេញពីលំពែង ត្រូវដឹកនាំតាមឈាម ។ វាជួយបញ្ចុះអត្រាក្នុងកូសនៅក្នុងឈាម (អ៊ីប៉ូគ្លីសេមី) ដោយអនុគ្រោះអោយធ្វើមជ្ឈកក្នុងកូស និង អោយកោសិកាប្រើ គ្រុធកូស ។

210

ក. តើកោសិកានីមួយៗ ទទួលអាស៊ីតអាមីនេបានមកពីណា ?

ខ. តើប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីក្រៅ (នៅក្នុងអាហារ) នៅពេលដែលចូលដល់សារពាង្គកាយ តើវានៅតែរក្សាជាប្រភេទភាពរបស់វាទៀត រឺទេ ?

ចូរពន្យល់អោយបានខ្លី ។

ក. កោសិកាទទួលអាស៊ីតអាមីនេ បានមកពីការបំបែកម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងអាហារ ។

ខ. ពេលចូលដល់សារពាង្គកាយ ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបាត់បង់យថាប្រភេទរបស់វា ។ ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងអាហារបានបំបែកជាដំបូងនៅក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារក្រោមអំពើនៃអង់ស៊ីមរហូតក្លាយជាអាស៊ីតអាមីនេ ។ អាស៊ីតអាមីនេទាំងនេះ ត្រូវជ្រាបតាមភ្លាសពោះវៀនតូចធ្វើដំណើរ

តាម ជួរឈាម ឆ្លងកាត់ថ្លើម និង បេះដូង ។ ឈាមដែលចេញពីបេះដូងត្រូវបានដឹកនាំអាស៊ីត អាមីនេចូលទៅក្នុងកោសិកានៃសរីរាង្គទាំងឡាយ ។ នៅទីនោះអាស៊ីតអាមីនេត្រូវបាន សំយោគសារជាថ្មី ដើម្បីបង្កើតនូវប្រូទីតយថាប្រភេទផ្ទាល់របស់សារពាង្គកាយ ។

211
តើប្រូតេអ៊ីន ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយនៃឯកត្តៈមួយ សុទ្ធតែដូចគ្នា ឬ ខុសគ្នា ?
ចូរបញ្ជាក់អំនះអំនាង ។

ប្រូតេអ៊ីន ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយនៃឯកត្តៈមួយមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេ គឺសុទ្ធតែ ជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទ មានតំនល់ជាប់អាស៊ីតអាមីនេដោយឡែករៀងៗខ្លួន និង មានទំរង់ទី III ជាក់លាក់ទៅតាមតួនាទីរបស់វាក្នុងការកំនត់នូវលក្ខណៈរាងវិទ្យា និង សរីរវិទ្យារបស់ សារពាង្គកាយ ។

212
គ្មានប្រូតេអ៊ីន តែឯកត្តៈនីមួយៗអាចមានជីវិត ឬទេ ? ពីព្រោះអ្វី ?

គ្មានប្រូតេអ៊ីន ឯកត្តៈនីមួយៗមិនអាចមានជីវិតបានទេ ពីព្រោះប្រូតេអ៊ីនជាសាធាតុគ្រឹះ នៃជីវិត វាទំនត់លក្ខណៈរាងវិទ្យា គឺមាននាទីជាប្រូតេអ៊ីនទំរង់ ហើយវាកំនត់លក្ខណៈ សរីរវិទ្យា គឺមាននាទីជាអង់ស៊ីម អរម៉ូន អង់ទីករ អេម៉ូកូប៊ីន ។

213
ក. តើទំរង់មូលដ្ឋាននៃ ប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វី ?
ខ. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលកំនត់យថាប្រភេទភាពនៃប្រូតេអ៊ីន (ឬកំណត់លក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ របស់ប្រូតេអ៊ីន) ។

ក. ទំរង់មូលដ្ឋាននៃប្រូតេអ៊ីន គឺប្រភេទអាស៊ីតអាមីនេ ដែលភ្ជាប់គ្នាដោយចំនងប៊ុបទីត ។

ខ.កត្តាដែលកំណត់យថាប្រភេទភាពនៃប្រូតេអ៊ីន គឺ តំណល់ដាច់អាស៊ីតអាមីនេ (ចំនួន ប្រភេទ ទីតាំងអាស៊ីតអាមីនេ) និងទំរង់ទី III នៃមូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ។

214

តើអ្វីទៅដែលកំណត់ យថាប្រភេទនៃនាទីប្រូតេអ៊ីន ?

យថាប្រភេទនៃនាទីប្រូតេអ៊ីនកំណត់ដោយ : តំណល់ដាច់អាស៊ីតអាមីនេ និង ទំរង់ទី III នៃប្រូតេអ៊ីន ។

215

តើប្រូតេអ៊ីនទាំងឡាយ ខុសគ្នាដោយសារអ្វីខ្លះ ?

ប្រូតេអ៊ីនទាំងឡាយ ខុសគ្នាដោយសារ : តំណល់ដាច់អាស៊ីតអាមីនេ (ចំនួន ប្រភេទ ទីតាំងអាស៊ីតអាមីនេ) និង ទំរង់ទី III នៃប្រូតេអ៊ីន ។

216

នៅក្នុងកោសិកា ប្រូតេអ៊ីន មាននាទីធំៗពីរយ៉ាង គឺកំណត់លក្ខណៈរាងវិទ្យា និង សរីរៈវិទ្យា ។

ចូរអោយឧទាហរណ៍អោយបានមួយក្នុងនាទីនីមួយៗ ។

សំនុំនេះបានស្នើ និង ចេញប្រលងចូលសកលវិទ្យាល័យវេទមហាបូស្សី (1999 -2000)

+ នាទីប្រូតេអ៊ីនក្នុងរាងវិទ្យា :

ប្រូតេអ៊ីនកំណត់លក្ខណៈកំពស់ (ឬពណ៌ភ្នែក ពណ៌ស្បែក)

+ នាទីប្រូតេអ៊ីនក្នុងសរីរៈវិទ្យា :

ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាអង់ស៊ីម ដែលចូលរួមគ្រប់ប្រតិកម្មគីមីជីវៈក្នុងសារពាង្គកាយ ។

217

ក្នុងពិភពរស់ អាស៊ីតអាមីនេមានតែ 20 ប្រភេទទេ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវាអាចបង្កើតបានជាប្រូតេអ៊ីន ច្រើនអនេកផ្សេងគ្នា ?

ពីព្រោះប្រូតេអ៊ីននីមួយៗ មានអាស៊ីតអាមីនេច្រើន (លើសពី 50) ។ អាស៊ីតអាមីនេទាំងនេះមានលទ្ធភាពបង្កើតបានជាប្រូតេអ៊ីនដែលខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសារ ចំនួនប្រភេទ ទីតាំងអាស៊ីតអាមីនេ ក្នុងទំរង់ទី I ហើយរូបតំបែនជាទំរង់ទី III ដោយមាននាទីកំនត់ជាក់លាក់រៀងៗខ្លួន ។ បើមានការផ្លាស់ប្តូរកត្តាណាមួយ នោះប្រូតេអ៊ីន នឹង ផ្លាស់ប្តូរទំរង់ និងមុខងារ ទាំងអស់ ។

218 ហេតុដូចម្តេច បានជាគេថាមូលេគុលប្រូតេអ៊ីនជាម៉ាក្រូមូលេគុលមានក្រម ?

វាជាម៉ាក្រូមូលេគុលពីព្រោះវាកើតពីអាស៊ីតអាមីនេជាច្រើន (លើសពី 50) ហើយវាជាមូលេគុលមានក្រម ពីព្រោះអាស៊ីតអាមីនេទាំងនេះមិនមែនភ្ជាប់គ្នាដោយគ្មានរបៀបទេ គឺវាភ្ជាប់គ្នាក្នុងលំដាប់កំនត់ច្បាស់លាស់ទៅតាមចំនួន ប្រភេទ ទីតាំងអាស៊ីតអាមីនេ ដែលកំនត់ដោយតំនលំដាប់នយោបាយក្នុងអ៊ីតនៃសែន ។ បើសិនជាមានបំលាស់ប្តូរនូវកត្តាណាមួយ វានឹងបាត់បង់នូវយថាប្រភេទភាពរបស់វាជាមិនខាន ។

219 តើប្រូតេអ៊ីន មានទំរង់ទូទៅដូចម្តេច ?

ប្រូតេអ៊ីនជា ប៉ូលីមែរនៃអាស៊ីតអាមីនេដែលមានលើសពី 50 ។ វាអាចបង្កឡើងពីច្រវាក់ប៉ូលីប៊ិបទីត មួយ រឺ ច្រើន ។ ប្រូតេអ៊ីននីមួយៗ ជាម៉ាក្រូមូលេគុលដែលមានទំរង់ជាក់លាក់ ។

ទំរង់ប្រូតេអ៊ីនមាន 3 កំរិត :

- ទំរង់ទី I : ជាតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ ដែលបង្កជាខ្សែទោលងាយ ។ ទំរង់នេះខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសារតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ ។
- ទំរង់ទី II : ជាច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេ ដែលរុំជាខ្សែខ្មៅ ។
- ទំរង់ទី III : ជាខ្សែខ្មៅប៉ូលីប៊ិបទីត ដែលរងការរុំថ្មី មួយទៀត ។

220 តើយថាប្រភេទនៃតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេរបស់ប្រូតេអ៊ីននីមួយៗកំនត់ជាបន្តបន្ទាប់នូវយថា ប្រភេទនៃអ្វីរបស់ប្រូតេអ៊ីន ?

យថាប្រភេទនៃតំនល់ដាច់អាស៊ីតអាមីនេរបស់ប្រូតេអ៊ីននីមួយៗ កំនត់ជាបន្តបន្ទាប់ នូវ
 យថាប្រភេទនៃរូបរាងហើយ ដែលកំនត់ជាបន្តនូវយថាប្រភេទនៃនាទីរបស់វា ។

221 តើជាដេលុទីប អាស្រ័យទៅ នឹងប្រូតេអ៊ីនតើពិតឬ ទេ ? ចូរបញ្ជាក់គំនិតរបស់អ្នក ។


ដេលុទីប អាស្រ័យទៅនឹងប្រូតេអ៊ីន ជាការពិត ពីព្រោះប្រូតេអ៊ីនភាគច្រើន ធ្វើអោយ
 លេចឡើងនូវដេលុទីប (រូបរាង ពណ៌ សំបុរ កំហុសមេតាបូលីស...) ។ កាលណាប្រូតេអ៊ីន
 រងនូវបំប្លែងតំនល់ដាច់អាស៊ីតអាមីនេ ឬ អវត្តមានប្រូតេអ៊ីនដោយបុព្វហេតុណាមួយ
 នោះវា នឹងធ្វើអោយដេលុទីបដែលកំនត់ដោយប្រូតេអ៊ីននោះប្រែប្រួល ឬក៏មិនអាចលេចចេញ
 ជាដេលុទីបបាន ។

ឧទា. - កង្វះអង់ស៊ីមប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគអាមីដុង ធ្វើអោយពោតមានគ្រាប់ជិត ។

- អវត្តមានប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីម “ ដេលុលអុកស៊ីដាស ” ធ្វើអោយបាត់បង់ជាតិ ពណ៌
 “ រង ឡានី ឆ ” ។ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ ឆ “ រង ឡានី ” ។

222 តើសារធាតុអ្វី ដែលបណ្តាលអោយភ្នែក ស្បែក រោម មានពណ៌ ? តើសារធាតុនេះ មានប្រភព
 ចេញពីអ្វី ? វាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ?

- + សារធាតុដែលបណ្តាលអោយភ្នែក ស្បែក រោម មានពណ៌ គឺ មេឡានីន (ជាតិពណ៌ត្នោត) ។
- + មេឡានីន មានប្រភពចេញពីអាស៊ីតអាមីនេ ទីរូស៊ីន ដែលមាននៅក្នុងអាហារ ។
- + វាកើតឡើងដោយសារ ប្រតិកម្មគីមីដែលបំប្លែង ទីរូស៊ីន ក្រោមអំពើនៃអង់ស៊ីម : ដេលុល
 អុកស៊ីដាស :



ដូចម្តេចដែលហៅថា “ភ្លើង” ?
តើ “ភ្លើង” បណ្តាលមកពីអ្វី ?

- + ភ្លើង គឺជាភាពចាត់បង់នូវជាតិពណ៌លើភ្នែក ស្បែក រោម ... ដោយសារអវត្តមានមេឡានីន ។
- + ភ្លើងបណ្តាលមកពីកង្វះអង់ស៊ីម ដែលទុកអ្នកស៊ីដាស សំរាប់សំយោគមេឡានីន ដែលជាជាតិពណ៌ត្នោតសំរាប់ផ្តល់ពណ៌ដល់ ភ្នែក ស្បែក រោម ... ។

លក្ខណៈរួម (លក្ខណៈដូចគ្នា) នៃម៉ូលេគុល ADN និងប្រូតេអ៊ីន មានអ្វីខ្លះ ?

លក្ខណៈរួម រវាងម៉ូលេគុល ADN និងប្រូតេអ៊ីន :

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗ ជាប្រភេទនៃម៉ូលេគុល តូចៗដែលជាឯកតា (ម៉ូណូមែរ) ។
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗ មានតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត ឬ អាស៊ីតអាមីនេយ៉ាងជាក់លាក់ ។

- ក. តើតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ ក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច ?
- ខ. តើតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត ក្នុងម៉ូលេគុល ADN មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច ?

ក. សារៈសំខាន់តំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ ក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន កំណត់ថាប្រភេទរូបរាង និងនាទីប្រូតេអ៊ីន ។

ខ. តំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត ក្នុងម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាពីសែនមួយទៅសែនមួយ ។
ដូចនេះសារៈសំខាន់នៃតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត ADN គឺកំណត់តំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនអោយខុសគ្នា គឺ ជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទ ។

226

ហេតុដូចម្តេច បានជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថា :

ពត៌មានសេនេទិច ស្ថិតនៅត្រង់តំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត នៃម៉ូលេគុល ADN ?

ពីព្រោះគេឃើញថា អង្គត់ពីរបស់ ADN ដែលមានតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីតខុសគ្នា សំយោគបានប្រូតេអ៊ីន 2 បែបដែលមានតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនខុសគ្នាដែរ ដូច្នេះគឺ នុយក្លេអូទីតនេះហើយដែលជាពត៌មាន សេនេទិចមានតួនាទីសាងសង់ទំរង់ប្រូតេអ៊ីនសំរាប់កំនត់លក្ខណៈសារពាង្គកាយ ។

227

ក្នុងកោសិកាអ៊ីការីយ៉ូត ពត៌មានសេនេទិចស្ថិតនៅលើម៉ូលេគុលអ្វី ? មានទីតាំងនៅឯណា ?

+ ពត៌មានសេនេទិច ស្ថិតនៅលើម៉ូលេគុល ADN ក្រោមទំរង់ជាតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត ។ វាស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា ។

228

ពីសែនទៅប្រូតេអ៊ីន មានប៉ុន្មានជំនាក់ ? អ្វីខ្លះ ? ជំនាក់ទាំងនេះ កើតនៅឯណា ?

- + ពីសែនទៅប្រូតេអ៊ីន មាន 2 ជំនាក់ :
- ជំនាក់ចំលង : សំយោគ ARNm ដែលជាសំនោចំលងពត៌មានសេនេទិច ។
- ជំនាក់បំបែកប្រែ : បកប្រែពត៌មានសេនេទិចអោយទៅជាប្រូតេអ៊ីន ។
- + ជំនាក់ចំលងកើតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ
- + ជំនាក់បំបែកប្រែ កើតនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស ។

229

ហេតុដូចម្តេចបានជា មានការចំលងពី ADN ទៅ ARNm ?

បានជាត្រូវ មានការចំលងពី ADN ទៅ ARNm ពីព្រោះ ADN ដែលមានព័ត៌មាន សេនេទិចសំរាប់សំយោគប្រូទីន ស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ ឯសំយោគប្រូតេអ៊ីនកើតឡើងនៅក្នុង ស៊ីតូប្លាស ដូច្នេះព័ត៌មានត្រូវបញ្ជូនពីណ្វៃយ៉ូមកស៊ីតូប្លាសតាមរយៈ ARNm ។

230 តើអ្វីទៅជា ARN ? តើ ARN មានប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ? (មិនបាច់រៀបរាប់) ។

ARN ជាប្រភេទមួយនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីត ។ វាជាប៉ូលីមែរនៃរីបូនុយក្លេអ៊ីតមួយខ្សែ ។ វាកើតពីការចំលងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន ។ វាមាននាទីចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូទីន ។

ARN មាន 3 ប្រភេទ :

- ARN ឆាន់សារ (ARNm)

- ARN ដឹកនាំ (ARNt)

231 - ARN រីបូសូម (ARNr)

តើម៉ូលេគុល ARN និង ADN មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ ?

លក្ខណៈខុសគ្នារវាង

ម៉ូលេគុល ARN

- ជាច្រវាក់រីបូនុយក្លេអ៊ីត 1 ខ្សែ
- ខ្លីជាងម៉ូលេគុល ADN យ៉ាងខ្លាំង
- ចំនួននុយក្លេអ៊ីត តិច (រាប់សិបទៅរាប់ពាន់)
- ម៉ាស់ម៉ូលេគុលប្រែប្រួលពី 25.000 ទៅ 500.000 ។

ម៉ូលេគុល ADN

- ជាច្រវាក់ដេអុកស៊ីរីបូនុយក្លេអ៊ីត 2 ខ្សែ ភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ។
- វែងជាងម៉ូលេគុល ARN យ៉ាងខ្លាំង
- ចំនួននុយក្លេអ៊ីត ច្រើន (រាប់ម៉ឺនទៅរាប់លាន)
- ម៉ាស់ម៉ូលេគុលប្រែប្រួលពីរាប់លាន ទៅ រាប់កោដិ ។

- ស្ត្រូបភេទរីបូស ($C_5H_{10}O_5$)

- បាសប្រភេទអ៊ុយរ៉ាស៊ីល (U)

- ស្ត្រូបភេទដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$)

- បាសប្រភេទទីមីន (T)

232

តើការចំណងពី ADN ទៅ ARNm (សំយោគ ARNm) ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច ?

ការសំយោគ ARNm ប្រព្រឹត្តនៅលើម៉ូលេគុល ADN ក្នុងចន្លោះវគ្គដោយ មាន អន្តរាគមន៍ពីអង់ស៊ីម ARN ប៉ូលីមេរ៉ាស ។ វាមាននាទីច្រើនយ៉ាង :

- ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិច នៅលើ ADN ដែលអាចអោយចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការសំយោគម៉ូលេគុល ARN នាំសារត្រង់កន្លែងជាក់លាក់ ។

- បើកម៉ូលេគុល ADN ដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំង 2 ។

- ធ្វើអោយមានប៉ូលីមែរកម្មនៃនុយក្លេអូទីត ។ ពេលនោះ រីបូនុយក្លេអូទីតសេរី បានមកភ្ជាប់ នឹងច្រវាក់តែម្ខាងនៃសែន តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A - U, C - G ។ ARNm ដែលកើតនេះ ដូចគ្នា នឹងច្រវាក់មិនមែនជាពុម្ព (លើកលែងតែ T ត្រូវជំនួសដោយ U) ។

- សំយោគរួចភ្លាម ម៉ូលេគុល ARNm ក៏ផ្តាច់ខ្លួនចេញពី ADN ហើយចាកចេញពី ណ្វៃយ៉ូ ។

233

ចូរបង្ហាញពីលក្ខណៈរួម (ដូចគ្នា) និងខុសគ្នារវាងសំយោគ ARN និងស្វ័យតំលើងទ្វេដៃ ADN ។

+ លក្ខណៈរួម :

- ប្រព្រឹត្តក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកា នៅចន្លោះវគ្គ ។

- សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃច្រវាក់នុយក្លេអូទីតទាំង 2 របស់ ADN ត្រូវផ្តាច់ចេញពីគ្នា

- ប្រព្រឹត្តក្រោមអំពើអង់ស៊ីមប៉ូលីមេរ៉ាស ។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា :

សំយោគ ARN m

- រីបូស៊ីយក្លេអូទីតសេរីជាប្រភេទ A, U,

C, G

- ទុយក្លេអូទីតសេរីបំពេញទៅនឹង ច្រវាក់
តែម្ខាងនៃអង្គត់ ADN តាមគោលការណ៍
បំពេញបាន A - U, C - G

- ក្រោយការសំយោគគេបាន ARN មួយដែល
ផ្តាច់ចេញពីច្រវាក់ ADN ចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅ
កាន់ស៊ីតូប្លាស្ទ ឯច្រវាក់ទាំង 2 នៃ ADN ក៏
ភ្ជាប់គ្នាវិញ

- ប្រព្រឹត្តក្រោមអំពើ ARN - ប៉ូលីមេរ៉ាស ។

សំយោគ ឡើងទៀត ADN

- ដេអុកស៊ីរីបូស៊ីយក្លេអូទីតសេរីជាប្រភេទ A,
T, C, G ។

- ទុយក្លេអូទីតសេរីបំពេញទៅនឹងច្រវាក់ទាំង
សងខាងនៃម៉ូលេគុល ADN តាមគោល
ការណ៍បំពេញបាន A - T, C - G ។

- ក្រោយតំឡើងទៀត គេបានម៉ូលេគុល ADN
ក្នុង 2 ដូចគ្នាបេះបិទ និងដូច ADN មេ
ទៀតហើយវាស្ថិតក្នុងណ្វៃយ៉ូជានិច្ច ។

- ប្រព្រឹត្តក្រោមអំពើ ADN - ប៉ូលីមេរ៉ាស ។

234

ប្រៀបធៀបអ៊ីដ្រូលីស ADN និង ARN ។

អ៊ីដ្រូលីស ADN ផ្តល់

- អាស៊ីតផូស្វ័រិច H_3PO_4

- ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស $C_5H_{10}O_4$

- បាសនីទ្រីច A, T, C, G

អ៊ីដ្រូលីស ARN ផ្តល់

- អាស៊ីតផូស្វ័រិច H_3PO_4

- ស្កររីបូស $C_5H_{10}O_5$

- បាសនីទ្រីច A, U, C, G

235

ប្រៀបធៀបបាសអាសូតរបស់ ADN និង ARN ។

បាសអាស៊ីត ADN

+ បាសពរមឌុច :

- ទីមីន (T) និងស៊ីតូស៊ីន (C)

+ បាសពរិច :

- អាដេនីន (A) និងកាទីន (G)

បាសអាស៊ីត ARN

+ បាសពរមឌុច :

- អ៊ុយរ៉ាស៊ីល (U) និង ស៊ីតូស៊ីន (C)

+ បាសពរិច :

- អាដេនីន (A) និងកាទីន (G)

236

ត្រប់កោសិកាពូជលាស់ នៃសារពាង្គកាយប្រភេទតែមួយ តើបរិមាណ ADN ថេរ ឬ ប្រែប្រួល ? ឯបរិមាណ ARN វិញយ៉ាងណាដែរ ?

+ ត្រប់កោសិកាពូជលាស់ប្រភេទតែមួយ បរិមាណ ADN នៅថេរជាទីធ្ងរ គឺមិនប្រែប្រួលទេ ពីព្រោះវាជាធាតុបង្កនៃក្រុមសូមដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទនីមួយៗ ។

+ ឯបរិមាណ ARN វិញគឺប្រែប្រួលជាទីធ្ងរពីកោសិកាមួយទៅកោសិកាមួយ គឺប្រែប្រួលតិច ឬ ច្រើនទៅតាមចលនាការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។ ARN មានចំនួនច្រើននៅក្នុងជាលិកាក្រពេញ ជាលិកាពូជលាស់របស់រុក្ខជាតិ ជាលិកាអំប្រើយ៉ុង និងយាយូរមតី នៅក្នុងកោសិកាដែលកំពុង ដុះដាលពូជលាស់ ។

237

តើ ARN ប៉ូលីមេរ៉ាសជាអ្វី ? វាមាននាទីដូចម្តេច ?

+ ARN ប៉ូលីមេរ៉ាស ជាអង់ស៊ីមជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងសំយោគ ARN ។

- វាមាននាទី ៣ យ៉ាង :

- ទទួលស្គាល់ “សញ្ញាសេនេទិច” នៅលើ ADN ដែលអាចចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការសំយោគ ម៉ូលេគុល ARN នាំសារ ត្រង់កន្លែងជាក់លាក់ ។

ជា គឹមអៀង

- បើកម៉ូលេគុល ADN ដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំង 2 ។
- ធ្វើអោយមានប៉ូលីមែរកម្មនៃមួយក្រុមទីត ។

238

តើក្រុមសេនេទិចត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរបំណុល ដើម្បីបង្កើតជាកូដុងទាំង 64 ? តើកូដុង 1 ជាពត៌មានសំរាប់កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ បំណុល ? ហេតុដូចម្តេច បានជាអាស៊ីតអាមីនេ 1 អាចកំណត់ដោយត្រីណុតុច្រើន (កូដុងច្រើន) ?

- + ក្រុមសេនេទិច ត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរ 4 គូ (A, U, C, G) បង្កើតបានជាកូដុង 64 ។
- + កូដុង 1 ជាពត៌មានសំរាប់កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ 1 ។
- + បានជាអាស៊ីតអាមីនេមួយ អាចកំណត់ដោយត្រីណុតុច្រើនពីព្រោះកូដុងមានច្រើនគឺ 64 ឯអាស៊ីតអាមីនេ មានតែ 20 ប៉ុណ្ណោះ ។

239

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមសេនេទិច មានលក្ខណៈជាសកល ?

- + ពីព្រោះក្រុមសេនេទិច ត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមគ្នាគ្រប់ប្រភេទការរស់ទាំងអស់ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលទៅមនុស្ស ចំពោះសត្វក៏ដូចជាកូដាតិ ។

240

តើធាតុកោសិកាអ្វី ដែលចូលរួមសំយោគប្រូតេអ៊ីន ? វាមាននាទីជាអ្វីដែរ ? តើវាស្ថិតនៅដូចម្តេចខ្លះក្នុងស៊ីតូប្លាស្ទ ? តើវិបូសូមដែលនៅសេរីដោយគ្មានភ្ជាប់ទៅ នឹង ARNm អាចសំយោគប្រូទីនបាន ឬទេ ? តើព្រោះអ្វី ?

- គឺជាវិបូសូម
- + វាមាននាទីជាមេរោង គឺជាកន្លែងសំរាប់សំយោគប្រូតេអ៊ីន ។

+ វាស្ថិតនៅជាសេរីនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្ទ ប៉ុន្តែខ្លះទៀតស្ថិតនៅតាមផ្នែកក្រៅនៃវេទិកយូមអង់ដូប្លាស្ទ ។

+ មិនអាចសំយោគប្រទីតបានទេព្យាបាល ឬ ARNr ដែលបានកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

241

តើវិបូសូម មានប៉ុន្មានផ្នែក ? ផ្នែកនីមួយៗបង្កឡើងពីអ្វីខ្លះ ?

+ វិបូសូមមាន 2 ផ្នែក :

- ឯកតារាងធំ

- ឯកតារាងតូច


+ ឯកតារាងធំកើតពី :

- ARNr 3 ម៉ូលេគុល

- ប្រូតេអ៊ីន 45

+ ឯកតារាងតូចកើតពី :

- ARNr 1 ម៉ូលេគុល + ប្រូតេអ៊ីន 33



242

ចូរនិយាយពីកំណត់នៃវិបូសូម ។

វិបូសូមបង្កពីឯកតារាងពីរ ដែលកើតពីបណ្តុំ ARNr និងប្រូតេអ៊ីន ។

- ប្រូតេអ៊ីនវិបូសូម កើតនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្ទ បន្ទាប់មកវាធ្វើដំនើរ ចូលទៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ

- ARNr កើតនៅក្នុងនុយក្លេអូសនៃណ្វៃយ៉ូ

នៅក្នុងនុយក្លេអូសនៃណ្វៃយ៉ូ ប្រូតេអ៊ីន និង ARNr ភ្ជាប់ជាមួយគ្នា ដើម្បីបង្កើតជាវិបូសូមពេញលេញ រួចចាកចេញពីណ្វៃយ៉ូ មកកាន់ស៊ីតូប្លាស្ទ ដើម្បីបំពេញមុខងារជាមេរោគជាង

សំយោគប្រូតេអ៊ីន ។

កាលណាវីបូសូមតត្តាភ្ជាប់ដោយ ARNm តើគេហៅថាអ្វី ? ហេតុអ្វីបានជាការ បំបែក ប្រូស៊ីសូមដោយវីបូនុយក្លេអាស ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបញ្ឈប់ ?

- + កាលណាវីបូសូមតត្តាភ្ជាប់ដោយ ARNm គេហៅថាប្រូស៊ីសូម ។
- + ពីព្រោះម៉ូលេគុល ARNm ដែលជុកតំណភ្ជាប់នុយក្លេអូទីតសំរាប់កំណត់លំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ ក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារ វីបូនុយក្លេអាសដែលជា អង់ស៊ីមអ៊ីដ្រូលីស ARN ។

តើ ARN ដឹកនាំ (ARNt) មានទំរង់ដូចម្តេច ? ទំរង់របស់វាបង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេស ២ ដែលមានមុខងារអ្វីខ្លះ ?

ARNt បង្កដោយប្រាក់ វីបូនុយក្លេអូទីត១ ខ្សែ ។ ប្រាក់នេះបត់បែនក្នុង លំហ មានរាងជាដុំដោយចុងម្ខាងមានកន្លែង សំរាប់ភ្ជាប់អាស៊ីត

អាមីនេ ២ចុងម្ខាងទៀតបត់ជាកំពក 3 កំពកកណ្តាលមានអង់ទីកូដុង ។ ARNt ជាម៉ូលេគុលខ្លីជាងគេ មានចំនួននុយក្លេអូទីត តែពី 70 – 80 ។



លក្ខណៈពិសេស ២ របស់ ARNt មានមុខងារសំខាន់ពីរយ៉ាង :

- ចុងម្ខាងនៃម៉ូលេគុល សំរាប់ភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេយថាប្រភេទមួយ ។
- ចុងម្ខាងទៀតមានអង់ទីកូដុង សំរាប់ទទួលស្គាល់កូដុងនៃ ARNm (តាមបាសបំពេញគ្នា) ។

ដូច្នេះ ARNt ជាអ្នកត្រូវអាស៊ីតអាមីនេទៅនឹងកូដុង ARNm ។

ក្នុងការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេលើ ARNt តើត្រូវមានអន្តរាគមន៍ពីអ្វីខ្លះ?

ការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេ ១ លើ ARNt

ប្រព្រឹត្តឡើងដោយអន្តរាគមន៍នៃអង់ស៊ីមយថាប្រភេទៈ

អាមីណូអាស៊ីល ARNt សាំងតេតាស (Aminoacyl ARNt synthetase) និង ATP ដែលផ្តល់ថាមពលក្នុងការភ្ជាប់ ។



ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមាន ARNt ?

ពីព្រោះក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ARNm មានតំណដាច់ក្នុងខ្លួនដែលជាប្លង់សំរាប់កំណត់តំណដាច់អាស៊ីតអាមីនេក្នុងមូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ប៉ុន្តែអាស៊ីតអាមីនេទីមួយៗមិនអាចស្គាល់ក្នុងខ្លួនដោយផ្ទាល់លើ ARNm បានទេ ។ ដូចនេះចាំបាច់ត្រូវមាន ARNt ជាអ្នកតំណាងអាស៊ីតអាមីនេ ដោយមានអង់ទីកូដុងសំរាប់ទទួលស្គាល់ជាមួយកូដុង ARNm ។

ចូរនិយាយពីមូលេគុល ARN ទាំងសារ (ARNm) និងនាទីរបស់វា ។

ARN ទាំងសារ (ARNm) ជាប្រភេទមួយនៃអាស៊ីតរីបូស៊ីត ។ វាជាប្រភេទអាស៊ីតរីបូស៊ីតអូទីតទោល ដែលចំណងតំណដាច់នូវកូដុងកំណត់នៅលើខ្លួន តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-U, C-G ។ ARNm អាចកើតពីនូវកូដុងប្រហែល 150 ទៅ ២០០ កូដុងនូវកូដុងអូទីត ។ វាមានអាយុខ្លីជាង ARNr ។

ARNm មាននាទីបញ្ជូនព័ត៌មានសេនេទិចពីណ្ឌូយ៉ូទៅកាន់រីបូសូមដើម្បីកំណត់តំណដាច់

អាស៊ីតអាមីនេ ក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ។

248

ចូរនិយាយពីម៉ូលេគុលARN រីបូសូម (ARNr) និងនាទីរបស់វា ។

ARNr ជាប្រភេទមួយនៃអាស៊ីតរីបូស៊ីត ។ វាសំយោគចេញពីប្រាក់ម្ខាងនៃសែនក្នុងនុយក្លេអូសនៃណ្វៃយ៉ូ ។ ARNr ជាប្រាក់រីបូស៊ីតក្លាយជាអ៊ីនីយ៉ូ ខ្សែ អាចកើតពីរីបូស៊ីតក្លាយជាអ៊ីនីយ៉ូប្រហែល ពី 2500-5000 ។ វាជាម៉ូលេគុលដែលមានអាយុវែងជាង ARNm និង ARNt ។

ARNr មាននាទីចូលរួមជាមួយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើតជារីបូសូម ។

249


តើចលនការសំយោគប្រាក់ប៉ូលីប៊ីប៊ីទីតមួយ មានប៉ុន្មានដំណាក់ ?

+ មានបីដំណាក់ : - ដំណាក់ដំបូង - ដំណាក់លូតវែង - ដំណាក់បញ្ចប់

250

តើដំណាក់ការដំបូងនៃការសំយោគប្រូតេអ៊ីនកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ?


ចាប់ផ្តើមដោយឯកតារងទាំង 2 នៃរីបូសូម ទៅភ្ជាប់នឹងកូដុងផ្តើម AUG លើម៉ូលេគុល ARNm ។ បន្ទាប់មក ARNt បានដឹកមេត្យូនីនមកភ្ជាប់ នឹងកូដុងផ្តើមដោយតំរូវ អង់ទីកូដុងទៅនឹងកូដុងនៅក្នុងប្រហោងទី១ (ទីកន្លែង P) នៃរីបូសូម ។



តើដំណាក់កាលនៃការសំយោគប្រូតេអ៊ីន មានដំណើរយ៉ាងដូចម្តេច ?

ការបកប្រែកូដុង និងការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ :


- ARNt ធ្វើដឹកអាស៊ីតអាមីនេទៅ ដោយភ្ជាប់អង់ទីកូដុង ទៅនឹងកូដុងទី 2 នៃ ARNm នៅក្នុងប្រហោងទី 2 នៃរីបូសូម (កន្លែង A) ។
- ចំនងប៊ុបទីតកើតឡើងរវាងអាស៊ីតអាមីនេទី 1 និងទី 2 ដោយសារអង់ស៊ីម ។
- រីបូសូមផ្លាស់ទីទៅលើកូដុងមួយទៀត ធ្វើអោយទីកន្លែង A ទំនេរ ។ ARNt ទី 3 ដែលដឹកអាស៊ីតអាមីនេថ្មីមួយទៀត មកភ្ជាប់ជាមួយកូដុងបន្តបន្ទាប់ត្រង់ទីកន្លែង A ។
- បំណាស់ទីនៃរីបូសូមលើ ARNm ធ្វើអោយមានអំនានកូដុងបន្តបន្ទាប់ ដូចរបៀបខាងលើ ទាំងអោយមានកំនត្រវាក់ប៉ូលីប៊ុបទីតមួយ ។



តើដំណាក់កាលនៃការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេច ?

កាលណារីបូសូម ផ្លាស់ទីទៅដល់កូដុងស្តប (UAA ឬ UAG) ធាតុសំញ៉ា ARNm រីបូសូម ARNt ត្រូវកំប៉ូលីប៊ុបទីត បានបែកចេញពីគ្នា ។ ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវ បានបញ្ចប់ ។ រំពេចនោះ មេត្យូនីន (អាស៊ីតអាមីនេជាតូ ទី១កូដុងដើម) ក៏ផ្តាច់ចេញពីត្រូវកំប៉ូលី

ប៊ីបទីត ដែលទើប និងសំយោគរួច ។ ច្រវាក់អាស៊ីតអាល់ដេរីនដែលទើប និងកើតជាទំរង់ទី I រួច
បត់បែនក្នុងលំហជាទំរង់ទី II រួចទី III សំរាប់ប្រើប្រាស់ ។



ប្រ. ប្រូស៊ីន គ្រឹះភ្លឺភ័ន្ត លេងរ៉ឺន្ត កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

253

ហេតុអ្វីបានជា កាលណារីបូសូមផ្លាស់ទីទៅដល់កូដុងស្តុប សំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបញ្ចប់ ?

ពីព្រោះពេលរីបូសូមមកដល់កូដុងស្តុបពេលនោះ ARNm រីបូសូម ARNt និង ច្រវាក់
ប៊ូលីប៊ីបទីត ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា ។

254

តើជា ADN ដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនបានច្រើនប្រភេទហេតុអ្វី ?

ពីព្រោះមូលេគុល ADN មានសែនជាច្រើនដែលសុទ្ធតែខុសគ្នា ហើយប្រភេទសែនផ្សេងៗ
គ្នានេះផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានសំរាប់កំណត់ទំរង់ប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែរ ។

255

តើចលនការគីមីនៃបាតុភូតតំណពូជ មានអ្វីខ្លះ ?

ផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងចលនការគីមីទាំងនេះ ។

- គឺចលនការស្វ័យគំលើងទ្វេនៃ ADN និងចលនការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។
- ទំនាក់ទំនងនៃចលនការគីមីទាំង 2 នេះមានប្រយោជន៍ ធានានូវភាពដូចគ្នារវាងកូន និងមេបា ។

256 ហេតុដូចម្តេចបានជាគេថា សែនជាកត្តាកំនត់លក្ខណៈតព្វជនៃភាវវស្ស ?

ពីព្រោះសែន ជាអង្គតំណែងមូលដ្ឋាន ADN ដែលមានតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត យ៉ាងជាក់លាក់សំរាប់កំនត់តំនលំដាប់ប៊ូនុយក្លេអូទីត ARNm ហើយតំនលំដាប់នេះ កំនត់នូវតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ដែលជាម៉ូលេគុលមាននាទីកំនត់លក្ខណៈតព្វជនៃភាវវស្ស ។

សែន $\longrightarrow$ ARNm $\longrightarrow$ ប្រូតេអ៊ីន $\longrightarrow$ លក្ខណៈ

257 ហេតុដូចម្តេច បានជាគេថា ADN ជាសំភារៈសេនេទិច (សំភារៈតំនព្វជន) ?

ពីព្រោះម៉ូលេគុល ADN មានតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត.... (មើលបន្តចំណីយសំនួរទី 256) ។

258 ហេតុដូចម្តេច បានជាគេចាត់ទុកថា : ដំណើរសំយោគប្រូតេអ៊ីនជាដំណើរបំបែកប្រែ ?

ពីព្រោះម៉ូលេគុលដំបូង (ADN) ដែលដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានជួរពត៌មានសេនេទិចក្រោមរូបរាង ជាតំនលំដាប់នុយក្លេអូទីត តំនលំដាប់នេះត្រូវចំលងចេញជាម៉ូលេគុល ARNm ដែលត្រូវបកប្រែបន្តអោយទៅជាតំនលំដាប់ អាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុល ប្រូតេអ៊ីនដោយមាន ARNt ជាអ្នកតំរូវក្នុងបំបែកប្រែ ។

សំណួរ :

អង្គត់ ADN { - CAA - CCA - ACA - (ប្រភេទមួយ) -
 - GTT - GGT - TGT -
 បំណក { ARNm = - GUU - GGU - UGU - ម៉ូលេគុលមួយ
 ប្រេ { ARNt = - CAA - CCA - ACA - ម៉ូលេគុលមួយ
 ប្រូតេអ៊ីន = វ៉ាលីន - គីស៊ីន - ស៊ីស្តេអ៊ីន -

259

តើចលនកម្ម ដែលបានអោយកោសិកាក្នុងអាចសំយោគប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នា នឹងប្រូតេអ៊ីនកោសិកាមេ ? ឆ្លុះពន្យល់ ។

- + តើចលនកម្ម មីតូស ។
- + ពីព្រោះមីតូសផ្តល់ដល់កោសិកាក្នុង ទ្រូម៉ូសូម ឬ ADN ដូចកោសិកាមេ ។
- ម៉ូលេគុល ADN ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិច សំរាប់កំណត់ទម្រង់ប្រូតេអ៊ីន ដូច្នេះកោសិកាក្នុងដែលមាន ADN ដូចកោសិកាមេ ត្រូវសំយោគ ប្រូតេអ៊ីនដូចកោសិកាមេដែរ ។

260

ហេតុដូចម្តេច បានជាគេចាត់ទុកក្រូម៉ូសូមមានមុខងារក្នុងការចែងដល់កូដៈតព្វជនៃការវិវត្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ ?

ពីព្រោះក្រូម៉ូសូម មានធាតុបង្កើតជាម៉ូលេគុល ADN ដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិច សំរាប់កំណត់កូដៈតព្វជន ។ ក្រូម៉ូសូម ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអោយស៊ីកូតតាមរយៈការម៉ែតញី ឈ្មោលក្នុងពេលបង្កកំនើត ។ ស៊ីកូតធ្វើមីតូស ដែលធ្វើអោយគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយ ក្នុងមាន ក្រូម៉ូសូម (ADN) សំរាប់កំណត់កូដៈតព្វជន ដូចសារពាង្គកាយមេ ។

តើជាអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច មាននាទីសំខាន់បំផុត ក្នុងបាតុភូតនៃជីវិត ។ ចូរអ្នកពន្យល់ ។

បាតុភូតនៃជីវិត គឺជាការផ្លាស់ប្តូរជាថ្មី នៃសមាសភាពប្រូទីត ក្នុងសារពាង្គកាយ ។ ប្រូទីត ត្រូវបានសំយោគនៅលើរីបូសូម ។ តើអ្វីទៅដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគនេះ ? គឺអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច ដែលមាន ADN ជាពុម្ពគំរូ បង្កើតម៉ូលេគុល ARNm ។ ARNm ជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានសេនេទិចទៅកាន់រីបូសូម ឯARNt ជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេទៅកាន់រីបូសូម ហើយ ARNr ជាសមាសធាតុបង្កើនរីបូសូមដែលជាមេរោងជាង សំយោគ ។

ដូចនេះយើងឃើញថាប្រូទីតកើតមានឡើងដោយសារអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច (ADN និង ARN) ។ ហេតុនេះទើបតើជាអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច មាននាទីសំខាន់ក្នុងបាតុភូតជីវិត ។

តើចលនការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារអ្វីខ្លះ ? (ចូរសង្ខេបនាទី ដែលចូលរួម) ។


ចលនការសំយោគ ប្រូតេអ៊ីន ប្រព្រឹត្តបានដោយសារ :

- ADN : ជាម៉ូលេគុលដឹកព័ត៌មានសេនេទិចសំរាប់សំយោគចេញនូវម៉ូលេគុល ARN
- ARNm: ចំលងព័ត៌មានសេនេទិច រួចបញ្ជូនទៅកាន់រីបូសូម
- ARNt: ដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេ និងគំរូអង់ទីកូដុង ជាមួយកូដុង ARNm ។
- ARNr: ចូលរួមជាមួយប្រូតេអ៊ីន បង្កើតជារីបូសូម
- រីបូសូម: មេរោងជាងសំយោគប្រូតេអ៊ីន
- អង់ស៊ីម: ជួយសំរួលក្នុងការសំយោគ
- ATP: ផ្តល់ថាមពលក្នុងការសំយោគ

នេះជាទិដ្ឋភាពរួមនៃចលនាការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។

ក. តើ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ជាអ្វី ?

ខ. ចេញពីរូបភាពនេះ តើ ARN ទាំងបីប្រភេទមានកំនើតនៅឯណា ? សំយោគ ចេញពី មូលលេគណ៍អ្វី ?



ក. 1 = ADN

5- ឯកតារងតូចនៃប្រូសូម

8- ប៉ូលីប្រូតេអ៊ីន

2 = ARN

6- ឯកតារងធំនៃប្រូសូម

9- ឯកតារងទាំងប៉ាច់ចេញពីគ្នា

3 = ARNt

7- ឯកតារងទាំងប៉ាច់បន្តិច ARNm កំពុងដំណើរការ

4 = ARNm

ខ. ចេញពីរូបភាពនេះ តើ ARN ទាំងបីប្រភេទមានកំនើតនៅក្នុងណឺយ៉ូ ។ វាសំយោគចេញពី

មូលលេគណ៍ ADN ។

តើគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយតែមួយ មានសែនដូចគ្នា ទេ ? ពីព្រោះអ្វី ?

គ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយតែមួយមានសែនដូចគ្នា ពីព្រោះកោសិកាទាំងអស់ មានកំនើតពីស៊ីក្លូតតែមួយ ដែលចែកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាម មីតូស ។ មីតូសជាចលនាការរាប់រង នូវភាពដូចគ្នានៃក្រូម៉ូសូម ហេតុនេះ ADN ត្រូវតែដូចគ្នាទៅដោយសែនដូចគ្នាដែរ នៅគ្រប់ កោសិកាក្នុង ។

អាំងស៊ុយលីនជាអ្វីដែលសំយោគចេញតែពីកោសិកាលំពែង ។

- ក. តើអាំងស៊ុយលីន មានកំនើតជាអ្វី ?
- ខ. តើសែនដែលសំយោគចេញអ្វីមួយខាងលើនេះមានតែនៅក្នុងកោសិកាលំពែងនេះ ឬ អ្វី ? ចូរបញ្ជាក់អំនះអំណាចរបស់អ្នក ។

ក. អ្វីមួយនេះ មានកំនើតជាប្រូតេអ៊ីន ។

ខ. សែនដែលសំយោគអាំងស៊ុយលីននេះ មិនមែនមានតែនៅក្នុង កោសិកាលំពែងទេគឺ មាននៅគ្រប់កោសិកាសត្វលាស់នៃសារពាង្គកាយ ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកោសិកាផ្សេងទៀត សែន នេះមិនមានសកម្មភាពទេ គឺកោសិកាមានមុខងារខុសៗគ្នា ក្នុងការតំរូវសំយោគប្រូតេអ៊ីន ហើយវាសំយោគប្រូតេអ៊ីនណាដែលចាំបាច់ និងនៅឆ្ងល់ដែលវាត្រូវការ ។

ហេតុនេះហើយបានជាអ្វីមួយខាងលើ តំរូវសំយោគចេញតែពីសែននៃកោសិកាលំពែង ប៉ុណ្ណោះ ។

កោសិកាលំពែង មានសែនដឹកនាំសំយោគរសលំពែង ដែលជាសរសៃរាងអាហារ ។ តើសែន នេះដឹកនាំសំយោគគ្រប់ពេលវេលា ទេ ? ចូរពន្យល់ ។

សែននេះមិនសំយោគរសលំពែងគ្រប់ពេលវេលាទេ ។ សែននេះមានសកម្មភាពតែពេល
ណាដែលពោះវៀនត្រូវការសរសៃឈាមអាហារបំប្លែង ។

ពីព្រោះ កោសិកានីមួយៗ សំយោគតែប្រូតេអ៊ីនណាដែលចាំបាច់ចំពោះវា និងនៅពេល
ដែលវាត្រូវការការគាំទ្រមានការតំរូវសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។

267
ក្នុងការតំរូវសំយោគប្រូតេអ៊ីន តើមានសែនប៉ុន្មាន ចូលរួម ?

មានសែន 3 យ៉ាង :

- សែនទំរង់ : ជាសែនដែលមានពតិមានសេនេទិច សំរាប់ដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។
- សែនប្រតិបត្តិការ : ជាសែនដែលមាននាទីបញ្ជាសែនទំរង់ ។
- សែនតំរូវ រឺ សែនត្រួតពិនិត្យ : ជាសែនដែលទទួលឥទ្ធិពលពីស៊ីតូគីន ហើយមាននាទី
បញ្ជាទៅលើសែនប្រតិបត្តិការ ។

268
ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកថា “តំនពូជ គឺជាការបញ្ជូនពតិមានពីឈ្មោយ្យទៅកាន់រីបូសូម” ជា
“ដំណើរបញ្ជូនទំរង់ប្រូតេអ៊ីន ?”

តំនពូជ ជាបុគ្គលកម្មដែលមេបាបញ្ជូនបណ្តុលកូណៈរបស់ខ្លួន (បញ្ជូនទំរង់ប្រូតេអ៊ីន)
ទៅអោយកូននៅជំនាន់ក្រោយ ។

ការបញ្ជូននេះ កើតឡើងតាមរយៈការម៉ែតមេបាដែលរលាយចូលគ្នា បង្កើតជាស៊ីតូត ដូច្នេះ
ADN របស់ស៊ីតូត គឺជា ADN មេបាដែលមានសែនជាច្រើន ហើយទុកនូវពតិមានសេនេទិច
ពតិមាននេះត្រូវបញ្ជូនពីឈ្មោយ្យទៅកាន់ រីបូសូមដើម្បីសំយោគប្រូតេអ៊ីនកំនត់លក្ខណៈ សារ
ពាង្គកាយកូន ។

ហេតុនេះ គេចាត់ទុកតំនពូជ គឺជាការបញ្ជូនពតិមានពីឈ្មោយ្យទៅកាន់រីបូសូម ។

តើមេរោគ ដែលបង្កជំងឺអេដស៍ជាអ្វី ?

វាមានទំរង់ដូចម្តេច ?

+ មេរោគបង្កជំងឺអេដស៍ គឺ ជាវីរុស HIV (Humain Immuno deficiency Virus) ។

+ វាមានទំហំ 100nm (10^{-10} m) ។ មេរោគអេដស៍បង្កឡើងដោយ :

- ផ្នែកខាងក្រៅ (សំបកក្រៅ) ជាប្រូតេអ៊ីន

- ផ្នែកខាងក្នុង (ណ្វៃយ៉ូ) មានប្រូតេអ៊ីន


និង ARN ពីរម៉ូលេគុល ។ អង់ស៊ីមត្រង់ស្ត្រីបតាសច្រាស

សំគាល់ : +ប្រូតេអ៊ីន : ជាអង់ស៊ីម

ត្រង់ស្ត្រីបតាសច្រាស ។ gp120, gp41 :

ជាប្រូតេអ៊ីនសំរាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង CD₄ ។

p18, p25, p7-p9 : ជាប្រូតេអ៊ីនទំរង់ ។



ក. តើសំភារៈសេនេទិច របស់វីរុស HIV ជា ADN ឬ ARN ?


ខ. ហេតុអ្វីបានជាគេហៅ HIV ជាវេត្រូវីរុស (retrovirus)

ក. សំភារៈសេនេទិចរបស់វីរុស HIV ជា ARN ។

ខ. បានជាគេហៅ HIV ថាជាវេត្រូវីរុស ពីព្រោះវីរុសនេះមានសំភារៈសេនេទិចជា ARN ដែលអាចចំលងទៅជា ADN ដោយអង់ស៊ីមត្រង់ស្ត្រីបតាសច្រាស ។

តើ HIV ភាគច្រើនជាបរាសិតនៃកោសិកាអ្វី ? ពេលវាចូលទៅក្នុងកោសិកានោះហើយតើវាបន្តពូជ តាមរបៀបដូចម្តេច ?

- + ភាគច្រើន វីរុស HIV ជាបរាសិតនៃឡាំផូស៊ីត T_4 ។
- + ពេលវាចូលទៅក្នុងឡាំផូស៊ីត T_4 វាចំណងព័ត៌មានសេនេទិចរបស់វា ដែលជា ARN អោយទៅជា ADN ដោយអង់ស៊ីមត្រង់ស្រូបតាស ។ ADN ដែលចំណងរួច (ប្រូវីរុស) ត្រូវផ្សេងចូលទៅក្នុង ADN នៃឡាំផូស៊ីត ។ ប្រូវីរុសបញ្ចេញអោយមានការផលិតវីរុសថ្មីជាច្រើន (សំយោគប្រូតេអ៊ីន និង ARN របស់វីរុស) ។ កាលណាវីរុស HIV កើតការចែកច្រើនឡាំផូស៊ីត ជួបបែកហើយវាក៏ផ្សេងចូលទៅក្នុងកោសិកាផ្សេងៗទៀត ។



តើវីរុស HIV ផ្សេងចូលទៅក្នុងឡាំផូស៊ីត T_4 តាមរបៀបដូចម្តេច ?

នៅលើស្រោមនៃវីរុស HIV មានប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាង (gp 120) ដែលបានភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំង ទៅនឹង CD₄ ដែលជាប្រូតេអ៊ីន ស្ថិតនៅលើភ្លាសឡាំដូស៊ីត T₄ (ឬ ភ្លាសកោសិកាសាំមួយ ចំនួន) ។ ការភ្ជាប់នេះអាចអោយវីរុស HIV បញ្ចូលនូវផ្នែកខាងក្នុងរបស់ខ្លួន (ប្រូតេអ៊ីន ARN) ទៅក្នុងឡាំដូស៊ីត ។

សំណួរដកស្រង់ពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំ

I. ចូរឆ្លើយ

1. កំឡិតកាត់ R របស់អាឡានីន : - CH₃

កំឡិតកាត់ R របស់វ៉ាលីន : - CH $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$

ក. សរសេររូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីនេទាំង 2 ។

ខ. សរសេររូបមន្តឌីប៊ុបទីតកើតពីអាស៊ីតអាមីនេទាំង 2 ។

2. តើយ៉ាងណាប្រភេទនៃនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនបណ្តាលមកពីអ្វី ?

3. តំនល់ដាច់បាតនៃច្រវាក់របស់ ADN មានដូចខាងក្រោម :

A - T - C - C - G - T - A - T - C (1)

ក. ចូររកតំនល់ដាច់នៃច្រវាក់ម្ខាងទៀត (2) ដែលបំពេញជាមួយច្រវាក់ (1) ខាងលើ របស់ ADN ។

ខ. ចូរសរសេរតំនល់ដាច់របស់ ARNm ដែលសំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាង (2) ជាកូដុង ច្រវាក់ខាងលើ (1) ។


គ. តើអង់ទីកូដុងណាខ្លះរបស់ ARNt ដែលជាគូ នឹងកូដុង ARNm ?

ឃ. តើអាស៊ីតអាមីនេ ដែលមានក្រុមនៅលើម៉ូលេគុល ADN ខាងលើមានចំនួនប៉ុន្មាន ?


4. រូបនេះបង្ហាញពីបំណកស្រាយក្រុមសេនេទិច

ក. ចូរដាក់ឈ្មោះទំរង់ម៉ូលេគុល (1, 2, 3, 4) ។

ខ. ចូរបកស្រាយដំណើរការនេះ




II ចូរបំពេញបន្ថែមក្នុងតំនួសបំពេញខាងក្រោម :




ចំណើន :

1. 1. ក. រូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាល់មីន :


អាឡាឡីន :



វ៉ាលីន :




ខ. រូបមន្តឌីប៊ីប៊ីត កើតពីអាស៊ីតអាល់មីន អាឡាឡីន និងវ៉ាលីន :



អាឡាឡីន

វ៉ាលីន



ឌីប៊ីប៊ីត

ឌីប៊ីប៊ីត

2. មើលសំណួរទី 213 ចំនួន 2 ឬ 214

3. តំណភ្ជាប់បេសនៃប្រភេទអាស៊ីតរាវ ADN :

A - T - C - C - G - T - A - T - C (1)

ក. តំណភ្ជាប់នៃប្រភេទអាស៊ីតរាវទៀតដែលបំពេញជាមួយប្រភេទ (1) បេស ADN :

T - A - G - G - C - A - T - A - G (2)

ខ. តំណភ្ជាប់នៃបេសរាវ ARNm ដែលបំពេញជាមួយប្រភេទ (2) :

A - U - C - C - G - U - A - U - C

គ. អង់តីកូដុង ARNt :

U - A - G, G - C - A, U - A - G

ឃ. ម៉ូលេគុល ADN ខាងលើមានក្រុមរបស់អាស៊ីតអាមីនេចំនួនបី ។

4. ក.1 ADN ច្រវាក់ទ្វេ

4. ARN:

2. ARNm

3. អាស៊ីតអាមីនេ ភ្ជាប់ជាមួយស្ករ

3. ADN ដែលមានព័ត៌មានសេនេទិច ស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ ។ ARNm ចំណង
យ៉ាងត្រឹម ត្រូវនូវក្រុមចេញពី ADN រួចចាកចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅកាន់រីបូសូម ។ រីបូសូម ជា
កន្លែងសំយោគ ប្រូតេអ៊ីន ។ ARN: ដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេទៅកាន់រីបូសូម ។ ប្រូតេអ៊ីន
ដែលសំយោគបានត្រូវ គ្នាទាំងត្រីប្រភេទនៃក្រុម (កូដុង) នៅលើ ARNm ។

II. 1. ARN

2. ARNm

3. ARN:

4. កូដុង

5. អង់ទីកូដុង

6. រីបូសូម



ចប់
ភាគ I